

**รายงานเบื้องต้น
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2553**

**การประชุมวิชาการ : มหกรรมจัดความรู้ปี ๒๕๕๔
โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง
ทรงห่วงใยประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔**

**"สังคมไทยไร้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วยพระ
บารมีปกเกล้า"**

๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ อาคาร อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

**กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค**

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ.2553	1
ตารางที่ 1.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553	2-3
ตารางที่ 1.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ.2553	4-5
ตารางที่ 2.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ.2553	6
ตารางที่ 2.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553	7-8
ตารางที่ 2.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร ²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัดที่ พ.ศ.2553	9-10
ตารางที่ 3.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	11
ตารางที่ 3.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	12-13
ตารางที่ 3.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	14-15
ตารางที่ 4.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	16
ตารางที่ 4.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	17-18
ตารางที่ 4.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	19-20
ตารางที่ 5.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	21
ตารางที่ 5.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	22-23
ตารางที่ 5.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	24-45
ตารางที่ 6.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	26
ตารางที่ 6.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	27-28
ตารางที่ 6.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	29-30

ตารางที่ 7.1	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ย > 2 แก้วมาตรฐาน/วัน, หญิงดื่มเฉลี่ย > 1 แก้วมาตรฐาน/วัน) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	31
ตารางที่ 7.2	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ย > 2 แก้วมาตรฐาน/วัน, หญิงดื่มเฉลี่ย > 1 แก้วมาตรฐาน/วัน) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี	32-33
ตารางที่ 7.3	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ย > 2 แก้วมาตรฐาน/วัน, หญิงดื่มเฉลี่ย > 1 แก้วมาตรฐาน/วัน) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	34-35
ตารางที่ 8.1	ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	36
ตารางที่ 8.1	ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	37-38
ตารางที่ 8.1	ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	39-40
ตารางที่ 9.1	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	41
ตารางที่ 9.1	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	42-43
ตารางที่ 9.1	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	44-45
ตารางที่ 10.1	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	46
ตารางที่ 10.2	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	47-48
ตารางที่ 10.3	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	49-50
ตารางที่ 11.1	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553	51
ตารางที่ 11.2	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553	52-53
ตารางที่ 11.3	ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553	54-55
ภาคผนวก		56-57

ตารางที่ 1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ.2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	1,008	423,061	8.9	0.5	7.9	9.8
25 - 34	1,848	770,448	17.2	0.7	15.9	18.6
35 - 44	2,490	1,090,924	21.8	0.6	20.6	22.9
45 - 54	2,104	954,384	25.0	0.9	23.3	26.7
55 - 64	3,097	527,565	22.9	0.7	21.6	24.2
65 - 74	1,184	204,984	20.8	1.0	18.8	22.8
รวม	11,731	3,971,366	18.6	0.4	17.9	19.3
หญิง						
15 - 24	854	361,075	8.2	0.4	7.4	9.1
25 - 34	1,743	767,565	17.9	0.8	16.5	19.4
35 - 44	3,295	1,520,070	28.5	0.7	27.0	30.0
45 - 54	3,075	1,405,878	34.5	0.8	32.9	36.1
55 - 64	4,259	821,768	34.3	0.8	32.8	35.8
65 - 74	1,583	297,243	28.1	1.2	25.8	30.4
รวม	14,809	5,173,598	24.0	0.4	23.3	24.8
ชายและหญิง						
15 - 24	1,862	784,136	8.6	0.3	7.9	9.2
25 - 34	3,591	1,538,013	17.6	0.5	16.6	18.6
35 - 44	5,785	2,610,994	25.2	0.5	24.3	26.2
45 - 54	5,179	2,360,261	29.9	0.7	28.6	31.2
55 - 64	7,356	1,349,333	28.7	0.6	27.6	29.9
65 - 74	2,767	502,227	24.6	0.8	22.9	26.2
รวมทั้งประเทศ	26,540	9,144,964	21.3	0.3	20.7	21.9

ตารางที่ 1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย \geq 25 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	14,533	3,486,281	24.2	0.5	23.1	25.2
นอกเขตเทศบาล	12,007	5,658,683	19.9	0.4	19.2	20.6
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	456	1,149,921	28.9	1.5	25.9	31.9
ภาคกลาง	9,120	2,277,845	21.7	0.5	20.7	22.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,266	2,882,125	19.3	0.5	18.3	20.4
ภาคเหนือ	5,698	1,704,304	21.6	0.6	20.4	22.8
ภาคใต้	5,000	1,130,768	20.2	0.6	19.1	21.3
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขตตรวจราชการที่ 1	1,310	437,547	20.3	1.2	17.8	22.7
เขตตรวจราชการที่ 2	1,503	253,984	23.2	1.1	21.1	25.4
เขตตรวจราชการที่ 3	1,828	449,277	21.1	1.4	18.4	23.8
เขตตรวจราชการที่ 4	1,480	498,233	21.7	0.9	19.9	23.5
เขตตรวจราชการที่ 5	1,509	221,673	20.6	1.1	18.5	22.7
เขตตรวจราชการที่ 6	1,402	468,106	20.3	1.0	18.3	22.4
เขตตรวจราชการที่ 7	2,001	268,627	22.7	0.8	21.0	24.3
เขตตรวจราชการที่ 8	1,597	394,035	18.7	0.9	16.9	20.4
เขตตรวจราชการที่ 9	1,490	417,131	23.9	1.3	21.3	26.4
เขตตรวจราชการที่ 10	1,488	531,540	21.6	1.0	19.8	23.5
เขตตรวจราชการที่ 11	971	266,739	18.6	1.1	16.4	20.7
เขตตรวจราชการที่ 12	1,187	657,035	18.2	1.2	15.9	20.5
เขตตรวจราชการที่ 13	1,282	514,757	18.2	0.9	16.5	20.0
เขตตรวจราชการที่ 14	1,338	912,054	19.9	1.3	17.4	22.4
เขตตรวจราชการที่ 15	1,207	441,227	21.2	1.4	18.4	23.9
เขตตรวจราชการที่ 16	1,183	320,175	17.6	0.8	15.9	19.2
เขตตรวจราชการที่ 17	1,802	516,841	22.4	1.4	19.7	25.0
เขตตรวจราชการที่ 18	1,506	426,061	25.4	1.1	23.2	27.5

ตารางที่ 1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย \geq 25 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
เขต สปสช.ที่ 1	2,390	761,402	19.5	0.9	17.8	21.2
เขต สปสช.ที่ 2	1,802	516,841	22.4	1.4	19.7	25.0
เขต สปสช.ที่ 3	1,877	475,885	25.0	1.0	23.1	27.0
เขต สปสช.ที่ 4	2,876	687,612	21.4	0.9	19.6	23.2
เขต สปสช.ที่ 5	2,989	719,906	21.4	0.7	20.0	22.8
เขต สปสช.ที่ 6	2,884	820,503	22.2	1.0	20.3	24.1
เขต สปสช.ที่ 7	1,513	698,582	18.2	1.1	16.0	20.3
เขต สปสช.ที่ 8	2,133	756,732	20.7	0.8	19.2	22.2
เขต สปสช.ที่ 9	1,338	912,054	19.9	1.3	17.4	22.4
เขต สปสช.ที่ 10	1,282	514,757	18.2	0.9	16.5	20.0
เขต สปสช.ที่ 11	2,646	575,840	20.9	0.9	19.1	22.7
เขต สปสช.ที่ 12	2,354	554,929	19.6	0.7	18.2	21.0
เขตสำนักป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	956	348,680	20.0	1.5	17.1	22.9
เขต สคร. ที่ 2	1,857	342,851	22.7	0.9	21.0	24.4
เขต สคร. ที่ 3	3,318	866,408	22.3	0.9	20.5	24.2
เขต สคร. ที่ 4	2,989	719,906	21.4	0.7	20.0	22.8
เขต สคร. ที่ 5	1,338	912,054	19.9	1.3	17.4	22.4
เขต สคร. ที่ 6	2,675	1,188,575	19.6	0.8	18.1	21.1
เขต สคร. ที่ 7	2,253	781,496	18.3	0.7	17.0	19.7
เขต สคร. ที่ 8	1,506	426,061	25.4	1.1	23.2	27.5
เขต สคร. ที่ 9	1,802	516,841	22.4	1.4	19.7	25.0
เขต สคร. ที่ 10	2,390	761,402	19.5	0.9	17.8	21.2
เขต สคร. ที่ 11	2,646	575,840	20.9	0.9	19.1	22.7
เขต สคร. ที่ 12	2,354	554,929	19.6	0.7	18.2	21.0

ตารางที่ 1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย \geq 25 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ.2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	456	1,149,921	28.9	1.5	25.9	31.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	344	168,950	20.3	3.0	14.4	26.3
นนทบุรี	332	137,202	17.8	2.5	12.9	22.8
ปทุมธานี	200	81,958	18.9	2.5	14.1	23.7
พระนครศรีอยุธยา	424	129,519	24.0	2.1	19.8	28.2
อ่างทอง	401	49,516	23.8	1.5	20.8	26.8
ลพบุรี	387	124,315	24.2	2.0	20.3	28.1
สิงห์บุรี	344	30,329	20.0	1.3	17.5	22.5
ชัยนาท	371	49,824	22.6	2.2	18.3	27.0
สระบุรี	354	88,868	21.2	1.3	18.6	23.8
ชลบุรี	457	237,271	26.9	2.4	22.2	31.7
ระยอง	278	65,549	16.8	2.6	11.7	21.9
จันทบุรี	344	77,956	23.3	1.9	19.7	27.0
ตราด	411	36,354	25.4	1.4	22.6	28.2
ฉะเชิงเทรา	344	97,095	21.1	2.7	15.8	26.3
ปราจีนบุรี	402	74,823	22.9	2.0	19.1	26.8
นครนายก	434	45,904	25.6	1.7	22.2	29.0
สระแก้ว	304	62,504	18.8	2.1	14.7	22.9
ราชบุรี	360	122,900	22.4	1.8	18.9	26.0
กาญจนบุรี	370	112,630	21.0	2.1	16.9	25.1
สุพรรณบุรี	403	132,536	22.4	1.6	19.2	25.6
นครปฐม	347	130,167	21.1	1.8	17.5	24.7
สมุทรสาคร	383	56,690	21.1	2.3	16.6	25.6
สมุทรสงคราม	407	30,919	22.1	3.1	16.0	28.3
เพชรบุรี	406	77,323	24.0	1.2	21.6	26.4
ประจวบคีรีขันธ์	313	56,741	16.4	2.0	12.5	20.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	326	375,584	20.6	2.7	15.2	25.9
บุรีรัมย์	337	202,821	19.3	1.9	15.6	23.0
สุรินทร์	291	153,368	16.5	1.8	12.9	20.1
ศรีสะเกษ	258	149,659	15.5	1.6	12.3	18.8
อุบลราชธานี	309	241,581	20.0	1.5	17.1	23.0
ยโสธร	357	71,900	17.5	1.5	14.5	20.5
ชัยภูมิ	384	180,281	23.0	1.5	20.0	26.0
อำนาจเจริญ	358	51,618	21.0	1.9	17.3	24.7
หนองบัวลำภู	390	81,738	23.2	1.5	20.2	26.2
ขอนแก่น	339	277,487	22.0	2.3	17.4	26.6
อุดรธานี	350	214,920	19.9	1.5	17.0	22.9
เลย	334	89,814	20.5	1.6	17.5	23.6
หนองคาย	414	145,068	24.7	2.2	20.3	29.0

ตารางที่ 1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย \geq 25 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ.2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	328	105,747	14.8	2.2	10.5	19.1
ร้อยเอ็ด	272	177,074	18.7	1.4	16.0	21.4
กาฬสินธุ์	248	96,727	14.1	1.3	11.5	16.7
สกลนคร	337	141,500	19.2	1.5	16.2	22.2
นครพนม	308	83,693	18.2	2.1	14.0	22.3
มุกดาหาร	326	41,547	17.6	2.0	13.6	21.6
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	322	248,605	22.6	2.4	17.9	27.3
ลำพูน	277	48,811	16.1	1.5	13.1	19.1
ลำปาง	347	123,817	22.0	1.5	19.0	25.0
อุตรดิตถ์	292	60,072	19.5	1.8	15.9	23.0
แพร่	319	65,053	19.0	1.8	15.4	22.5
น่าน	302	44,681	14.5	1.7	11.2	17.8
พะเยา	275	60,917	16.6	1.7	13.3	19.9
เชียงราย	287	149,524	18.6	1.4	15.8	21.3
แม่ฮ่องสอน	261	19,995	16.9	2.8	11.4	22.3
นครสวรรค์	377	160,982	24.8	1.8	21.3	28.3
อุทัยธานี	353	49,083	22.8	2.1	18.6	27.0
กำแพงเพชร	340	94,930	21.5	1.9	17.6	25.3
ตาก	358	65,472	22.3	2.5	17.4	27.2
สุโขทัย	398	102,206	23.5	2.4	18.7	28.2
พิษณุโลก	377	127,225	21.7	2.9	16.1	27.4
พิจิตร	436	121,067	32.3	2.0	28.3	36.3
เพชรบูรณ์	377	161,866	23.6	3.2	17.3	29.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	310	178,772	18.7	2.0	14.8	22.6
กระบี่	393	66,554	24.1	2.1	20.0	28.1
พังงา	419	41,962	24.7	2.7	19.5	30.0
ภูเก็ต	388	48,552	21.3	2.0	17.4	25.2
สุราษฎร์ธานี	359	141,670	21.0	1.7	17.7	24.3
ระนอง	409	27,259	23.8	1.1	21.5	26.0
ชุมพร	368	71,071	21.0	1.7	17.7	24.3
สงขลา	293	163,170	18.1	1.5	15.3	21.0
สตูล	352	39,887	21.6	1.2	19.2	24.0
ตรัง	392	84,300	21.3	1.2	19.0	23.7
พัทลุง	365	76,593	23.1	1.5	20.1	26.1
ปัตตานี	341	63,299	18.2	2.7	12.8	23.6
ยะลา	318	51,857	19.5	1.2	17.2	21.9
นราธิวาส	293	75,823	18.4	2.1	14.4	22.5

ตารางที่ 2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ.2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	236	99,795	2.1	0.2	1.6	2.6
25 - 34	374	145,481	3.3	0.4	2.5	4.0
35 - 44	391	167,569	3.3	0.3	2.7	4.0
45 - 54	329	138,701	3.6	0.4	2.9	4.4
55 - 64	447	70,320	3.1	0.3	2.6	3.6
65 - 74	162	27,973	2.8	0.4	2.0	3.7
รวม	1,939	649,838	3.0	0.2	2.7	3.4
หญิง						
15 - 24	245	96,799	2.2	0.2	1.8	2.6
25 - 34	474	198,883	4.6	0.4	3.9	5.4
35 - 44	798	347,452	6.5	0.4	5.7	7.3
45 - 54	694	331,620	8.1	0.5	7.2	9.1
55 - 64	969	180,005	7.5	0.4	6.8	8.2
65 - 74	342	64,492	6.1	0.6	5.0	7.2
รวม	3,522	1,219,251	5.7	0.2	5.3	6.0
ชายและหญิง						
15 - 24	481	196,594	2.1	0.2	1.8	2.5
25 - 34	848	344,363	3.9	0.3	3.4	4.5
35 - 44	1,189	515,021	5.0	0.2	4.5	5.5
45 - 54	1,023	470,320	6.0	0.3	5.3	6.6
55 - 64	1,416	250,325	5.3	0.2	4.8	5.8
65 - 74	504	92,465	4.5	0.4	3.8	5.3
รวมทั้งประเทศ	5,461	1,869,088	4.4	0.1	4.1	4.6

ตารางที่ 2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	3,202	804,944	5.6	0.3	5.1	6.1
นอกเขตเทศบาล	2,259	1,064,145	3.7	0.1	3.5	4.0
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	103	277,490	7.0	0.9	5.3	8.7
ภาคกลาง	1,998	505,529	4.8	0.2	4.4	5.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,132	489,477	3.3	0.2	2.9	3.6
ภาคเหนือ	1,108	350,407	4.4	0.3	3.9	5.0
ภาคใต้	1,120	246,185	4.4	0.3	3.9	4.9
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขตตรวจราชการที่ 1	294	90,659	4.2	0.4	3.4	5.0
เขตตรวจราชการที่ 2	343	60,947	5.6	0.6	4.5	6.7
เขตตรวจราชการที่ 3	394	101,179	4.8	0.6	3.6	5.9
เขตตรวจราชการที่ 4	335	111,461	4.9	0.4	4.2	5.6
เขตตรวจราชการที่ 5	314	44,047	4.1	0.3	3.5	4.7
เขตตรวจราชการที่ 6	289	94,252	4.1	0.5	3.2	5.0
เขตตรวจราชการที่ 7	464	58,310	4.9	0.4	4.1	5.8
เขตตรวจราชการที่ 8	367	93,623	4.4	0.4	3.6	5.3
เขตตรวจราชการที่ 9	318	97,237	5.6	0.5	4.6	6.6
เขตตรวจราชการที่ 10	262	85,217	3.5	0.4	2.8	4.2
เขตตรวจราชการที่ 11	164	42,755	3.0	0.4	2.2	3.7
เขตตรวจราชการที่ 12	194	96,005	2.7	0.3	2.0	3.3
เขตตรวจราชการที่ 13	254	89,640	3.2	0.3	2.6	3.8
เขตตรวจราชการที่ 14	258	175,860	3.8	0.4	3.0	4.6
เขตตรวจราชการที่ 15	210	85,710	4.1	0.7	2.8	5.4
เขตตรวจราชการที่ 16	189	53,853	3.0	0.3	2.4	3.5
เขตตรวจราชการที่ 17	371	105,305	4.6	0.5	3.7	5.5
เขตตรวจราชการที่ 18	338	105,539	6.3	0.6	5.2	7.4

ตารางที่ 2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย \geq 30 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ.2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
เขต สปสช.ที่ 1	399	139,564	3.6	0.4	2.8	4.3
เขต สปสช.ที่ 2	371	105,305	4.6	0.5	3.7	5.5
เขต สปสช.ที่ 3	403	114,681	6.0	0.5	5.0	7.0
เขต สปสช.ที่ 4	671	153,835	4.8	0.3	4.1	5.5
เขต สปสช.ที่ 5	649	155,508	4.6	0.3	4.1	5.1
เขต สปสช.ที่ 6	613	187,043	5.1	0.4	4.2	5.9
เขต สปสช.ที่ 7	251	103,264	2.7	0.3	2.1	3.3
เขต สปสช.ที่ 8	369	120,713	3.3	0.3	2.8	3.8
เขต สปสช.ที่ 9	258	175,860	3.8	0.4	3.0	4.6
เขต สปสช.ที่ 10	254	89,640	3.2	0.3	2.6	3.8
เขต สปสช.ที่ 11	590	125,657	4.6	0.4	3.7	5.4
เขต สปสช.ที่ 12	530	120,528	4.2	0.3	3.6	4.9
เขตสำนักป้องกันควบคุมโรค.						
เขต สคร. ที่ 1	224	73,548	4.2	0.5	3.3	5.1
เขต สคร. ที่ 2	413	78,058	5.2	0.5	4.3	6.1
เขต สคร. ที่ 3	712	198,415	5.1	0.4	4.3	5.9
เขต สคร. ที่ 4	649	155,508	4.6	0.3	4.1	5.1
เขต สคร. ที่ 5	258	175,860	3.8	0.4	3.0	4.6
เขต สคร. ที่ 6	456	181,222	3.0	0.3	2.5	3.5
เขต สคร. ที่ 7	418	132,396	3.1	0.2	2.7	3.6
เขต สคร. ที่ 8	338	105,539	6.3	0.6	5.2	7.4
เขต สคร. ที่ 9	371	105,305	4.6	0.5	3.7	5.5
เขต สคร. ที่ 10	399	139,564	3.6	0.4	2.8	4.3
เขต สคร. ที่ 11	590	125,657	4.6	0.4	3.7	5.4
เขต สคร. ที่ 12	530	120,528	4.2	0.3	3.6	4.9

ตารางที่ 2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัดที่ พ.ศ.2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	103	277,490	7.0	0.9	5.2	8.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	71	42,287	5.1	1.4	2.3	71
นนทบุรี	71	23,828	3.1	0.7	1.7	71
ปทุมธานี	44	18,208	4.2	0.4	3.4	44
พระนครศรีอยุธยา	109	31,512	5.8	1.0	3.9	109
อ่างทอง	80	9,020	4.3	0.7	2.9	80
ลพบุรี	102	34,499	6.7	1.1	4.6	102
สิงห์บุรี	96	8,285	5.5	0.7	4.1	96
ชัยนาท	65	9,143	4.2	0.8	2.6	65
สระบุรี	70	17,111	4.1	0.8	2.5	70
ชลบุรี	103	61,324	7.0	1.0	5.0	103
ระยอง	49	10,445	2.7	0.6	1.5	49
จันทบุรี	75	17,524	5.2	0.6	4.1	75
ตราด	91	7,944	5.5	0.5	4.5	91
ฉะเชิงเทรา	73	18,778	4.1	0.8	2.5	73
ปราจีนบุรี	84	14,057	4.3	0.6	3.2	84
นครนายก	99	11,372	6.4	1.1	4.1	99
สระแก้ว	67	14,683	4.4	0.7	3.0	67
ราชบุรี	93	32,809	6.0	0.9	4.2	93
กาญจนบุรี	83	24,299	4.5	0.6	3.3	83
สุพรรณบุรี	100	31,679	5.3	0.7	3.9	100
นครปฐม	59	22,674	3.7	0.5	2.6	59
สมุทรสาคร	84	12,441	4.6	0.9	2.9	84
สมุทรสงคราม	97	6,842	4.9	1.0	3.0	97
เพชรบุรี	80	14,711	4.6	0.5	3.5	80
ประจวบคีรีขันธ์	53	10,052	2.9	0.4	2.1	53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	62	68,123	3.7	0.7	2.3	5.1
บุรีรัมย์	74	47,127	4.5	0.9	2.7	6.3
สุรินทร์	50	26,986	2.9	0.8	1.3	4.5
ศรีสะเกษ	53	26,743	2.8	0.5	1.8	3.8
อุบลราชธานี	59	40,316	3.3	0.5	2.3	4.3
ยโสธร	62	10,482	2.6	0.5	1.6	3.5
ชัยภูมิ	72	33,624	4.3	0.7	2.8	5.7
อำนาจเจริญ	80	12,099	4.9	0.7	3.6	6.3
หนองบัวลำภู	72	14,986	4.3	0.7	2.8	5.7
ขอนแก่น	60	48,192	3.8	0.9	2.1	5.5
อุดรธานี	56	30,905	2.9	0.6	1.7	4.0
เลย	52	13,024	3.0	0.6	1.8	4.1
หนองคาย	82	26,302	4.5	0.8	2.9	6.0

ตารางที่ 2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัม/เมตร²) ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัดที่สำรวจ พ.ศ.2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	68	18,527	2.6	0.6	1.5	3.7
ร้อยเอ็ด	36	17,886	1.9	0.4	1.0	2.7
กาฬสินธุ์	30	11,400	1.7	0.3	1.0	2.3
สกลนคร	64	25,001	3.4	0.5	2.3	4.5
นครพนม	43	10,495	2.3	0.7	1.0	3.6
มุกดาหาร	57	7,260	3.1	0.7	1.7	4.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	62	53,852	4.9	1.2	2.6	7.2
ลำพูน	40	7,415	2.4	0.5	1.5	3.4
ลำปาง	57	19,428	3.4	0.6	2.3	4.6
อุตรดิตถ์	51	9,878	3.2	0.5	2.2	4.2
แพร่	54	10,880	3.2	0.6	2.0	4.3
น่าน	45	5,475	1.8	0.5	0.7	2.8
พะเยา	40	9,399	2.6	0.5	1.6	3.5
เชียงราย	50	28,100	3.5	0.4	2.6	4.4
แม่ฮ่องสอน	51	5,016	4.2	1.0	2.2	6.2
นครสวรรค์	79	43,808	6.8	1.0	4.8	8.7
อุทัยธานี	80	12,898	6.0	1.4	3.2	8.7
กำแพงเพชร	84	22,611	5.1	0.8	3.6	6.6
ตาก	72	16,509	5.6	1.3	3.1	8.1
สุโขทัย	83	18,618	4.3	1.0	2.4	6.2
พิษณุโลก	80	23,916	4.1	0.9	2.3	5.9
พิจิตร	95	26,221	7.0	1.1	4.8	9.2
เพชรบูรณ์	85	36,383	5.3	1.0	3.4	7.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	66	39,278	4.1	0.9	2.3	5.9
กระบี่	95	17,015	6.1	0.9	4.4	7.9
พังงา	96	9,173	5.4	1.3	2.9	8.0
ภูเก็ต	83	10,298	4.5	1.0	2.5	6.5
สุราษฎร์ธานี	67	28,454	4.2	0.7	2.8	5.6
ระนอง	102	7,216	6.3	1.4	3.6	9.0
ชุมพร	81	14,222	4.2	0.6	3.1	5.3
สงขลา	60	38,070	4.2	0.8	2.7	5.7
สตูล	69	6,472	3.5	0.6	2.3	4.7
ตรัง	88	14,607	3.7	0.4	2.8	4.6
พัทลุง	75	12,298	3.7	0.5	2.7	4.7
ปัตตานี	91	16,850	4.9	1.1	2.8	6.9
ยะลา	72	10,713	4.0	0.4	3.2	4.9
นราธิวาส	75	21,517	5.2	0.9	3.4	7.1

ตารางที่ 3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	6,172	2,772,112	53.2	1.1	51.1	55.4
25 - 34	4,397	1,880,578	38.9	0.9	37.0	40.7
35 - 44	4,044	1,764,268	32.6	0.9	30.9	34.4
45 - 54	2,901	1,263,859	30.4	1.1	28.2	32.7
55 - 64	4,369	739,814	28.4	0.8	26.8	30.0
65 - 74	1,926	321,629	27.3	1.0	25.4	29.2
รวม	23,809	8,742,261	37.4	0.7	36.0	38.8
หญิง						
15 - 24	3,952	1,839,119	38.3	0.9	36.5	40.0
25 - 34	3,331	1,468,158	30.9	1.0	29.0	32.8
35 - 44	4,099	1,828,611	31.2	0.9	29.5	32.9
45 - 54	3,344	1,443,338	31.4	0.9	29.5	33.2
55 - 64	4,306	815,095	27.6	0.8	26.0	29.1
65 - 74	1,784	326,556	23.4	0.9	21.6	25.2
รวม	20,816	7,720,877	31.7	0.6	30.4	32.9
ชายและหญิง						
15 - 24	10,124	4,611,231	46.1	0.8	44.4	47.7
25 - 34	7,728	3,348,736	34.9	0.8	33.4	36.4
35 - 44	8,143	3,592,879	31.9	0.7	30.5	33.3
45 - 54	6,245	2,707,197	30.9	0.8	29.3	32.5
55 - 64	8,675	1,554,909	28.0	0.7	26.6	29.3
65 - 74	3,710	648,185	25.2	0.7	23.8	26.6
รวมทั้งประเทศ	44,625	16,463,138	34.5	0.6	33.3	35.6

ตารางที่ 3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	23,071	4,891,853	30.4	0.7	29.0	31.8
นอกเขตเทศบาล	21,554	11,571,285	36.5	0.8	35.0	38.1
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	327	841,757	19.4	1.5	16.4	22.3
ภาคกลาง	13,319	3,804,194	32.1	1.0	30.0	34.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11,445	6,111,131	37.5	1.2	35.2	39.9
ภาคเหนือ	10,733	3,333,422	37.4	1.0	35.4	39.4
ภาคใต้	8,801	2,372,634	37.4	1.6	34.3	40.5
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	1,907	734,747	28.2	2.1	24.0	32.4
เขต สธ. ที่ 2	2,487	424,572	34.9	2.3	30.5	39.4
เขต สธ. ที่ 3	2,563	754,684	32.4	2.5	27.5	37.2
เขต สธ. ที่ 4	2,190	816,031	32.5	1.9	28.8	36.2
เขต สธ. ที่ 5	2,201	412,676	33.3	2.4	28.6	37.9
เขต สธ. ที่ 6	2,644	1,005,362	38.8	3.5	31.9	45.6
เขต สธ. ที่ 7	2,982	468,513	35.7	1.7	32.3	39.0
เขต สธ. ที่ 8	3,175	898,759	36.9	1.4	34.1	39.8
เขต สธ. ที่ 9	1,971	661,486	33.7	3.5	26.8	40.6
เขต สธ. ที่ 10	2,260	901,500	33.4	2.4	28.7	38.2
เขต สธ. ที่ 11	1,680	515,205	31.7	2.4	26.9	36.4
เขต สธ. ที่ 12	2,363	1,538,265	39.8	3.0	34.0	45.6
เขต สธ. ที่ 13	2,670	1,270,988	40.8	2.2	36.5	45.1
เขต สธ. ที่ 14	2,472	1,885,172	37.9	2.3	33.4	42.4
เขต สธ. ที่ 15	2,463	834,710	36.4	2.4	31.8	41.0
เขต สธ. ที่ 16	3,007	867,626	43.1	1.9	39.3	46.8
เขต สธ. ที่ 17	3,133	987,000	38.3	1.9	34.5	42.1
เขต สธ. ที่ 18	2,130	644,085	31.7	1.9	28.0	35.4

ตารางที่ 3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	5,470	1,702,336	39.5	1.6	36.5	42.6
เขต สปสช. ที่ 2	3,133	987,000	38.3	1.9	34.5	42.1
เขต สปสช. ที่ 3	2,677	740,695	32.3	1.8	28.8	35.8
เขต สปสช. ที่ 4	4,282	1,120,836	29.8	1.6	26.7	33.0
เขต สปสช. ที่ 5	4,391	1,228,706	32.8	1.5	29.8	35.7
เขต สปสช. ที่ 6	4,099	1,358,042	33.1	2.2	28.8	37.4
เขต สปสช. ที่ 7	2,842	1,602,912	38.9	2.8	33.3	44.5
เขต สปสช. ที่ 8	3,461	1,352,059	33.2	1.9	29.6	36.9
เขต สปสช. ที่ 9	2,472	1,885,172	37.9	2.3	33.4	42.4
เขต สปสช. ที่ 10	2,670	1,270,988	40.8	2.2	36.5	45.1
เขต สปสช. ที่ 11	4,021	1,092,930	35.6	3.0	29.8	41.4
เขต สปสช. ที่ 12	4,780	1,279,703	39.1	1.2	36.8	41.4
เขต สปสช. ที่ 13	327	841,757	19.4	1.5	16.4	22.3
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	1,283	558,042	26.0	2.3	21.4	30.6
เขต สคร. ที่ 2	3,111	601,276	35.9	2.2	31.6	40.2
เขต สคร. ที่ 3	4,534	1,416,170	33.0	2.1	28.8	37.1
เขต สคร. ที่ 4	4,391	1,228,706	32.8	1.5	29.8	35.7
เขต สคร. ที่ 5	2,472	1,885,172	37.9	2.3	33.4	42.4
เขต สคร. ที่ 6	4,623	2,439,766	37.2	2.1	33.1	41.3
เขต สคร. ที่ 7	4,350	1,786,193	37.6	1.7	34.4	40.9
เขต สคร. ที่ 8	2,130	644,085	31.7	1.9	28.0	35.4
เขต สคร. ที่ 9	3,133	987,000	38.3	1.9	34.5	42.1
เขต สคร. ที่ 10	5,470	1,702,336	39.5	1.6	36.5	42.6
เขต สคร. ที่ 11	4,021	1,092,930	35.6	3.0	29.8	41.4
เขต สคร. ที่ 12	4,780	1,279,703	39.1	1.2	36.8	41.4

ตารางที่ 3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	327	841,757	19.4	1.5	16.3	22.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	587	312,384	35.2	4.7	25.9	44.4
นนทบุรี	342	162,664	19.6	3.2	13.3	25.9
ปทุมธานี	468	225,308	30.9	4.0	23.1	38.8
พระนครศรีอยุธยา	473	170,070	28.9	3.6	21.8	36.0
อ่างทอง	701	91,577	41.9	4.1	33.8	50.0
ลพบุรี	591	179,238	31.4	3.5	24.5	38.3
สิงห์บุรี	648	57,147	34.3	3.2	28.1	40.5
ชัยนาท	547	96,610	37.2	5.5	26.4	48.1
สระบุรี	624	176,704	38.4	5.1	28.3	48.6
ชลบุรี	486	338,757	35.2	6.5	22.4	48.0
ระยอง	507	164,332	36.3	4.8	26.8	45.7
จันทบุรี	505	121,635	31.4	2.5	26.4	36.3
ตราด	473	36,762	22.8	3.2	16.6	29.0
ฉะเชิงเทรา	523	149,787	29.7	4.9	20.1	39.2
ปราจีนบุรี	573	111,765	32.3	5.5	21.6	43.1
นครนายก	435	58,128	30.2	5.3	19.8	40.6
สระแก้ว	445	122,620	30.6	5.2	20.3	40.8
ราชบุรี	605	221,663	35.2	4.4	26.6	43.9
กาญจนบุรี	474	153,399	26.4	3.7	19.2	33.6
สุพรรณบุรี	606	225,794	34.9	3.6	27.9	42.0
นครปฐม	505	215,175	32.9	3.0	26.9	38.9
สมุทรสาคร	369	73,219	20.1	2.8	14.7	25.5
สมุทรสงคราม	550	46,814	31.3	5.5	20.4	42.1
เพชรบุรี	646	146,918	41.9	3.9	34.2	49.5
ประจวบคีรีขันธ์	636	145,725	38.8	4.9	29.1	48.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	603	721,708	37.0	3.7	29.7	44.3
บุรีรัมย์	654	473,157	41.1	4.9	31.6	50.7
สุรินทร์	660	395,550	38.8	5.9	27.3	50.4
ศรีสะเกษ	572	336,537	31.0	2.9	25.2	36.8
อุบลราชธานี	817	693,531	52.0	3.6	44.9	59.2
ยโสธร	688	141,006	33.8	6.7	20.7	46.9
ชัยภูมิ	555	294,757	34.3	3.8	26.8	41.9
อำนาจเจริญ	593	99,914	35.5	3.2	29.3	41.7
หนองบัวลำภู	620	147,448	38.8	4.3	30.4	47.2
ขอนแก่น	464	450,130	33.0	3.7	25.8	40.2
อุดรธานี	528	349,582	30.0	4.3	21.5	38.5
เลย	377	117,451	24.9	2.5	20.0	29.8
หนองคาย	735	287,020	42.3	5.2	32.0	52.5

ตารางที่ 3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	666	284,609	38.9	4.8	29.5	48.4
ร้อยเอ็ด	685	519,332	51.3	6.4	38.8	63.8
กาฬสินธุ์	548	284,194	37.5	5.3	27.0	47.9
สกลนคร	524	267,679	31.6	3.4	24.9	38.3
นครพนม	677	182,879	34.7	4.9	25.1	44.4
มุกดาหาร	479	64,647	25.5	3.8	18.1	32.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	574	413,670	34.3	4.0	26.6	42.1
ลำพูน	654	135,135	41.9	4.0	33.9	49.8
ลำปาง	712	240,820	39.6	3.4	33.0	46.2
อุตรดิตถ์	585	126,777	35.3	5.0	25.5	45.0
แพร่	660	137,821	37.0	3.4	30.2	43.8
น่าน	828	152,335	41.1	5.5	30.4	51.8
พะเยา	816	193,520	49.7	4.8	40.2	59.1
เชียงราย	703	383,950	43.6	2.6	38.4	48.7
แม่ฮ่องสอน	523	45,085	29.0	5.3	18.5	39.5
นครสวรรค์	529	269,766	33.2	2.9	27.6	38.8
อุทัยธานี	591	90,607	36.3	8.0	20.7	51.9
กำแพงเพชร	410	124,288	22.7	2.4	17.9	27.4
ตาก	653	124,161	36.1	3.4	29.4	42.8
สุโขทัย	694	202,710	43.3	4.5	34.5	52.2
พิษณุโลก	576	228,847	35.1	4.5	26.2	43.9
พิจิตร	600	159,424	37.6	2.6	32.5	42.7
เพชรบูรณ์	625	304,504	40.4	3.5	33.6	47.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	640	450,588	40.2	7.6	25.2	55.1
กระบี่	699	111,923	36.7	4.8	27.3	46.1
พังงา	677	67,873	36.5	4.7	27.2	45.7
ภูเก็ต	430	69,145	28.2	1.7	24.8	31.6
สุราษฎร์ธานี	560	250,798	34.4	3.7	27.2	41.7
ระนอง	488	37,239	30.6	4.9	21.0	40.1
ชุมพร	527	105,363	29.0	4.3	20.5	37.6
สงขลา	535	316,387	32.5	2.6	27.5	37.5
สตูล	608	72,835	34.8	3.3	28.2	41.4
ตรัง	688	182,332	40.0	2.9	34.3	45.7
พัทลุง	917	198,612	52.2	2.3	47.7	56.6
ปัตตานี	744	182,893	42.3	4.3	33.9	50.7
ยะลา	671	138,050	42.5	2.4	37.8	47.1
นราธิวาส	617	188,595	38.3	2.8	32.8	43.7

ตารางที่ 4.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	1,943	876,429	16.8	0.8	15.3	18.3
25 - 34	2,202	912,623	18.9	0.8	17.2	20.5
35 - 44	2,521	1,062,476	19.6	0.8	18.0	21.2
45 - 54	2,003	882,672	21.3	1.2	19.0	23.5
55 - 64	3,449	613,396	23.6	0.9	21.7	25.4
65 - 74	1,386	231,969	19.5	0.9	17.7	21.3
รวม	13,504	4,579,565	19.6	0.7	18.2	20.9
หญิง						
15 - 24	2,318	974,273	20.3	0.9	18.5	22.1
25 - 34	2,672	1,142,347	24.0	0.9	22.3	25.8
35 - 44	3,296	1,509,037	25.8	1.0	23.8	27.8
45 - 54	2,641	1,165,583	25.3	1.1	23.1	27.6
55 - 64	3,578	710,463	24.0	0.9	22.3	25.7
65 - 74	1,483	303,297	21.6	1.2	19.3	23.8
รวม	15,988	5,804,999	23.8	0.8	22.3	25.3
ชายและหญิง						
15 - 24	4,261	1,850,702	18.5	0.7	17.1	19.9
25 - 34	4,874	2,054,970	21.4	0.7	20.0	22.9
35 - 44	5,817	2,571,513	22.8	0.8	21.2	24.5
45 - 54	4,644	2,048,254	23.4	1.0	21.4	25.4
55 - 64	7,027	1,323,859	23.8	0.8	22.2	25.4
65 - 74	2,869	535,266	20.6	0.9	18.9	22.4
รวมทั้งประเทศ	29,492	10,384,564	21.7	0.7	20.4	23.1

ตารางที่ 4.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	14,779	3,437,531	21.4	0.8	19.7	23.0
นอกเขตเทศบาล	14,713	6,947,033	21.9	0.9	20.1	23.8
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	328	786,833	18.1	2.1	14.0	22.2
ภาคกลาง	8,771	2,457,983	20.7	1.0	18.7	22.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,295	3,457,948	21.2	1.4	18.4	24.1
ภาคเหนือ	6,760	2,047,746	23.0	1.5	20.1	25.8
ภาคใต้	6,338	1,634,055	25.8	1.8	22.2	29.3
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	1,541	566,634	21.7	2.3	17.3	26.2
เขต สธ. ที่ 2	1,260	241,927	19.9	3.0	14.1	25.7
เขต สธ. ที่ 3	1,592	435,600	18.7	2.0	14.7	22.7
เขต สธ. ที่ 4	1,632	545,074	21.7	2.5	16.7	26.7
เขต สธ. ที่ 5	1,452	225,474	18.2	1.9	14.4	22.0
เขต สธ. ที่ 6	1,614	623,773	24.0	3.4	17.3	30.7
เขต สธ. ที่ 7	2,400	358,215	27.3	2.7	21.9	32.6
เขต สธ. ที่ 8	2,324	652,067	26.8	2.6	21.8	31.8
เขต สธ. ที่ 9	1,294	443,275	22.6	2.5	17.6	27.6
เขต สธ. ที่ 10	1,867	629,210	23.3	2.6	18.2	28.5
เขต สธ. ที่ 11	814	204,392	12.6	1.8	9.1	16.1
เขต สธ. ที่ 12	1,685	1,007,056	26.0	4.7	16.8	35.3
เขต สธ. ที่ 13	1,305	502,911	16.1	1.7	12.8	19.4
เขต สธ. ที่ 14	1,624	1,114,380	22.4	2.2	18.0	26.8
เขต สธ. ที่ 15	1,589	530,430	23.1	2.3	18.7	27.6
เขต สธ. ที่ 16	1,801	501,534	24.9	2.3	20.4	29.4
เขต สธ. ที่ 17	2,223	719,533	27.9	3.4	21.3	34.6
เขต สธ. ที่ 18	1,147	296,249	14.5	2.4	9.8	19.3

ตารางที่ 4.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	3,390	1,031,964	24.0	1.6	20.8	27.1
เขต สปสช. ที่ 2	2,223	719,533	27.9	3.4	21.3	34.6
เขต สปสช. ที่ 3	1,399	330,030	14.4	2.2	10.1	18.7
เขต สปสช. ที่ 4	2,882	813,028	21.6	1.8	18.0	25.2
เขต สปสช. ที่ 5	3,084	770,547	20.5	1.8	17.0	24.1
เขต สปสช. ที่ 6	2,553	840,627	20.5	1.7	17.2	23.8
เขต สปสช. ที่ 7	2,029	1,052,750	25.5	4.4	16.8	34.3
เขต สปสช. ที่ 8	2,337	787,907	19.4	1.9	15.7	23.0
เขต สปสช. ที่ 9	1,624	1,114,380	22.4	2.2	18.0	26.8
เขต สปสช. ที่ 10	1,305	502,911	16.1	1.7	12.8	19.4
เขต สปสช. ที่ 11	3,041	738,925	24.0	2.9	18.4	29.7
เขต สปสช. ที่ 12	3,297	895,130	27.4	2.2	23.1	31.7
เขต สปสช. ที่ 13	328	786,833	18.1	2.1	14.0	22.2
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	961	397,021	18.5	2.2	14.1	22.8
เขต สคร. ที่ 2	1,840	411,540	24.6	2.9	19.0	30.2
เขต สคร. ที่ 3	2,886	878,874	20.5	1.6	17.3	23.6
เขต สคร. ที่ 4	3,084	770,547	20.5	1.8	17.0	24.1
เขต สคร. ที่ 5	1,624	1,114,380	22.4	2.2	18.0	26.8
เขต สคร. ที่ 6	3,552	1,636,266	24.9	3.0	19.1	30.8
เขต สคร. ที่ 7	2,119	707,303	14.9	1.3	12.4	17.4
เขต สคร. ที่ 8	1,147	296,249	14.5	2.4	9.8	19.3
เขต สคร. ที่ 9	2,223	719,533	27.9	3.4	21.3	34.6
เขต สคร. ที่ 10	3,390	1,031,964	24.0	1.6	20.8	27.1
เขต สคร. ที่ 11	3,041	738,925	24.0	2.9	18.4	29.7
เขต สคร. ที่ 12	3,297	895,130	27.4	2.2	23.1	31.7

ตารางที่ 4.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	328	786,833	18.1	2.1	14.0	22.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	268	148,623	16.7	2.8	11.3	22.2
นนทบุรี	335	157,414	19.0	3.8	11.4	26.5
ปทุมธานี	337	132,287	18.1	4.1	10.0	26.2
พระนครศรีอยุธยา	289	107,320	18.2	3.2	12.0	24.5
อ่างทอง	275	37,646	17.2	2.6	12.1	22.3
ลพบุรี	366	141,717	24.8	5.7	13.7	36.0
สิงห์บุรี	367	28,783	17.3	3.7	10.0	24.5
ชัยนาท	252	33,781	13.0	3.9	5.3	20.7
สระบุรี	580	169,612	36.9	6.3	24.6	49.2
ชลบุรี	512	275,421	28.6	3.8	21.3	36.0
ระยอง	288	90,662	20.0	7.2	5.9	34.1
จันทบุรี	271	62,472	16.1	1.9	12.3	19.9
ตราด	223	14,720	9.1	2.7	3.8	14.5
ฉะเชิงเทรา	354	107,142	21.2	5.6	10.3	32.2
ปราจีนบุรี	276	68,901	19.9	5.6	8.9	30.9
นครนายก	333	38,247	19.9	5.4	9.3	30.5
สระแก้ว	361	72,686	18.1	4.6	9.1	27.1
ราชบุรี	483	180,940	28.8	6.4	16.3	41.3
กาญจนบุรี	401	135,871	23.4	4.8	14.0	32.7
สุพรรณบุรี	432	132,337	20.4	3.4	13.7	27.2
นครปฐม	316	95,925	14.7	4.3	6.2	23.2
สมุทรสาคร	347	67,099	18.4	4.6	9.5	27.4
สมุทรสงคราม	494	44,520	29.7	5.7	18.6	40.9
เพชรบุรี	286	52,373	14.9	2.8	9.5	20.3
ประจวบคีรีขันธ์	325	61,482	16.3	2.9	10.7	21.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	344	319,844	16.4	2.7	11.1	21.7
บุรีรัมย์	555	349,546	30.4	5.8	19.0	41.8
สุรินทร์	267	154,486	15.2	3.1	9.2	21.2
ศรีสะเกษ	191	101,196	9.3	2.8	3.9	14.8
อุบลราชธานี	316	248,601	18.6	2.2	14.4	22.9
ยโสธร	476	97,703	23.4	6.1	11.4	35.3
ชัยภูมิ	458	290,503	33.8	7.2	19.7	48.0
อำนาจเจริญ	322	55,410	19.7	2.9	13.9	25.4
หนองบัวลำภู	771	162,281	42.7	5.7	31.5	53.9
ขอนแก่น	435	424,373	31.1	10.4	10.8	51.4
อุดรธานี	360	230,965	19.8	5.2	9.7	29.9
เลย	389	106,956	22.6	3.6	15.7	29.6
หนองคาย	347	129,008	19.0	3.5	12.2	25.9

ตารางที่ 4.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่รับประทานผักผลไม้ ≥ 5 หน่วยมาตรฐาน/วัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	398	183,481	25.1	9.0	7.5	42.7
ร้อยเอ็ด	447	229,504	22.7	6.9	9.1	36.2
กาฬสินธุ์	405	169,698	22.4	2.2	18.0	26.7
สกลนคร	216	96,982	11.4	3.0	5.7	17.2
นครพนม	254	61,715	11.7	1.9	7.9	15.5
มุกดาหาร	344	45,694	18.0	3.9	10.4	25.6
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	401	260,612	21.6	3.4	15.0	28.2
ลำพูน	409	92,546	28.7	7.4	14.2	43.2
ลำปาง	384	145,497	23.9	3.1	17.8	30.0
อุตรดิตถ์	353	65,465	18.2	3.2	11.9	24.5
แพร่	458	89,542	24.0	4.6	15.1	33.0
น่าน	463	79,019	21.3	3.7	14.1	28.5
พะเยา	430	99,588	25.6	5.1	15.5	35.6
เชียงราย	450	233,385	26.5	4.0	18.7	34.3
แม่ฮ่องสอน	395	31,775	20.4	5.1	10.5	30.4
นครสวรรค์	261	86,305	10.6	3.2	4.4	16.8
อุทัยธานี	287	31,422	12.6	4.0	4.8	20.4
กำแพงเพชร	262	96,817	17.7	5.6	6.7	28.6
ตาก	359	79,129	23.0	7.3	8.8	37.2
สุโขทัย	550	132,916	28.4	4.1	20.3	36.5
พิษณุโลก	610	287,720	44.1	8.4	27.5	60.6
พิจิตร	337	81,704	19.3	2.2	14.9	23.6
เพชรบูรณ์	351	154,303	20.5	6.9	6.9	34.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	306	224,405	20.0	6.7	6.9	33.0
กระบี่	611	108,282	35.5	6.9	22.0	48.9
พังงา	546	52,090	28.0	4.9	18.3	37.7
ภูเก็ต	342	58,168	23.7	5.0	13.9	33.6
สุราษฎร์ธานี	402	178,357	24.5	5.2	14.3	34.7
ระนอง	457	34,135	28.0	5.8	16.6	39.4
ชุมพร	377	83,488	23.0	5.2	12.8	33.3
สงขลา	574	289,177	29.7	5.1	19.8	39.6
สตูล	493	65,868	31.5	6.1	19.4	43.5
ตรัง	444	105,540	23.2	5.0	13.4	32.9
พัทลุง	529	137,523	36.1	6.2	23.9	48.3
ปัตตานี	450	98,508	22.8	5.6	11.8	33.7
ยะลา	376	65,151	20.0	4.6	11.0	29.1
นราธิวาส	431	133,363	27.0	4.5	18.2	35.9

ตารางที่ 5.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	2,841	1,417,677	28.9	1.2	26.5	31.4
25 - 34	4,004	1,775,109	39.0	0.9	37.2	40.8
35 - 44	4,565	2,054,282	40.1	0.9	38.4	41.8
45 - 54	3,338	1,593,099	40.2	1.2	37.8	42.5
55 - 64	4,988	927,336	37.0	0.7	35.7	38.4
65 - 74	1,867	348,974	31.0	1.1	28.9	33.0
รวม	21,603	8,116,477	36.6	0.5	35.6	37.6
หญิง						
15 - 24	72	34,091	0.7	0.1	0.4	1.0
25 - 34	112	77,135	1.7	0.3	1.2	2.1
35 - 44	236	116,981	2.0	0.2	1.6	2.5
45 - 54	256	135,717	3.0	0.3	2.4	3.6
55 - 64	608	111,988	3.9	0.3	3.3	4.4
65 - 74	295	49,859	3.6	0.3	2.9	4.3
รวม	1,579	525,770	2.2	0.1	1.9	2.4
ชายและหญิง						
15 - 24	2,913	1,451,768	15.1	0.7	13.7	16.5
25 - 34	4,116	1,852,244	20.1	0.5	19.1	21.0
35 - 44	4,801	2,171,263	20.0	0.4	19.1	20.8
45 - 54	3,594	1,728,815	20.4	0.7	19.0	21.7
55 - 64	5,596	1,039,324	19.2	0.4	18.5	20.0
65 - 74	2,162	398,833	15.9	0.6	14.8	17.0
รวมทั้งประเทศ	23,182	8,642,247	18.7	0.3	18.2	19.3

ตารางที่ 5.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	10,687	2,596,220	16.8	0.4	16.0	17.5
นอกเขตเทศบาล	12,495	6,046,027	19.7	0.4	19.0	20.5
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	328	842,481	19.7	1.2	17.5	22.0
ภาคกลาง	6,500	1,643,658	14.3	0.4	13.5	15.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,193	3,090,102	19.7	0.5	18.7	20.8
ภาคเหนือ	5,152	1,630,136	19.1	0.7	17.6	20.5
ภาคใต้	5,009	1,435,871	23.4	0.7	22.0	24.8
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	883	300,247	12.0	1.0	10.0	13.9
เขต สธ. ที่ 2	1,160	218,937	18.3	1.1	16.1	20.5
เขต สธ. ที่ 3	1,337	348,988	15.3	0.8	13.6	16.9
เขต สธ. ที่ 4	1,054	360,391	14.7	1.0	12.7	16.6
เขต สธ. ที่ 5	1,026	162,448	13.9	0.8	12.4	15.4
เขต สธ. ที่ 6	1,513	632,437	25.4	1.4	22.7	28.1
เขต สธ. ที่ 7	1,619	275,706	21.5	1.0	19.6	23.4
เขต สธ. ที่ 8	1,877	527,727	22.4	1.0	20.5	24.3
เขต สธ. ที่ 9	1,040	252,647	13.3	1.1	11.1	15.6
เขต สธ. ที่ 10	1,460	551,374	21.4	1.1	19.3	23.5
เขต สธ. ที่ 11	935	288,199	18.5	1.2	16.2	20.8
เขต สธ. ที่ 12	1,253	723,061	19.4	1.6	16.3	22.5
เขต สธ. ที่ 13	1,382	687,129	22.6	0.8	21.0	24.3
เขต สธ. ที่ 14	1,163	840,339	17.6	0.9	15.8	19.5
เขต สธ. ที่ 15	1,219	401,539	18.1	1.5	15.1	21.1
เขต สธ. ที่ 16	1,099	329,947	16.8	0.9	15.1	18.5
เขต สธ. ที่ 17	1,634	491,271	19.7	1.1	17.6	21.8
เขต สธ. ที่ 18	1,200	407,379	21.8	2.0	18.0	25.7

ตารางที่ 5.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	2,318	731,485	17.5	0.9	15.7	19.3
เขต สปสช. ที่ 2	1,634	491,271	19.7	1.1	17.6	21.8
เขต สปสช. ที่ 3	1,478	443,023	20.8	1.8	17.3	24.4
เขต สปสช. ที่ 4	2,042	519,338	14.3	0.7	12.8	15.8
เขต สปสช. ที่ 5	2,080	522,839	14.4	0.7	13.0	15.8
เขต สปสช. ที่ 6	2,100	565,837	14.2	0.7	12.7	15.6
เขต สปสช. ที่ 7	1,622	775,954	19.5	1.5	16.6	22.5
เขต สปสช. ที่ 8	2,026	786,680	20.2	0.8	18.6	21.8
เขต สปสช. ที่ 9	1,163	840,339	17.6	0.9	15.8	19.5
เขต สปสช. ที่ 10	1,382	687,129	22.6	0.8	21.0	24.3
เขต สปสช. ที่ 11	2,299	695,640	23.6	1.2	21.3	25.9
เขต สปสช. ที่ 12	2,710	740,230	23.3	0.8	21.7	24.9
เขต สปสช. ที่ 13	328	842,481	19.7	1.2	17.5	22.0
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	634	231,924	11.3	1.1	9.1	13.5
เขต สคร. ที่ 2	1,409	287,260	17.4	1.0	15.4	19.4
เขต สคร. ที่ 3	2,377	601,635	14.4	0.7	13.0	15.8
เขต สคร. ที่ 4	2,080	522,839	14.4	0.7	13.0	15.8
เขต สคร. ที่ 5	1,163	840,339	17.6	0.9	15.8	19.5
เขต สคร. ที่ 6	2,713	1,274,435	20.2	1.0	18.2	22.2
เขต สคร. ที่ 7	2,317	975,328	21.2	0.7	19.9	22.5
เขต สคร. ที่ 8	1,200	407,379	21.8	2.0	18.0	25.7
เขต สคร. ที่ 9	1,634	491,271	19.7	1.1	17.6	21.8
เขต สคร. ที่ 10	2,318	731,485	17.5	0.9	15.7	19.3
เขต สคร. ที่ 11	2,299	695,640	23.6	1.2	21.3	25.9
เขต สคร. ที่ 12	2,710	740,230	23.3	0.8	21.7	24.9

ตารางที่ 5.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	328	842,481	19.7	1.2	17.5	22.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	156	88,299	10.2	1.3	7.6	12.8
นนทบุรี	143	54,914	6.8	1.0	4.8	8.8
ปทุมธานี	183	89,554	13.1	2.3	8.6	17.6
พระนครศรีอยุธยา	308	87,456	15.6	1.7	12.1	19.0
อ่างทอง	305	32,816	15.1	2.4	10.3	19.9
ลพบุรี	343	124,252	22.2	1.7	18.8	25.5
สิงห์บุรี	234	26,226	16.4	1.9	12.6	20.1
ชัยนาท	278	35,644	13.9	1.5	10.9	16.8
สระบุรี	249	68,322	15.0	2.2	10.6	19.3
ชลบุรี	240	112,209	12.2	2.1	8.1	16.3
ระยอง	162	40,099	9.2	1.2	6.9	11.5
จันทบุรี	339	70,974	18.9	1.4	16.2	21.5
ตราด	299	29,364	18.4	1.6	15.2	21.7
ฉะเชิงเทรา	297	94,874	19.3	1.8	15.8	22.7
ปราจีนบุรี	293	56,700	16.4	2.9	10.7	22.1
นครนายก	277	35,798	18.8	1.7	15.3	22.2
สระแก้ว	314	73,317	18.7	2.1	14.6	22.9
ราชบุรี	287	97,848	15.9	2.0	12.0	19.8
กาญจนบุรี	291	98,101	17.3	2.9	11.6	23.0
สุพรรณบุรี	253	82,895	12.9	1.4	10.2	15.6
นครปฐม	223	81,547	12.9	1.6	9.7	16.0
สมุทรสาคร	217	38,396	11.5	1.2	9.0	13.9
สมุทรสงคราม	306	21,808	14.9	1.9	11.1	18.6
เพชรบุรี	288	56,817	16.8	1.8	13.3	20.2
ประจวบคีรีขันธ์	215	45,427	13.0	1.3	10.5	15.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	282	341,471	17.9	1.6	14.9	21.0
บุรีรัมย์	192	117,724	11.6	1.8	8.2	15.1
สุรินทร์	339	205,474	20.4	1.9	16.6	24.2
ศรีสะเกษ	333	220,051	20.6	1.3	18.1	23.1
อุบลราชธานี	396	325,735	25.3	1.4	22.6	28.1
ยโสธร	292	80,405	19.5	2.5	14.5	24.4
ชัยภูมิ	350	175,671	20.9	1.9	17.0	24.7
อำนาจเจริญ	361	60,938	22.6	2.0	18.6	26.5
หนองบัวลำภู	486	110,339	29.1	0.9	27.3	30.9
ขอนแก่น	308	217,764	16.5	2.0	12.5	20.5
อุดรธานี	375	247,188	22.1	1.9	18.4	25.7
เลย	314	87,316	20.2	2.0	16.3	24.2
หนองคาย	285	106,531	16.5	2.2	12.2	20.8

ตารางที่ 5.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	340	158,717	22.1	2.7	16.8	27.4
ร้อยเอ็ด	322	224,835	22.8	3.5	15.9	29.6
กาฬสินธุ์	283	121,744	17.3	2.4	12.6	22.0
สกลนคร	255	141,132	17.5	1.8	13.9	21.0
นครพนม	311	94,174	18.6	1.9	14.9	22.4
มุกดาหาร	369	52,893	21.7	2.2	17.5	25.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	330	225,904	19.4	2.7	14.0	24.7
ลำพูน	284	51,541	16.4	2.0	12.4	20.4
ลำปาง	255	90,446	15.1	1.4	12.3	18.0
อุตรดิตถ์	268	54,283	16.1	1.9	12.4	19.8
แพร่	276	58,685	16.0	1.2	13.6	18.4
น่าน	214	48,652	13.2	2.6	8.1	18.4
พะเยา	312	69,981	18.2	1.8	14.7	21.8
เชียงราย	297	152,629	18.0	1.3	15.5	20.6
แม่ฮ่องสอน	350	33,647	23.1	3.3	16.5	29.6
นครสวรรค์	258	169,666	23.9	4.1	15.8	32.1
อุทัยธานี	277	43,028	18.6	3.1	12.4	24.7
กำแพงเพชร	360	118,017	22.8	1.7	19.5	26.1
ตาก	418	86,745	26.2	3.8	18.8	33.6
สุโขทัย	354	108,805	23.3	1.6	20.1	26.5
พิษณุโลก	295	122,840	19.6	2.2	15.2	23.9
พิจิตร	305	76,669	18.7	2.1	14.5	22.9
เพชรบูรณ์	299	118,599	16.2	2.1	12.2	20.3
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	368	263,773	24.5	2.5	19.6	29.3
กระบี่	312	63,015	21.1	1.6	17.9	24.3
พังงา	361	47,261	26.2	2.1	22.0	30.3
ภูเก็ต	209	31,400	13.1	1.5	10.1	16.1
สุราษฎร์ธานี	370	172,653	25.1	2.6	20.1	30.1
ระนอง	336	25,319	21.2	2.2	16.8	25.6
ชุมพร	343	92,221	26.6	2.9	20.9	32.3
สงขลา	375	201,645	21.6	1.9	17.9	25.3
สตูล	352	45,355	22.8	2.4	18.1	27.5
ตรัง	401	108,712	24.6	2.3	20.1	29.0
พัทลุง	432	103,791	27.4	1.4	24.6	30.2
ปัตตานี	419	105,517	25.3	1.9	21.6	29.1
ยะลา	398	73,935	23.0	1.7	19.7	26.4
นราธิวาส	333	101,275	20.9	1.8	17.3	24.5

ตารางที่ 6.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	4,083	1,999,461	41.0	1.1	38.8	43.1
25 - 34	5,586	2,458,020	53.1	1.0	51.1	55.0
35 - 44	6,231	2,807,920	54.0	1.0	52.0	56.0
45 - 54	4,433	2,029,566	50.9	1.1	48.8	53.0
55 - 64	5,483	998,256	39.5	0.8	38.0	41.1
65 - 74	1,704	318,973	27.8	1.0	25.8	29.7
รวม	27,520	10,612,197	47.4	0.6	46.2	48.7
หญิง						
15 - 24	803	383,494	8.3	0.5	7.2	9.3
25 - 34	1,310	602,196	13.1	0.6	11.9	14.3
35 - 44	1,938	907,257	16.0	0.6	14.8	17.2
45 - 54	1,430	670,870	15.0	0.7	13.7	16.4
55 - 64	1,329	288,438	10.0	0.5	9.1	10.9
65 - 74	397	79,617	5.8	0.5	4.8	6.8
รวม	7,207	2,931,873	12.4	0.4	11.7	13.1
ชายและหญิง						
15 - 24	4,886	2,382,955	25.1	0.7	23.7	26.5
25 - 34	6,896	3,060,216	33.2	0.6	31.9	34.4
35 - 44	8,169	3,715,177	34.2	0.6	32.9	35.4
45 - 54	5,863	2,700,436	32.0	0.7	30.5	33.4
55 - 64	6,812	1,286,694	23.8	0.5	22.8	24.8
65 - 74	2,101	398,590	15.8	0.6	14.7	16.9
รวมทั้งประเทศ	34,727	13,544,069	29.5	0.4	28.6	30.3

ตารางที่ 6.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	17,443	4,208,881	27.4	0.6	26.2	28.6
นอกเขตเทศบาล	17,284	9,335,188	30.5	0.6	29.4	31.6
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	380	1,022,846	24.0	1.7	20.6	27.4
ภาคกลาง	10,070	2,764,293	24.3	0.6	23.1	25.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,163	5,324,014	34.0	0.9	32.2	35.7
ภาคเหนือ	9,976	3,242,951	37.8	0.9	36.1	39.6
ภาคใต้	4,138	1,189,965	19.5	0.8	17.9	21.0
เขตตรวจราชการสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	1,425	578,181	23.2	1.6	19.9	26.4
เขต สธ. ที่ 2	1,673	329,603	27.9	1.3	25.3	30.4
เขต สธ. ที่ 3	2,259	638,094	28.3	1.3	25.7	30.9
เขต สธ. ที่ 4	1,466	511,215	21.1	1.4	18.4	23.7
เขต สธ. ที่ 5	1,357	226,374	19.7	1.1	17.6	21.8
เขต สธ. ที่ 6	1,650	677,319	27.2	1.4	24.4	30.1
เขต สธ. ที่ 7	1,592	227,864	17.9	1.1	15.9	20.0
เขต สธ. ที่ 8	896	284,782	12.1	1.1	10.0	14.2
เขต สธ. ที่ 9	1,890	480,825	25.9	1.8	22.4	29.3
เขต สธ. ที่ 10	2,182	903,380	35.0	2.0	31.0	39.0
เขต สธ. ที่ 11	1,528	518,336	33.7	3.0	27.8	39.6
เขต สธ. ที่ 12	1,948	1,198,531	32.3	1.5	29.5	35.2
เขต สธ. ที่ 13	2,378	1,107,560	36.8	1.7	33.4	40.2
เขต สธ. ที่ 14	2,127	1,596,207	33.1	1.9	29.3	36.9
เขต สธ. ที่ 15	2,430	821,365	37.1	1.9	33.4	40.8
เขต สธ. ที่ 16	2,877	917,044	46.8	2.1	42.6	50.9
เขต สธ. ที่ 17	2,750	856,261	34.2	1.6	31.0	37.3
เขต สธ. ที่ 18	1,919	648,281	34.3	1.5	31.3	37.3

ตารางที่ 6.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	5,307	1,738,409	41.7	1.4	38.9	44.4
เขต สปสช. ที่ 2	2,750	856,261	34.2	1.6	31.0	37.3
เขต สปสช. ที่ 3	2,349	715,055	33.4	1.4	30.6	36.1
เขต สปสช. ที่ 4	3,008	884,068	24.4	1.2	22.1	26.8
เขต สปสช. ที่ 5	2,823	737,589	20.6	1.0	18.7	22.5
เขต สปสช. ที่ 6	3,809	1,075,861	27.4	1.2	25.1	29.7
เขต สปสช. ที่ 7	2,483	1,279,295	32.4	1.4	29.7	35.1
เขต สปสช. ที่ 8	3,175	1,340,952	34.6	1.8	31.0	38.1
เขต สปสช. ที่ 9	2,127	1,596,207	33.1	1.9	29.3	36.9
เขต สปสช. ที่ 10	2,378	1,107,560	36.8	1.7	33.4	40.2
เขต สปสช. ที่ 11	2,375	709,175	24.1	1.2	21.7	26.6
เขต สปสช. ที่ 12	1,763	480,790	15.1	0.9	13.4	16.9
เขต สปสช. ที่ 13	380	1,022,846	24.0	1.7	20.6	27.4
เขตสำนักป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	1,037	465,470	22.8	2.0	19.0	26.7
เขต สคร. ที่ 2	2,061	442,314	27.0	1.1	24.8	29.2
เขต สคร. ที่ 3	4,149	1,118,920	27.2	1.1	25.0	29.4
เขต สคร. ที่ 4	2,823	737,589	20.6	1.0	18.7	22.5
เขต สคร. ที่ 5	2,127	1,596,207	33.1	1.9	29.3	36.9
เขต สคร. ที่ 6	4,130	2,101,911	33.4	1.2	31.1	35.8
เขต สคร. ที่ 7	3,906	1,625,896	35.7	1.5	32.7	38.7
เขต สคร. ที่ 8	1,919	648,281	34.3	1.5	31.3	37.3
เขต สคร. ที่ 9	2,750	856,261	34.2	1.6	31.0	37.3
เขต สคร. ที่ 10	5,307	1,738,409	41.7	1.4	38.9	44.4
เขต สคร. ที่ 11	2,375	709,175	24.1	1.2	21.7	26.6
เขต สคร. ที่ 12	1,763	480,790	15.1	0.9	13.4	16.9

ตารางที่ 6.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	380	1,022,846	24.0	1.7	20.5	27.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	362	210,372	24.6	2.5	19.7	29.6
นนทบุรี	256	128,374	16.1	2.6	11.0	21.2
ปทุมธานี	346	182,926	26.9	3.5	19.9	33.8
พระนครศรีอยุธยา	435	154,170	27.4	1.7	24.1	30.7
อ่างทอง	440	54,350	25.0	2.2	20.7	29.3
ลพบุรี	501	175,824	31.6	2.3	27.2	36.1
สิงห์บุรี	302	32,656	20.5	1.6	17.4	23.7
ชัยนาท	430	66,774	26.6	2.0	22.7	30.5
สระบุรี	388	112,711	24.8	2.3	20.3	29.3
ชลบุรี	374	191,587	21.1	2.8	15.6	26.7
ระยอง	386	103,159	24.5	2.1	20.3	28.7
จันทบุรี	616	138,382	37.1	2.5	32.1	42.1
ตราด	514	47,697	30.1	3.7	22.9	37.3
ฉะเชิงเทรา	405	107,436	22.1	1.9	18.3	26.0
ปราจีนบุรี	542	113,461	32.9	3.9	25.3	40.6
นครนายก	340	43,058	22.8	2.9	17.1	28.5
สระแก้ว	610	163,766	42.8	3.7	35.5	50.1
ราชบุรี	407	141,022	23.1	2.9	17.5	28.8
กาญจนบุรี	413	136,987	24.6	4.1	16.6	32.6
สุพรรณบุรี	341	112,620	17.7	2.1	13.7	21.8
นครปฐม	305	120,585	19.3	1.9	15.5	23.0
สมุทรสาคร	296	64,091	20.1	1.7	16.8	23.4
สมุทรสงคราม	400	28,932	20.0	2.2	15.6	24.4
เพชรบุรี	384	72,887	21.3	2.5	16.5	26.1
ประจวบคีรีขันธ์	277	60,463	17.5	1.9	13.7	21.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	524	610,491	32.7	3.6	25.5	39.8
บุรีรัมย์	542	399,793	35.3	4.6	26.3	44.4
สุรินทร์	531	327,325	32.9	3.3	26.4	39.4
ศรีสะเกษ	579	355,767	34.3	3.0	28.3	40.3
อุบลราชธานี	582	500,309	38.6	2.7	33.4	43.9
ยโสธร	600	141,487	34.4	4.5	25.4	43.3
ชัยภูมิ	530	258,599	31.1	2.2	26.7	35.5
อำนาจเจริญ	617	109,998	40.8	2.5	35.9	45.8
หนองบัวลำภู	652	164,873	43.4	2.2	39.1	47.7
ขอนแก่น	485	431,701	33.0	2.1	28.9	37.0
อุดรธานี	576	389,466	34.9	3.6	27.9	41.9
เลย	404	125,547	27.5	3.6	20.4	34.6
หนองคาย	550	223,493	35.4	4.5	26.5	44.3

ตารางที่ 6.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	534	233,154	32.7	4.5	23.9	41.5
ร้อยเอ็ด	519	315,591	32.1	2.3	27.7	36.5
กาฬสินธุ์	410	218,085	31.1	3.8	23.7	38.5
สกลนคร	497	279,206	35.0	5.2	24.8	45.2
นครพนม	496	158,367	31.9	3.8	24.5	39.3
มุกดาหาร	535	80,764	33.3	2.3	28.7	37.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	557	397,165	34.4	3.1	28.2	40.5
ลำพูน	665	128,586	42.1	3.4	35.3	48.8
ลำปาง	641	231,782	38.5	2.9	32.8	44.2
อุตรดิตถ์	568	121,297	35.7	3.2	29.4	42.1
แพร่	725	169,866	46.8	2.2	42.5	51.0
น่าน	664	132,045	35.8	5.9	24.2	47.4
พะเยา	680	165,319	43.8	3.8	36.4	51.2
เชียงราย	808	449,815	52.9	3.6	45.9	59.9
แม่ฮ่องสอน	567	63,832	43.2	3.8	35.6	50.8
นครสวรรค์	470	259,469	35.2	2.4	30.5	39.9
อุทัยธานี	387	64,804	28.4	3.7	21.0	35.7
กำแพงเพชร	594	194,306	37.9	3.6	30.8	45.0
ตาก	559	127,616	38.3	3.1	32.2	44.4
สุโขทัย	585	181,325	38.8	2.0	35.0	42.7
พิษณุโลก	542	217,174	34.0	3.5	27.1	40.8
พิจิตร	468	129,702	31.4	2.1	27.3	35.5
เพชรบูรณ์	496	208,849	28.7	3.8	21.3	36.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	353	277,865	26.0	2.3	21.5	30.5
กระบี่	233	26,418	8.9	1.8	5.4	12.4
พังงา	328	33,486	18.9	4.0	11.0	26.7
ภูเก็ต	271	40,698	17.1	2.2	12.7	21.4
สุราษฎร์ธานี	441	204,890	29.4	2.8	23.9	35.0
ระนอง	360	29,122	25.0	2.5	20.1	30.0
ชุมพร	389	96,695	27.9	2.7	22.6	33.2
สงขลา	340	199,631	21.4	1.8	17.8	24.9
สตูล	173	18,996	9.6	2.0	5.6	13.5
ตรัง	400	98,140	22.3	1.8	18.8	25.7
พัทลุง	467	97,868	26.0	3.8	18.4	33.5
ปัตตานี	121	19,552	4.6	1.7	1.2	8.1
ยะลา	151	19,491	6.1	1.5	3.0	9.1
นราธิวาส	111	27,113	5.6	2.1	1.5	9.7

ตารางที่ 7.1 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามเพศและช่วงอายุ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	604	309,886	6.4	0.4	5.5	7.2
25 - 34	1,008	423,024	9.1	0.6	8.0	10.3
35 - 44	1,066	438,897	8.4	0.4	7.6	9.3
45 - 54	717	312,603	7.8	0.6	6.7	9.0
55 - 64	700	120,621	4.8	0.3	4.2	5.3
65 - 74	180	31,234	2.7	0.3	2.1	3.4
รวม	4,275	1,636,265	7.3	0.3	6.8	7.9
หญิง						
15 - 24	73	43,821	0.9	0.2	0.6	1.3
25 - 34	134	63,441	1.4	0.2	0.9	1.9
35 - 44	220	106,697	1.9	0.2	1.5	2.3
45 - 54	183	93,317	2.1	0.3	1.5	2.7
55 - 64	130	27,275	0.9	0.1	0.7	1.2
65 - 74	24	6,391	0.5	0.2	0.1	0.9
รวม	764	340,941	1.4	0.1	1.2	1.6
ชายและหญิง						
15 - 24	677	353,706	3.7	0.3	3.2	4.2
25 - 34	1,142	486,464	5.3	0.3	4.6	5.9
35 - 44	1,286	545,594	5.0	0.2	4.5	5.5
45 - 54	900	405,920	4.8	0.4	4.1	5.5
55 - 64	830	147,896	2.7	0.2	2.4	3.1
65 - 74	204	37,625	1.5	0.2	1.1	1.9
รวมทั้งประเทศ	5,039	1,977,206	4.3	0.2	4.0	4.6

ตารางที่ 7.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	2,649	696,230	4.5	0.3	3.9	5.2
นอกเขตเทศบาล	2,390	1,280,976	4.2	0.2	3.8	4.5
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	70	199,554	4.7	1.1	2.6	6.8
ภาคกลาง	1,458	398,861	3.5	0.2	3.1	3.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,161	618,540	3.9	0.3	3.4	4.5
ภาคเหนือ	1,748	583,351	6.8	0.4	6.1	7.6
ภาคใต้	602	176,900	2.9	0.3	2.3	3.5
เขตตรวจราชการสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	204	84,722	3.4	0.6	2.3	4.5
เขต สธ. ที่ 2	231	51,254	4.3	0.6	3.1	5.5
เขต สธ. ที่ 3	314	90,762	4.0	0.5	3.1	5.0
เขต สธ. ที่ 4	219	68,474	2.8	0.3	2.2	3.5
เขต สธ. ที่ 5	195	30,336	2.6	0.3	2.1	3.2
เขต สธ. ที่ 6	241	91,181	3.7	0.5	2.6	4.7
เขต สธ. ที่ 7	215	36,548	2.9	0.4	2.0	3.8
เขต สธ. ที่ 8	146	49,171	2.1	0.4	1.2	2.9
เขต สธ. ที่ 9	295	73,313	3.9	0.4	3.1	4.8
เขต สธ. ที่ 10	208	81,184	3.1	0.5	2.2	4.0
เขต สธ. ที่ 11	165	55,882	3.6	0.9	1.9	5.3
เขต สธ. ที่ 12	239	129,985	3.5	0.6	2.4	4.6
เขต สธ. ที่ 13	257	131,856	4.4	0.4	3.6	5.2
เขต สธ. ที่ 14	292	219,633	4.5	0.6	3.4	5.7
เขต สธ. ที่ 15	371	138,694	6.3	0.7	5.0	7.6
เขต สธ. ที่ 16	547	171,834	8.8	1.0	6.8	10.7
เขต สธ. ที่ 17	582	176,108	7.0	0.8	5.4	8.6
เขต สธ. ที่ 18	248	96,714	5.1	0.7	3.8	6.4

ตารางที่ 7.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	918	310,529	7.4	0.6	6.3	8.6
เขต สปสช. ที่ 2	582	176,108	7.0	0.8	5.4	8.6
เขต สปสช. ที่ 3	300	103,930	4.9	0.6	3.7	6.1
เขต สปสช. ที่ 4	430	134,824	3.7	0.4	2.9	4.6
เขต สปสช. ที่ 5	414	98,810	2.8	0.2	2.3	3.2
เขต สปสช. ที่ 6	562	158,011	4.0	0.3	3.4	4.7
เขต สปสช. ที่ 7	285	136,866	3.5	0.5	2.4	4.5
เขต สปสช. ที่ 8	327	130,186	3.4	0.5	2.5	4.3
เขต สปสช. ที่ 9	292	219,633	4.5	0.6	3.4	5.7
เขต สปสช. ที่ 10	257	131,856	4.4	0.4	3.6	5.2
เขต สปสช. ที่ 11	298	91,534	3.1	0.5	2.2	4.0
เขต สปสช. ที่ 12	304	85,367	2.7	0.4	2.0	3.4
เขต สปสช. ที่ 13	70	199,554	4.7	1.1	2.6	6.8
เขตสำนักป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	135	67,646	3.3	0.7	2.0	4.7
เขต สคร. ที่ 2	300	68,330	4.2	0.5	3.2	5.1
เขต สคร. ที่ 3	609	164,075	4.0	0.3	3.4	4.6
เขต สคร. ที่ 4	414	98,810	2.8	0.2	2.3	3.2
เขต สคร. ที่ 5	292	219,633	4.5	0.6	3.4	5.7
เขต สคร. ที่ 6	447	211,169	3.4	0.4	2.6	4.1
เขต สคร. ที่ 7	422	187,737	4.1	0.4	3.3	4.9
เขต สคร. ที่ 8	248	96,714	5.1	0.7	3.8	6.4
เขต สคร. ที่ 9	582	176,108	7.0	0.8	5.4	8.6
เขต สคร. ที่ 10	918	310,529	7.4	0.6	6.3	8.6
เขต สคร. ที่ 11	298	91,534	3.1	0.5	2.2	4.0
เขต สคร. ที่ 12	304	85,367	2.7	0.4	2.0	3.4

ตารางที่ 7.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	70	199,554	4.7	1.1	2.6	6.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	34	20,606	2.4	0.8	0.8	4.0
นนทบุรี	25	12,462	1.6	0.4	0.7	2.4
ปทุมธานี	48	33,500	4.9	1.4	2.2	7.7
พระนครศรีอยุธยา	62	21,684	3.9	0.9	2.1	5.7
อ่างทอง	41	5,107	2.3	0.8	0.9	3.8
ลพบุรี	102	35,351	6.4	1.1	4.2	8.5
สิงห์บุรี	36	3,580	2.3	0.5	1.3	3.2
ชัยนาท	52	7,216	2.9	0.8	1.2	4.5
สระบุรี	69	17,076	3.8	0.7	2.3	5.2
ชลบุรี	64	30,491	3.4	0.7	2.1	4.7
ระยอง	35	10,149	2.4	0.6	1.3	3.5
จันทบุรี	118	25,797	6.9	0.9	5.1	8.7
ตราด	78	6,877	4.3	0.8	2.8	5.9
ฉะเชิงเทรา	62	18,888	3.9	1.1	1.7	6.1
ปราจีนบุรี	87	19,120	5.6	1.2	3.2	7.9
นครนายก	47	6,064	3.2	0.6	2.1	4.3
สระแก้ว	84	26,082	6.8	0.9	5.1	8.5
ราชบุรี	63	20,034	3.3	0.5	2.3	4.3
กาญจนบุรี	43	12,973	2.3	0.6	1.1	3.5
สุพรรณบุรี	67	19,220	3.0	0.8	1.5	4.5
นครปฐม	46	16,246	2.6	0.7	1.2	4.0
สมุทรสาคร	37	6,995	2.2	0.5	1.2	3.2
สมุทรสงคราม	60	3,384	2.3	0.6	1.1	3.6
เพชรบุรี	68	14,096	4.1	0.7	2.8	5.4
ประจวบคีรีขันธ์	30	5,861	1.7	0.5	0.8	2.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	64	82,278	4.4	1.1	2.2	6.6
บุรีรัมย์	80	56,239	5.0	1.1	2.9	7.0
สุรินทร์	79	44,531	4.5	1.1	2.4	6.6
ศรีสะเกษ	77	36,518	3.5	0.9	1.7	5.3
อุบลราชธานี	80	80,376	6.2	0.5	5.3	7.2
ยโสธร	52	8,056	2.0	0.6	0.8	3.1
ชัยภูมิ	69	36,584	4.4	1.2	2.0	6.8
อำนาจเจริญ	48	6,905	2.6	0.6	1.5	3.7
หนองบัวลำภู	52	13,357	3.5	0.5	2.5	4.5
ขอนแก่น	66	49,367	3.8	0.7	2.4	5.1
อุดรธานี	55	33,682	3.0	0.9	1.3	4.8
เลย	30	11,596	2.5	0.9	0.8	4.3
หนองคาย	71	22,549	3.6	0.7	2.1	5.0

ตารางที่ 7.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักใน 30 วันที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	105	43,622	6.1	2.3	1.6	10.6
ร้อยเอ็ด	47	26,904	2.7	1.0	0.8	4.6
กาฬสินธุ์	21	10,092	1.4	0.4	0.6	2.2
สกลนคร	58	32,476	4.1	1.5	1.0	7.1
นครพนม	61	16,526	3.3	0.9	1.5	5.1
มุกดาหาร	46	6,881	2.8	0.7	1.5	4.2
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	91	67,118	5.8	1.0	3.8	7.8
ลำพูน	104	20,496	6.7	1.4	4.0	9.4
ลำปาง	128	45,409	7.5	1.3	5.0	10.1
อุตรดิตถ์	115	27,251	8.0	1.7	4.7	11.4
แพร่	157	39,120	10.8	2.1	6.6	14.9
น่าน	100	21,130	5.7	1.5	2.8	8.6
พะเยา	145	35,487	9.4	1.6	6.3	12.5
เชียงราย	145	76,098	8.9	1.9	5.2	12.7
แม่ฮ่องสอน	48	5,672	3.8	0.9	2.0	5.7
นครสวรรค์	61	46,553	6.3	1.1	4.1	8.5
อุทัยธานี	42	6,485	2.8	0.8	1.2	4.4
กำแพงเพชร	81	26,463	5.2	0.8	3.6	6.7
ตาก	100	18,757	5.6	1.3	3.1	8.2
สุโขทัย	175	49,474	10.6	1.3	8.0	13.2
พิษณุโลก	116	47,253	7.4	2.4	2.7	12.1
พิจิตร	64	17,213	4.2	1.0	2.3	6.1
เพชรบูรณ์	76	33,374	4.6	1.2	2.1	7.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	28	19,532	1.8	0.5	0.8	2.8
กระบี่	30	4,829	1.6	0.5	0.6	2.7
พังงา	37	3,830	2.2	0.7	0.7	3.6
ภูเก็ต	42	6,817	2.9	1.4	0.1	5.6
สุราษฎร์ธานี	74	34,029	4.9	1.2	2.6	7.2
ระนอง	31	2,200	1.9	0.7	0.6	3.2
ชุมพร	56	20,296	5.9	2.0	2.0	9.7
สงขลา	57	35,500	3.8	0.9	1.9	5.7
สตูล	19	2,797	1.4	0.5	0.4	2.4
ตรัง	75	18,872	4.3	1.0	2.4	6.2
พัทลุง	83	17,324	4.6	1.2	2.2	7.0
ปัตตานี	37	6,512	1.5	0.8	0.0	3.1
ยะลา	19	1,986	0.6	0.2	0.2	1.0
นราธิวาส	14	2,376	0.5	0.2	0.1	0.9

ตารางที่ 8.1 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ในประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	6,811	3,130,525	60.1	1.2	57.7	62.5
25 - 34	7,180	3,167,792	65.5	1.0	63.6	67.3
35 - 44	7,769	3,511,660	64.9	1.0	63.0	66.9
45 - 54	6,050	2,777,843	66.9	1.2	64.5	69.3
55 - 64	9,763	1,715,409	65.9	0.9	64.2	67.6
65 - 74	4,316	745,431	63.3	1.3	60.8	65.8
รวม	41,889	15,048,660	64.3	0.8	62.8	65.9
หญิง						
15 - 24	6,673	3,094,988	64.4	1.0	62.5	66.4
25 - 34	7,009	3,131,102	65.9	1.0	63.9	67.9
35 - 44	8,491	3,944,987	67.4	0.9	65.5	69.2
45 - 54	6,845	3,069,536	66.7	1.2	64.3	69.1
55 - 64	9,699	1,944,574	65.7	0.9	63.9	67.6
65 - 74	4,427	863,303	61.9	1.2	59.5	64.2
รวม	43,144	16,048,492	65.9	0.7	64.4	67.3
ชายและหญิง						
15 - 24	13,484	6,225,514	62.2	1.0	60.3	64.1
25 - 34	14,189	6,298,894	65.7	0.8	64.1	67.3
35 - 44	16,260	7,456,648	66.2	0.8	64.6	67.8
45 - 54	12,895	5,847,379	66.8	1.0	64.9	68.7
55 - 64	19,462	3,659,983	65.8	0.8	64.3	67.4
65 - 74	8,743	1,608,734	62.5	0.9	60.7	64.4
รวมทั้งประเทศ	85,033	31,097,152	65.1	0.7	63.8	66.4

หมายเหตุ : หมายถึงคำถามที่ตอบถูกทุกข้อในเรื่องของ 1) การกินอาหารทอด แกงกะทิ และอาหารที่มีไขมันสูง จะทำให้ท่านมีระดับไขมันในเลือดสูง 2) การกินผักผลไม้ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 3) ผู้ที่ชอบกินอาหารเค็มจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ชอบกินอาหารจืด 4) ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 5) คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม 6) การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที, 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง

ตารางที่ 8.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ใน ประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	43,232	10,371,413	64.5	1.1	62.3	66.7
นอกเขตเทศบาล	41,801	20,725,739	65.4	0.8	63.8	67.1
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	1,131	2,813,418	64.8	3.5	57.9	71.6
ภาคกลาง	27,659	7,685,181	64.7	1.1	62.6	66.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,459	10,983,458	67.4	1.2	65.1	69.8
ภาคเหนือ	18,146	5,359,297	60.1	1.4	57.4	62.8
ภาคใต้	16,638	4,255,798	67.1	1.4	64.4	69.8
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	4,568	1,680,291	64.5	2.1	60.3	68.6
เขต สธ. ที่ 2	4,350	774,957	63.8	2.8	58.3	69.2
เขต สธ. ที่ 3	5,552	1,538,427	66.0	2.4	61.2	70.8
เขต สธ. ที่ 4	4,450	1,650,793	65.7	2.8	60.3	71.2
เขต สธ. ที่ 5	4,354	779,564	62.9	3.1	56.7	69.0
เขต สธ. ที่ 6	4,783	1,748,158	67.4	2.7	62.0	72.7
เขต สธ. ที่ 7	6,386	976,054	74.3	2.0	70.4	78.2
เขต สธ. ที่ 8	5,469	1,531,586	62.9	1.9	59.2	66.7
เขต สธ. ที่ 9	4,385	1,261,148	64.2	2.8	58.7	69.8
เขต สธ. ที่ 10	4,480	1,838,320	68.2	2.3	63.8	72.6
เขต สธ. ที่ 11	3,085	906,057	55.7	4.0	47.8	63.6
เขต สธ. ที่ 12	4,858	2,811,409	72.7	2.7	67.5	77.9
เขต สธ. ที่ 13	4,453	2,152,000	69.0	2.8	63.6	74.5
เขต สธ. ที่ 14	4,583	3,275,672	65.8	2.0	61.8	69.8
เขต สธ. ที่ 15	4,235	1,333,805	58.2	3.0	52.2	64.2
เขต สธ. ที่ 16	4,276	1,216,134	60.4	2.2	56.1	64.7
เขต สธ. ที่ 17	5,221	1,561,782	60.6	3.0	54.7	66.5
เขต สธ. ที่ 18	4,414	1,247,576	61.3	2.6	56.2	66.5

ตารางที่ 8.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ใน ประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ						
เขต สปสช. ที่ 1	8,511	2,549,939	59.2	1.9	55.5	63.0
เขต สปสช. ที่ 2	5,221	1,561,782	60.6	3.0	54.7	66.5
เขต สปสช. ที่ 3	5,466	1,390,821	60.6	2.5	55.8	65.5
เขต สปสช. ที่ 4	8,936	2,422,157	64.5	1.6	61.3	67.7
เขต สปสช. ที่ 5	8,804	2,430,358	64.8	2.1	60.6	69.0
เขต สปสช. ที่ 6	8,867	2,689,421	65.6	1.9	61.8	69.3
เขต สปสช. ที่ 7	5,756	2,930,627	71.1	2.6	66.0	76.3
เขต สปสช. ที่ 8	6,667	2,625,158	64.5	2.2	60.3	68.8
เขต สปสช. ที่ 9	4,583	3,275,672	65.8	2.0	61.8	69.8
เขต สปสช. ที่ 10	4,453	2,152,000	69.0	2.8	63.6	74.5
เขต สปสช. ที่ 11	8,711	2,143,608	69.8	2.4	65.1	74.5
เขต สปสช. ที่ 12	7,927	2,112,190	64.6	1.5	61.6	67.6
เขต สปสช. ที่ 13	1,131	2,813,418	64.8	3.5	57.9	71.6
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร. ที่ 1	3,376	1,373,011	63.9	2.4	59.3	68.6
เขต สคร. ที่ 2	5,542	1,082,237	64.6	2.4	59.9	69.4
เขต สคร. ที่ 3	9,937	2,799,575	65.2	1.8	61.6	68.8
เขต สคร. ที่ 4	8,804	2,430,358	64.8	2.1	60.6	69.0
เขต สคร. ที่ 5	4,583	3,275,672	65.8	2.0	61.8	69.8
เขต สคร. ที่ 6	9,338	4,649,728	70.9	1.9	67.2	74.5
เขต สคร. ที่ 7	7,538	3,058,057	64.4	2.3	59.9	69.0
เขต สคร. ที่ 8	4,414	1,247,576	61.3	2.6	56.2	66.5
เขต สคร. ที่ 9	5,221	1,561,782	60.6	3.0	54.7	66.5
เขต สคร. ที่ 10	8,511	2,549,939	59.2	1.9	55.5	63.0
เขต สคร. ที่ 11	8,711	2,143,608	69.8	2.4	65.1	74.5
เขต สคร. ที่ 12	7,927	2,112,190	64.6	1.5	61.6	67.6

ตารางที่ 8.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ใน ประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,131	2,813,418	64.8	3.5	57.6	72.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,211	632,697	71.3	4.1	63.3	79.3
นนทบุรี	1,105	541,057	65.1	3.9	57.6	72.7
ปทุมธานี	1,076	429,688	59.0	3.8	51.6	66.4
พระนครศรีอยุธยา	1,195	402,265	68.4	3.2	62.1	74.6
อ่างทอง	1,078	146,158	66.9	4.1	58.9	74.8
ลพบุรี	1,065	371,419	65.1	3.8	57.6	72.5
สิงห์บุรี	1,155	114,135	68.5	4.2	60.3	76.7
ชัยนาท	1,052	143,245	55.2	8.1	39.2	71.1
สระบุรี	1,192	307,281	66.9	4.9	57.3	76.4
ชลบุรี	1,142	631,184	65.6	5.0	55.7	75.5
ระยอง	1,042	291,334	64.3	4.5	55.5	73.1
จันทบุรี	1,010	227,939	58.8	2.7	53.4	64.1
ตราด	1,191	110,691	68.7	7.1	54.8	82.6
ฉะเชิงเทรา	1,149	345,244	68.4	5.7	57.2	79.7
ปราจีนบุรี	1,102	234,635	67.9	3.9	60.2	75.6
นครนายก	1,070	110,153	57.2	4.6	48.1	66.3
สระแก้ว	1,020	215,697	53.8	6.3	41.3	66.2
ราชบุรี	1,153	417,406	66.3	3.5	59.5	73.2
กาญจนบุรี	996	346,086	59.5	6.2	47.2	71.8
สุพรรณบุรี	1,107	431,747	66.7	5.6	55.7	77.8
นครปฐม	1,194	455,554	69.7	6.3	57.3	82.2
สมุทรสาคร	1,224	250,322	68.8	6.2	56.6	81.0
สมุทรสงคราม	955	78,764	52.6	5.5	41.8	63.5
เพชรบุรี	985	198,385	56.6	5.5	45.8	67.3
ประจวบคีรีขันธ์	1,190	252,094	67.1	6.2	54.9	79.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,121	1,197,686	61.4	2.7	56.1	66.8
บุรีรัมย์	1,258	872,909	75.9	3.7	68.6	83.2
สุรินทร์	1,194	698,185	68.5	4.9	58.9	78.1
ศรีสะเกษ	961	660,513	60.8	5.4	50.3	71.3
อุบลราชธานี	1,254	1,040,180	78.0	4.0	70.1	86.0
ยโสธร	1,186	277,734	66.5	6.8	53.3	79.8
ชัยภูมิ	1,010	506,892	59.0	5.6	47.9	70.1
อำนาจเจริญ	1,052	173,574	61.6	3.8	54.2	69.1
หนองบัวลำภู	1,064	233,039	61.3	2.3	56.7	65.9
ขอนแก่น	1,221	953,049	69.9	3.7	62.6	77.2
อุดรธานี	1,209	827,054	71.0	4.6	62.0	80.1
เลย	1,115	328,724	69.6	3.3	63.1	76.1
หนองคาย	1,092	449,502	66.2	3.7	58.9	73.5

ตารางที่ 8.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ใน ประชากรอายุ 15- 74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	1,164	514,084	70.3	5.4	59.7	80.9
ร้อยเอ็ด	1,244	806,305	79.6	6.1	67.7	91.5
กาฬสินธุ์	1,229	537,971	70.9	3.1	64.9	76.9
สกลนคร	1,029	480,430	56.7	6.5	43.9	69.5
นครพนม	1,158	306,408	58.2	5.7	47.1	69.3
มุกดาหาร	898	119,218	47.0	7.5	32.3	61.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	919	612,782	50.8	4.9	41.3	60.4
ลำพูน	1,150	224,494	69.6	4.3	61.1	78.0
ลำปาง	1,162	410,971	67.5	4.5	58.6	76.4
อุตรดิตถ์	1,122	233,011	64.8	3.9	57.1	72.5
แพร่	1,142	247,250	66.4	4.1	58.4	74.4
น่าน	1,037	222,127	59.9	7.3	45.7	74.2
พะเยา	1,081	243,193	62.4	3.8	54.8	70.0
เชียงราย	1,016	503,564	57.2	3.2	50.8	63.5
แม่ฮ่องสอน	1,004	85,558	55.0	6.6	42.0	68.1
นครสวรรค์	1,077	467,682	57.5	4.3	49.0	66.0
อุทัยธานี	1,174	163,765	65.6	7.4	51.1	80.1
กำแพงเพชร	1,047	343,325	62.7	3.1	56.6	68.7
ตาก	952	174,667	50.8	6.9	37.1	64.4
สุโขทัย	1,079	294,939	63.0	5.2	52.9	73.2
พิษณุโลก	1,065	416,882	63.9	5.9	52.3	75.4
พิจิตร	1,116	272,804	64.4	4.4	55.8	73.0
เพชรบูรณ์	1,003	442,283	58.7	7.2	44.5	72.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,159	711,446	63.4	5.4	52.7	74.1
กระบี่	1,348	232,123	76.1	4.7	66.7	85.4
พังงา	1,272	141,844	76.3	5.8	64.9	87.6
ภูเก็ต	1,206	169,703	69.3	3.8	61.9	76.7
สุราษฎร์ธานี	1,274	533,512	73.3	2.8	67.8	78.8
ระนอง	1,211	82,186	67.5	4.9	57.9	77.1
ชุมพร	1,241	272,794	75.2	5.6	64.2	86.2
สงขลา	1,083	623,175	64.0	3.2	57.7	70.3
สตูล	1,097	126,839	60.6	5.1	50.5	70.8
ตรัง	1,349	350,197	76.9	3.5	70.1	83.7
พัทลุง	1,109	230,407	60.5	2.6	55.3	65.7
ปัตตานี	1,048	285,405	66.0	3.2	59.7	72.3
ยะลา	1,176	220,114	67.7	4.5	58.8	76.6
นราธิวาส	1,065	276,053	56.0	5.3	45.5	66.5

ตารางที่ 9.1 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	1,621	802,533	16.3	0.9	14.6	18.0
25 - 34	3,053	1,311,625	28.4	1.0	26.4	30.3
35 - 44	5,520	2,349,209	45.2	1.0	43.2	47.2
45 - 54	4,984	2,197,036	55.4	1.3	52.9	57.9
55 - 64	9,411	1,556,663	62.4	1.0	60.5	64.4
65 - 74	4,589	760,202	67.5	1.2	65.3	69.8
รวม	29,178	8,977,268	40.2	0.7	38.8	41.6
หญิง						
15 - 24	1,880	910,213	19.7	0.9	18.0	21.4
25 - 34	3,902	1,757,601	38.6	1.0	36.7	40.5
35 - 44	7,350	3,222,875	57.1	0.9	55.3	59.0
45 - 54	6,582	2,860,620	64.4	1.1	62.3	66.6
55 - 64	10,870	2,134,693	74.7	0.8	73.1	76.2
65 - 74	5,232	1,010,116	74.4	1.0	72.3	76.4
รวม	35,816	11,896,118	50.7	0.7	49.4	52.0
ชายและหญิง						
15 - 24	3,501	1,712,746	17.9	0.7	16.5	19.4
25 - 34	6,955	3,069,226	33.4	0.8	31.8	35.1
35 - 44	12,870	5,572,084	51.4	0.8	49.8	53.1
45 - 54	11,566	5,057,656	60.2	1.0	58.3	62.1
55 - 64	20,281	3,691,356	69.0	0.8	67.5	70.5
65 - 74	9,821	1,770,318	71.3	0.9	69.5	73.1
รวมทั้งประเทศ	64,994	20,873,386	45.6	0.6	44.3	46.8

ตารางที่ 9.2 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	32,214	6,318,897	41.4	0.8	39.8	43.0
นอกเขตเทศบาล	32,780	14,554,489	47.6	0.8	46.0	49.3
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	497	1,132,597	27.3	2.0	23.5	31.2
ภาคกลาง	21,043	5,127,469	45.1	1.1	43.0	47.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,261	7,992,308	51.1	1.3	48.6	53.5
ภาคเหนือ	13,925	3,795,233	44.7	1.3	42.1	47.2
ภาคใต้	12,268	2,825,779	46.0	1.4	43.2	48.9
เขตตรวจราชการสาธารณสุข						
เขต สช. ที่ 1	3,310	1,055,133	42.6	2.5	37.6	47.6
เขต สช. ที่ 2	3,349	502,568	42.2	2.1	38.1	46.4
เขต สช. ที่ 3	4,641	1,225,621	54.3	2.2	50.0	58.6
เขต สช. ที่ 4	3,051	922,847	38.0	2.2	33.6	42.3
เขต สช. ที่ 5	3,220	478,477	42.3	2.3	37.8	46.8
เขต สช. ที่ 6	3,697	1,228,717	48.9	2.8	43.4	54.4
เขต สช. ที่ 7	4,585	619,053	48.6	2.3	44.1	53.1
เขต สช. ที่ 8	3,986	978,008	41.6	2.0	37.7	45.5
เขต สช. ที่ 9	3,472	942,823	49.9	2.6	44.7	55.1
เขต สช. ที่ 10	3,978	1,535,898	60.0	2.2	55.7	64.3
เขต สช. ที่ 11	2,657	745,684	48.0	3.2	41.7	54.3
เขต สช. ที่ 12	3,939	2,186,939	59.0	2.1	54.8	63.2
เขต สช. ที่ 13	3,321	1,281,215	42.5	2.8	37.1	48.0
เขต สช. ที่ 14	3,366	2,242,572	46.6	2.8	41.0	52.1
เขต สช. ที่ 15	3,009	904,899	40.9	3.0	34.9	46.8
เขต สช. ที่ 16	3,726	946,800	48.4	2.3	43.9	53.0
เขต สช. ที่ 17	4,116	1,188,387	47.9	1.9	44.1	51.7
เขต สช. ที่ 18	3,074	755,148	40.9	3.0	35.1	46.8

ตารางที่ 9.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
เขต สปสช. ที่ 1	6,735	1,851,698	44.4	1.9	40.6	48.2
เขต สปสช. ที่ 2	4,116	1,188,387	47.9	1.9	44.1	51.7
เขต สปสช. ที่ 3	3,942	873,556	41.6	2.7	36.4	46.9
เขต สปสช. ที่ 4	6,673	1,538,624	42.8	1.9	39.1	46.4
เขต สปสช. ที่ 5	6,271	1,401,324	39.3	1.7	36.0	42.7
เขต สปสช. ที่ 6	7,231	2,069,113	52.2	1.8	48.8	55.7
เขต สปสช. ที่ 7	4,547	2,256,273	57.1	2.0	53.1	61.0
เขต สปสช. ที่ 8	6,027	2,212,248	57.2	1.9	53.4	61.0
เขต สปสช. ที่ 9	3,366	2,242,572	46.6	2.8	41.0	52.1
เขต สปสช. ที่ 10	3,321	1,281,215	42.5	2.8	37.1	48.0
เขต สปสช. ที่ 11	6,176	1,385,845	46.7	2.4	41.9	51.5
เขต สปสช. ที่ 12	6,092	1,439,933	45.4	1.6	42.3	48.6
เขต สปสช. ที่ 13	497	1,132,597	27.3	2.0	23.5	31.2
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร.ที่ 1	2,420	846,521	41.9	2.9	36.2	47.6
เขต สคร.ที่ 2	4,239	711,180	43.2	2.0	39.4	47.0
เขต สคร.ที่ 3	8,113	2,168,444	52.3	1.7	49.0	55.6
เขต สคร.ที่ 4	6,271	1,401,324	39.3	1.7	36.0	42.7
เขต สคร.ที่ 5	3,366	2,242,572	46.6	2.8	41.0	52.1
เขต สคร.ที่ 6	7,917	3,722,838	59.4	1.6	56.4	62.5
เขต สคร.ที่ 7	5,978	2,026,898	44.4	2.1	40.2	48.6
เขต สคร.ที่ 8	3,074	755,148	40.9	3.0	35.1	46.8
เขต สคร.ที่ 9	4,116	1,188,387	47.9	1.9	44.1	51.7
เขต สคร.ที่ 10	6,735	1,851,698	44.4	1.9	40.6	48.2
เขต สคร.ที่ 11	6,176	1,385,845	46.7	2.4	41.9	51.5
เขต สคร.ที่ 12	6,092	1,439,933	45.4	1.6	42.3	48.6

ตารางที่ 9.3 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	497	1,132,597	27.3	2.0	23.5	31.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,062	502,950	59.0	4.0	51.1	66.9
นนทบุรี	772	292,802	37.2	4.3	28.8	45.6
ปทุมธานี	804	277,503	41.4	5.2	31.2	51.6
พระนครศรีอยุธยา	844	276,216	49.0	5.0	39.3	58.7
อ่างทอง	919	112,261	51.7	5.1	41.8	61.6
ลพบุรี	711	193,126	34.7	3.3	28.2	41.2
สิงห์บุรี	851	78,772	48.5	3.9	41.0	56.1
ชัยนาท	868	118,408	46.6	3.4	39.9	53.2
สระบุรี	890	208,613	45.8	4.5	37.0	54.5
ชลบุรี	968	520,928	56.5	4.1	48.5	64.5
ระยอง	879	196,739	45.0	4.8	35.6	54.5
จันทบุรี	778	163,694	44.2	3.1	38.1	50.2
ตราด	847	61,463	38.7	5.9	27.1	50.3
ฉะเชิงเทรา	955	266,863	54.3	2.8	48.8	59.9
ปราจีนบุรี	917	176,328	51.3	4.3	42.9	59.7
นครนายก	882	99,332	53.5	3.3	47.0	60.0
สระแก้ว	825	180,148	46.8	7.0	33.1	60.4
ราชบุรี	820	260,766	42.5	4.3	34.2	50.9
กาญจนบุรี	703	196,131	34.9	3.6	27.9	41.9
สุพรรณบุรี	800	248,001	39.2	5.5	28.5	50.0
นครปฐม	728	217,949	35.0	3.8	27.5	42.4
สมุทรสาคร	749	113,677	36.9	4.0	29.1	44.8
สมุทรสงคราม	842	55,960	40.9	5.0	31.0	50.8
เพชรบุรี	779	133,510	39.3	3.2	33.0	45.6
ประจวบคีรีขันธ์	850	175,329	50.5	5.2	40.4	60.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	887	937,320	49.5	5.4	38.9	60.1
บุรีรัมย์	913	568,390	50.3	5.7	39.1	61.5
สุรินทร์	867	417,636	42.6	5.5	31.9	53.4
ศรีสะเกษ	577	325,597	31.3	5.8	19.9	42.6
อุบลราชธานี	841	601,231	46.7	3.1	40.5	52.9
ยโสธร	967	203,855	49.0	7.3	34.6	63.3
ชัยภูมิ	699	319,226	39.3	3.3	32.7	45.8
อำนาจเจริญ	936	150,531	56.1	2.4	51.3	60.8
หนองบัวลำภู	949	187,643	49.4	3.0	43.5	55.2
ขอนแก่น	934	720,766	55.7	3.9	48.1	63.4
อุดรธานี	1,101	720,590	66.7	4.3	58.3	75.1
เลย	950	270,701	58.8	3.9	51.2	66.3
หนองคาย	978	356,965	55.9	3.3	49.4	62.3

ตารางที่ 9.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	1,032	463,583	64.5	5.6	53.4	75.5
ร้อยเอ็ด	1,095	610,840	61.6	3.0	55.7	67.6
กาฬสินธุ์	878	391,751	55.7	4.8	46.2	65.2
สกลนคร	928	405,716	50.4	5.3	40.0	60.8
นครพนม	1,121	270,634	53.9	4.2	45.7	62.2
มุกดาหาร	608	69,334	28.2	5.7	16.9	39.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	720	467,413	40.5	5.3	30.0	50.9
ลำพูน	740	129,134	41.2	4.5	32.4	50.1
ลำปาง	816	257,513	42.6	3.8	35.2	50.1
อุตรดิตถ์	737	140,604	41.2	4.2	33.0	49.4
แพร่	1,062	219,603	59.9	4.8	50.5	69.3
น่าน	894	153,781	42.3	6.5	29.7	55.0
พะเยา	955	206,331	54.7	3.9	47.0	62.3
เชียงราย	815	367,085	43.3	3.5	36.4	50.2
แม่ฮ่องสอน	733	50,839	35.8	4.1	27.7	43.9
นครสวรรค์	808	262,756	38.6	5.0	28.9	48.4
อุทัยธานี	732	88,974	38.5	7.2	24.3	52.7
กำแพงเพชร	723	213,029	40.8	6.6	27.8	53.7
ตาก	778	132,918	40.3	3.7	33.1	47.6
สุโขทัย	947	254,943	55.0	3.7	47.7	62.4
พิษณุโลก	873	326,862	51.9	5.0	42.2	61.6
พิจิตร	811	190,389	46.4	2.7	41.1	51.8
เพชรบูรณ์	781	333,060	46.3	3.2	40.2	52.5
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	733	473,304	43.1	5.1	33.2	53.1
กระบี่	901	128,928	43.3	4.0	35.4	51.2
พังงา	959	97,247	53.3	6.0	41.5	65.1
ภูเก็ต	802	92,690	39.1	5.5	28.3	49.9
สุราษฎร์ธานี	972	361,709	52.5	5.7	41.2	63.7
ระนอง	905	53,253	45.9	5.4	35.2	56.5
ชุมพร	904	178,715	51.3	3.4	44.6	58.0
สงขลา	642	353,635	37.8	4.0	29.9	45.8
สตูล	841	94,382	47.8	5.1	37.8	57.8
ตรัง	1,018	246,935	56.1	4.0	48.2	64.0
พัทลุง	1,088	214,990	56.8	3.1	50.7	62.9
ปัตตานี	806	163,745	39.1	4.0	31.3	46.9
ยะลา	838	139,619	44.4	4.1	36.4	52.4
นราธิวาส	859	226,628	46.7	4.0	38.8	54.6

ตารางที่ 10.1 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15-24	4,355	2,027,148	41.8	1.0	39.9	43.8
25-34	6,004	2,506,967	54.9	1.1	52.8	57.0
35-44	8,111	3,438,331	66.6	1.0	64.7	68.5
45-54	6,811	2,962,783	74.2	1.1	72.1	76.3
55-64	11,907	2,011,489	80.3	0.7	78.8	81.7
65-74	5,653	952,336	83.9	0.9	82.1	85.7
รวม	42,841	13,899,054	41.8	1.0	39.9	43.8
หญิง						
15-24	4,922	2,294,641	50.8	1.0	48.8	52.8
25-34	7,041	3,066,825	67.7	1.0	65.8	69.6
35-44	9,884	4,378,875	78.3	0.8	76.7	79.8
45-54	8,283	3,605,075	81.0	1.0	79.0	82.9
55-64	12,786	2,529,442	87.9	0.6	86.8	89.1
65-74	6,191	1,204,855	88.3	0.9	86.6	89.9
รวม	49,107	17,079,713	73.2	0.6	72.1	74.3
ชายและหญิง						
15-24	9,277	4,321,790	46.2	0.9	44.5	47.8
25-34	13,045	5,573,792	61.3	0.8	59.6	62.9
35-44	17,995	7,817,207	72.7	0.7	71.2	74.1
45-54	15,094	6,567,857	77.8	0.8	76.1	79.4
55-64	24,693	4,540,931	84.4	0.5	83.3	85.4
65-74	11,844	2,157,191	86.3	0.7	84.9	87.7
รวมทั้งประเทศ	91,948	30,978,767	68.0	0.5	66.9	69.1

ตารางที่ 10.2 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความ เชื่อมั่นของ ค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	44,679	8,936,273	58.8	1.0	56.9	60.6
นอกเขตเทศบาล	47,269	22,042,494	72.6	0.7	71.3	73.9
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	631	1,478,716	35.3	2.5	30.3	40.3
ภาคกลาง	29,511	7,475,309	66.4	1.0	64.4	68.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23,351	11,499,842	73.9	0.9	72.1	75.8
ภาคเหนือ	21,716	6,368,965	75.3	1.0	73.3	77.3
ภาคใต้	16,739	4,155,935	68.3	1.1	66.1	70.5
เขตตรวจราชการสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	4,534	1,545,575	63.1	2.5	58.2	68.0
เขต สธ. ที่ 2	5,280	898,984	75.9	1.8	72.3	79.5
เขต สธ. ที่ 3	6,038	1,593,303	70.9	1.9	67.3	74.6
เขต สธ. ที่ 4	4,328	1,425,341	59.1	2.6	54.1	64.1
เขต สธ. ที่ 5	4,513	707,850	64.7	1.9	60.9	68.5
เขต สธ. ที่ 6	5,077	1,829,604	73.0	1.9	69.3	76.8
เขต สธ. ที่ 7	6,079	865,039	68.7	2.2	64.4	73.1
เขต สธ. ที่ 8	5,583	1,461,292	62.9	1.9	59.2	66.7
เขต สธ. ที่ 9	4,818	1,304,257	69.6	1.7	66.3	72.8
เขต สธ. ที่ 10	4,956	1,927,335	75.5	1.6	72.3	78.6
เขต สธ. ที่ 11	3,417	1,029,476	67.0	3.1	60.9	73.2
เขต สธ. ที่ 12	4,851	2,696,810	73.5	2.1	69.4	77.5
เขต สธ. ที่ 13	5,045	2,188,199	72.7	2.1	68.6	76.8
เขต สธ. ที่ 14	5,082	3,658,022	76.4	1.8	73.0	79.9
เขต สธ. ที่ 15	5,211	1,677,191	76.1	2.0	72.2	80.1
เขต สธ. ที่ 16	5,500	1,554,920	80.8	1.7	77.5	84.1
เขต สธ. ที่ 17	6,116	1,810,144	73.0	1.5	70.1	75.9
เขต สธ. ที่ 18	4,889	1,326,710	71.7	2.7	66.3	77.1

ตารางที่ 10.2 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
เขต สปสช. ที่ 1	10,711	3,232,112	78.3	1.3	75.6	80.9
เขต สปสช. ที่ 2	6,116	1,810,144	73.0	1.5	70.1	75.9
เขต สปสช. ที่ 3	6,160	1,507,785	71.7	2.4	66.9	76.5
เขต สปสช. ที่ 4	9,684	2,395,064	67.1	1.9	63.4	70.8
เขต สปสช. ที่ 5	8,841	2,133,190	60.8	1.9	57.1	64.5
เขต สปสช. ที่ 6	9,715	2,765,980	70.3	1.3	67.8	72.9
เขต สปสช. ที่ 7	5,734	2,806,476	71.7	1.9	67.9	75.5
เขต สปสช. ที่ 8	7,490	2,847,145	74.0	1.5	71.0	77.1
เขต สปสช. ที่ 9	5,082	3,658,022	76.4	1.8	73.0	79.9
เขต สปสช. ที่ 10	5,045	2,188,199	72.7	2.1	68.6	76.8
เขต สปสช. ที่ 11	8,458	2,065,474	69.9	1.8	66.4	73.4
เขต สปสช. ที่ 12	8,281	2,090,460	66.7	1.5	63.9	69.6
เขต สปสช. ที่ 13	631	1,478,716	35.3	2.5	30.3	40.3
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร.ที่ 1	3,321	1,248,895	62.5	2.9	56.8	68.2
เขต สคร.ที่ 2	6,493	1,195,665	73.1	1.8	69.6	76.6
เขต สคร.ที่ 3	10,856	2,897,559	70.3	1.3	67.8	72.8
เขต สคร.ที่ 4	8,841	2,133,190	60.8	1.9	57.1	64.5
เขต สคร.ที่ 5	5,082	3,658,022	76.4	1.8	73.0	79.9
เขต สคร.ที่ 6	9,807	4,624,145	74.3	1.4	71.5	77.1
เขต สคร.ที่ 7	8,462	3,217,675	70.8	1.7	67.4	74.2
เขต สคร.ที่ 8	4,889	1,326,710	71.7	2.7	66.3	77.1
เขต สคร.ที่ 9	6,116	1,810,144	73.0	1.5	70.1	75.9
เขต สคร.ที่ 10	10,711	3,232,112	78.3	1.3	75.6	80.9
เขต สคร.ที่ 11	8,458	2,065,474	69.9	1.8	66.4	73.4
เขต สคร.ที่ 12	8,281	2,090,460	66.7	1.5	63.9	69.6

ตารางที่ 10.3 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	631	1,478,716	35.30	2.53	30.33	40.26
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,228	596,370	69.9	3.4	63.2	76.6
นนทบุรี	1,045	419,538	53.8	5.6	42.8	64.8
ปทุมธานี	1,019	404,362	61.7	3.6	54.7	68.7
พระนครศรีอยุธยา	1,257	424,995	75.4	3.1	69.4	81.4
อ่างทอง	1,454	179,759	82.9	3.8	75.6	90.3
ลพบุรี	1,273	413,511	74.6	3.1	68.5	80.8
สิงห์บุรี	1,282	124,639	77.5	3.2	71.2	83.7
ชัยนาท	1,271	181,075	71.7	3.3	65.3	78.2
สระบุรี	1,213	296,680	65.7	4.3	57.2	74.2
ชลบุรี	1,186	649,637	71.3	2.9	65.7	77.0
ระยอง	1,172	284,867	65.7	2.6	60.7	70.8
จันทบุรี	1,208	260,372	69.9	2.2	65.5	74.3
ตราด	1,252	109,381	69.0	2.7	63.7	74.3
ฉะเชิงเทรา	1,220	352,051	72.3	3.6	65.1	79.4
ปราจีนบุรี	1,272	252,718	73.7	4.4	65.0	82.4
นครนายก	1,141	131,580	70.2	3.5	63.3	77.0
สระแก้ว	1,177	260,584	69.5	4.6	60.4	78.5
ราชบุรี	1,236	421,781	69.4	4.0	61.5	77.2
กาญจนบุรี	1,058	317,192	56.4	4.1	48.5	64.4
สุพรรณบุรี	1,091	353,092	56.4	6.2	44.3	68.6
นครปฐม	943	333,276	54.0	5.1	44.1	64.0
สมุทรสาคร	1,036	173,528	61.6	3.0	55.7	67.5
สมุทรสงคราม	1,240	84,872	61.4	6.4	48.8	74.0
เพชรบุรี	1,164	221,566	65.6	2.6	60.6	70.7
ประจวบคีรีขันธ์	1,073	227,883	67.7	4.3	59.2	76.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,305	1,450,501	77.8	3.1	71.8	83.9
บุรีรัมย์	1,315	873,237	77.3	3.3	70.9	83.7
สุรินทร์	1,265	752,212	76.8	4.3	68.4	85.2
ศรีสะเกษ	1,189	750,460	72.2	4.8	62.9	81.6
อุบลราชธานี	1,171	913,131	71.0	2.4	66.3	75.7
ยโสธร	1,339	307,047	74.0	5.7	62.8	85.2
ชัยภูมิ	1,197	582,072	71.5	2.9	65.8	77.1
อำนาจเจริญ	1,346	217,560	80.9	3.1	74.9	87.0
หนองบัวลำภู	1,230	260,502	68.6	2.4	63.9	73.3
ขอนแก่น	1,140	892,395	70.4	3.7	63.1	77.6
อุดรธานี	1,295	856,207	78.3	2.6	73.2	83.4
เลย	1,185	335,895	74.0	2.7	68.8	79.3
หนองคาย	1,246	474,731	75.8	3.9	68.3	83.4

ตารางที่ 10.3 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความ เชื่อมั่นของ ค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	1,273	564,400	79.3	2.8	73.8	84.8
ร้อยเอ็ด	1,301	729,514	73.8	4.7	64.7	83.0
กาฬสินธุ์	1,137	510,501	72.8	4.0	64.9	80.7
สกลนคร	1,179	549,912	69.3	5.1	59.2	79.3
นครพนม	1,355	369,898	74.2	3.1	68.2	80.3
มุกดาหาร	883	109,666	45.1	7.4	30.5	59.6
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,263	869,758	75.9	3.3	69.5	82.3
ลำพูน	1,269	230,728	74.4	4.7	65.2	83.7
ลำปาง	1,358	462,590	76.9	3.1	70.8	83.0
อุตรดิตถ์	1,115	238,423	70.6	2.9	64.9	76.3
แพร่	1,414	307,727	84.5	2.5	79.7	89.4
น่าน	1,412	284,411	77.9	3.4	71.4	84.5
พะเยา	1,378	307,110	82.8	2.3	78.3	87.2
เชียงราย	1,296	655,672	79.5	3.4	72.9	86.1
แม่ฮ่องสอน	1,321	114,115	78.0	3.6	71.0	85.0
นครสวรรค์	1,198	460,151	65.5	5.2	55.3	75.7
อุทัยธานี	1,230	178,332	77.7	4.0	69.9	85.5
กำแพงเพชร	1,244	385,855	75.3	3.1	69.2	81.5
ตาก	1,205	220,919	67.7	3.7	60.4	75.0
สุโขทัย	1,375	367,932	79.4	2.5	74.6	84.2
พิษณุโลก	1,257	478,241	75.9	2.5	71.0	80.7
พิจิตร	1,217	302,372	74.4	2.2	70.0	78.7
เพชรบูรณ์	1,164	504,629	70.0	3.7	62.8	77.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,136	761,902	70.0	3.3	63.4	76.5
กระบี่	1,203	186,685	63.4	5.0	53.7	73.2
พังงา	1,281	137,584	75.2	4.6	66.1	84.2
ภูเก็ต	1,047	132,909	56.8	6.3	44.4	69.1
สุราษฎร์ธานี	1,264	510,995	73.6	4.0	65.7	81.5
ระนอง	1,263	85,149	74.6	2.6	69.4	79.8
ชุมพร	1,264	250,250	72.6	3.1	66.5	78.7
สงขลา	919	531,427	57.6	4.4	49.1	66.1
สตูล	1,181	142,979	72.7	4.1	64.6	80.9
ตรัง	1,285	322,711	74.6	3.0	68.6	80.5
พัทลุง	1,413	306,457	81.3	1.6	78.1	84.5
ปัตตานี	1,226	279,733	68.4	2.8	62.9	74.0
ยะลา	1,130	189,841	61.3	3.2	55.1	67.5
นราธิวาส	1,127	317,312	65.4	3.8	58.0	72.8

ตารางที่ 11.1 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ชาย						
15 - 24	551	303,985	6.1	0.6	5.0	7.2
25 - 34	1,184	509,399	11.0	0.6	9.9	12.0
35 - 44	2,251	936,588	18.0	0.7	16.5	19.4
45 - 54	2,404	1,049,411	26.3	1.3	23.8	28.9
55 - 64	4,692	764,815	30.8	0.8	29.4	32.3
65 - 74	2,558	407,872	36.7	1.1	34.5	38.9
รวม	13,640	3,972,070	17.7	0.5	16.7	18.7
หญิง						
15 - 24	622	319,608	6.9	0.6	5.7	8.1
25 - 34	1,490	666,397	14.6	0.7	13.1	16.0
35 - 44	2,955	1,275,515	22.6	0.8	21.1	24.0
45 - 54	3,321	1,443,017	32.7	1.0	30.8	34.5
55 - 64	5,981	1,169,422	41.5	0.9	39.7	43.2
65 - 74	3,063	584,015	44.0	1.2	41.8	46.3
รวม	17,432	5,457,974	23.3	0.5	22.3	24.3
ชายและหญิง						
15 - 24	1,173	623,593	6.5	0.5	5.5	7.5
25 - 34	2,674	1,175,795	12.8	0.5	11.7	13.8
35 - 44	5,206	2,212,103	20.4	0.6	19.2	21.5
45 - 54	5,725	2,492,428	29.7	0.9	27.9	31.4
55 - 64	10,673	1,934,237	36.5	0.7	35.2	37.8
65 - 74	5,621	991,887	40.7	0.9	38.9	42.4
รวมทั้งประเทศ	31,072	9,430,044	20.6	0.4	19.7	21.4

ตารางที่ 11.2 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	17,771	3,933,904	25.7	0.7	24.3	27.0
นอกเขตเทศบาล	13,301	5,496,140	18.0	0.6	16.9	19.1
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	517	1,184,475	28.2	1.9	24.4	31.9
ภาคกลาง	11,337	2,621,325	23.0	0.8	21.4	24.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,767	2,916,218	18.7	0.9	16.9	20.4
ภาคเหนือ	7,045	1,705,617	20.0	0.9	18.2	21.8
ภาคใต้	5,406	1,002,409	16.5	0.8	15.0	17.9
เขตตรวจราชการสาธารณสุข						
เขต สธ. ที่ 1	2,147	661,513	26.6	2.0	22.6	30.5
เขต สธ. ที่ 2	1,833	258,038	21.6	1.6	18.4	24.8
เขต สธ. ที่ 3	2,175	519,442	23.1	2.2	18.9	27.3
เขต สธ. ที่ 4	1,374	381,679	15.7	1.2	13.4	18.0
เขต สธ. ที่ 5	1,679	227,554	19.6	1.7	16.1	23.0
เขต สธ. ที่ 6	1,482	406,230	16.1	1.0	14.2	18.1
เขต สธ. ที่ 7	2,543	287,784	22.9	1.7	19.5	26.2
เขต สธ. ที่ 8	1,381	308,396	13.4	1.5	10.5	16.2
เขต สธ. ที่ 9	2,129	573,098	30.4	1.8	26.9	34.0
เขต สธ. ที่ 10	1,189	432,112	16.7	1.7	13.4	19.9
เขต สธ. ที่ 11	1,060	272,550	17.5	3.4	10.8	24.2
เขต สธ. ที่ 12	1,433	744,018	20.3	2.5	15.5	25.2
เขต สธ. ที่ 13	1,807	756,395	25.1	1.9	21.3	28.9
เขต สธ. ที่ 14	1,278	711,143	14.8	1.0	12.8	16.8
เขต สธ. ที่ 15	1,596	514,094	23.1	2.8	17.7	28.6
เขต สธ. ที่ 16	1,719	354,590	18.2	1.3	15.6	20.8
เขต สธ. ที่ 17	2,145	476,576	19.1	1.2	16.7	21.5
เขต สธ. ที่ 18	1,585	360,357	19.3	1.2	16.9	21.7

ตารางที่ 11.2 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามพื้นที่ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ						
เขต สปสช. ที่ 1	3,315	868,684	20.8	1.6	17.7	24.0
เขต สปสช. ที่ 2	2,145	476,576	19.1	1.2	16.7	21.5
เขต สปสช. ที่ 3	1,992	410,908	19.4	1.2	17.1	21.7
เขต สปสช. ที่ 4	4,034	909,671	25.2	1.5	22.3	28.0
เขต สปสช. ที่ 5	3,053	609,234	17.0	1.0	15.0	18.9
เขต สปสช. ที่ 6	3,843	1,051,868	26.6	1.6	23.6	29.7
เขต สปสช. ที่ 7	1,715	774,169	19.8	2.4	15.2	24.5
เขต สปสช. ที่ 8	1,967	674,511	17.3	1.7	13.9	20.7
เขต สปสช. ที่ 9	1,278	711,143	14.8	1.0	12.8	16.8
เขต สปสช. ที่ 10	1,807	756,395	25.1	1.9	21.3	28.9
เขต สปสช. ที่ 11	3,052	510,814	17.1	1.0	15.1	19.1
เขต สปสช. ที่ 12	2,354	491,595	15.8	1.1	13.6	18.0
เขต สปสช. ที่ 13	517	1,184,475	28.2	1.9	24.4	31.9
เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค						
เขต สคร.ที่ 1	1,700	570,021	28.0	2.4	23.2	32.8
เขต สคร.ที่ 2	2,280	349,530	21.2	1.4	18.4	23.9
เขต สคร.ที่ 3	4,304	1,092,540	26.4	1.5	23.5	29.4
เขต สคร.ที่ 4	3,053	609,234	17.0	1.0	15.0	18.9
เขต สคร.ที่ 5	1,278	711,1403	14.8	1.0	12.8	16.8
เขต สคร.ที่ 6	2,622	1,176,130	18.8	1.7	15.6	22.1
เขต สคร.ที่ 7	2,867	1,028,945	22.5	1.7	19.1	25.9
เขต สคร.ที่ 8	1,585	360,357	19.3	1.2	16.9	21.7
เขต สคร.ที่ 9	2,145	476,576	19.1	1.2	16.7	21.5
เขต สคร.ที่ 10	3,315	868,684	20.8	1.6	17.7	24.0
เขต สคร.ที่ 11	3,052	510,814	17.1	1.0	15.1	19.1
เขต สคร.ที่ 12	2,354	491,595	15.8	1.1	13.6	18.0

ตารางที่ 11.3 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	517	1,184,475	28.2	1.9	24.4	31.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	562	217,404	25.4	4.4	16.7	34.0
นนทบุรี	694	258,760	32.7	4.2	24.5	40.8
ปทุมธานี	536	178,768	26.5	5.1	16.6	36.4
พระนครศรีอยุธยา	470	132,492	23.4	2.4	18.7	28.0
อ่างทอง	542	66,836	30.8	3.2	24.5	37.0
ลพบุรี	479	109,128	19.4	2.5	14.5	24.4
สิงห์บุรี	405	31,522	19.5	1.8	16.0	22.9
ชัยนาท	407	50,551	19.8	3.7	12.7	27.0
สระบุรี	447	91,492	20.1	2.6	14.9	25.2
ชลบุรี	568	311,542	33.8	2.9	28.1	39.4
ระยอง	590	137,858	32.1	3.0	26.2	38.1
จันทบุรี	439	90,026	24.2	2.0	20.3	28.1
ตราด	532	33,672	21.3	4.1	13.2	29.4
ฉะเชิงเทรา	406	112,718	22.9	3.6	15.9	29.9
ปราจีนบุรี	401	68,565	20.2	3.3	13.7	26.6
นครนายก	461	40,672	22.3	4.7	13.1	31.5
สระแก้ว	345	80,083	21.1	6.0	9.3	33.0
ราชบุรี	309	99,068	16.1	1.9	12.3	19.9
กาญจนบุรี	330	84,519	15.0	1.6	11.8	18.2
สุพรรณบุรี	426	117,804	18.8	3.4	12.1	25.5
นครปฐม	309	80,289	12.9	2.0	9.0	16.8
สมุทรสาคร	521	68,196	20.6	3.9	12.9	28.3
สมุทรสงคราม	377	22,144	15.7	2.9	10.0	21.3
เพชรบุรี	431	69,680	20.7	2.7	15.3	26.1
ประจวบคีรีขันธ์	350	67,534	19.1	3.5	12.3	25.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	343	314,890	16.8	1.7	13.5	20.1
บุรีรัมย์	289	150,315	13.2	2.5	8.3	18.2
สุรินทร์	354	119,630	12.2	1.2	9.9	14.5
ศรีสะเกษ	221	98,455	9.5	2.0	5.5	13.5
อุบลราชธานี	727	517,093	40.1	3.1	34.0	46.2
ยโสธร	341	64,648	15.5	4.6	6.6	24.5
ชัยภูมิ	292	126,308	15.5	2.4	10.9	20.2
อำนาจเจริญ	518	76,199	28.1	3.7	20.9	35.3
หนองบัวลำภู	230	38,191	10.1	1.2	7.8	12.3
ขอนแก่น	297	205,801	16.2	2.6	11.1	21.2
อุดรธานี	332	198,690	18.1	3.0	12.3	23.8
เลย	272	88,420	19.2	5.0	9.4	29.0
หนองคาย	355	106,811	16.4	2.4	11.7	21.1

ตารางที่ 11.3 ความชุก (ร้อยละ) ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี แบ่งตามจังหวัด พ.ศ. 2553 (ต่อ)

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
มหาสารคาม	435	175,450	24.6	8.9	7.1	42.2
ร้อยเอ็ด	328	226,102	23.2	4.8	13.7	32.7
กาฬสินธุ์	373	136,665	19.6	2.9	13.9	25.4
สกลนคร	427	185,993	23.1	6.4	10.5	35.7
นครพนม	351	56,405	11.2	2.3	6.7	15.8
มุกดาหาร	282	30,151	12.2	2.8	6.8	17.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	452	309,522	26.7	5.0	16.8	36.6
ลำพูน	382	63,862	20.3	1.8	16.7	23.9
ลำปาง	403	116,955	19.3	2.1	15.3	23.4
อุตรดิตถ์	402	73,975	21.6	2.7	16.3	26.9
แพร่	410	67,735	18.5	2.1	14.3	22.7
น่าน	486	53,578	14.6	2.6	9.5	19.7
พะเยา	437	86,789	23.1	3.1	17.1	29.1
เชียงราย	386	146,488	17.5	2.2	13.1	21.8
แม่ฮ่องสอน	359	23,755	16.5	3.1	10.4	22.6
นครสวรรค์	379	121,883	17.6	1.7	14.2	20.9
อุทัยธานี	340	31,648	13.5	3.0	7.7	19.3
กำแพงเพชร	266	72,286	13.7	2.3	9.2	18.2
ตาก	495	68,043	20.2	2.5	15.3	25.2
สุโขทัย	378	70,549	15.2	2.8	9.7	20.7
พิษณุโลก	511	138,405	21.9	2.7	16.6	27.2
พิจิตร	600	134,540	32.7	2.2	28.3	37.1
เพชรบูรณ์	359	125,605	17.4	2.5	12.4	22.3
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	291	139,653	12.7	1.2	10.3	15.1
กระบี่	463	53,105	17.7	3.7	10.4	24.9
พังงา	505	36,038	19.9	3.7	12.6	27.2
ภูเก็ต	481	56,371	23.7	5.0	14.0	33.5
สุราษฎร์ธานี	400	138,370	19.7	2.5	14.8	24.7
ระนอง	522	24,009	20.9	2.0	17.0	24.8
ชุมพร	390	63,269	18.2	2.6	13.2	23.3
สงขลา	276	157,630	16.9	2.9	11.3	22.6
สตูล	327	28,167	14.1	1.4	11.4	16.9
ตรัง	572	118,262	27.9	3.0	22.1	33.7
พัทลุง	401	64,938	17.4	1.5	14.4	20.3
ปัตตานี	233	34,341	8.7	1.8	5.2	12.2
ยะลา	292	34,816	11.1	1.1	9.0	13.2
นราธิวาส	253	53,441	11.3	2.4	6.7	16.0

ภาคผนวก

รายชื่อจังหวัด ตามเขตพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข

เขต	เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข	เขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
1	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี	เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
2	ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง	อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์	สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง
3	ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ	นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท	ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก
4	กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก สระบุรี	ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
5	ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม	ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์	นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
6	ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง	สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว	ขอนแก่น เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์
7	ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง	ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร	อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร
8	สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส	หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม	นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร
9	จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด	นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ	พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
10	หนองคาย เลย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู บึงกาฬ	อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ	เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
11	นครพนม มุกดาหาร สกลนคร	นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร	นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
12	ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์	สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส	สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
13	อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี	กรุงเทพมหานคร	-
14	สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ	-	-
15	เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน	-	-
16	น่าน พะเยา เชียงราย แพร่	-	-
17	ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์	-	-
18	กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี	-	-

รายชื่อจังหวัด ตามรายภาค

ภาค	รายชื่อจังหวัด
กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
กลาง	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร
เหนือ	นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
ใต้	นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส