

# ตารางผลการสำรวจ



# ส่วนที่ 1

ลักษณะทางสังคม

และเศรษฐกิจ



ตารางที่ 1.1.1 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานภาพสมรส ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	โสด	สมรส	หย่า / แยกกันอยู่	หม้าย
<b>ชาย</b>						
15 - 24	11,310	5,180,941	85.1 (0.8)	14.4 (0.9)	0.4 (0.1)	0.1 (0.0)
25 - 34	10,975	4,782,894	39.5 (0.9)	57.9 (0.9)	2.3 (0.2)	0.4 (0.1)
35 - 44	11,919	5,333,497	13.3 (0.6)	82.9 (0.6)	3.3 (0.2)	0.5 (0.1)
45 - 54	9,026	4,110,837	8.2 (0.6)	87.0 (0.7)	3.7 (0.3)	1.1 (0.2)
55 - 64	14,747	2,573,120	3.1 (0.3)	89.7 (0.5)	2.9 (0.2)	4.3 (0.3)
65 - 74	6,729	1,172,510	2.8 (0.4)	83.6 (0.8)	2.4 (0.3)	11.2 (0.7)
รวม	64,706	23,153,799	32.2 (0.4)	63.9 (0.4)	2.4 (0.1)	1.4 (0.1)
<b>หญิง</b>						
15 - 24	10,387	4,768,355	73.4 (0.7)	24.9 (0.7)	1.3 (0.2)	0.4 (0.1)
25 - 34	10,489	4,701,463	28.1 (0.8)	68.1 (0.8)	3.0 (0.2)	0.8 (0.1)
35 - 44	12,559	5,796,508	10.4 (0.5)	82.7 (0.6)	4.8 (0.3)	2.0 (0.2)
45 - 54	9,952	4,545,380	10.3 (0.7)	78.4 (1.0)	5.5 (0.5)	5.9 (0.4)
55 - 64	14,544	2,928,725	7.4 (0.4)	70.6 (0.7)	4.8 (0.3)	17.2 (0.5)
65 - 74	7,044	1,390,414	5.6 (0.4)	55.4 (1.0)	4.1 (0.4)	34.9 (1.0)
รวม	64,975	24,130,843	25.6 (0.4)	64.6 (0.4)	3.8 (0.1)	5.9 (0.1)
<b>รวม</b>						
15 - 24	21,697	9,949,296	79.5 (0.6)	19.4 (0.6)	0.8 (0.1)	0.2 (0.0)
25 - 34	21,464	9,484,356	33.8 (0.7)	62.9 (0.7)	2.6 (0.2)	0.6 (0.1)
35 - 44	24,478	11,130,005	11.8 (0.4)	82.8 (0.5)	4.1 (0.2)	1.3 (0.1)
45 - 54	18,978	8,656,217	9.3 (0.5)	82.5 (0.6)	4.6 (0.3)	3.6 (0.2)
55 - 64	29,291	5,501,845	5.4 (0.2)	79.5 (0.4)	3.9 (0.2)	11.2 (0.3)
65 - 74	13,773	2,562,924	4.3 (0.3)	68.3 (0.7)	3.3 (0.3)	24.0 (0.6)
รวมทั้งประเทศ	129,681	47,284,643	28.9 (0.3)	64.3 (0.3)	3.1 (0.1)	3.7 (0.1)

ตารางที่ 1.1.2 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานภาพสมรส ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	โสด	สมรส	หย่า / แยกกันอยู่	หม้าย
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	65,535	15,816,695	33.6 (0.5)	59.1 (0.5)	3.4 (0.2)	3.9 (0.1)
นอกเขตเทศบาล	64,146	31,467,947	26.5 (0.4)	66.9 (0.4)	3.0 (0.1)	3.7 (0.1)
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,669	4,212,789	37.0 (1.3)	56.3 (1.5)	3.2 (0.5)	3.5 (0.4)
ภาคกลาง	42,761	11,755,702	33.8 (0.7)	59.0 (0.7)	3.4 (0.2)	3.7 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,363	16,165,523	25.4 (0.5)	68.1 (0.5)	2.8 (0.2)	3.6 (0.2)
ภาคเหนือ	28,914	8,847,363	24.7 (0.5)	67.6 (0.5)	3.7 (0.2)	4.0 (0.2)
ภาคใต้	23,974	6,303,267	28.8 (0.6)	64.8 (0.6)	2.5 (0.2)	3.8 (0.2)
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	5,067	2,111,470	40.1 (2.0)	53.3 (2.0)	3.0 (0.3)	3.6 (0.3)
เขต สคร. ที่ 2	8,619	1,669,372	27.8 (1.1)	64.4 (1.1)	3.7 (0.3)	4.2 (0.3)
เขต สคร. ที่ 3	15,333	4,241,092	30.2 (0.9)	62.5 (0.9)	3.4 (0.3)	3.8 (0.2)
เขต สคร. ที่ 4	13,742	3,733,768	37.0 (1.2)	55.9 (1.2)	3.6 (0.2)	3.5 (0.2)
เขต สคร. ที่ 5	6,847	4,966,170	26.2 (1.1)	67.3 (1.0)	3.2 (0.3)	3.3 (0.3)
เขต สคร. ที่ 6	13,614	6,516,171	25.3 (0.8)	67.9 (0.8)	2.9 (0.3)	3.9 (0.3)
เขต สคร. ที่ 7	11,902	4,683,181	24.9 (0.7)	69.4 (0.8)	2.4 (0.2)	3.3 (0.3)
เขต สคร. ที่ 8	6,767	2,002,142	23.4 (1.1)	69.3 (0.9)	3.7 (0.2)	3.6 (0.4)
เขต สคร. ที่ 9	8,532	2,560,081	23.2 (0.7)	68.8 (0.8)	3.7 (0.4)	4.4 (0.3)
เขต สคร. ที่ 10	13,615	4,285,139	26.2 (0.8)	66.0 (0.9)	3.7 (0.3)	4.1 (0.3)
เขต สคร. ที่ 11	11,944	3,053,700	29.3 (0.9)	64.7 (0.9)	2.6 (0.3)	3.4 (0.3)
เขต สคร. ที่ 12	12,030	3,249,567	28.4 (0.7)	65.0 (0.8)	2.4 (0.2)	4.2 (0.2)

ตารางที่ 1.1.3 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานภาพสมรส ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	โสด	สมรส	หย่า / แยกกันอยู่	หม้าย
กรุงเทพมหานคร	1,669	4,212,789	37.0 (1.3)	56.3 (1.5)	3.2 (0.5)	3.5 (0.4)
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,718	882,829	29.9 (2.4)	66.3 (2.4)	1.4 (0.3)	2.4 (0.4)
นนทบุรี	1,710	820,981	37.7 (1.9)	56.5 (1.8)	2.4 (0.4)	3.4 (0.5)
ปทุมธานี	1,657	708,059	49.8 (3.1)	44.6 (3.3)	2.7 (0.6)	2.9 (0.4)
พระนครศรีอยุธยา	1,700	582,431	31.7 (1.6)	59.4 (1.6)	4.2 (0.9)	4.8 (0.6)
อ่างทอง	1,738	218,178	26.5 (1.3)	65.1 (1.2)	3.9 (0.6)	4.4 (0.5)
ลพบุรี	1,709	568,169	24.9 (2.3)	67.1 (2.1)	3.9 (0.7)	4.1 (0.4)
สิงห์บุรี	1,712	166,138	32.2 (1.8)	58.6 (1.5)	4.7 (0.9)	4.6 (0.6)
ชัยนาท	1,714	258,714	28.8 (2.7)	64.2 (2.5)	2.7 (0.7)	4.3 (0.5)
สระบุรี	1,746	458,173	29.9 (2.3)	62.7 (2.6)	3.4 (0.6)	4.0 (0.6)
ชลบุรี	1,658	929,655	31.2 (2.0)	57.8 (2.1)	5.3 (1.0)	5.8 (0.5)
ระยอง	1,693	447,045	39.7 (3.7)	54.2 (3.5)	2.2 (0.6)	3.9 (0.6)
จันทบุรี	1,711	383,477	26.2 (1.7)	65.7 (2.0)	4.6 (0.5)	3.6 (0.5)
ตราด	1,710	158,748	22.7 (1.9)	67.6 (1.6)	4.7 (0.8)	5.0 (0.4)
ฉะเชิงเทรา	1,725	503,307	32.8 (1.9)	60.1 (2.2)	4.1 (0.9)	3.1 (0.4)
ปราจีนบุรี	1,723	345,355	23.3 (2.1)	70.7 (1.9)	3.0 (0.6)	3.1 (0.5)
นครนายก	1,688	191,706	33.6 (3.0)	58.7 (2.6)	3.2 (0.7)	4.4 (0.6)
สระแก้ว	1,707	398,970	26.2 (1.3)	67.6 (1.7)	3.0 (1.3)	3.2 (0.7)
ราชบุรี	1,718	624,975	35.4 (1.9)	57.0 (1.9)	4.2 (0.5)	3.4 (0.7)
กาญจนบุรี	1,722	580,605	35.3 (2.3)	57.2 (1.9)	4.2 (0.8)	3.2 (0.6)
สุพรรณบุรี	1,727	645,947	28.9 (1.8)	63.3 (1.8)	4.0 (0.5)	3.8 (0.4)
นครปฐม	1,696	646,891	50.8 (3.9)	43.9 (3.5)	2.5 (0.6)	2.8 (0.4)
สมุทรสาคร	1,717	360,900	32.1 (1.9)	61.5 (2.4)	3.3 (0.6)	3.1 (0.6)
สมุทรสงคราม	1,726	149,188	39.4 (3.7)	53.3 (3.2)	4.0 (0.9)	3.3 (0.5)
เพชรบุรี	1,719	350,337	36.6 (2.2)	54.8 (2.3)	3.7 (0.5)	4.9 (0.7)
ประจวบคีรีขันธ์	1,717	374,925	36.7 (2.1)	56.1 (2.0)	3.0 (0.7)	4.2 (0.7)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,703	1,947,482	31.0 (1.9)	63.3 (1.7)	3.0 (0.4)	2.7 (0.4)
บุรีรัมย์	1,711	1,147,856	24.4 (1.8)	68.4 (2.2)	4.1 (0.9)	3.1 (0.5)
สุรินทร์	1,718	1,013,964	24.6 (1.8)	68.4 (1.7)	2.9 (0.5)	4.1 (0.8)
ศรีสะเกษ	1,692	1,082,978	26.1 (1.9)	68.5 (2.0)	2.0 (0.4)	3.4 (0.9)
อุบลราชธานี	1,700	1,318,828	25.7 (1.2)	69.5 (1.3)	2.6 (0.5)	2.2 (0.3)
ยโสธร	1,716	417,473	24.3 (1.7)	70.7 (1.9)	2.3 (0.6)	2.7 (0.5)
ชัยภูมิ	1,715	856,869	19.5 (2.5)	73.7 (2.1)	2.7 (0.4)	4.2 (0.6)
อำนาจเจริญ	1,693	280,835	18.1 (2.1)	75.8 (2.5)	2.5 (0.7)	3.6 (0.5)
หนองบัวลำภู	1,727	380,167	16.2 (1.3)	77.2 (1.6)	2.3 (0.5)	4.3 (0.5)
ขอนแก่น	1,722	1,361,014	28.4 (2.7)	63.2 (2.1)	3.2 (1.1)	5.2 (0.5)
อุดรธานี	1,702	1,158,082	24.1 (2.2)	71.2 (2.5)	2.0 (0.6)	2.7 (0.4)
เลย	1,662	469,526	22.0 (1.9)	73.5 (1.7)	1.6 (0.4)	2.9 (0.5)
หนองคาย	1,714	675,339	24.4 (1.9)	67.9 (1.9)	3.2 (0.9)	4.4 (0.7)

ตารางที่ 1.1.3 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานภาพสมรส ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	โสด	สมรส	หย่า / แยกกันอยู่	หม้าย
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,714	727,220	28.7 (2.5)	63.7 (2.4)	3.3 (0.8)	4.3 (0.8)
ร้อยเอ็ด	1,714	1,007,171	27.0 (0.8)	66.1 (1.1)	3.8 (0.6)	3.1 (0.8)
กาฬสินธุ์	1,659	737,652	22.9 (1.3)	69.6 (1.6)	3.0 (0.8)	4.4 (0.9)
สกลนคร	1,665	805,028	23.6 (2.1)	68.8 (2.3)	2.6 (0.4)	5.0 (0.6)
นครพนม	1,713	525,003	24.3 (1.8)	69.5 (1.9)	2.1 (0.5)	4.1 (0.4)
มุกดาหาร	1,723	253,037	28.6 (2.3)	65.1 (2.2)	3.2 (0.7)	3.1 (0.4)
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,700	1,196,585	26.3 (1.7)	65.6 (2.2)	3.7 (0.6)	4.3 (0.7)
ลำพูน	1,704	320,880	28.5 (2.1)	62.8 (2.2)	4.5 (0.7)	4.2 (0.6)
ลำปาง	1,703	607,894	27.8 (1.5)	65.0 (1.3)	3.6 (0.6)	3.6 (0.7)
อุตรดิตถ์	1,697	355,387	28.1 (1.7)	63.8 (1.5)	3.2 (0.6)	4.9 (0.5)
แพร่	1,712	369,965	28.1 (2.5)	64.3 (2.4)	2.9 (0.5)	4.7 (0.6)
น่าน	1,722	370,320	26.4 (1.2)	68.1 (2.1)	2.6 (0.7)	2.9 (0.6)
พะเยา	1,703	386,330	24.4 (1.8)	68.4 (2.1)	3.4 (0.5)	3.8 (0.5)
เชียงราย	1,706	878,493	24.6 (2.8)	66.6 (2.5)	4.3 (1.0)	4.6 (0.6)
แม่ฮ่องสอน	1,665	154,672	23.8 (1.8)	69.7 (1.8)	3.3 (1.1)	3.2 (0.7)
นครสวรรค์	1,703	807,522	25.1 (1.8)	68.1 (1.4)	3.7 (0.3)	3.1 (0.5)
อุทัยธานี	1,689	243,565	21.6 (1.9)	71.6 (1.7)	3.1 (0.5)	3.8 (0.5)
กำแพงเพชร	1,678	530,429	22.9 (1.2)	69.8 (1.6)	3.6 (0.6)	3.6 (0.6)
ตาก	1,700	342,225	22.6 (1.6)	70.2 (1.9)	2.9 (0.7)	4.4 (0.9)
สุโขทัย	1,711	466,729	23.3 (1.7)	68.4 (1.9)	3.8 (0.7)	4.5 (0.6)
พิษณุโลก	1,710	649,156	20.2 (1.7)	71.3 (1.9)	4.6 (1.1)	3.9 (0.6)
พิจิตร	1,697	420,627	21.6 (1.9)	69.9 (2.1)	4.3 (0.4)	4.2 (0.7)
เพชรบูรณ์	1,714	746,584	23.7 (1.1)	68.5 (1.6)	3.3 (0.9)	4.4 (0.7)
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,717	1,119,818	29.2 (1.3)	64.4 (1.5)	2.5 (0.6)	3.8 (0.8)
กระบี่	1,701	304,214	24.7 (2.2)	70.6 (2.4)	1.8 (0.3)	2.8 (0.5)
พังงา	1,697	184,517	27.1 (2.0)	67.4 (2.2)	2.8 (0.7)	2.7 (0.6)
ภูเก็ต	1,719	244,382	43.8 (2.7)	51.0 (2.7)	2.9 (0.9)	2.3 (0.3)
สุราษฎร์ธานี	1,685	719,450	28.2 (2.5)	64.9 (2.5)	3.2 (0.6)	3.7 (0.4)
ระนอง	1,716	121,431	28.8 (3.6)	65.0 (3.8)	2.1 (0.3)	4.2 (0.5)
ชุมพร	1,709	359,887	26.6 (1.0)	68.3 (1.4)	2.1 (0.6)	3.0 (0.6)
สงขลา	1,701	961,477	29.9 (1.6)	63.6 (1.7)	2.5 (0.5)	4.0 (0.4)
สตูล	1,707	207,299	27.9 (1.4)	66.3 (1.3)	2.3 (0.6)	3.6 (0.6)
ตรัง	1,715	454,411	24.9 (2.4)	69.5 (2.3)	2.2 (0.4)	3.4 (0.4)
พัทลุง	1,724	380,756	23.0 (1.2)	69.7 (1.3)	3.8 (1.0)	3.5 (0.5)
ปัตตานี	1,729	428,878	32.1 (1.2)	60.1 (1.1)	2.5 (0.6)	5.3 (0.6)
ยะลา	1,727	323,896	27.4 (2.3)	66.4 (2.4)	2.0 (0.5)	4.1 (0.6)
นราธิวาส	1,727	492,850	30.3 (2.0)	62.5 (2.1)	1.7 (0.4)	5.5 (0.9)



ตารางที่ 1.2.1 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามระดับการศึกษา ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ไม่ได้รับ การศึกษา	ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา
<b>ชาย</b>							
15 - 24	10,752	4,923,805	0.5 (0.1)	14.0 (0.6)	72.2 (0.9)	8.3 (0.9)	5.0 (0.4)
25 - 34	10,970	4,793,485	0.7 (0.2)	26.4 (0.8)	48.8 (1.0)	10.4 (0.9)	13.6 (0.7)
35 - 44	11,891	5,342,246	1.5 (0.2)	50.1 (1.1)	35.1 (0.9)	5.2 (0.4)	8.1 (0.5)
45 - 54	9,007	4,072,064	2.0 (0.3)	60.8 (1.5)	24.0 (1.0)	5.2 (0.5)	8.1 (0.7)
55 - 64	14,683	2,537,306	3.9 (0.3)	76.9 (0.8)	11.1 (0.5)	2.4 (0.3)	5.7 (0.5)
65 - 74	6,681	1,164,591	7.6 (0.7)	74.9 (1.1)	11.7 (0.8)	2.4 (0.4)	3.5 (0.4)
รวม	63,984	22,833,496	1.8 (0.1)	43.5 (0.7)	40.1 (0.5)	6.5 (0.5)	8.1 (0.3)
<b>หญิง</b>							
15 - 24	9,767	4,440,827	0.4 (0.1)	9.0 (0.5)	73.7 (0.8)	7.9 (0.5)	9.1 (0.5)
25 - 34	10,457	4,691,100	1.3 (0.2)	25.0 (0.8)	45.9 (0.8)	8.9 (0.5)	18.8 (0.7)
35 - 44	12,531	5,791,756	2.2 (0.2)	55.5 (1.0)	28.0 (0.8)	4.9 (0.4)	9.4 (0.5)
45 - 54	9,912	4,471,428	3.7 (0.3)	67.7 (1.2)	16.5 (0.7)	3.2 (0.3)	8.9 (0.8)
55 - 64	14,514	2,895,695	9.0 (0.5)	80.4 (0.8)	6.1 (0.5)	1.2 (0.1)	3.3 (0.3)
65 - 74	6,999	1,372,094	16.3 (0.8)	76.1 (1.0)	5.1 (0.5)	0.8 (0.1)	1.7 (0.2)
รวม	64,180	23,662,900	3.6 (0.2)	47.3 (0.6)	33.9 (0.4)	5.2 (0.2)	9.9 (0.4)
<b>รวม</b>							
15 - 24	20,519	9,364,633	0.5 (0.1)	11.6 (0.4)	72.9 (0.7)	8.1 (0.5)	6.9 (0.3)
25 - 34	21,427	9,484,586	1.0 (0.2)	25.7 (0.6)	47.4 (0.7)	9.7 (0.5)	16.2 (0.6)
35 - 44	24,422	11,134,002	1.9 (0.2)	52.9 (0.9)	31.4 (0.6)	5.0 (0.3)	8.8 (0.4)
45 - 54	18,919	8,543,491	2.9 (0.2)	64.4 (1.2)	20.1 (0.7)	4.1 (0.3)	8.5 (0.7)
55 - 64	29,197	5,433,001	6.6 (0.4)	78.8 (0.7)	8.4 (0.4)	1.7 (0.2)	4.4 (0.3)
65 - 74	13,680	2,536,685	12.3 (0.6)	75.5 (0.8)	8.2 (0.5)	1.5 (0.2)	2.5 (0.2)
รวมทั้งประเทศ	128,164	46,496,397	2.7 (0.1)	45.4 (0.6)	37.0 (0.4)	5.8 (0.3)	9.0 (0.3)

ตารางที่ 1.2.2 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามระดับการศึกษา ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ไม่ได้รับ การศึกษา	ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	64,626	15,402,068	2.0 (0.2)	36.1 (0.6)	38.8 (0.5)	8.1 (0.3)	14.9 (0.5)
นอกเขตเทศบาล	63,538	31,094,329	3.0 (0.2)	50.0 (0.9)	36.1 (0.5)	4.7 (0.4)	6.1 (0.4)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	1,562	3,983,106	1.8 (0.3)	35.0 (1.8)	40.1 (1.2)	7.5 (0.9)	15.6 (1.5)
ภาคกลาง	42,127	11,510,745	1.9 (0.1)	38.6 (0.9)	40.7 (0.7)	7.5 (0.4)	11.4 (0.5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,147	16,011,862	1.3 (0.1)	53.2 (1.3)	35.5 (0.6)	4.4 (0.7)	5.7 (0.7)
ภาคเหนือ	28,568	8,752,235	6.4 (0.7)	48.3 (1.4)	32.9 (0.9)	4.6 (0.3)	7.7 (0.6)
ภาคใต้	23,760	6,238,449	3.4 (0.2)	40.8 (0.9)	37.7 (0.6)	7.1 (0.5)	10.9 (0.5)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	4,975	2,054,671	1.0 (0.2)	22.8 (1.8)	46.8 (2.7)	9.3 (0.9)	20.1 (2.1)
เขต สคร. ที่ 2	8,509	1,645,082	2.4 (0.3)	44.9 (1.5)	39.1 (1.3)	6.7 (0.6)	6.9 (0.6)
เขต สคร. ที่ 3	15,164	4,186,345	2.0 (0.2)	38.8 (1.3)	40.4 (0.8)	8.4 (0.9)	10.4 (0.7)
เขต สคร. ที่ 4	13,479	3,624,646	2.0 (0.2)	44.3 (1.3)	38.2 (0.9)	5.8 (0.5)	9.7 (0.7)
เขต สคร. ที่ 5	6,764	4,875,343	1.9 (0.3)	53.2 (1.5)	36.5 (1.4)	3.7 (0.5)	4.7 (0.6)
เขต สคร. ที่ 6	13,548	6,456,663	0.7 (0.1)	49.1 (2.8)	36.7 (0.9)	6.2 (1.6)	7.2 (1.7)
เขต สคร. ที่ 7	11,835	4,679,856	1.4 (0.2)	58.6 (1.1)	32.8 (0.9)	2.7 (0.2)	4.5 (0.5)
เขต สคร. ที่ 8	6,718	1,991,303	4.3 (0.4)	49.7 (5.3)	34.6 (3.0)	4.4 (1.0)	7.0 (1.7)
เขต สคร. ที่ 9	8,433	2,539,067	4.1 (0.7)	53.2 (1.4)	31.9 (1.2)	4.3 (0.4)	6.5 (0.7)
เขต สคร. ที่ 10	13,417	4,221,865	8.8 (1.3)	44.8 (1.2)	32.7 (0.9)	5.0 (0.4)	8.7 (0.8)
เขต สคร. ที่ 11	11,806	3,003,842	1.6 (0.2)	42.1 (1.4)	39.1 (1.0)	7.0 (0.8)	10.2 (0.7)
เขต สคร. ที่ 12	11,954	3,234,608	5.1 (0.4)	39.6 (1.1)	36.4 (0.8)	7.3 (0.6)	11.6 (0.7)

ตารางที่ 1.2.3 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามระดับการศึกษา ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ไม่ได้รับการศึกษา	ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร	1,562	3,983,106	1.8 (0.3)	35.0 (1.8)	40.1 (1.2)	7.5 (0.9)	15.6 (1.5)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,691	868,991	1.0 (0.4)	38.6 (2.2)	41.1 (1.8)	8.4 (1.3)	10.9 (1.8)
นนทบุรี	1,702	815,610	0.6 (0.1)	18.7 (2.5)	39.7 (2.6)	9.7 (1.3)	31.3 (3.6)
ปทุมธานี	1,584	659,256	1.5 (0.4)	18.3 (2.8)	53.4 (5.5)	10.9 (2.0)	15.9 (2.4)
พระนครศรีอยุธยา	1,689	579,806	0.8 (0.2)	33.8 (2.3)	49.3 (2.3)	7.1 (1.7)	9.1 (1.5)
อ่างทอง	1,720	215,255	0.8 (0.3)	44.6 (2.8)	41.1 (2.6)	5.3 (0.6)	8.2 (1.1)
ลพบุรี	1,670	557,854	3.7 (0.5)	52.5 (2.9)	34.7 (2.7)	4.7 (0.9)	4.4 (1.1)
สิงห์บุรี	1,706	164,981	1.6 (0.3)	39.0 (2.4)	42.0 (2.0)	9.1 (1.1)	8.2 (1.4)
ชัยนาท	1,682	254,376	2.6 (0.5)	46.0 (5.2)	39.8 (4.0)	6.7 (1.3)	4.9 (1.0)
สระบุรี	1,731	452,617	1.7 (0.6)	37.1 (2.5)	42.1 (1.8)	9.0 (1.6)	10.1 (1.5)
ชลบุรี	1,651	927,450	1.9 (0.4)	35.3 (4.2)	39.4 (2.0)	12.4 (3.1)	11.1 (1.7)
ระยอง	1,649	429,832	0.8 (0.3)	22.4 (2.7)	45.8 (3.1)	13.4 (2.0)	17.5 (2.6)
จันทบุรี	1,676	370,271	2.1 (0.4)	46.5 (2.8)	35.1 (2.2)	4.7 (1.0)	11.6 (2.1)
ตราด	1,687	158,436	3.7 (0.9)	54.4 (1.9)	29.3 (1.5)	3.9 (0.6)	8.6 (1.8)
ฉะเชิงเทรา	1,713	500,064	2.6 (0.7)	42.4 (3.0)	39.9 (1.8)	6.1 (1.7)	9.0 (2.1)
ปราจีนบุรี	1,725	345,185	1.9 (0.8)	41.4 (3.3)	46.5 (2.7)	4.4 (1.1)	6.0 (1.2)
นครนายก	1,684	189,254	3.2 (0.8)	38.1 (3.1)	40.5 (1.9)	8.1 (1.5)	10.1 (1.5)
สระแก้ว	1,688	396,861	3.5 (0.9)	45.7 (3.5)	40.1 (2.7)	5.3 (0.7)	5.3 (1.8)
ราชบุรี	1,696	611,882	2.3 (0.6)	50.2 (2.7)	33.8 (1.9)	6.4 (1.1)	7.3 (1.2)
กาญจนบุรี	1,673	563,866	2.9 (1.0)	47.6 (3.2)	37.1 (1.8)	4.7 (0.7)	7.6 (1.2)
สุพรรณบุรี	1,713	636,922	2.2 (0.5)	49.7 (4.7)	35.6 (2.7)	6.0 (1.8)	6.5 (1.1)
นครปฐม	1,652	604,184	1.2 (0.4)	37.0 (2.6)	38.1 (2.2)	5.2 (0.8)	18.6 (2.3)
สมุทรสาคร	1,709	358,048	1.8 (0.4)	41.2 (2.5)	38.3 (2.4)	8.0 (1.7)	10.7 (2.1)
สมุทรสงคราม	1,701	145,435	1.9 (0.5)	38.4 (3.8)	45.8 (2.9)	7.1 (3.0)	6.8 (1.2)
เพชรบุรี	1,695	345,714	1.2 (0.4)	41.0 (3.3)	40.4 (1.6)	5.1 (0.8)	12.3 (2.4)
ประจวบคีรีขันธ์	1,640	358,595	2.1 (0.4)	40.6 (3.1)	47.2 (2.8)	4.8 (0.8)	5.4 (0.8)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,665	1,884,392	1.6 (0.3)	45.2 (2.6)	43.0 (2.7)	5.0 (0.8)	5.3 (1.4)
บุรีรัมย์	1,689	1,131,294	2.8 (0.6)	57.7 (3.1)	32.2 (2.6)	2.3 (0.7)	5.0 (1.1)
สุรินทร์	1,704	1,005,333	1.8 (0.8)	56.5 (2.3)	33.0 (2.0)	3.7 (1.2)	5.0 (0.8)
ศรีสะเกษ	1,677	1,075,819	2.4 (0.6)	62.6 (2.3)	29.6 (2.2)	1.2 (0.3)	4.1 (1.1)
อุบลราชธานี	1,693	1,314,612	1.0 (0.6)	55.9 (2.0)	34.4 (1.3)	3.0 (0.6)	5.7 (1.1)
ยโสธร	1,720	417,787	1.3 (0.4)	56.5 (4.0)	34.1 (3.6)	3.7 (0.9)	4.4 (0.8)
ชัยภูมิ	1,706	854,324	1.4 (0.3)	61.1 (2.5)	31.7 (2.3)	2.9 (0.6)	2.9 (0.7)
อำนาจเจริญ	1,685	280,154	1.0 (0.2)	66.6 (3.2)	28.6 (3.2)	1.6 (0.3)	2.2 (0.6)
หนองบัวลำภู	1,725	379,994	1.0 (0.3)	67.6 (2.0)	26.8 (1.5)	1.7 (0.4)	3.0 (1.0)
ขอนแก่น	1,683	1,337,199	0.8 (0.4)	43.4 (7.7)	34.0 (1.3)	7.0 (1.2)	14.8 (6.7)
อุดรธานี	1,694	1,151,661	0.7 (0.2)	55.6 (2.7)	34.6 (2.5)	4.1 (0.8)	5.0 (1.0)
เลย	1,688	469,782	2.4 (0.4)	55.8 (4.1)	31.5 (1.9)	3.8 (1.4)	6.5 (2.7)
หนองคาย	1,693	664,531	1.1 (0.2)	51.9 (2.8)	39.1 (2.6)	3.3 (0.7)	4.7 (1.2)

ตารางที่ 1.2.3 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามระดับการศึกษา ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ไม่ได้รับการศึกษา	ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>							
มหาสารคาม	1,719	728,254	0.5 (0.2)	46.5 (3.2)	44.6 (2.6)	3.0 (0.5)	5.4 (1.1)
ร้อยเอ็ด	1,705	995,513	0.1 (0.1)	36.6 (10.3)	40.2 (2.5)	15.6 (8.0)	7.5 (1.3)
กาฬสินธุ์	1,641	729,729	0.2 (0.1)	52.8 (2.6)	39.1 (2.2)	4.9 (1.0)	3.0 (0.8)
สกลนคร	1,693	833,983	0.2 (0.1)	59.1 (2.8)	35.3 (2.5)	2.4 (0.4)	3.0 (0.6)
นครพนม	1,655	506,274	1.1 (0.4)	57.2 (2.4)	31.6 (2.5)	4.6 (0.8)	5.5 (1.1)
มุกดาหาร	1,712	251,226	3.4 (0.9)	51.9 (3.0)	33.9 (2.0)	4.8 (0.8)	6.0 (1.2)
<b>ภาคเหนือ</b>							
เชียงใหม่	1,653	1,164,695	9.1 (3.4)	42.3 (2.9)	33.0 (2.0)	5.7 (1.0)	9.8 (2.4)
ลำพูน	1,690	318,654	1.6 (0.7)	47.7 (2.1)	34.3 (1.9)	5.9 (0.8)	10.4 (2.2)
ลำปาง	1,699	606,795	4.5 (1.0)	47.1 (1.6)	34.3 (1.4)	5.9 (0.6)	8.2 (1.3)
อุตรดิตถ์	1,666	347,495	1.6 (0.4)	48.0 (3.6)	32.1 (2.4)	7.2 (1.0)	11.1 (2.0)
แพร่	1,678	362,314	2.3 (0.4)	49.3 (2.6)	32.7 (1.7)	7.0 (1.8)	8.7 (1.5)
น่าน	1,714	368,362	18.3 (5.6)	35.2 (4.1)	34.6 (1.6)	4.1 (1.1)	7.7 (1.4)
พะเยา	1,671	378,654	6.5 (1.3)	52.3 (2.3)	28.4 (1.7)	4.6 (0.6)	8.2 (1.3)
เชียงราย	1,685	871,243	10.8 (3.1)	46.0 (3.3)	33.3 (2.7)	2.7 (0.5)	7.2 (1.4)
แม่ฮ่องสอน	1,627	151,147	24.9 (5.9)	34.8 (2.1)	24.7 (1.9)	4.5 (1.4)	11.2 (2.2)
นครสวรรค์	1,705	805,562	3.7 (0.4)	40.3 (9.9)	40.4 (5.3)	5.9 (1.7)	9.6 (3.3)
อุทัยธานี	1,679	243,467	5.1 (1.1)	55.3 (3.3)	31.3 (3.3)	2.6 (0.6)	5.7 (1.3)
กำแพงเพชร	1,651	523,998	5.6 (0.8)	58.5 (2.2)	28.4 (1.9)	3.4 (0.8)	4.1 (0.8)
ตาก	1,676	338,358	15.2 (3.9)	43.3 (3.7)	31.6 (2.9)	3.2 (0.5)	6.7 (1.2)
สุโขทัย	1,698	464,733	2.2 (1.1)	59.7 (2.1)	29.8 (1.9)	3.0 (0.8)	5.3 (1.4)
พิษณุโลก	1,696	645,893	2.1 (0.6)	52.4 (3.4)	34.4 (3.1)	4.9 (1.0)	6.2 (1.2)
พิจิตร	1,683	418,276	3.3 (0.9)	53.6 (2.3)	33.2 (2.0)	3.6 (0.7)	6.3 (1.2)
เพชรบูรณ์	1,697	742,587	3.3 (0.8)	56.6 (2.2)	31.1 (2.5)	3.6 (0.7)	5.4 (1.6)
<b>ภาคใต้</b>							
นครศรีธรรมราช	1,688	1,094,063	2.2 (0.6)	44.7 (3.0)	37.3 (1.5)	7.6 (1.5)	8.1 (1.1)
กระบี่	1,680	300,517	1.2 (0.4)	46.5 (3.7)	36.9 (3.8)	4.9 (0.7)	10.5 (3.3)
พังงา	1,670	181,245	1.6 (0.6)	47.5 (3.3)	38.0 (2.6)	5.0 (0.7)	7.9 (1.3)
ภูเก็ต	1,697	240,398	1.4 (0.4)	26.0 (2.5)	45.5 (1.9)	7.8 (1.3)	19.2 (2.3)
สุราษฎร์ธานี	1,661	708,894	1.2 (0.2)	39.6 (2.7)	41.9 (2.3)	5.1 (1.1)	12.1 (1.8)
ระนอง	1,710	120,430	2.3 (0.8)	37.4 (5.3)	39.3 (2.3)	9.2 (1.2)	11.8 (4.8)
ชุมพร	1,700	358,294	0.9 (0.3)	44.6 (2.1)	37.2 (3.1)	10.3 (3.2)	7.1 (1.3)
สงขลา	1,699	964,043	2.0 (0.6)	34.0 (2.5)	36.3 (1.6)	11.2 (1.5)	16.6 (1.7)
สตูล	1,696	206,399	3.2 (0.6)	50.6 (3.0)	34.4 (2.0)	4.0 (0.7)	7.9 (0.9)
ตรัง	1,703	449,903	1.8 (0.7)	45.3 (2.1)	36.3 (2.1)	6.6 (1.1)	10.1 (1.3)
พัทลุง	1,720	380,035	1.3 (0.4)	43.7 (2.5)	38.7 (2.1)	7.1 (0.9)	9.1 (1.7)
ปัตตานี	1,718	429,058	9.8 (1.0)	38.9 (2.4)	39.7 (2.2)	4.8 (0.8)	6.7 (1.0)
ยะลา	1,708	319,192	9.5 (1.1)	36.1 (2.1)	36.8 (1.8)	5.8 (1.0)	11.8 (1.4)
นราธิวาส	1,710	485,978	11.2 (1.6)	40.8 (3.8)	32.5 (2.6)	4.7 (1.1)	10.8 (2.6)

ตารางที่ 1.2.4 ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ประชากรอายุ 15 - 74 ปี ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,867	10.3	0.1	10.1	10.5
25 - 34	10,653	10.1	0.1	10.0	10.3
35 - 44	11,541	8.4	0.1	8.2	8.5
45 - 54	8,729	7.2	0.1	6.9	7.5
55 - 64	14,175	5.5	0.1	5.4	5.7
65 - 74	6,451	4.7	0.1	4.5	4.9
รวม	62,416	8.5	0.1	8.3	8.6
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,999	10.9	0.1	10.8	11.0
25 - 34	10,156	10.5	0.1	10.3	10.6
35 - 44	12,147	8.0	0.1	7.8	8.1
45 - 54	9,614	6.5	0.1	6.3	6.7
55 - 64	14,028	4.6	0.1	4.5	4.7
65 - 74	6,753	3.6	0.1	3.4	3.7
รวม	62,697	8.1	0.1	8.0	8.2
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,866	10.6	0.1	10.5	10.7
25 - 34	20,809	10.3	0.1	10.2	10.4
35 - 44	23,688	8.2	0.1	8.0	8.3
45 - 54	18,343	6.8	0.1	6.6	7.1
55 - 64	28,203	5.0	0.1	4.9	5.2
65 - 74	13,204	4.1	0.1	4.0	4.2
รวมทั้งประเทศ	125,113	8.3	0.1	8.2	8.4

ตารางที่ 1.2.5 ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ประชากรอายุ 15 - 74 ปี ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษา  
ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
<i>ในเขตเทศบาล</i>	62,686	9.3	0.1	9.2	9.5
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	62,427	7.8	0.1	7.6	8.0
<b>ภาค</b>					
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	1,272	9.4	0.2	8.9	9.9
<i>ภาคกลาง</i>	41,153	9.0	0.1	8.8	9.1
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	31,474	7.8	0.1	7.5	8.1
<i>ภาคเหนือ</i>	27,989	7.5	0.1	7.3	7.7
<i>ภาคใต้</i>	23,225	8.7	0.1	8.5	8.8
<b>เขต สคร.</b>					
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	4,659	10.7	0.2	10.2	11.2
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	8,439	8.2	0.1	7.9	8.5
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	14,846	8.9	0.1	8.7	9.2
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	13,209	8.4	0.1	8.2	8.7
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	6,707	7.7	0.1	7.5	7.9
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	13,243	8.3	0.3	7.7	8.8
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	11,524	7.4	0.1	7.2	7.5
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	6,434	7.4	0.3	6.8	8.0
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	8,336	7.5	0.1	7.2	7.7
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	13,219	7.6	0.2	7.3	7.9
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	11,569	8.6	0.1	8.4	8.8
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	11,656	8.7	0.1	8.5	9.0

ตารางที่ 1.2.6 ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ประชากรอายุ 15 - 74 ปี ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษา  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,272	9.4	0.2	8.9	9.9
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,594	9.1	0.2	8.7	9.6
นนทบุรี	1,645	12.0	0.4	11.2	12.8
ปทุมธานี	1,320	10.5	0.2	10.1	10.9
พระนครศรีอยุธยา	1,694	9.1	0.3	8.5	9.6
อ่างทอง	1,717	8.5	0.2	8.0	8.9
ลพบุรี	1,667	7.3	0.2	6.9	7.7
สิงห์บุรี	1,684	8.8	0.2	8.4	9.3
ชัยนาท	1,630	8.0	0.5	7.1	8.9
สระบุรี	1,741	9.0	0.3	8.4	9.6
ชลบุรี	1,637	9.2	0.4	8.5	9.9
ระยอง	1,607	10.5	0.4	9.8	11.2
จันทบุรี	1,673	8.6	0.3	7.9	9.2
ตราด	1,684	7.8	0.3	7.3	8.4
ฉะเชิงเทรา	1,692	8.4	0.4	7.7	9.1
ปราจีนบุรี	1,719	8.5	0.3	7.9	9.0
นครนายก	1,643	8.8	0.3	8.2	9.5
สระแก้ว	1,597	8.1	0.4	7.4	8.8
ราชบุรี	1,668	7.9	0.2	7.5	8.4
กาญจนบุรี	1,629	8.1	0.2	7.6	8.5
สุพรรณบุรี	1,715	8.0	0.4	7.3	8.7
นครปฐม	1,643	9.5	0.2	9.0	9.9
สมุทรสาคร	1,648	8.8	0.3	8.2	9.4
สมุทรสงคราม	1,724	8.7	0.3	8.0	9.3
เพชรบุรี	1,638	8.7	0.3	8.1	9.3
ประจวบคีรีขันธ์	1,544	8.3	0.2	7.8	8.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,643	8.3	0.2	7.9	8.7
บุรีรัมย์	1,707	7.3	0.2	6.9	7.6
สุรินทร์	1,670	7.4	0.2	6.9	7.9
ศรีสะเกษ	1,621	6.9	0.2	6.5	7.3
อุบลราชธานี	1,599	7.5	0.2	7.2	7.9
ยโสธร	1,716	7.6	0.2	7.2	7.9
ชัยภูมิ	1,687	7.2	0.2	6.8	7.6
อำนาจเจริญ	1,666	6.9	0.2	6.4	7.3
หนองบัวลำภู	1,726	6.8	0.2	6.5	7.1
ขอนแก่น	1,667	9.1	0.9	7.3	10.8
อุดรธานี	1,630	7.8	0.2	7.4	8.1
เลย	1,682	7.4	0.4	6.6	8.3
หนองคาย	1,680	7.5	0.3	6.9	8.1

ตารางที่ 1.2.6 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ประชากรอายุ 15 - 74 ปี ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>				
มหาสารคาม	1,691	8.3	0.3	7.8 8.8
ร้อยเอ็ด	1,676	9.4	1.0	7.5 11.4
กาฬสินธุ์	1,491	7.8	0.2	7.4 8.1
สกลนคร	1,601	7.5	0.1	7.2 7.8
นครพนม	1,617	7.6	0.2	7.2 8.0
มุกดาหาร	1,704	7.7	0.3	7.2 8.2
<b>ภาคเหนือ</b>				
เชียงใหม่	1,584	7.8	0.5	6.8 8.7
ลำพูน	1,617	8.5	0.3	7.9 9.2
ลำปาง	1,698	7.9	0.2	7.4 8.3
อุตรดิตถ์	1,664	8.4	0.3	7.8 9.0
แพร่	1,716	8.2	0.3	7.5 8.8
น่าน	1,682	7.1	0.5	6.1 8.1
พะเยา	1,650	7.3	0.2	6.8 7.8
เชียงราย	1,672	7.2	0.3	6.5 7.8
แม่ฮ่องสอน	1,600	6.6	0.7	5.3 7.9
นครสวรรค์	1,621	8.1	0.5	7.1 9.1
อุทัยธานี	1,556	7.3	0.4	6.5 8.0
กำแพงเพชร	1,593	6.6	0.2	6.2 7.0
ตาก	1,672	6.8	0.3	6.2 7.4
สุโขทัย	1,693	7.2	0.3	6.6 7.8
พิษณุโลก	1,643	7.8	0.3	7.2 8.3
พิจิตร	1,664	7.3	0.2	6.8 7.7
เพชรบูรณ์	1,664	7.2	0.2	6.8 7.6
<b>ภาคใต้</b>				
นครศรีธรรมราช	1,592	8.4	0.2	8.0 8.8
กระบี่	1,652	8.3	0.3	7.6 8.9
พังงา	1,669	8.2	0.3	7.7 8.8
ภูเก็ต	1,670	10.1	0.3	9.5 10.7
สุราษฎร์ธานี	1,618	8.7	0.2	8.3 9.1
ระนอง	1,692	9.1	0.7	7.7 10.6
ชุมพร	1,676	8.5	0.2	8.1 9.0
สงขลา	1,625	9.7	0.3	9.2 10.2
สตูล	1,573	8.0	0.2	7.6 8.4
ตรัง	1,675	8.6	0.2	8.4 8.9
พัทลุง	1,720	8.8	0.2	8.4 9.3
ปัตตานี	1,689	8.0	0.2	7.6 8.5
ยะลา	1,671	8.5	0.3	8.0 9.0
นราธิวาส	1,703	7.9	0.5	7.1 8.8



ตารางที่ 1.3.1 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามภาวะการทำงาน ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	มีงานทำ	ว่างงาน	รอฤดูกาล เกษตร	ทำงาน โดยไม่มี ค่าตอบแทน	เรียน หนังสือ โดย ไม่ทำงาน	อื่น ๆ
<b>ชาย</b>								
15 - 24	11,228	5,154,217	37.4 (1.1)	10.7 (0.5)	7.0 (0.6)	1.7 (0.2)	40.9 (1.1)	2.3 (0.3)
25 - 34	10,995	4,807,058	76.1 (0.8)	5.0 (0.3)	14.4 (0.7)	1.1 (0.2)	0.8 (0.1)	2.7 (0.3)
35 - 44	11,955	5,374,200	71.5 (1.0)	3.0 (0.2)	22.2 (0.9)	0.8 (0.2)	-	2.3 (0.3)
45 - 54	9,045	4,125,085	68.7 (1.2)	3.9 (0.4)	23.1 (1.1)	1.1 (0.2)	-	3.0 (0.4)
55 - 64	14,749	2,580,598	50.9 (0.9)	11.1 (0.5)	28.4 (0.9)	3.7 (0.2)	-	6.0 (0.6)
65 - 74	6,719	1,173,881	34.1 (1.2)	28.4 (1.2)	20.9 (1.1)	7.8 (0.5)	-	8.7 (0.7)
<b>รวม</b>	<b>64,691</b>	<b>23,215,040</b>	<b>60.2 (0.7)</b>	<b>7.5 (0.2)</b>	<b>18.0 (0.6)</b>	<b>1.8 (0.1)</b>	<b>9.3 (0.2)</b>	<b>3.2 (0.2)</b>
<b>หญิง</b>								
15 - 24	10,368	4,767,082	29.7 (0.7)	11.1 (0.6)	5.4 (0.4)	6.0 (0.4)	46.5 (0.8)	1.4 (0.2)
25 - 34	10,494	4,723,268	67.6 (0.9)	6.5 (0.4)	15.1 (0.7)	8.0 (0.5)	1.0 (0.2)	1.7 (0.2)
35 - 44	12,551	5,801,992	61.7 (1.0)	4.8 (0.4)	22.0 (0.9)	7.9 (0.6)	-	3.4 (0.4)
45 - 54	9,964	4,555,329	56.1 (1.1)	6.2 (0.5)	22.7 (0.9)	11.1 (0.6)	-	3.8 (0.5)
55 - 64	14,528	2,932,651	38.0 (0.9)	14.6 (0.6)	23.3 (0.8)	19.2 (0.7)	-	4.9 (0.4)
65 - 74	7,003	1,387,118	21.8 (1.0)	29.7 (1.2)	12.9 (0.8)	26.9 (1.1)	-	8.6 (0.7)
<b>รวม</b>	<b>64,908</b>	<b>24,167,440</b>	<b>50.3 (0.7)</b>	<b>9.3 (0.3)</b>	<b>17.1 (0.6)</b>	<b>10.6 (0.3)</b>	<b>9.5 (0.2)</b>	<b>3.2 (0.2)</b>
<b>ชายและหญิง</b>								
15 - 24	21,596	9,921,299	33.7 (0.7)	10.9 (0.4)	6.2 (0.4)	3.7 (0.2)	43.6 (0.8)	1.9 (0.2)
25 - 34	21,489	9,530,327	71.9 (0.8)	5.8 (0.3)	14.7 (0.7)	4.5 (0.3)	0.9 (0.1)	2.2 (0.2)
35 - 44	24,506	11,176,192	66.4 (0.8)	3.9 (0.2)	22.1 (0.8)	4.5 (0.3)	-	2.9 (0.3)
45 - 54	19,009	8,680,414	62.1 (1.0)	5.1 (0.3)	22.9 (0.9)	6.3 (0.3)	-	3.4 (0.4)
55 - 64	29,277	5,513,249	44.0 (0.8)	13.0 (0.5)	25.7 (0.8)	11.9 (0.4)	-	5.4 (0.4)
65 - 74	13,722	2,560,999	27.4 (0.9)	29.1 (1.0)	16.6 (0.8)	18.2 (0.7)	-	8.7 (0.6)
<b>รวมทั้ง ประเทศ</b>	<b>129,599</b>	<b>47,382,480</b>	<b>55.2 (0.6)</b>	<b>8.4 (0.2)</b>	<b>17.6 (0.6)</b>	<b>6.3 (0.2)</b>	<b>9.4 (0.2)</b>	<b>3.2 (0.2)</b>

ตารางที่ 1.3.2 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามภาวะการทำงาน ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	มีงานทำ	ว่างงาน	รอดูท่า การเกษตร	ทำงาน โดยไม่มี ค่าตอบแทน	เรียน หนังสือ โดย ไม่ทำงาน	อื่น ๆ
<b>เขตการปกครอง</b>								
<i>ในเขตเทศบาล</i>	65,500	15,934,232	64.1 (0.7)	9.7 (0.4)	6.3 (0.4)	6.1 (0.2)	9.9 (0.3)	3.9 (0.3)
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	64,099	31,448,248	50.6 (0.9)	7.7 (0.3)	23.3 (0.9)	6.3 (0.3)	9.1 (0.2)	2.9 (0.2)
<b>ภาค</b>								
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	1,716	4,326,165	73.3 (1.9)	9.9 (1.1)	0.1 (0.1)	3.7 (0.5)	7.3 (0.9)	5.7 (1.1)
<i>ภาคกลาง</i>	42,789	11,776,592	62.2 (0.9)	9.2 (0.3)	6.9 (0.6)	7.1 (0.3)	11.4 (0.5)	3.1 (0.2)
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	32,276	16,132,705	41.3 (1.4)	8.2 (0.4)	33.3 (1.5)	5.7 (0.5)	8.7 (0.3)	2.7 (0.3)
<i>ภาคเหนือ</i>	28,860	8,843,197	51.6 (1.3)	8.3 (0.6)	22.1 (1.5)	6.2 (0.3)	8.5 (0.3)	3.2 (0.3)
<i>ภาคใต้</i>	23,958	6,303,822	69.9 (1.3)	6.3 (0.4)	2.7 (0.5)	7.9 (0.5)	10.2 (0.4)	3.0 (0.8)
<b>เขต สคร.</b>								
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	5,065	2,114,661	59.8 (2.3)	12.5 (1.0)	2.6 (0.7)	7.5 (0.9)	14.4 (1.3)	3.2 (0.6)
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	8,621	1,669,345	59.9 (2.4)	9.2 (0.7)	12.8 (1.9)	6.4 (0.6)	8.9 (0.6)	2.8 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	15,406	4,271,977	63.8 (1.2)	9.0 (0.6)	7.0 (0.9)	7.7 (0.4)	9.3 (0.5)	3.2 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	13,697	3,720,609	62.8 (1.7)	7.6 (0.5)	6.6 (1.4)	6.6 (0.4)	13.3 (1.0)	3.1 (0.5)
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	6,833	4,936,730	40.6 (2.7)	8.0 (0.8)	32.5 (2.8)	6.4 (1.2)	9.0 (0.5)	3.4 (0.6)
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	13,549	6,492,965	41.3 (2.3)	8.1 (0.7)	31.7 (2.5)	6.7 (0.6)	9.6 (0.4)	2.6 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	11,894	4,703,011	42.2 (1.9)	8.5 (0.8)	36.4 (2.1)	3.8 (0.4)	7.0 (0.5)	2.1 (0.2)
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	6,730	1,992,884	50.9 (2.1)	10.4 (1.9)	22.6 (3.9)	5.2 (0.5)	6.2 (0.4)	4.6 (0.9)
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	8,537	2,565,589	51.4 (2.4)	8.2 (0.7)	23.7 (2.4)	6.6 (0.6)	8.3 (0.5)	1.9 (0.3)
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	13,593	4,284,724	52.1 (2.1)	7.4 (0.6)	20.9 (2.0)	6.5 (0.5)	9.7 (0.5)	3.4 (0.5)
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	11,938	3,051,207	69.4 (2.1)	5.5 (0.5)	3.3 (1.0)	8.3 (0.9)	9.8 (0.6)	3.6 (1.6)
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	12,020	3,252,615	70.3 (1.4)	7.1 (0.5)	2.1 (0.4)	7.6 (0.6)	10.6 (0.4)	2.3 (0.5)

ตารางที่ 1.3.3 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามภาวะการทำงาน ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	มีงานทำ	ว่างงาน	รอฤดูกาล เกษตร	ทำงาน โดยไม่มี ค่าตอบแทน	เรียน หนังสือ โดย ไม่ทำงาน	อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร	1,716	4,326,165	73.3 (1.9)	9.9 (1.1)	-	3.7 (0.5)	7.3 (0.9)	5.7 (1.1)
ภาคกลาง								
สมุทรปราการ	1,709	881,732	70.2 (2.3)	11.4 (1.8)	0.6 (0.6)	6.6 (1.1)	9.0 (1.1)	2.1 (0.6)
นนทบุรี	1,708	823,410	62.7 (1.9)	10.8 (1.8)	1.1 (0.5)	7.4 (0.9)	13.4 (0.9)	4.5 (1.4)
ปทุมธานี	1,651	705,801	53.2 (4.1)	15.6 (1.2)	1.7 (0.7)	7.5 (2.4)	19.2 (2.6)	2.9 (0.6)
พระนครศรีอยุธยา	1,706	585,451	63.6 (3.4)	11.0 (2.0)	5.9 (2.2)	7.4 (1.0)	10.3 (0.8)	1.8 (0.7)
อ่างทอง	1,739	218,174	62.8 (2.0)	4.6 (1.1)	11.4 (1.7)	10.9 (1.1)	8.7 (0.9)	1.6 (0.5)
ลพบุรี	1,710	567,804	58.9 (6.2)	7.8 (1.5)	16.4 (4.7)	5.0 (0.8)	7.5 (1.2)	4.5 (1.1)
สิงห์บุรี	1,714	165,941	57.8 (3.7)	13.7 (1.9)	10.2 (2.0)	5.9 (1.0)	11.0 (0.9)	1.3 (0.4)
ชัยนาท	1,712	258,328	51.8 (3.3)	11.0 (1.2)	14.7 (3.1)	8.8 (2.9)	12.0 (1.4)	1.7 (0.5)
สระบุรี	1,746	459,097	64.9 (3.2)	10.5 (1.0)	9.0 (2.6)	4.9 (1.0)	8.2 (1.2)	2.5 (0.8)
ชลบุรี	1,702	957,658	65.9 (2.0)	10.0 (1.4)	2.0 (1.0)	8.2 (0.9)	8.3 (0.7)	5.6 (1.2)
ระยอง	1,707	450,342	59.7 (2.8)	9.9 (1.3)	4.2 (0.9)	9.5 (1.3)	15.3 (2.7)	1.5 (0.6)
จันทบุรี	1,709	382,272	62.3 (3.6)	6.0 (0.8)	14.1 (4.2)	5.9 (0.7)	8.7 (0.7)	3.0 (0.7)
ตราด	1,715	160,252	68.5 (3.0)	8.9 (2.4)	5.8 (2.5)	8.6 (1.5)	6.8 (0.5)	1.4 (0.8)
ฉะเชิงเทรา	1,730	503,929	63.8 (5.2)	6.1 (0.9)	12.1 (4.8)	6.4 (0.9)	8.9 (0.8)	2.7 (1.2)
ปราจีนบุรี	1,722	344,449	67.8 (4.0)	6.5 (1.8)	7.3 (2.9)	8.7 (1.0)	8.1 (1.5)	1.5 (0.3)
นครนายก	1,709	192,256	58.8 (3.9)	8.0 (1.2)	5.9 (1.5)	11.0 (2.3)	12.0 (1.9)	4.4 (1.8)
สระแก้ว	1,703	399,088	48.0 (4.0)	9.7 (1.9)	23.7 (5.0)	6.8 (1.5)	7.6 (0.8)	4.2 (1.4)
ราชบุรี	1,715	625,509	66.7 (2.7)	7.0 (1.2)	4.4 (1.6)	7.9 (1.1)	10.3 (0.9)	3.7 (1.5)
กาญจนบุรี	1,716	578,744	51.2 (6.8)	8.4 (1.7)	15.5 (6.7)	6.6 (1.0)	12.3 (1.5)	6.0 (1.9)
สุพรรณบุรี	1,723	645,381	64.0 (3.8)	6.2 (1.0)	11.7 (3.8)	5.9 (0.5)	9.7 (0.9)	2.4 (0.8)
นครปฐม	1,703	645,279	59.5 (3.4)	8.1 (1.5)	1.7 (1.3)	5.2 (1.2)	23.0 (3.5)	2.4 (0.8)
สมุทรสาคร	1,724	362,069	75.9 (2.0)	8.0 (0.8)	0.3 (0.1)	6.9 (1.3)	8.5 (0.9)	0.4 (0.1)
สมุทรสงคราม	1,729	149,339	69.9 (3.1)	7.6 (1.4)	0.8 (0.5)	6.9 (1.0)	12.7 (2.0)	2.2 (0.9)
เพชรบุรี	1,712	349,334	65.3 (2.5)	7.6 (0.9)	5.7 (1.6)	7.0 (1.1)	12.6 (1.7)	2.0 (0.6)
ประจวบคีรีขันธ์	1,675	364,954	59.5 (3.8)	8.9 (1.6)	5.3 (1.2)	7.2 (1.0)	14.8 (1.7)	4.4 (2.2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								
นครราชสีมา	1,693	1,927,950	47.2 (5.1)	8.8 (1.2)	23.4 (5.3)	5.8 (1.1)	11.8 (1.0)	3.1 (1.1)
บุรีรัมย์	1,710	1,148,014	33.7 (5.2)	7.5 (2.0)	36.9 (4.2)	7.3 (4.7)	8.9 (1.1)	5.6 (1.1)
สุรินทร์	1,716	1,004,968	34.4 (5.1)	6.6 (1.4)	41.4 (5.0)	6.8 (1.4)	7.3 (0.8)	3.5 (1.3)
ศรีสะเกษ	1,683	1,081,068	29.0 (4.2)	7.0 (1.8)	51.3 (5.3)	3.6 (1.1)	6.9 (1.2)	2.2 (0.4)
อุบลราชธานี	1,712	1,325,609	62.0 (1.9)	7.6 (1.4)	19.3 (2.6)	2.3 (0.5)	5.9 (0.7)	2.9 (0.4)
ยโสธร	1,717	417,478	48.3 (7.5)	6.4 (1.8)	35.4 (6.6)	3.0 (0.6)	5.9 (0.9)	1.0 (0.4)
ชัยภูมิ	1,714	855,797	42.2 (4.1)	8.6 (1.9)	37.0 (5.0)	6.2 (1.1)	4.8 (0.7)	1.1 (0.4)
อำนาจเจริญ	1,685	279,480	38.0 (3.8)	6.1 (1.0)	43.7 (3.9)	3.4 (0.4)	5.8 (1.2)	2.9 (0.5)
หนองบัวลำภู	1,727	380,167	31.1 (3.7)	4.9 (0.9)	47.0 (3.5)	10.8 (0.7)	5.7 (0.8)	0.5 (0.2)
ขอนแก่น	1,682	1,335,651	45.2 (4.3)	8.2 (1.9)	23.2 (5.6)	8.6 (2.1)	11.9 (0.7)	3.0 (0.7)
อุดรธานี	1,690	1,149,818	41.1 (4.8)	9.7 (1.7)	35.4 (5.7)	5.0 (0.8)	7.8 (1.1)	0.9 (0.3)
เลย	1,637	467,464	38.2 (6.2)	7.6 (0.8)	33.8 (5.0)	7.0 (1.5)	7.0 (1.0)	6.4 (0.2)
หนองคาย	1,704	673,837	44.9 (5.9)	9.7 (1.6)	22.9 (5.2)	7.9 (2.2)	9.1 (1.2)	5.5 (3.1)

ตารางที่ 1.3.3 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามภาวะการทำงานในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	มีงานทำ	ว่างงาน	รอฤดูกาลเกษตร	ทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน	เรียนหนังสือโดยไม่ทำงาน	อื่น ๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)								
มหาสารคาม	1,718	729,743	38.7 (5.1)	6.1 (1.5)	33.6 (5.1)	6.6 (2.3)	12.6 (1.2)	2.4 (1.0)
ร้อยเอ็ด	1,719	1,010,169	47.3 (8.7)	7.2 (2.6)	28.0 (9.3)	5.1 (1.1)	11.1 (1.5)	1.4 (0.5)
กาฬสินธุ์	1,672	746,115	33.0 (3.7)	9.1 (1.1)	43.5 (4.7)	4.4 (1.0)	7.3 (0.6)	2.7 (0.8)
สกลนคร	1,695	836,636	37.6 (5.5)	13.1 (3.0)	34.0 (5.2)	5.1 (1.5)	8.2 (1.4)	2.0 (0.4)
นครพนม	1,681	510,624	23.7 (3.0)	8.9 (2.4)	50.9 (4.6)	6.6 (1.1)	8.7 (1.0)	1.3 (0.5)
มุกดาหาร	1,721	252,115	41.9 (6.3)	10.5 (2.7)	34.8 (6.7)	3.2 (0.9)	8.4 (1.4)	1.2 (0.3)
ภาคเหนือ								
เชียงใหม่	1,700	1,199,115	57.9 (4.5)	7.6 (1.1)	15.3 (4.4)	5.5 (1.2)	9.3 (1.2)	4.3 (1.3)
ลำพูน	1,706	321,627	67.7 (3.5)	5.0 (0.7)	9.6 (2.8)	5.2 (1.1)	9.2 (1.1)	3.3 (0.9)
ลำปาง	1,706	608,692	52.8 (5.4)	7.4 (1.5)	20.2 (4.7)	6.7 (0.9)	11.4 (0.7)	1.5 (0.4)
อุตรดิตถ์	1,692	353,385	49.1 (3.6)	8.0 (1.0)	20.6 (3.3)	8.6 (1.0)	10.2 (1.1)	3.5 (1.0)
แพร่	1,719	371,749	56.8 (4.3)	7.2 (1.3)	14.5 (3.5)	7.7 (1.4)	8.2 (0.7)	5.5 (2.0)
น่าน	1,723	370,001	53.3 (8.2)	3.5 (0.8)	24.3 (8.6)	6.9 (1.4)	11.0 (1.3)	1.0 (0.3)
พะเยา	1,708	388,521	36.9 (4.1)	10.5 (2.6)	33.2 (4.4)	7.8 (1.5)	8.9 (0.8)	2.8 (0.9)
เชียงราย	1,699	872,406	42.4 (5.4)	8.8 (1.7)	28.2 (5.1)	6.9 (0.9)	10.2 (1.5)	3.4 (1.1)
แม่ฮ่องสอน	1,632	152,613	51.3 (7.0)	5.4 (1.9)	26.0 (5.9)	5.0 (1.4)	6.4 (1.6)	5.8 (3.1)
นครสวรรค์	1,691	798,103	56.1 (2.8)	13.2 (3.8)	14.2 (6.1)	5.4 (0.5)	6.6 (0.7)	4.5 (1.2)
อุทัยธานี	1,670	243,266	41.1 (6.5)	7.4 (1.1)	37.9 (6.9)	4.7 (1.3)	4.7 (1.3)	4.3 (1.0)
กำแพงเพชร	1,681	533,999	50.0 (3.5)	7.2 (1.0)	26.9 (3.9)	6.2 (1.4)	7.0 (0.9)	2.7 (0.7)
ตาก	1,704	343,673	59.0 (4.1)	7.9 (1.5)	16.7 (3.2)	6.0 (1.2)	8.7 (1.5)	1.8 (0.8)
สุโขทัย	1,712	467,508	59.1 (4.3)	5.4 (1.1)	19.7 (4.1)	7.2 (1.3)	7.7 (0.9)	0.9 (0.4)
พิษณุโลก	1,718	651,170	52.5 (4.6)	8.9 (1.4)	21.0 (4.3)	7.4 (0.9)	7.7 (1.3)	2.4 (0.7)
พิจิตร	1,688	417,516	48.0 (3.2)	10.9 (1.2)	24.4 (3.3)	3.9 (0.7)	5.4 (0.8)	7.5 (3.1)
เพชรบูรณ์	1,711	749,853	43.2 (6.0)	9.7 (1.5)	33.1 (6.3)	4.7 (1.4)	8.0 (0.8)	1.3 (0.6)
ภาคใต้								
นครศรีธรรมราช	1,699	1,113,360	64.4 (5.4)	4.0 (1.1)	5.3 (2.7)	9.6 (2.2)	10.5 (1.3)	6.2 (4.3)
กระบี่	1,703	304,521	78.0 (2.6)	4.7 (1.1)	-	7.6 (2.2)	9.2 (1.5)	0.4 (0.2)
พังงา	1,714	185,085	69.7 (3.8)	3.8 (0.6)	1.7 (0.8)	12.2 (2.0)	7.1 (0.7)	5.6 (2.8)
ภูเก็ต	1,718	243,865	67.9 (2.3)	12.3 (0.8)	0.2 (0.1)	6.6 (0.9)	12.5 (1.9)	0.5 (0.2)
สุราษฎร์ธานี	1,684	722,043	73.3 (2.6)	6.6 (0.7)	2.5 (1.0)	7.0 (1.3)	8.9 (1.0)	1.8 (0.6)
ระนอง	1,709	121,065	64.7 (3.1)	8.4 (0.9)	6.9 (3.3)	8.2 (2.0)	10.8 (1.9)	1.1 (0.5)
ชุมพร	1,711	361,267	72.3 (3.1)	4.0 (1.1)	3.5 (1.0)	6.3 (1.2)	9.6 (1.8)	4.3 (2.3)
สงขลา	1,713	968,948	75.0 (2.3)	5.3 (1.0)	1.6 (0.7)	5.1 (0.8)	11.5 (1.0)	1.5 (0.6)
สตูล	1,696	205,369	62.2 (2.9)	7.3 (1.4)	1.5 (0.3)	16.3 (1.9)	8.8 (1.2)	4.0 (1.6)
ตรัง	1,716	452,568	76.7 (2.4)	5.3 (1.1)	0.2 (0.1)	7.8 (2.3)	9.7 (1.1)	0.3 (0.1)
พัทลุง	1,723	380,513	73.0 (2.4)	5.1 (0.9)	4.7 (1.4)	8.3 (1.2)	7.5 (0.8)	1.5 (0.6)
ปัตตานี	1,730	429,997	59.3 (3.7)	9.7 (1.2)	2.9 (0.9)	8.6 (1.4)	13.6 (1.3)	5.9 (2.4)
ยะลา	1,717	322,402	66.1 (2.5)	11.8 (1.6)	2.5 (1.3)	5.8 (1.0)	10.7 (1.3)	3.0 (0.8)
นราธิวาส	1,725	492,817	68.7 (5.40)	8.5 (1.5)	1.9 (1.1)	8.7 (2.1)	10.1 (1.1)	2.1 (1.5)

ตารางที่ 1.4.1 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อคนตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี)/ เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 1,000 บาท	1,000 - 4,999 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 บาท ขึ้นไป
<b>ชาย</b>							
15 - 24	9,614	4,439,093	28.3 (1.1)	37.0 (1.0)	28.2 (1.2)	5.7 (0.5)	0.7 (0.2)
25 - 34	9,718	4,285,552	4.5 (0.4)	22.4 (0.9)	44.4 (0.9)	25.1 (0.9)	3.7 (0.4)
35 - 44	10,442	4,738,767	3.8 (0.3)	28.0 (0.9)	37.0 (0.9)	24.9 (1.0)	6.3 (0.5)
45 - 54	7,901	3,598,268	4.0 (0.4)	27.9 (1.2)	33.8 (1.1)	24.3 (1.4)	10.0 (1.1)
55 - 64	12,803	2,233,398	10.6 (0.5)	39.3 (0.9)	26.6 (0.8)	17.0 (0.6)	6.6 (0.6)
65 - 74	5,815	998,709	24.1 (1.0)	42.5 (1.2)	18.7 (0.8)	11.7 (0.7)	3.0 (0.5)
<b>รวม</b>	<b>56,293</b>	<b>20,293,787</b>	<b>11.1 (0.4)</b>	<b>30.7 (0.7)</b>	<b>34.0 (0.6)</b>	<b>19.1 (0.6)</b>	<b>5.1 (0.4)</b>
<b>หญิง</b>							
15 - 24	8,902	4,077,579	28.9 (1.2)	36.8 (1.0)	26.0 (0.9)	7.5 (0.6)	0.7 (0.2)
25 - 34	9,245	4,143,156	7.8 (0.5)	26.8 (0.9)	39.6 (1.0)	22.8 (0.8)	3.1 (0.3)
35 - 44	11,000	5,108,954	6.7 (0.5)	33.9 (0.9)	35.0 (0.9)	19.5 (0.7)	5.0 (0.4)
45 - 54	8,560	3,826,584	8.6 (0.7)	36.6 (1.1)	30.3 (0.9)	17.9 (0.9)	6.6 (0.5)
55 - 64	12,644	2,525,767	17.4 (0.7)	47.6 (0.9)	20.7 (0.6)	11.0 (0.6)	3.3 (0.3)
65 - 74	6,096	1,207,168	32.7 (1.2)	45.5 (1.2)	14.0 (0.9)	6.2 (0.6)	1.6 (0.3)
<b>รวม</b>	<b>56,447</b>	<b>20,889,208</b>	<b>14.4 (0.5)</b>	<b>35.9 (0.6)</b>	<b>30.4 (0.5)</b>	<b>15.7 (0.4)</b>	<b>3.7 (0.2)</b>
<b>รวม</b>							
15 - 24	18,516	8,516,672	28.6 (0.9)	36.9 (0.8)	27.2 (0.8)	6.6 (0.4)	0.7 (0.1)
25 - 34	18,963	8,428,708	6.1 (0.3)	24.5 (0.7)	42.0 (0.7)	23.9 (0.7)	3.4 (0.3)
35 - 44	21,442	9,847,721	5.3 (0.3)	31.0 (0.8)	35.9 (0.7)	22.1 (0.7)	5.6 (0.3)
45 - 54	16,461	7,424,851	6.4 (0.4)	32.4 (1.0)	32.0 (0.8)	21.0 (0.9)	8.2 (0.7)
55 - 64	25,447	4,759,164	14.2 (0.6)	43.7 (0.8)	23.5 (0.5)	13.8 (0.4)	4.8 (0.3)
65 - 74	11,911	2,205,877	28.8 (0.9)	44.1 (0.9)	16.1 (0.7)	8.7 (0.4)	2.3 (0.3)
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>112,740</b>	<b>41,182,995</b>	<b>12.8 (0.4)</b>	<b>33.3 (0.6)</b>	<b>32.2 (0.4)</b>	<b>17.4 (0.5)</b>	<b>4.4 (0.2)</b>

ตารางที่ 1.4.2 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อคน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 1,000 บาท	1,000 - 4,999 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 บาท ขึ้นไป
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	55,729	13,040,443	12.6 (0.6)	21.0 (0.5)	34.3 (0.6)	24.9 (0.5)	7.2 (0.3)
นอกเขตเทศบาล	57,011	28,142,551	12.9 (0.5)	39.1 (0.9)	31.2 (0.6)	13.9 (0.6)	3.0 (0.3)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	1,239	3,167,314	10.8 (1.8)	6.9 (1.0)	35.9 (2.0)	37.3 (1.3)	9.2 (1.0)
ภาคกลาง	35,977	9,900,628	12.5 (0.6)	22.9 (0.7)	38.2 (0.7)	20.9 (0.6)	5.5 (0.4)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29,015	14,575,825	14.3 (0.8)	45.6 (1.4)	26.1 (0.8)	11.1 (1.1)	2.9 (0.5)
ภาคเหนือ	25,029	7,791,049	13.8 (0.7)	42.1 (1.3)	30.1 (0.8)	11.4 (0.6)	2.7 (0.2)
ภาคใต้	21,480	5,748,179	8.9 (0.6)	22.8 (0.9)	38.0 (1.1)	24.7 (0.9)	5.6 (0.6)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	3,880	1,607,433	13.9 (1.6)	18.2 (2.2)	32.7 (2.2)	27.2 (2.0)	8.0 (1.6)
เขต สคร. ที่ 2	7,486	1,464,677	11.8 (1.3)	27.4 (1.3)	39.6 (1.1)	17.2 (1.1)	4.1 (1.0)
เขต สคร. ที่ 3	13,109	3,696,399	10.6 (0.8)	20.4 (1.1)	37.8 (1.2)	24.1 (1.2)	7.0 (0.8)
เขต สคร. ที่ 4	11,502	3,132,119	14.4 (1.3)	26.3 (1.5)	40.8 (1.5)	15.5 (0.8)	3.1 (0.3)
เขต สคร. ที่ 5	6,166	4,489,817	13.4 (1.3)	47.3 (2.3)	27.9 (1.8)	9.2 (1.1)	2.2 (0.4)
เขต สคร. ที่ 6	12,366	5,911,193	12.5 (1.2)	40.4 (2.5)	28.2 (1.0)	14.6 (2.4)	4.3 (1.2)
เขต สคร. ที่ 7	10,483	4,174,815	17.9 (1.4)	51.1 (1.8)	21.2 (1.1)	8.0 (0.7)	1.7 (0.2)
เขต สคร. ที่ 8	5,286	1,625,973	13.2 (1.4)	33.9 (3.0)	36.0 (1.4)	13.6 (1.7)	3.4 (0.5)
เขต สคร. ที่ 9	7,503	2,305,420	11.2 (0.9)	47.4 (0.2)	28.8 (1.6)	10.2 (0.9)	2.4 (0.3)
เขต สคร. ที่ 10	12,240	3,859,657	15.6 (1.2)	42.4 (1.5)	28.3 (1.0)	11.1 (0.8)	2.5 (0.3)
เขต สคร. ที่ 11	10,545	2,787,511	8.3 (0.7)	20.1 (1.5)	35.8 (1.9)	28.8 (1.4)	6.9 (1.0)
เขต สคร. ที่ 12	10,935	2,960,667	9.3 (0.9)	25.4 (1.1)	40.0 (1.2)	20.8 (1.0)	4.5 (0.6)

ตารางที่ 1.4.3 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อคน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 1,000 บาท	1,000 - 4,999 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 บาท ขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร	1,239	3,167,314	10.8 (1.8)	6.9 (1.0)	35.9 (2.0)	37.3 (1.3)	9.2 (1.0)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,441	741,619	10.4 (2.1)	10.7 (1.4)	39.8 (3.3)	33.7 (3.5)	5.4 (1.0)
นนทบุรี	1,292	592,044	19.1 (2.7)	12.0 (1.7)	26.4 (2.6)	29.6 (2.5)	12.9 (2.8)
ปทุมธานี	1,080	504,865	14.7 (3.9)	21.1 (5.0)	35.1 (3.9)	24.3 (3.6)	4.7 (2.1)
พระนครศรีอยุธยา	1,508	510,525	7.1 (1.6)	22.3 (2.3)	37.6 (3.6)	27.3 (3.1)	5.7 (1.8)
อ่างทอง	1,642	207,988	3.3 (0.8)	36.7 (2.4)	38.8 (2.0)	18.1 (2.7)	3.0 (0.7)
ลพบุรี	1,496	490,272	8.5 (1.5)	32.2 (2.6)	43.9 (1.9)	12.4 (1.7)	3.1 (0.8)
สิงห์บุรี	1,390	132,683	12.6 (2.2)	29.1 (2.7)	39.4 (3.0)	16.3 (1.6)	2.6 (0.7)
ชัยนาท	1,405	216,713	18.0 (6.2)	31.0 (5.8)	33.6 (2.5)	15.2 (1.9)	2.1 (0.5)
สระบุรี	1,553	417,021	16.5 (1.9)	14.6 (2.0)	38.0 (2.2)	23.7 (3.0)	7.3 (3.3)
ชลบุรี	1,498	861,328	11.3 (1.9)	17.7 (1.6)	37.5 (3.3)	22.8 (2.6)	10.8 (2.4)
ระยอง	1,318	348,440	12.8 (2.4)	14.4 (1.4)	27.7 (2.7)	30.0 (1.2)	15.1 (2.6)
จันทบุรี	1,477	331,173	4.8 (1.1)	22.8 (1.8)	43.2 (1.9)	23.9 (2.2)	5.4 (1.0)
ตราด	1,405	127,298	10.9 (1.9)	28.2 (5.2)	40.4 (1.8)	16.1 (3.3)	4.4 (1.1)
ฉะเชิงเทรา	1,490	434,337	12.3 (1.8)	27.8 (5.3)	38.1 (2.2)	18.4 (2.7)	3.4 (0.8)
ปราจีนบุรี	1,626	316,452	8.5 (2.0)	27.1 (3.2)	40.2 (2.8)	20.9 (3.2)	3.4 (0.6)
นครนายก	1,368	180,851	10.6 (2.8)	32.6 (2.4)	40.3 (2.3)	13.0 (2.3)	3.5 (0.7)
สระแก้ว	1,486	354,900	12.8 (4.1)	27.3 (5.4)	34.4 (4.0)	20.0 (4.1)	5.5 (2.1)
ราชบุรี	1,518	551,684	13.7 (2.3)	29.1 (2.8)	40.4 (3.1)	13.8 (1.7)	3.0 (0.6)
กาญจนบุรี	1,338	489,857	16.4 (2.6)	27.1 (3.4)	42.6 (4.1)	11.9 (1.6)	2.0 (0.9)
สุพรรณบุรี	1,533	539,161	10.5 (1.6)	25.0 (5.2)	44.4 (4.3)	16.0 (2.1)	4.0 (0.5)
นครปฐม	1,321	531,644	20.4 (5.7)	19.7 (3.2)	37.4 (4.2)	19.4 (2.3)	3.0 (0.8)
สมุทรสาคร	1,445	277,471	13.2 (2.1)	21.0 (6.8)	38.2 (4.1)	22.7 (3.0)	4.8 (0.8)
สมุทรสงคราม	1,552	136,029	10.1 (1.8)	27.9 (2.9)	46.0 (2.5)	14.2 (1.9)	1.8 (0.4)
เพชรบุรี	1,518	314,986	10.0 (1.8)	35.4 (3.4)	38.5 (2.2)	12.3 (1.9)	3.7 (0.8)
ประจวบคีรีขันธ์	1,277	291,286	16.0 (2.7)	27.9 (3.2)	40.3 (2.5)	14.3 (2.6)	1.6 (0.4)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,499	1,714,995	13.6 (1.8)	41.8 (4.6)	31.8 (3.3)	10.1 (1.7)	2.7 (0.9)
บุรีรัมย์	1,609	1,108,553	13.4 (3.1)	48.7 (3.9)	26.6 (2.9)	8.7 (2.2)	2.6 (1.0)
สุรินทร์	1,459	878,316	15.4 (3.7)	48.9 (4.1)	24.5 (5.2)	10.2 (3.0)	0.9 (0.3)
ศรีสะเกษ	1,420	962,061	21.5 (4.3)	53.8 (5.9)	17.1 (2.7)	6.7 (1.8)	0.9 (0.4)
อุบลราชธานี	1,525	1,214,234	17.7 (2.2)	48.1 (3.1)	24.1 (2.2)	8.7 (1.5)	1.5 (0.5)
ยโสธร	1,664	406,442	7.6 (2.3)	56.5 (3.4)	26.5 (2.9)	7.5 (1.4)	2.0 (0.6)
ชัยภูมิ	1,599	787,953	10.7 (1.7)	55.5 (4.2)	25.0 (3.1)	6.6 (1.0)	2.2 (0.8)
อำนาจเจริญ	1,474	243,204	14.2 (2.7)	49.9 (3.8)	22.7 (2.3)	9.5 (2.2)	3.7 (1.6)
หนองบัวลำภู	1,716	378,214	7.9 (1.0)	56.5 (2.3)	26.5 (1.9)	8.0 (1.2)	1.1 (0.4)
ขอนแก่น	1,513	1,217,417	14.3 (2.7)	31.7 (6.8)	28.0 (1.6)	16.5 (4.2)	9.5 (5.0)
อุดรธานี	1,495	978,919	14.5 (3.1)	42.5 (4.3)	28.6 (3.2)	11.3 (1.9)	3.0 (0.6)
เลย	1,482	428,531	12.5 (1.1)	48.9 (3.5)	25.0 (1.9)	10.6 (2.0)	2.9 (1.2)
หนองคาย	1,467	584,154	10.5 (1.9)	35.1 (3.3)	34.6 (3.0)	15.9 (3.2)	3.9 (0.8)

ตารางที่ 1.4.3 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อคน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า1,000 บาท	1,000 - 4,999 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 บาท ขึ้นไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	1,661	716,526	11.3 (3.3)	41.6 (3.2)	30.4 (3.8)	14.9 (3.9)	1.8 (0.4)
ร้อยเอ็ด	1,543	940,637	10.8 (4.7)	36.4 (8.7)	24.0 (1.8)	24.0 (10.5)	4.8 (1.4)
กาฬสินธุ์	1,489	666,794	14.2 (1.6)	47.7 (3.4)	28.5 (2.9)	8.0 (1.7)	1.6 (0.5)
สกลนคร	1,348	682,763	21.6 (3.2)	52.3 (2.0)	18.1 (3.0)	6.4 (1.2)	1.7 (0.4)
นครพนม	1,465	437,467	16.7 (3.2)	48.8 (5.1)	21.5 (2.0)	10.3 (2.3)	2.6 (0.6)
มุกดาหาร	1,587	228,644	17.5 (4.4)	47.9 (4.6)	21.6 (3.3)	10.5 (2.5)	2.5 (0.9)
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	1,490	1,024,634	16.5 (2.9)	34.6 (3.1)	34.5 (2.4)	11.8 (2.3)	2.6 (0.7)
ลำพูน	1,491	289,942	9.8 (2.1)	35.1 (4.3)	36.6 (2.8)	16.2 (2.8)	2.3 (0.5)
ลำปาง	1,597	575,379	12.6 (2.0)	50.1 (2.9)	24.6 (2.0)	10.1 (1.8)	2.6 (0.6)
อุตรดิตถ์	1,400	298,983	15.4 (1.9)	42.0 (3.9)	26.9 (2.4)	10.9 (1.4)	4.8 (1.1)
แพร่	1,519	329,646	11.3 (1.2)	40.1 (3.4)	30.3 (2.3)	14.6 (2.4)	3.7 (0.6)
น่าน	1,649	360,363	19.1 (6.3)	50.0 (4.5)	20.0 (3.0)	8.5 (1.7)	2.4 (0.5)
พะเยา	1,554	354,150	17.7 (3.0)	48.3 (3.3)	22.5 (2.5)	9.4 (1.4)	2.1 (0.5)
เชียงราย	1,548	807,370	16.4 (1.9)	45.3 (4.0)	27.0 (2.4)	9.3 (1.5)	2.0 (0.5)
แม่ฮ่องสอน	1,392	118,172	25.9 (6.1)	36.5 (3.4)	20.0 (3.1)	13.9 (2.6)	3.7 (0.7)
นครสวรรค์	1,406	702,212	12.9 (2.8)	30.1 (5.3)	37.5 (1.5)	16.2 (2.8)	3.3 (0.8)
อุทัยธานี	1,190	150,527	17.4 (4.0)	42.8 (3.8)	26.2 (2.4)	10.0 (2.6)	3.5 (1.0)
กำแพงเพชร	1,425	448,068	12.1 (1.8)	38.3 (3.4)	37.2 (3.6)	9.6 (2.0)	2.8 (0.5)
ตาก	1,530	309,109	13.9 (3.3)	47.3 (4.2)	26.5 (2.5)	10.7 (1.8)	1.6 (0.4)
สุโขทัย	1,618	455,458	7.8 (1.3)	57.6 (4.8)	26.5 (3.2)	7.0 (1.1)	1.1 (0.5)
พิษณุโลก	1,511	594,151	13.4 (1.2)	43.0 (4.2)	29.8 (3.3)	11.0 (2.0)	2.9 (0.5)
พิจิตร	1,265	325,166	13.2 (1.9)	31.7 (2.4)	35.5 (3.4)	14.9 (1.9)	4.7 (1.2)
เพชรบูรณ์	1,444	647,719	8.4 (2.3)	46.9 (4.2)	31.6 (3.8)	11.1 (2.2)	2.0 (0.5)
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	1,403	993,368	7.5 (1.1)	25.6 (4.1)	37.7 (4.4)	24.7 (2.9)	4.4 (1.6)
กระบี่	1,620	293,116	6.3 (1.1)	16.9 (2.4)	43.4 (2.6)	27.0 (3.2)	6.4 (1.1)
พังงา	1,511	170,324	8.4 (2.7)	23.9 (1.9)	42.2 (1.9)	21.9 (2.7)	3.6 (0.9)
ภูเก็ต	1,554	219,851	11.9 (2.2)	12.3 (2.4)	29.1 (2.8)	38.8 (2.8)	7.9 (1.2)
สุราษฎร์ธานี	1,589	691,623	10.7 (1.7)	15.9 (1.9)	27.8 (2.9)	34.1 (2.8)	11.6 (2.8)
ระนอง	1,377	97,711	11.8 (1.5)	22.1 (3.4)	35.8 (2.3)	20.3 (1.4)	9.9 (2.4)
ชุมพร	1,491	321,519	4.1 (0.8)	17.6 (3.6)	41.9 (2.3)	31.3 (4.3)	5.1 (0.6)
สงขลา	1,477	848,195	7.1 (1.4)	16.6 (1.5)	43.7 (2.6)	25.9 (2.3)	6.7 (1.8)
สตูล	1,441	176,045	12.2 (3.1)	27.8 (3.1)	37.6 (3.4)	18.9 (4.3)	3.6 (0.7)
ตรัง	1,593	420,526	9.0 (1.5)	17.2 (2.0)	44.5 (3.6)	26.6 (3.6)	2.6 (0.5)
พัทลุง	1,662	369,914	3.9 (0.8)	27.9 (3.4)	37.3 (2.8)	24.7 (3.1)	6.2 (1.0)
ปัตตานี	1,576	387,765	15.1 (2.8)	36.6 (2.2)	37.3 (2.3)	9.2 (0.8)	1.9 (0.5)
ยะลา	1,552	293,396	14.8 (3.0)	26.6 (3.4)	36.5 (2.4)	19.0 (3.1)	3.1 (0.6)
นราธิวาส	1,634	464,826	8.8 (3.5)	36.2 (3.5)	36.6 (2.4)	14.5 (1.9)	3.9 (1.3)



ตารางที่ 1.4.4 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อครอบครัว ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี)/ เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 5,000 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 - 49,999 บาท	50,000 บาท ขึ้นไป
<b>ชาย</b>							
15 - 24	7,495	3,522,719	14.8 (1.0)	30.2 (1.0)	40.4 (1.1)	10.2 (0.6)	4.4 (0.4)
25 - 34	8,632	3,774,698	12.3 (0.7)	29.2 (0.9)	43.0 (1.0)	10.6 (0.6)	4.8 (0.5)
35 - 44	9,790	4,356,207	16.9 (0.9)	29.6 (0.9)	38.5 (1.1)	10.4 (0.6)	4.5 (0.3)
45 - 54	7,443	3,318,598	16.6 (1.1)	26.9 (1.1)	37.7 (1.5)	11.4 (0.6)	7.4 (1.1)
55 - 64	11,910	2,067,269	25.6 (0.9)	27.7 (0.8)	31.0 (0.8)	9.5 (0.5)	6.1 (0.4)
65 - 74	5,073	851,362	34.6 (1.2)	26.3 (1.0)	27.0 (1.1)	7.7 (0.6)	4.3 (0.5)
<b>รวม</b>	<b>50,343</b>	<b>17,890,852</b>	<b>17.3 (0.7)</b>	<b>28.8 (0.6)</b>	<b>38.3 (0.8)</b>	<b>10.4 (0.4)</b>	<b>5.3 (0.4)</b>
<b>หญิง</b>							
15 - 24	7,118	3,272,613	14.0 (0.8)	29.8 (1.0)	39.3 (1.0)	12.1 (0.8)	4.8 (0.5)
25 - 34	8,349	3,737,007	12.6 (0.7)	26.7 (0.9)	43.0 (1.0)	12.8 (0.7)	4.8 (0.4)
35 - 44	10,354	4,759,283	15.8 (0.8)	29.4 (0.8)	37.9 (0.9)	12.0 (0.8)	4.8 (0.4)
45 - 54	8,063	3,543,802	18.1 (0.8)	28.3 (0.9)	35.2 (0.9)	12.0 (0.7)	6.4 (0.6)
55 - 64	11,478	2,269,997	30.2 (0.9)	28.2 (0.8)	29.3 (0.8)	8.0 (0.4)	4.3 (0.4)
65 - 74	5,071	997,543	40.1 (1.3)	25.3 (1.2)	24.0 (1.0)	6.8 (0.7)	3.7 (0.7)
<b>รวม</b>	<b>50,433</b>	<b>18,580,244</b>	<b>18.3 (0.6)</b>	<b>28.4 (0.6)</b>	<b>36.9 (0.6)</b>	<b>11.4 (0.5)</b>	<b>5.0 (0.3)</b>
<b>รวม</b>							
15 - 24	14,613	6,795,332	14.4 (0.8)	30.0 (0.8)	39.9 (0.9)	11.1 (0.6)	4.6 (0.4)
25 - 34	16,981	7,511,705	12.5 (0.6)	27.9 (0.7)	43.0 (0.8)	11.7 (0.6)	4.8 (0.4)
35 - 44	20,144	9,115,490	16.4 (0.7)	29.5 (0.7)	38.1 (0.8)	11.3 (0.6)	4.7 (0.3)
45 - 54	15,506	6,862,399	17.4 (0.8)	27.6 (0.8)	36.4 (1.0)	11.7 (0.5)	6.9 (0.8)
55 - 64	23,388	4,337,265	28.0 (0.8)	28.0 (0.6)	30.1 (0.7)	8.7 (0.4)	5.2 (0.3)
65 - 74	10,144	1,848,904	37.6 (1.1)	25.8 (0.8)	25.4 (0.8)	7.2 (0.5)	4.0 (0.5)
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>100,776</b>	<b>36,471,096</b>	<b>17.8 (0.6)</b>	<b>28.6 (0.5)</b>	<b>37.5 (0.6)</b>	<b>10.9 (0.4)</b>	<b>5.1 (0.3)</b>

ตารางที่ 1.4.5 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อครอบครัว ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 5,000 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 - 49,999 บาท	50,000 บาท ขึ้นไป
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	48,039	10,420,007	9.6 (0.4)	22.7 (0.6)	41.9 (0.7)	16.9 (0.6)	8.8 (0.4)
นอกเขตเทศบาล	52,737	26,051,089	21.1 (0.8)	30.9 (0.7)	35.8 (0.8)	8.5 (0.5)	3.7 (0.4)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	749	1,936,253	2.5 (0.6)	15.0 (1.2)	50.0 (2.2)	22.2 (1.9)	10.3 (1.5)
ภาคกลาง	30,985	8,470,231	7.4 (0.5)	23.6 (1.0)	45.3 (1.0)	16.2 (1.0)	7.6 (0.5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,916	13,623,764	28.0 (1.5)	32.1 (1.1)	29.4 (1.2)	6.6 (0.7)	3.9 (0.8)
ภาคเหนือ	22,878	7,158,091	22.6 (1.0)	34.8 (1.0)	32.3 (1.3)	7.2 (0.4)	3.2 (0.2)
ภาคใต้	19,248	5,282,757	7.6 (0.9)	23.9 (1.1)	48.8 (1.4)	14.6 (1.0)	5.2 (0.4)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	3,075	1,259,188	4.3 (0.6)	11.7 (1.1)	46.3 (1.9)	24.4 (1.6)	13.2 (1.6)
เขต สคร. ที่ 2	6,473	1,275,410	10.1 (1.0)	32.9 (2.4)	42.7 (2.4)	10.4 (1.1)	3.9 (0.5)
เขต สคร. ที่ 3	11,603	3,304,737	6.4 (0.8)	19.5 (1.5)	47.0 (1.9)	18.6 (2.1)	8.5 (0.8)
เขต สคร. ที่ 4	9,834	2,630,895	8.8 (0.9)	29.9 (1.9)	43.9 (1.6)	12.0 (1.0)	5.4 (0.5)
เขต สคร. ที่ 5	5,741	4,154,925	26.3 (2.8)	34.6 (1.9)	29.9 (2.2)	5.9 (0.8)	3.3 (0.4)
เขต สคร. ที่ 6	11,357	5,524,872	19.4 (1.9)	31.2 (2.1)	34.9 (2.0)	8.7 (1.4)	5.7 (1.8)
เขต สคร. ที่ 7	9,818	3,943,967	41.9 (2.4)	30.8 (1.5)	21.0 (1.4)	4.1 (0.6)	2.2 (0.4)
เขต สคร. ที่ 8	4,756	1,487,326	19.1 (1.8)	35.6 (3.0)	36.4 (4.0)	5.5 (0.7)	3.4 (0.6)
เขต สคร. ที่ 9	6,830	2,166,892	25.7 (2.1)	35.8 (1.7)	29.7 (2.2)	6.5 (0.7)	2.3 (0.3)
เขต สคร. ที่ 10	11,292	3,503,873	22.1 (1.4)	33.8 (1.3)	32.2 (1.4)	8.3 (0.7)	3.5 (0.3)
เขต สคร. ที่ 11	9,227	2,544,303	7.3 (1.7)	17.5 (1.4)	51.1 (2.1)	17.9 (1.7)	6.0 (0.6)
เขต สคร. ที่ 12	10,021	2,738,454	7.7 (0.6)	29.7 (1.7)	46.6 (1.9)	11.5 (1.1)	4.4 (0.5)

ตารางที่ 1.4.6 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อครอบครัว ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 5,000 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 - 49,999 บาท	50,000 บาท ขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร	749	1,936,253	2.5 (0.6)	15.0 (1.2)	50.0 (2.2)	22.2 (1.9)	10.3 (1.5)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,230	653,174	1.8 (0.5)	10.5 (3.0)	53.1 (3.4)	26.5 (3.7)	8.1 (1.5)
นนทบุรี	1,048	480,683	4.0 (0.9)	8.5 (1.7)	41.1 (2.6)	28.7 (2.3)	17.8 (2.6)
ปทุมธานี	830	377,231	4.0 (1.3)	12.4 (1.3)	44.6 (2.6)	23.1 (2.3)	15.9 (2.3)
พระนครศรีอยุธยา	1,197	401,274	5.1 (1.2)	14.9 (2.7)	54.3 (3.5)	20.6 (3.9)	5.1 (1.5)
อ่างทอง	1,486	190,714	7.6 (1.5)	27.9 (2.4)	49.3 (2.6)	12.3 (2.7)	2.9 (0.7)
ลพบุรี	1,338	443,450	11.4 (1.8)	39.4 (5.8)	38.4 (5.0)	7.5 (1.2)	3.3 (0.7)
สิงห์บุรี	1,177	113,064	13.1 (2.0)	34.2 (2.8)	38.9 (3.7)	9.3 (1.3)	4.4 (1.1)
ชัยนาท	1,197	175,495	14.9 (3.3)	31.7 (2.5)	43.9 (4.0)	7.4 (2.1)	2.1 (0.7)
สระบุรี	1,275	352,687	6.4 (2.6)	27.6 (3.0)	45.1 (5.3)	14.8 (3.1)	6.0 (1.4)
ชลบุรี	1,335	777,895	4.7 (1.3)	17.3 (3.4)	47.0 (5.8)	20.0 (7.4)	11.0 (1.8)
ระยอง	1,100	293,635	4.2 (1.3)	12.6 (2.9)	32.1 (4.5)	29.5 (3.8)	21.6 (4.4)
จันทบุรี	1,356	301,403	6.3 (1.1)	21.9 (2.2)	52.3 (2.5)	14.1 (1.4)	5.4 (0.9)
ตราด	1,242	109,033	8.5 (1.1)	37.0 (7.8)	41.4 (6.1)	9.0 (2.2)	4.2 (1.0)
ฉะเชิงเทรา	1,280	375,684	9.7 (3.2)	23.1 (5.7)	46.8 (6.5)	14.6 (3.8)	5.7 (1.3)
ปราจีนบุรี	1,537	296,941	7.2 (1.5)	21.1 (3.0)	55.2 (3.2)	12.2 (2.7)	4.2 (0.7)
นครนายก	1,216	172,108	9.4 (2.4)	27.1 (4.1)	47.1 (3.8)	12.3 (3.0)	4.0 (1.0)
สระแก้ว	1,307	324,865	15.1 (4.2)	30.9 (5.6)	37.4 (3.8)	10.9 (2.3)	5.6 (2.3)
ราชบุรี	1,317	471,669	11.3 (3.1)	31.1 (3.6)	43.3 (3.9)	9.5 (1.6)	4.8 (1.3)
กาญจนบุรี	1,105	414,639	10.7 (1.6)	47.7 (6.5)	31.7 (4.2)	7.5 (2.1)	2.4 (1.1)
สุพรรณบุรี	1,390	462,016	10.1 (2.3)	27.8 (4.6)	44.7 (3.9)	12.4 (3.0)	4.9 (0.8)
นครปฐม	1,054	418,644	4.1 (0.9)	19.7 (3.3)	48.3 (3.4)	18.5 (3.6)	9.4 (1.9)
สมุทรสาคร	1,159	214,520	3.2 (1.0)	14.3 (2.0)	57.1 (3.3)	16.9 (1.8)	8.5 (1.7)
สมุทรสงคราม	1,401	126,349	6.0 (1.2)	23.9 (2.9)	50.1 (1.7)	16.8 (3.8)	3.2 (0.6)
เพชรบุรี	1,316	274,271	10.0 (1.8)	34.8 (5.0)	39.4 (2.9)	10.2 (2.4)	5.6 (1.2)
ประจวบคีรีขันธ์	1,092	248,788	11.5 (4.2)	29.8 (3.4)	47.2 (5.1)	7.3 (1.4)	4.3 (0.9)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,411	1,578,372	19.2 (3.4)	36.8 (3.7)	33.3 (3.4)	7.0 (1.7)	3.6 (0.6)
บุรีรัมย์	1,471	983,487	27.4 (3.7)	29.9 (2.7)	33.0 (3.7)	6.4 (1.3)	3.4 (1.1)
สุรินทร์	1,316	826,788	35.9 (10.4)	31.4 (5.4)	26.6 (6.9)	4.1 (1.3)	2.1 (0.5)
ศรีสะเกษ	1,219	902,908	49.7 (6.1)	23.0 (2.3)	22.3 (4.3)	2.9 (1.4)	2.1 (1.6)
อุบลราชธานี	1,424	1,158,535	43.9 (4.4)	34.0 (3.1)	16.4 (2.3)	4.2 (1.3)	1.6 (0.6)
ยโสธร	1,595	395,706	24.3 (4.9)	39.8 (4.6)	28.2 (3.7)	5.2 (0.9)	2.5 (0.6)
ชัยภูมิ	1,543	766,279	29.2 (3.6)	39.7 (2.1)	22.3 (2.8)	5.1 (0.9)	3.6 (1.2)
อำนาจเจริญ	1,439	238,093	35.5 (4.1)	30.6 (2.6)	27.9 (4.1)	3.9 (1.1)	2.2 (0.8)
หนองบัวลำภู	1,576	350,281	28.5 (3.5)	34.7 (2.2)	30.9 (4.2)	3.7 (0.6)	2.2 (1.0)
ขอนแก่น	1,275	1,143,503	16.3 (4.5)	30.2 (7.1)	27.7 (2.9)	11.4 (4.3)	14.4 (7.2)
อุดรธานี	1,415	902,829	19.0 (5.1)	24.7 (2.4)	44.1 (4.5)	7.7 (1.2)	4.5 (0.9)
เลย	1,374	409,012	22.2 (3.0)	36.8 (5.1)	31.5 (3.7)	5.8 (1.7)	3.7 (1.1)
หนองคาย	1,399	564,073	15.5 (2.8)	32.2 (3.5)	40.2 (4.4)	8.4 (1.7)	3.7 (0.8)

ตารางที่ 1.4.6 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ต่ำกว่า 5,000 บาท	5,000 - 9,999 บาท	10,000 - 24,999 บาท	25,000 - 49,999 บาท	50,000 บาทขึ้นไป
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>							
มหาสารคาม	1,568	693,894	17.9 (4.9)	32.9 (4.5)	35.5 (3.8)	10.6 (4.7)	3.1 (0.7)
ร้อยเอ็ด	1,372	833,044	18.4 (6.2)	23.9 (4.8)	41.4 (7.7)	12.8 (3.9)	3.5 (1.7)
กาฬสินธุ์	1,378	628,237	25.1 (4.4)	44.1 (3.2)	25.4 (3.8)	3.0 (0.8)	2.3 (0.7)
สกลนคร	1,261	624,988	45.0 (7.3)	32.4 (5.7)	17.0 (2.6)	3.5 (0.8)	2.1 (0.7)
นครพนม	1,331	402,263	36.9 (4.8)	29.2 (4.4)	24.3 (2.6)	6.0 (1.3)	3.6 (0.8)
มุกดาหาร	1,549	221,474	39.3 (6.6)	28.1 (3.2)	25.2 (4.3)	5.4 (1.3)	2.0 (0.9)
<b>ภาคเหนือ</b>							
เชียงใหม่	1,269	837,180	19.9 (2.5)	35.8 (2.8)	30.0 (2.6)	10.3 (2.4)	4.0 (0.9)
ลำพูน	1,362	270,816	10.4 (2.1)	27.4 (2.3)	48.5 (3.7)	10.8 (2.3)	3.0 (0.7)
ลำปาง	1,540	550,382	22.9 (3.8)	32.7 (2.7)	32.3 (4.3)	7.9 (1.4)	4.2 (0.9)
อุตรดิตถ์	1,180	263,325	25.1 (3.1)	34.7 (2.8)	26.7 (2.3)	9.8 (1.8)	3.7 (0.9)
แพร่	1,400	296,203	15.3 (2.2)	30.8 (3.2)	37.5 (3.2)	10.9 (1.3)	5.6 (1.1)
น่าน	1,595	351,496	27.3 (5.1)	32.3 (1.8)	30.0 (3.6)	7.0 (1.5)	3.4 (1.0)
พะเยา	1,461	334,115	31.6 (4.1)	31.0 (2.2)	28.8 (3.3)	6.4 (1.2)	2.3 (0.5)
เชียงราย	1,416	758,379	21.6 (4.0)	39.2 (3.8)	31.0 (3.5)	5.8 (1.2)	2.4 (0.7)
แม่ฮ่องสอน	1,249	105,303	41.8 (7.8)	25.4 (3.9)	19.1 (3.6)	9.2 (1.9)	4.5 (0.9)
นครสวรรค์	1,286	627,734	14.4 (2.2)	29.9 (4.6)	45.9 (6.0)	6.4 (1.1)	3.4 (1.3)
อุทัยธานี	1,042	131,810	29.4 (4.7)	36.9 (5.7)	26.0 (6.2)	4.6 (1.2)	3.2 (0.8)
กำแพงเพชร	1,331	433,668	20.2 (3.1)	43.6 (4.4)	29.6 (4.1)	3.8 (0.6)	2.8 (0.5)
ตาก	1,429	296,768	23.1 (3.8)	41.8 (5.9)	27.3 (2.9)	5.7 (1.3)	2.1 (0.4)
สุโขทัย	1,574	451,389	28.6 (4.5)	39.0 (3.0)	26.7 (3.8)	3.8 (1.2)	1.9 (0.6)
พิษณุโลก	1,394	558,946	32.5 (3.9)	34.4 (4.0)	23.7 (3.7)	7.1 (1.8)	2.3 (0.6)
พิจิตร	1,097	294,114	22.9 (2.1)	35.5 (2.3)	30.8 (1.9)	6.5 (1.2)	4.3 (1.1)
เพชรบูรณ์	1,253	596,464	18.6 (4.7)	32.2 (3.0)	40.0 (5.9)	7.0 (1.4)	2.2 (0.6)
<b>ภาคใต้</b>							
นครศรีธรรมราช	1,248	904,714	12.3 (4.8)	19.7 (2.9)	49.8 (5.0)	13.6 (4.2)	4.6 (1.0)
กระบี่	1,556	288,628	4.4 (1.3)	16.7 (2.8)	56.0 (3.6)	16.4 (1.9)	6.6 (1.5)
พังงา	1,302	156,723	6.6 (2.6)	27.6 (4.8)	50.0 (5.8)	12.4 (1.9)	3.4 (0.7)
ภูเก็ต	1,134	162,184	2.2 (0.6)	7.3 (1.5)	46.7 (3.7)	37.3 (4.6)	6.5 (1.9)
สุราษฎร์ธานี	1,434	639,575	4.4 (1.1)	13.0 (1.8)	51.5 (3.6)	22.1 (2.9)	9.0 (1.7)
ระนอง	1,158	82,022	7.1 (1.2)	24.8 (3.1)	41.2 (3.6)	16.8 (3.7)	10.1 (4.3)
ชุมพร	1,395	310,456	4.7 (1.5)	19.9 (5.1)	55.2 (4.6)	16.6 (2.5)	3.6 (0.8)
สงขลา	1,232	746,299	4.0 (0.7)	18.6 (3.2)	52.4 (4.3)	18.2 (3.3)	6.8 (1.2)
สตูล	1,312	165,886	10.4 (3.1)	27.5 (4.6)	49.8 (5.7)	9.3 (1.9)	2.9 (0.6)
ตรัง	1,503	402,222	4.6 (1.2)	21.2 (3.3)	58.8 (3.7)	12.1 (2.3)	3.3 (0.7)
พัทลุง	1,614	358,958	7.0 (1.6)	26.5 (2.6)	45.4 (1.8)	14.7 (2.7)	6.4 (0.9)
ปัตตานี	1,395	346,823	15.6 (2.0)	45.0 (3.7)	33.6 (4.8)	3.7 (0.9)	2.1 (0.5)
ยะลา	1,386	265,767	8.8 (1.8)	38.9 (3.4)	44.3 (4.4)	5.1 (0.7)	2.9 (0.7)
นราธิวาส	1,579	452,500	9.8 (1.7)	41.9 (4.4)	37.2 (3.6)	7.9 (2.1)	3.1 (1.2)

ตารางที่ 1.5.1 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานะทางการเงินตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ไม่พอใช้	ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออม	มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องประหยัด	มีเงินใช้จ่ายอย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บ
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,581	4,415,696	15.7 (0.9)	72.8 (1.1)	8.1 (0.6)	3.4 (0.4)
25 - 34	10,364	4,547,164	25.5 (1.0)	59.1 (1.1)	11.2 (0.7)	4.2 (0.3)
35 - 44	11,331	5,105,723	32.3 (0.9)	53.8 (1.0)	9.5 (0.7)	4.4 (0.3)
45 - 54	8,610	3,960,106	33.0 (1.2)	50.8 (1.2)	11.1 (0.9)	5.2 (0.4)
55 - 64	14,057	2,466,345	31.2 (0.9)	52.6 (0.9)	10.2 (0.6)	6.0 (0.4)
65 - 74	6,338	1,081,838	23.9 (1.1)	61.1 (1.3)	10.0 (0.8)	5.0 (0.4)
รวม	60,281	21,576,872	27.0 (0.7)	58.5 (0.7)	10.0 (0.4)	4.5 (0.2)
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,916	4,113,473	15.2 (0.8)	71.6 (1.1)	8.7 (0.8)	4.4 (0.4)
25 - 34	9,902	4,448,271	25.1 (0.9)	59.2 (1.0)	10.5 (0.7)	5.2 (0.4)
35 - 44	11,953	5,547,959	32.6 (0.9)	52.7 (1.0)	9.7 (0.6)	5.1 (0.4)
45 - 54	9,492	4,336,947	32.5 (1.0)	54.0 (1.0)	8.9 (0.6)	4.6 (0.5)
55 - 64	13,820	2,787,082	30.7 (0.9)	56.6 (1.0)	8.1 (0.5)	4.6 (0.3)
65 - 74	6,569	1,290,271	21.2 (0.9)	65.7 (1.1)	7.8 (0.6)	5.4 (0.5)
รวม	60,652	22,524,004	27.0 (0.6)	58.9 (0.7)	9.2 (0.5)	4.9 (0.3)
<b>รวม</b>						
15 - 24	18,497	8,529,170	15.4 (0.7)	72.2 (0.9)	8.4 (0.6)	3.9 (0.3)
25 - 34	20,266	8,995,435	25.3 (0.8)	59.1 (0.9)	10.9 (0.6)	4.7 (0.3)
35 - 44	23,284	10,653,682	32.4 (0.8)	53.2 (0.9)	9.6 (0.5)	4.8 (0.3)
45 - 54	18,102	8,297,053	32.7 (1.0)	52.5 (0.9)	9.9 (0.6)	4.9 (0.4)
55 - 64	27,877	5,253,427	30.9 (0.8)	54.7 (0.8)	9.1 (0.4)	5.3 (0.3)
65 - 74	12,907	2,372,109	22.4 (0.8)	63.6 (1.0)	8.8 (0.5)	5.2 (0.4)
รวมทั้งประเทศ	120,933	44,100,876	27.0 (0.6)	58.7 (0.7)	9.6 (0.4)	4.7 (0.2)

ตารางที่ 1.5.2 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานะทางการเงิน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ไม่พอใช้	ต้องใช้จ่าย อย่างประหยัด และอดออม	มีเงินใช้จ่าย อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้อง ประหยัด	มีเงินใช้จ่าย อย่างสบาย และมีเงิน เหลือเก็บ
<b>เขตการปกครอง</b>						
<i>ในเขตเทศบาล</i>	60,347	14,391,300	20.0 (0.6)	61.5 (1.2)	12.8 (0.8)	5.7 (0.3)
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	60,586	29,709,576	30.4 (0.9)	57.4 (0.8)	8.0 (0.5)	4.2 (0.3)
<b>ภาค</b>						
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	1,501	3,803,616	10.2 (1.4)	67.8 (3.9)	17.9 (2.9)	4.1 (0.9)
<i>ภาคกลาง</i>	39,532	10,850,951	21.5 (0.9)	62.7 (1.1)	10.1 (0.7)	5.8 (0.4)
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	30,370	15,200,282	36.9 (1.5)	52.8 (1.2)	7.3 (0.6)	2.9 (0.2)
<i>ภาคเหนือ</i>	26,986	8,260,980	31.7 (1.2)	57.1 (1.2)	6.5 (0.5)	4.8 (0.6)
<i>ภาคใต้</i>	22,544	5,985,046	16.3 (1.0)	62.8 (1.3)	13.4 (1.1)	7.6 (0.6)
<b>เขต สคร.</b>						
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	4,437	1,868,232	15.3 (1.9)	67.1 (3.8)	11.0 (1.8)	6.5 (1.2)
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	8,185	1,577,141	29.4 (2.1)	57.6 (2.1)	7.6 (0.9)	5.5 (0.9)
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	14,174	3,950,083	23.6 (1.4)	60.5 (1.4)	10.3 (0.7)	5.6 (0.6)
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	12,736	3,455,496	18.8 (1.4)	65.0 (1.9)	10.5 (1.6)	5.7 (0.6)
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	6,472	4,664,363	38.6 (2.8)	52.1 (2.6)	6.5 (1.0)	2.9 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	12,780	6,117,674	32.2 (2.5)	55.7 (1.7)	8.6 (1.2)	3.5 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	11,118	4,418,245	41.8 (2.2)	49.6 (2.0)	6.5 (0.9)	2.1 (0.4)
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	6,248	1,824,434	35.6 (2.6)	50.7 (2.2)	8.0 (1.3)	5.7 (1.0)
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	8,007	2,442,873	32.3 (2.2)	56.3 (1.8)	6.6 (0.9)	4.8 (0.7)
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	12,731	3,993,673	29.5 (1.7)	60.5 (1.9)	5.7 (0.6)	4.4 (1.2)
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	11,081	2,890,388	18.0 (2.0)	60.5 (2.1)	14.4 (2.1)	7.1 (0.8)
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	11,463	3,094,659	14.7 (0.8)	64.9 (1.5)	12.4 (1.0)	7.9 (1.0)

ตารางที่ 1.5.3 ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานะทางการเงิน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ไม่พอใช้	ต้องใช้จ่าย อย่างประหยัด และอดออม	มีเงินใช้จ่าย อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้อง ประหยัด	มีเงินใช้จ่าย อย่างสบาย และมีเงิน เหลือเก็บ
กรุงเทพมหานคร	1,501	3,803,616	10.2 (1.4)	67.8 (3.9)	17.9 (2.9)	4.1 (0.9)
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,532	795,715	18.3 (4.9)	64.8 (4.1)	11.9 (2.4)	5.0 (1.5)
นนทบุรี	1,507	727,343	16.7 (2.9)	66.5 (3.6)	11.1 (1.8)	5.7 (1.6)
ปทุมธานี	1,373	604,415	9.8 (2.5)	67.8 (10.0)	12.6 (5.2)	9.8 (3.6)
พระนครศรีอยุธยา	1,557	536,474	19.6 (3.3)	67.4 (4.5)	9.2 (2.3)	3.8 (0.7)
อ่างทอง	1,700	213,960	26.2 (3.2)	62.5 (3.7)	7.2 (1.5)	4.2 (0.9)
ลพบุรี	1,631	537,461	39.0 (4.2)	47.5 (3.8)	6.2 (1.6)	7.3 (1.9)
สิงห์บุรี	1,567	149,735	22.3 (3.1)	62.9 (2.5)	8.8 (1.5)	6.0 (1.8)
ชัยนาท	1,595	227,077	31.8 (4.2)	59.8 (4.0)	5.4 (1.2)	3.0 (1.2)
สระบุรี	1,692	448,909	20.4 (4.1)	64.4 (4.5)	10.1 (2.0)	5.2 (2.0)
ชลบุรี	1,579	885,967	20.2 (2.9)	63.9 (3.7)	9.2 (1.4)	6.8 (1.6)
ระยอง	1,504	398,028	18.3 (1.8)	55.8 (3.1)	17.1 (2.4)	8.8 (1.6)
จันทบุรี	1,616	362,545	31.2 (1.8)	55.2 (2.6)	8.7 (1.3)	4.9 (0.7)
ตราด	1,599	151,216	24.9 (2.5)	58.2 (3.9)	9.1 (2.6)	7.7 (2.5)
ฉะเชิงเทรา	1,615	465,039	22.4 (3.9)	63.0 (4.4)	10.3 (1.8)	4.3 (1.3)
ปราจีนบุรี	1,676	334,679	34.4 (3.2)	55.1 (3.4)	7.6 (1.6)	2.9 (0.7)
นครนายก	1,462	181,429	18.9 (2.4)	62.7 (4.3)	14.4 (4.7)	3.9 (1.4)
สระแก้ว	1,591	375,465	34.7 (3.6)	55.5 (3.4)	4.8 (0.6)	5.0 (2.2)
ราชบุรี	1,604	583,063	19.5 (2.5)	66.4 (3.0)	7.8 (0.8)	6.4 (2.2)
กาญจนบุรี	1,555	528,315	19.5 (3.6)	69.1 (3.8)	9.3 (1.3)	2.2 (0.6)
สุพรรณบุรี	1,617	601,176	24.4 (5.7)	65.5 (6.5)	6.8 (1.6)	3.3 (0.8)
นครปฐม	1,579	611,008	12.6 (2.2)	56.6 (5.9)	20.3 (7.8)	10.5 (1.8)
สมุทรสาคร	1,611	332,393	15.9 (1.9)	66.4 (4.9)	12.1 (2.8)	5.6 (1.4)
สมุทรสงคราม	1,670	143,500	18.2 (3.5)	69.8 (4.0)	7.2 (1.6)	4.9 (0.9)
เพชรบุรี	1,611	329,386	24.1 (2.1)	63.3 (2.5)	6.6 (1.0)	6.0 (1.6)
ประจวบคีรีขันธ์	1,489	326,654	15.4 (2.4)	69.3 (2.5)	9.8 (1.9)	5.5 (1.3)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,575	1,768,238	35.0 (3.7)	52.8 (3.7)	8.7 (2.1)	3.5 (0.9)
บุรีรัมย์	1,655	1,105,852	43.5 (6.1)	44.9 (5.1)	8.0 (2.4)	3.6 (0.9)
สุรินทร์	1,617	965,427	42.2 (8.4)	54.5 (8.0)	2.2 (0.6)	1.1 (0.5)
ศรีสะเกษ	1,559	1,030,671	47.4 (6.5)	45.1 (6.0)	4.4 (1.8)	3.2 (1.3)
อุบลราชธานี	1,570	1,259,599	41.3 (4.1)	48.5 (3.4)	9.2 (1.9)	0.9 (0.3)
ยโสธร	1,672	407,560	54.3 (6.5)	41.6 (6.2)	2.2 (0.6)	1.9 (0.8)
ชัยภูมิ	1,625	824,845	35.4 (3.9)	57.4 (4.1)	4.6 (1.1)	2.5 (0.6)
อำนาจเจริญ	1,619	263,513	44.2 (2.9)	46.0 (2.6)	6.9 (1.2)	2.9 (0.7)
หนองบัวลำภู	1,722	378,870	27.9 (3.0)	53.7 (2.3)	11.9 (1.5)	6.4 (1.1)
ขอนแก่น	1,494	1,227,218	34.3 (5.7)	51.2 (3.5)	10.1 (2.6)	4.5 (1.2)
อุดรธานี	1,574	1,061,601	35.5 (4.5)	57.5 (4.3)	4.1 (1.0)	3.0 (0.6)
เลย	1,583	449,298	38.8 (5.1)	50.9 (4.4)	8.9 (1.9)	1.5 (0.4)
หนองคาย	1,577	630,884	25.0 (3.2)	60.0 (3.3)	11.2 (2.4)	3.9 (0.9)

ตารางที่ 1.5.3 (ต่อ) ร้อยละ (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) ของประชากรอายุ 15 - 74 ปี จำแนกตามสถานะทางการเงิน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ไม่พอใช้	ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออม	มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องประหยัด	มีเงินใช้จ่ายอย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,638	707,939	38.1 (7.9)	53.3 (7.4)	7.2 (1.8)	1.5 (0.3)
ร้อยเอ็ด	1,670	987,511	23.7 (8.8)	60.3 (4.7)	11.6 (5.0)	4.4 (1.5)
กาฬสินธุ์	1,522	674,353	34.0 (4.5)	57.3 (4.4)	5.8 (1.7)	2.8 (0.8)
สกลนคร	1,507	741,117	35.9 (3.8)	53.8 (4.2)	8.0 (2.6)	2.3 (0.6)
นครพนม	1,550	482,591	30.4 (3.3)	62.4 (3.1)	5.7 (1.3)	1.6 (0.4)
มุกดาหาร	1,641	233,195	37.5 (7.5)	54.2 (7.0)	4.8 (1.7)	3.4 (1.4)
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,509	1,067,902	26.0 (3.4)	58.3 (4.8)	7.9 (1.9)	7.8 (4.2)
ลำพูน	1,629	304,333	23.0 (3.9)	65.8 (4.7)	8.0 (2.2)	3.1 (0.8)
ลำปาง	1,647	584,462	30.2 (3.0)	63.1 (2.9)	3.8 (0.8)	2.9 (0.8)
อุตรดิตถ์	1,529	325,135	29.1 (4.3)	58.8 (2.8)	6.3 (1.4)	5.9 (2.3)
แพร่	1,620	350,305	26.3 (4.0)	65.0 (3.9)	5.0 (0.9)	3.6 (1.1)
น่าน	1,636	355,858	34.5 (9.4)	59.7 (9.0)	3.8 (0.9)	2.0 (0.6)
พะเยา	1,563	357,553	43.0 (4.8)	51.4 (4.3)	3.6 (1.1)	2.0 (0.6)
เชียงราย	1,626	839,838	29.1 (4.0)	62.0 (4.2)	4.7 (0.9)	4.2 (1.2)
แม่ฮ่องสอน	1,501	133,422	30.4 (4.7)	59.4 (5.4)	8.2 (2.1)	2.0 (1.2)
นครสวรรค์	1,580	719,782	31.9 (4.2)	52.0 (3.0)	9.4 (1.1)	6.7 (1.6)
อุทัยธานี	1,499	209,359	34.0 (7.0)	49.7 (6.7)	13.2 (9.2)	3.1 (1.3)
กำแพงเพชร	1,565	491,688	33.1 (4.8)	54.1 (5.7)	6.3 (1.6)	6.5 (2.2)
ตาก	1,611	323,103	29.6 (2.3)	63.8 (2.2)	4.3 (0.7)	2.2 (0.6)
สุโขทัย	1,676	462,686	32.3 (3.4)	58.6 (3.8)	5.8 (1.2)	3.4 (1.3)
พิษณุโลก	1,596	618,538	28.9 (4.6)	56.2 (4.4)	9.8 (2.5)	5.1 (0.7)
พิจิตร	1,604	403,606	46.0 (2.8)	44.8 (2.3)	4.8 (0.9)	4.4 (1.0)
เพชรบูรณ์	1,595	713,410	38.0 (5.7)	50.3 (4.0)	5.5 (1.7)	6.2 (2.0)
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,555	1,059,775	17.2 (4.9)	57.2 (4.6)	17.8 (4.9)	7.8 (1.9)
กระบี่	1,637	290,926	16.9 (2.8)	65.0 (3.2)	13.9 (4.9)	4.3 (1.1)
พังงา	1,563	168,821	25.3 (4.9)	64.2 (5.0)	7.2 (1.6)	3.3 (0.9)
ภูเก็ต	1,635	230,821	15.7 (2.3)	63.0 (3.9)	15.9 (3.6)	5.3 (1.2)
สุราษฎร์ธานี	1,603	690,549	16.5 (2.4)	60.5 (3.3)	14.2 (2.6)	8.7 (1.5)
ระนอง	1,495	110,184	22.5 (3.3)	62.2 (2.8)	8.9 (1.0)	6.3 (1.4)
ชุมพร	1,593	339,310	21.1 (2.9)	62.5 (3.1)	8.7 (2.1)	7.7 (1.8)
สงขลา	1,609	916,341	14.8 (1.5)	63.8 (3.4)	14.2 (2.5)	7.2 (1.1)
สตูล	1,589	193,210	15.3 (2.9)	67.0 (4.7)	11.6 (2.6)	6.1 (1.8)
ตรัง	1,653	432,763	19.9 (2.1)	62.1 (2.5)	12.5 (2.0)	5.5 (1.0)
พัทลุง	1,672	367,746	20.3 (3.4)	53.1 (3.1)	10.9 (1.1)	15.7 (5.3)
ปัตตานี	1,662	409,672	10.7 (1.6)	71.5 (4.7)	11.5 (2.1)	6.2 (3.0)
ยะลา	1,612	302,562	12.6 (2.9)	67.8 (3.4)	12.5 (1.8)	7.1 (2.1)
นราธิวาส	1,666	472,365	9.8 (1.7)	70.6 (3.8)	11.2 (2.5)	8.4 (2.0)



**ส่วนที่ 2**

**สถานะสุขภาพทั่วไป**



ตารางที่ 2.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10,095	4,609,885	89.0	0.7	87.8	90.3
25 - 34	9,179	3,989,212	83.3	0.6	82.0	84.5
35 - 44	9,097	4,183,851	77.9	0.7	76.5	79.3
45 - 54	6,211	2,875,664	69.7	1.0	67.7	71.7
55 - 64	8,286	1,491,461	57.7	0.8	56.0	59.3
65 - 74	3,102	552,036	46.8	1.1	44.6	49.1
รวม	45,970	17,702,109	76.2	0.5	75.3	77.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,918	4,099,698	85.9	0.8	84.4	87.4
25 - 34	8,131	3,682,845	78.0	0.7	76.6	79.5
35 - 44	8,693	4,097,098	70.6	0.8	69.1	72.1
45 - 54	6,072	2,828,317	61.9	0.9	60.0	63.7
55 - 64	6,929	1,410,585	48.1	0.8	46.4	49.7
65 - 74	2,609	523,409	37.5	1.1	35.4	39.6
รวม	41,352	16,641,952	68.8	0.5	67.7	69.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	19,013	8,709,583	87.5	0.6	86.4	88.7
25 - 34	17,310	7,672,057	80.7	0.6	79.6	81.8
35 - 44	17,790	8,280,949	74.1	0.6	72.9	75.3
45 - 54	12,283	5,703,981	65.6	0.8	64.0	67.2
55 - 64	15,215	2,902,045	52.6	0.7	51.2	53.9
65 - 74	5,711	1,075,445	41.8	0.8	40.1	43.4
รวมทั้งประเทศ	87,322	34,344,060	72.4	0.5	71.5	73.3

ตารางที่ 2.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	44,304	11,711,326	73.5	0.7	72.2	74.8
นอกเขตเทศบาล	43,018	22,632,735	71.9	0.6	70.7	73.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,313	3,454,037	80.3	1.8	76.7	83.8
ภาคกลาง	28,750	8,466,421	71.8	0.8	70.2	73.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,587	11,642,602	72.0	0.9	70.3	73.8
ภาคเหนือ	19,396	6,184,117	69.9	0.9	68.2	71.7
ภาคใต้	16,276	4,596,884	72.8	1.0	70.8	74.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,590	1,582,843	74.3	1.6	71.2	77.3
เขต สคร. ที่ 2	5,846	1,193,905	71.5	2.2	67.2	75.9
เขต สคร. ที่ 3	10,067	2,960,945	69.5	1.6	66.4	72.7
เขต สคร. ที่ 4	9,247	2,728,728	73.1	1.4	70.4	75.8
เขต สคร. ที่ 5	4,382	3,412,035	68.8	1.9	65.0	72.6
เขต สคร. ที่ 6	9,401	4,838,141	74.5	1.3	71.8	77.1
เขต สคร. ที่ 7	7,804	3,392,426	72.1	1.2	69.7	74.4
เขต สคร. ที่ 8	4,331	1,340,277	67.0	1.7	63.8	70.3
เขต สคร. ที่ 9	5,283	1,700,391	66.2	2.0	62.4	70.1
เขต สคร. ที่ 10	9,782	3,143,449	73.5	1.2	71.1	75.8
เขต สคร. ที่ 11	8,141	2,227,938	72.8	1.7	69.5	76.2
เขต สคร. ที่ 12	8,135	2,368,945	72.7	1.0	70.7	74.7

ตารางที่ 2.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,313	3,454,037	80.3	1.8	76.7	83.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,163	647,865	74.1	3.2	67.8	80.5
นนทบุรี	1,179	615,297	74.4	2.4	69.7	79.1
ปทุมธานี	1,201	527,985	73.6	2.7	68.3	78.8
พระนครศรีอยุธยา	1,210	439,561	74.9	3.1	68.8	80.9
อ่างทอง	1,213	158,003	72.5	2.6	67.4	77.6
ลพบุรี	1,115	395,292	69.4	5.4	58.9	79.9
สิงห์บุรี	1,179	117,103	71.1	3.6	64.1	78.2
ชัยนาท	1,126	184,245	71.5	4.9	61.9	81.0
สระบุรี	1,213	339,261	73.9	3.1	67.7	80.0
ชลบุรี	1,027	637,372	66.8	4.4	58.1	75.4
ระยอง	1,195	348,926	78.0	2.3	73.5	82.5
จันทบุรี	1,017	248,841	64.3	2.4	59.6	69.0
ตราด	1,152	116,621	73.0	5.7	61.8	84.1
ฉะเชิงเทรา	1,160	362,587	72.4	4.4	63.7	81.0
ปราจีนบุรี	1,029	201,175	58.2	5.1	48.3	68.2
นครนายก	1,228	142,566	74.3	2.6	69.2	79.3
สระแก้ว	1,096	254,991	64.1	7.0	50.4	77.9
ราชบุรี	1,151	443,086	71.0	2.9	65.3	76.7
กาญจนบุรี	1,077	390,996	67.4	3.8	59.9	74.8
สุพรรณบุรี	1,136	468,807	72.5	3.7	65.3	79.7
นครปฐม	1,263	518,242	79.9	4.1	71.9	87.9
สมุทรสาคร	1,208	282,954	78.6	3.7	71.3	85.8
สมุทรสงคราม	1,085	107,898	72.2	3.5	65.3	79.1
เพชรบุรี	1,076	232,107	66.3	2.6	61.2	71.4
ประจวบคีรีขันธ์	1,251	284,638	76.0	3.4	69.4	82.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,084	1,300,524	67.0	3.2	60.7	73.3
บุรีรัมย์	1,135	835,776	72.9	3.3	66.4	79.4
สุรินทร์	1,122	721,255	70.8	3.4	64.1	77.6
ศรีสะเกษ	1,047	775,677	71.8	2.6	66.7	76.9
อุบลราชธานี	1,176	974,545	73.9	2.1	69.8	78.0
ยโสธร	1,275	326,041	78.0	3.9	70.3	85.7
ชัยภูมิ	1,041	554,480	64.9	5.6	53.9	76.0
อำนาจเจริญ	969	175,398	62.7	1.9	59.0	66.5
หนองบัวลำภู	1,085	262,609	69.1	2.3	64.5	73.7
ขอนแก่น	1,216	960,708	70.6	3.8	63.2	77.9
อุดรธานี	1,161	878,310	76.1	3.1	70.0	82.2
เลย	1,180	327,871	69.9	4.8	60.5	79.3
หนองคาย	1,109	466,686	71.2	3.4	64.5	77.8

ตารางที่ 2.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	1,249	602,401	82.6	2.9	76.9 - 88.4
ร้อยเอ็ด	1,238	811,196	80.2	2.3	75.6 - 84.8
กาฬสินธุ์	1,163	528,362	71.8	2.7	66.6 - 77.0
สกลนคร	1,096	612,626	73.3	3.7	66.0 - 80.7
นครพนม	986	335,672	64.3	3.4	57.6 - 71.1
มุกดาหาร	1,255	192,467	76.2	3.0	70.3 - 82.2
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	1,128	826,539	69.0	2.7	63.6 - 74.4
ลำพูน	1,336	260,784	81.3	3.1	75.2 - 87.5
ลำปาง	1,178	437,261	71.9	2.0	68.0 - 75.9
อุตรดิตถ์	1,150	256,020	71.4	3.8	64.0 - 78.9
แพร่	1,361	300,668	80.7	3.3	74.3 - 87.2
น่าน	1,196	277,554	75.2	4.2	67.0 - 83.3
พะเยา	1,229	293,049	75.3	2.9	69.6 - 81.1
เชียงราย	1,183	634,042	72.3	2.9	66.7 - 77.9
แม่ฮ่องสอน	1,171	113,551	78.5	2.2	74.2 - 82.8
นครสวรรค์	1,115	537,696	67.8	2.3	63.2 - 72.3
อุทัยธานี	1,101	167,900	68.1	7.1	54.2 - 82.1
กำแพงเพชร	982	337,074	62.7	3.9	55.1 - 70.3
ตาก	1,073	225,234	65.5	5.9	54.0 - 77.1
สุโขทัย	1,041	296,264	63.4	2.8	58.0 - 68.8
พิษณุโลก	1,029	434,791	67.1	4.2	58.8 - 75.4
พิจิตร	1,133	297,606	70.6	1.9	66.9 - 74.3
เพชรบูรณ์	990	488,081	65.0	4.2	56.9 - 73.2
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	1,146	824,255	73.8	3.6	66.7 - 80.8
กระบี่	1,206	235,548	77.6	3.1	71.4 - 83.7
พังงา	1,154	133,724	72.2	3.0	66.2 - 78.1
ภูเก็ต	1,287	192,612	79.1	2.9	73.4 - 84.7
สุราษฎร์ธานี	1,039	487,485	67.1	3.7	59.9 - 74.4
ระนอง	1,106	85,215	70.6	2.4	65.8 - 75.4
ชุมพร	1,203	269,100	74.5	4.3	66.1 - 82.8
สงขลา	1,216	727,471	75.0	1.8	71.5 - 78.5
สตูล	1,087	138,047	66.6	3.4	59.9 - 73.4
ตรัง	1,106	322,599	71.2	2.5	66.2 - 76.2
พัทลุง	1,101	259,025	68.1	1.5	65.2 - 71.0
ปัตตานี	1,152	321,670	74.6	3.0	68.6 - 80.6
ยะลา	1,236	244,486	75.3	2.1	71.1 - 79.6
นราธิวาส	1,237	355,647	72.3	4.1	64.2 - 80.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 2.2.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,865	0.5	0.0	0.4	0.6
25 - 34	10,597	0.6	0.1	0.5	0.8
35 - 44	11,551	0.7	0.0	0.6	0.8
45 - 54	8,728	0.9	0.1	0.8	1.1
55 - 64	14,127	1.3	0.1	1.2	1.4
65 - 74	6,403	1.6	0.1	1.4	1.8
รวม	62,271	0.8	0.0	0.8	0.9
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,992	0.7	0.0	0.6	0.8
25 - 34	10,128	0.8	0.0	0.7	0.9
35 - 44	12,117	1.1	0.1	0.9	1.2
45 - 54	9,624	1.2	0.1	1.1	1.3
55 - 64	13,881	1.8	0.1	1.6	1.9
65 - 74	6,711	2.0	0.1	1.8	2.2
รวม	62,453	1.1	0.0	1.0	1.2
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,857	0.6	0.0	0.5	0.7
25 - 34	20,725	0.7	0.0	0.6	0.8
35 - 44	23,668	0.9	0.0	0.8	1.0
45 - 54	18,352	1.1	0.1	1.0	1.2
55 - 64	28,008	1.6	0.1	1.4	1.7
65 - 74	13,114	1.8	0.1	1.7	1.9
รวมทั้งประเทศ	124,724	1.0	0.0	0.9	1.0

ตารางที่ 2.2.2 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	62,951	0.8	0.0	0.8	0.9
นอกเขตเทศบาล	61,773	1.0	0.0	0.9	1.1
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,624	0.5	0.1	0.2	0.8
ภาคกลาง	41,202	0.9	0.0	0.9	1.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,116	0.9	0.0	0.9	1.0
ภาคเหนือ	27,672	1.2	0.1	1.0	1.3
ภาคใต้	23,110	1.1	0.1	1.0	1.2
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,884	0.9	0.1	0.7	1.2
เขต สคร. ที่ 2	8,358	0.9	0.1	0.7	1.0
เขต สคร. ที่ 3	14,833	1.0	0.1	0.8	1.1
เขต สคร. ที่ 4	13,127	0.9	0.1	0.8	1.1
เขต สคร. ที่ 5	6,573	1.0	0.1	0.8	1.1
เขต สคร. ที่ 6	13,208	0.9	0.1	0.8	1.0
เขต สคร. ที่ 7	11,335	0.9	0.1	0.8	1.1
เขต สคร. ที่ 8	6,391	1.2	0.1	0.9	1.4
เขต สคร. ที่ 9	8,170	1.1	0.1	0.9	1.2
เขต สคร. ที่ 10	13,111	1.2	0.2	0.9	1.5
เขต สคร. ที่ 11	11,554	1.2	0.1	1.0	1.4
เขต สคร. ที่ 12	11,556	1.0	0.1	0.9	1.1



ตารางที่ 2.2.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,624	0.5	0.1	0.2	0.8
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,641	0.8	0.2	0.4	1.1
นนทบุรี	1,675	0.9	0.2	0.5	1.2
ปทุมธานี	1,553	1.1	0.2	0.7	1.5
พระนครศรีอยุธยา	1,656	0.9	0.1	0.7	1.1
อ่างทอง	1,729	0.6	0.1	0.4	0.8
ลพบุรี	1,652	1.2	0.2	0.8	1.6
สิงห์บุรี	1,612	0.9	0.1	0.6	1.1
ชัยนาท	1,619	0.9	0.2	0.6	1.3
สระบุรี	1,746	0.7	0.1	0.5	0.9
ชลบุรี	1,618	0.9	0.1	0.7	1.1
ระยอง	1,640	0.9	0.1	0.7	1.2
จันทบุรี	1,676	1.6	0.1	1.3	1.8
ตราด	1,677	1.0	0.2	0.6	1.3
ฉะเชิงเทรา	1,688	0.8	0.1	0.6	1.1
ปราจีนบุรี	1,713	0.9	0.1	0.7	1.2
นครนายก	1,582	0.7	0.2	0.4	1.0
สระแก้ว	1,598	1.3	0.3	0.7	1.8
ราชบุรี	1,672	1.1	0.2	0.7	1.5
กาญจนบุรี	1,642	0.8	0.2	0.4	1.1
สุพรรณบุรี	1,711	0.7	0.2	0.4	1.1
นครปฐม	1,558	0.9	0.3	0.3	1.5
สมุทรสาคร	1,636	1.1	0.1	0.8	1.3
สมุทรสงคราม	1,699	1.1	0.2	0.8	1.5
เพชรบุรี	1,590	1.2	0.2	0.9	1.6
ประจวบคีรีขันธ์	1,619	0.6	0.1	0.5	0.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,609	1.0	0.1	0.7	1.3
บุรีรัมย์	1,673	0.6	0.1	0.4	0.9
สุรินทร์	1,634	1.3	0.2	0.9	1.6
ศรีสะเกษ	1,591	1.0	0.2	0.6	1.3
อุบลราชธานี	1,621	0.9	0.1	0.7	1.1
ยโสธร	1,706	0.6	0.1	0.4	0.8
ชัยภูมิ	1,657	1.1	0.2	0.8	1.5
อำนาจเจริญ	1,606	1.6	0.2	1.2	2.0
หนองบัวลำภู	1,727	1.3	0.2	1.0	1.6
ขอนแก่น	1,664	0.8	0.1	0.5	1.1
อุดรธานี	1,622	1.0	0.2	0.6	1.3
เลย	1,628	1.2	0.2	0.8	1.5
หนองคาย	1,630	0.7	0.1	0.5	1.0

ตารางที่ 2.2.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>				
มหาสารคาม	1,706	0.9	0.2	0.5 - 1.2
ร้อยเอ็ด	1,669	0.9	0.1	0.6 - 1.1
กาฬสินธุ์	1,562	0.8	0.2	0.4 - 1.1
สกลนคร	1,544	0.7	0.1	0.5 - 1.0
นครพนม	1,614	1.3	0.3	0.7 - 1.9
มุกดาหาร	1,653	0.8	0.2	0.5 - 1.1
<b>ภาคเหนือ</b>				
เชียงใหม่	1,607	1.8	0.5	0.7 - 2.8
ลำพูน	1,653	0.7	0.1	0.5 - 0.9
ลำปาง	1,676	0.9	0.1	0.6 - 1.1
อุตรดิตถ์	1,637	0.8	0.1	0.6 - 1.1
แพร่	1,697	0.8	0.2	0.5 - 1.1
น่าน	1,687	1.2	0.2	0.8 - 1.6
พะเยา	1,620	1.0	0.2	0.7 - 1.3
เชียงราย	1,628	1.3	0.1	1.0 - 1.6
แม่ฮ่องสอน	1,543	1.1	0.2	0.8 - 1.5
นครสวรรค์	1,627	1.3	0.3	0.8 - 1.8
อุทัยธานี	1,593	1.2	0.2	0.8 - 1.6
กำแพงเพชร	1,564	1.1	0.1	0.8 - 1.4
ตาก	1,639	1.4	0.3	0.8 - 1.9
สุโขทัย	1,671	1.2	0.2	0.8 - 1.5
พิษณุโลก	1,611	1.0	0.2	0.7 - 1.3
พิจิตร	1,607	1.1	0.2	0.7 - 1.5
เพชรบูรณ์	1,612	1.0	0.2	0.6 - 1.4
<b>ภาคใต้</b>				
นครศรีธรรมราช	1,626	1.0	0.2	0.6 - 1.5
กระบี่	1,681	0.9	0.2	0.6 - 1.3
พังงา	1,684	0.9	0.1	0.6 - 1.1
ภูเก็ต	1,667	0.8	0.1	0.5 - 1.1
สุราษฎร์ธานี	1,632	1.6	0.3	1.1 - 2.2
ระนอง	1,647	1.1	0.2	0.6 - 1.6
ชุมพร	1,617	1.3	0.2	0.9 - 1.7
สงขลา	1,615	0.9	0.1	0.7 - 1.2
สตูล	1,619	1.0	0.1	0.7 - 1.3
ตรัง	1,668	1.1	0.2	0.7 - 1.6
พัทลุง	1,698	1.4	0.1	1.2 - 1.6
ปัตตานี	1,660	1.1	0.1	0.8 - 1.3
ยะลา	1,615	0.8	0.2	0.5 - 1.2
นราธิวาส	1,681	0.9	0.2	0.5 - 1.3

ตารางที่ 2.2.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>ชาย</b>							
15 - 24	10,865	4,962,832	87.0 (0.6)	6.6 (0.4)	5.2 (0.4)	1.0 (0.2)	0.3 (0.1)
25 - 34	10,597	4,621,495	85.6 (0.6)	7.1 (0.4)	5.7 (0.4)	0.9 (0.2)	0.5 (0.2)
35 - 44	11,551	5,174,773	83.0 (0.7)	8.3 (0.4)	7.0 (0.4)	1.2 (0.1)	0.4 (0.1)
45 - 54	8,728	3,975,564	80.3 (0.8)	9.7 (0.6)	7.6 (0.5)	1.7 (0.2)	0.8 (0.2)
55 - 64	14,127	2,463,747	74.7 (0.7)	12.0 (0.5)	9.3 (0.4)	2.7 (0.2)	1.3 (0.2)
65 - 74	6,403	1,111,594	69.8 (1.0)	14.2 (0.8)	11.0 (0.7)	3.6 (0.3)	1.5 (0.2)
รวม	62,271	22,310,005	82.4 (0.4)	8.6 (0.3)	6.9 (0.3)	1.5 (0.1)	0.6 (0.1)
<b>หญิง</b>							
15 - 24	9,992	4,610,715	83.2 (0.7)	7.7 (0.4)	7.4 (0.4)	1.6 (0.2)	0.1 (0.0)
25 - 34	10,128	4,550,759	79.8 (0.7)	9.4 (0.5)	8.8 (0.5)	1.7 (0.2)	0.2 (0.1)
35 - 44	12,117	5,606,098	77.0 (0.7)	11.0 (0.5)	9.5 (0.5)	1.6 (0.2)	0.9 (0.1)
45 - 54	9,624	4,399,024	73.5 (0.9)	13.2 (0.6)	10.1 (0.6)	2.3 (0.2)	0.9 (0.2)
55 - 64	13,881	2,802,977	67.0 (0.7)	15.1 (0.6)	12.6 (0.5)	3.6 (0.2)	1.7 (0.2)
65 - 74	6,711	1,331,638	63.9 (1.1)	15.8 (0.7)	14.5 (0.8)	4.0 (0.3)	1.9 (0.2)
รวม	62,453	23,301,210	76.2 (0.5)	11.2 (0.3)	9.7 (0.3)	2.1 (0.1)	0.8 (0.1)
<b>ชายและหญิง</b>							
15 - 24	20,857	9,573,547	85.2 (0.5)	7.1 (0.3)	6.3 (0.3)	1.3 (0.2)	0.2 (0.1)
25 - 34	20,725	9,172,253	82.7 (0.6)	8.3 (0.4)	7.3 (0.4)	1.3 (0.2)	0.4 (0.1)
35 - 44	23,668	10,780,870	79.9 (0.6)	9.7 (0.3)	8.3 (0.4)	1.4 (0.1)	0.7 (0.1)
45 - 54	18,352	8,374,588	76.7 (0.7)	11.5 (0.5)	8.9 (0.5)	2.0 (0.2)	0.9 (0.1)
55 - 64	28,008	5,266,725	70.6 (0.6)	13.7 (0.4)	11.1 (0.4)	3.2 (0.2)	1.5 (0.1)
65 - 74	13,114	2,443,231	66.6 (0.8)	15.0 (0.6)	12.9 (0.6)	3.8 (0.2)	1.7 (0.2)
รวมทั้งประเทศ	124,724	45,611,214	79.2 (0.4)	9.9 (0.3)	8.3 (0.3)	1.8 (0.1)	0.7 (0.0)

ตารางที่ 2.2.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวันที่เจ็บป่วย				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	62,951	15,241,377	83.0 (0.6)	8.0 (0.3)	6.5 (0.3)	1.7 (0.1)	0.8 (0.1)
นอกเขตเทศบาล	61,773	30,369,837	77.3 (0.6)	10.9 (0.3)	9.3 (0.4)	1.9 (0.1)	0.7 (0.1)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	1,624	4,112,942	91.1 (1.9)	4.1 (0.8)	3.4 (0.9)	0.7 (0.2)	0.7 (0.3)
ภาคกลาง	41,202	11,404,059	79.2 (0.7)	10.4 (0.5)	7.9 (0.4)	1.8 (0.2)	0.7 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,116	15,576,902	78.5 (0.7)	10.8 (0.5)	8.5 (0.5)	1.5 (0.1)	0.7 (0.1)
ภาคเหนือ	27,672	8,425,315	76.2 (1.0)	10.5 (0.4)	10.1 (0.8)	2.4 (0.4)	0.8 (0.1)
ภาคใต้	23,110	6,091,997	77.1 (1.0)	10.1 (0.7)	9.7 (0.5)	2.4 (0.3)	0.7 (0.1)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	4,884	2,035,609	78.9 (2.1)	10.8 (1.5)	7.5 (0.9)	2.3 (0.5)	0.7 (0.3)
เขต สคร. ที่ 2	8,358	1,630,060	79.4 (1.7)	11.1 (1.5)	7.1 (0.7)	1.6 (0.3)	0.6 (0.2)
เขต สคร. ที่ 3	14,833	4,140,096	77.8 (1.1)	11.2 (0.7)	8.4 (0.7)	1.9 (0.3)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 4	13,127	3,598,294	80.7 (1.2)	9.0 (0.6)	7.9 (0.7)	1.6 (0.2)	0.6 (0.1)
เขต สคร. ที่ 5	6,573	4,770,648	77.9 (1.5)	10.1 (1.0)	9.8 (1.1)	1.5 (0.2)	0.8 (0.1)
เขต สคร. ที่ 6	13,208	6,287,985	78.3 (1.1)	11.7 (0.8)	8.1 (0.8)	1.3 (0.1)	0.8 (0.2)
เขต สคร. ที่ 7	11,335	4,518,269	79.4 (1.0)	10.4 (0.7)	7.8 (0.6)	1.7 (0.2)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 8	6,391	1,817,485	76.9 (1.4)	10.1 (0.7)	10.0 (0.8)	2.3 (0.6)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 9	8,170	2,482,718	78.0 (1.3)	10.1 (0.7)	9.1 (0.8)	2.0 (0.3)	0.8 (0.2)
เขต สคร. ที่ 10	13,111	4,125,112	74.9 (1.7)	10.9 (0.6)	10.7 (1.5)	2.8 (0.7)	0.8 (0.1)
เขต สคร. ที่ 11	11,554	2,967,854	75.6 (1.9)	11.6 (1.3)	9.4 (0.9)	2.6 (0.5)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 12	11,556	3,124,143	78.6 (1.0)	8.6 (0.5)	9.9 (0.6)	2.3 (0.2)	0.8 (0.2)

ตารางที่ 2.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา  
จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
กรุงเทพมหานคร	1,624	4,112,942	91.1 (1.9)	4.1 (0.8)	3.4 (0.9)	0.7 (0.2)	0.7 (0.3)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,641	851,284	79.2 (3.0)	11.8 (2.0)	7.1 (1.8)	1.4 (1.0)	0.5 (0.2)
นนทบุรี	1,675	809,911	83.3 (2.8)	7.8 (1.7)	6.1 (1.1)	2.0 (0.6)	0.7 (0.3)
ปทุมธานี	1,553	655,412	77.1 (2.9)	9.1 (1.2)	10.1 (1.4)	3.4 (1.1)	0.4 (0.2)
พระนครศรีอยุธยา	1,656	570,286	74.6 (4.9)	16.9 (4.0)	6.4 (1.4)	1.3 (0.4)	0.7 (0.2)
อ่างทอง	1,729	217,347	83.7 (2.6)	9.1 (1.7)	6.1 (1.4)	0.9 (0.3)	0.3 (0.1)
ลพบุรี	1,652	553,424	78.8 (2.3)	9.3 (1.0)	7.9 (1.4)	2.8 (0.7)	1.3 (0.3)
สิงห์บุรี	1,612	154,936	79.8 (3.1)	8.9 (1.8)	9.2 (1.7)	1.5 (0.4)	0.5 (0.1)
ชัยนาท	1,619	247,181	80.1 (2.2)	10.8 (1.8)	6.9 (1.7)	1.3 (0.4)	0.9 (0.4)
สระบุรี	1,746	457,173	77.6 (5.0)	15.2 (4.9)	6.0 (1.1)	0.8 (0.2)	0.3 (0.1)
ชลบุรี	1,618	914,126	80.9 (2.4)	10.3 (1.5)	6.1 (1.3)	1.8 (0.6)	0.9 (0.2)
ระยอง	1,640	435,319	74.4 (1.9)	13.0 (1.3)	10.4 (1.2)	1.8 (0.4)	0.3 (0.1)
จันทบุรี	1,676	377,867	72.9 (1.5)	10.8 (0.9)	11.9 (1.0)	3.2 (0.5)	1.3 (0.3)
ตราด	1,677	156,304	80.0 (2.6)	10.0 (2.0)	7.4 (1.2)	1.6 (0.4)	0.9 (0.3)
ฉะเชิงเทรา	1,688	493,815	80.3 (3.0)	10.5 (2.5)	6.7 (1.5)	2.0 (0.5)	0.5 (0.2)
ปราจีนบุรี	1,713	343,892	74.4 (3.1)	13.9 (2.1)	10.1 (1.3)	1.1 (0.5)	0.5 (0.2)
นครนายก	1,582	188,021	83.9 (2.2)	8.8 (1.0)	5.0 (1.1)	1.9 (0.5)	0.4 (0.2)
สระแก้ว	1,598	379,469	72.3 (5.7)	10.6 (2.4)	13.4 (5.0)	3.0 (0.7)	0.6 (0.3)
ราชบุรี	1,672	608,621	81.5 (2.7)	8.8 (1.4)	6.9 (1.4)	1.5 (0.4)	1.4 (0.4)
กาญจนบุรี	1,642	561,037	83.9 (2.9)	7.7 (1.7)	6.5 (1.3)	1.2 (0.4)	0.7 (0.4)
สุพรรณบุรี	1,711	641,446	83.4 (3.1)	7.9 (1.5)	6.8 (1.6)	1.5 (0.3)	0.5 (0.2)
นครปฐม	1,558	618,039	79.6 (4.0)	9.9 (1.5)	8.1 (2.6)	1.6 (0.5)	0.8 (0.6)
สมุทรสาคร	1,636	342,798	76.0 (2.6)	8.0 (1.9)	13.2 (2.7)	2.3 (0.5)	0.4 (0.1)
สมุทรสงคราม	1,699	144,278	71.1 (5.3)	13.5 (2.1)	12.8 (2.9)	2.0 (0.6)	0.6 (0.2)
เพชรบุรี	1,590	333,166	77.1 (2.1)	11.0 (1.5)	8.7 (0.9)	1.8 (0.3)	1.3 (0.4)
ประจวบคีรีขันธ์	1,619	348,909	83.0 (3.0)	9.3 (2.0)	5.9 (1.3)	1.3 (0.3)	0.4 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,609	1,859,656	79.2 (2.5)	9.7 (2.2)	8.3 (1.3)	1.8 (0.5)	0.9 (0.3)
บุรีรัมย์	1,673	1,123,342	83.0 (2.2)	8.8 (1.1)	7.0 (1.7)	0.7 (0.2)	0.4 (0.2)
สุรินทร์	1,634	978,465	68.3 (4.0)	13.3 (1.5)	16.3 (3.8)	1.4 (0.3)	0.6 (0.6)
ศรีสะเกษ	1,591	1,047,674	81.6 (2.7)	8.6 (1.7)	6.8 (1.2)	2.2 (0.5)	0.8 (0.3)
อุบลราชธานี	1,621	1,293,642	77.5 (1.5)	12.9 (1.7)	8.0 (1.3)	0.8 (0.3)	0.7 (0.3)
ยโสธร	1,706	416,152	75.0 (3.5)	17.3 (2.7)	7.2 (1.3)	0.5 (0.2)	0.1 (0.1)
ชัยภูมิ	1,657	809,184	79.2 (2.7)	8.6 (1.4)	9.2 (1.6)	2.0 (0.6)	0.9 (0.4)
อำนาจเจริญ	1,606	262,526	71.9 (2.0)	11.6 (1.5)	11.7 (1.8)	2.9 (0.8)	1.7 (0.4)
หนองบัวลำภู	1,727	380,167	71.3 (1.7)	14.6 (1.7)	11.2 (1.6)	2.1 (0.4)	0.8 (0.2)
ขอนแก่น	1,664	1,320,374	80.1 (2.6)	11.4 (1.4)	6.9 (1.4)	1.3 (0.4)	0.4 (0.2)
อุดรธานี	1,622	1,095,847	74.8 (2.5)	13.2 (2.6)	10.1 (2.9)	1.1 (0.3)	0.7 (0.4)
เลย	1,628	445,260	72.7 (4.1)	13.5 (2.0)	11.0 (2.6)	2.0 (0.4)	0.8 (0.3)
หนองคาย	1,630	637,128	82.4 (3.1)	7.7 (1.8)	8.3 (1.4)	1.3 (0.3)	0.3 (0.1)

ตารางที่ 2.2.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>							
มหาสารคาม	1,706	724,918	73.6 (5.6)	16.5 (4.3)	8.5 (3.4)	1.0 (0.2)	0.4 (0.2)
ร้อยเอ็ด	1,669	990,902	83.9 (1.4)	9.2 (1.1)	4.4 (0.7)	1.0 (0.3)	1.5 (0.5)
กาฬสินธุ์	1,562	693,390	81.1 (3.2)	9.3 (1.9)	7.9 (1.9)	1.4 (0.5)	0.4 (0.2)
สกลนคร	1,544	763,021	84.8 (2.0)	6.6 (0.9)	6.3 (1.3)	1.8 (0.5)	0.5 (0.3)
นครพนม	1,614	498,850	76.6 (3.0)	8.9 (1.6)	10.5 (1.8)	3.2 (1.3)	0.8 (0.4)
มุกดาหาร	1,653	236,405	84.4 (2.1)	6.8 (0.8)	6.3 (1.7)	1.8 (0.5)	0.7 (0.3)
<b>ภาคเหนือ</b>							
เชียงใหม่	1,607	1,134,581	69.4 (5.2)	10.6 (1.3)	14.6 (4.5)	4.4 (2.3)	1.0 (0.4)
ลำพูน	1,653	313,189	81.5 (2.6)	10.3 (1.8)	6.2 (0.9)	1.6 (0.5)	0.2 (0.1)
ลำปาง	1,676	594,525	81.8 (1.6)	9.3 (1.1)	6.0 (0.8)	2.2 (0.30)	0.6 (0.2)
อุตรดิตถ์	1,637	342,525	84.1 (1.8)	7.1 (0.9)	6.4 (1.1)	1.3 (0.3)	0.9 (0.3)
แพร่	1,697	365,745	77.8 (3.0)	13.7 (1.9)	6.6 (1.4)	1.4 (0.4)	0.5 (0.2)
น่าน	1,687	367,984	76.4 (2.9)	10.4 (2.5)	9.9 (1.7)	2.5 (1.0)	0.8 (0.3)
พะเยา	1,620	370,885	79.9 (3.4)	10.0 (2.7)	6.8 (0.9)	2.6 (0.6)	0.6 (0.2)
เชียงราย	1,628	840,611	70.4 (3.1)	11.8 (1.0)	14.7 (3.3)	2.5 (0.5)	0.7 (0.2)
แม่ฮ่องสอน	1,543	137,592	78.1 (2.0)	10.8 (1.5)	8.6 (1.5)	1.2 (0.7)	1.3 (0.3)
นครสวรรค์	1,627	689,363	76.7 (1.9)	10.9 (0.9)	8.5 (1.0)	3.2 (1.3)	0.8 (0.4)
อุทัยธานี	1,593	231,065	71.5 (7.5)	12.1 (3.9)	14.2 (4.6)	2.1 (0.8)	0.2 (0.1)
กำแพงเพชร	1,564	489,303	76.0 (2.4)	10.1 (1.3)	11.7 (1.4)	1.4 (0.3)	0.8 (0.3)
ตาก	1,639	326,996	75.3 (3.5)	9.3 (1.2)	11.4 (2.0)	3.0 (0.9)	0.9 (0.3)
สุโขทัย	1,671	463,551	75.1 (2.1)	11.7 (1.3)	10.6 (2.3)	1.5 (0.4)	1.1 (0.3)
พิษณุโลก	1,611	621,118	77.7 (1.5)	11.5 (1.8)	8.2 (1.0)	1.8 (0.5)	0.8 (0.2)
พิจิตร	1,607	407,755	81.3 (1.9)	7.6 (1.2)	8.1 (1.1)	1.9 (0.5)	1.1 (0.3)
เพชรบูรณ์	1,612	728,526	78.5 (3.7)	9.8 (1.6)	9.1 (1.9)	2.3 (0.7)	0.4 (0.2)
<b>ภาคใต้</b>							
นครศรีธรรมราช	1,626	1,090,882	77.7 (3.8)	11.8 (3.1)	7.7 (1.4)	2.0 (0.9)	0.8 (0.6)
กระบี่	1,681	301,434	70.4 (5.8)	17.9 (4.3)	9.9 (2.2)	1.7 (0.4)	0.1 (0.1)
พังงา	1,684	182,079	77.0 (4.5)	11.3 (3.0)	9.5 (1.6)	1.9 (0.6)	0.3 (0.1)
ภูเก็ต	1,667	238,037	84.5 (2.4)	7.3 (1.1)	6.1 (1.1)	1.2 (0.8)	0.8 (0.3)
สุราษฎร์ธานี	1,632	698,775	71.0 (3.8)	10.7 (1.3)	12.4 (2.6)	5.0 (1.6)	0.9 (0.2)
ระนอง	1,647	114,947	75.2 (3.8)	11.6 (2.2)	10.6 (1.8)	1.7 (0.5)	1.0 (0.7)
ชุมพร	1,617	341,701	75.6 (4.2)	10.8 (2.8)	10.1 (2.0)	2.2 (0.7)	1.3 (0.4)
สงขลา	1,615	921,567	80.5 (1.8)	7.8 (1.3)	9.1 (0.9)	2.2 (0.5)	0.5 (0.3)
สตูล	1,619	197,563	77.8 (3.5)	7.9 (1.5)	11.2 (2.0)	2.9 (0.7)	0.3 (0.1)
ตรัง	1,668	431,254	78.4 (1.4)	10.1 (0.8)	8 (1.1)	2.3 (0.3)	1.2 (0.6)
พัทลุง	1,698	374,502	75.9 (1.7)	8.2 (1.0)	11.9 (1.9)	3.4 (0.4)	0.7 (0.2)
ปัตตานี	1,660	408,741	76.2 (2.8)	8.8 (1.4)	12.3 (1.6)	2.3 (0.5)	0.4 (0.2)
ยะลา	1,615	308,064	79.9 (3.0)	10.1 (1.4)	7.8 (1.5)	1.8 (0.7)	0.4 (0.2)
นราธิวาส	1,681	482,453	79.1 (3.5)	8.1 (1.3)	10.7 (2.2)	1.6 (0.4)	0.4 (0.3)

ตารางที่ 2.3.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,816	0.4	0.0	0.3	0.5
25 - 34	10,523	0.6	0.1	0.5	0.7
35 - 44	11,483	0.6	0.0	0.5	0.7
45 - 54	8,688	0.7	0.1	0.6	0.8
55 - 64	14,103	0.8	0.1	0.7	1.0
65 - 74	6,386	0.8	0.1	0.7	0.9
รวม	61,999	0.6	0.0	0.6	0.7
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,943	0.6	0.1	0.5	0.8
25 - 34	10,039	0.7	0.1	0.6	0.9
35 - 44	12,057	1.0	0.1	0.9	1.2
45 - 54	9,589	1.0	0.1	0.9	1.1
55 - 64	13,870	1.2	0.1	1.1	1.3
65 - 74	6,710	1.2	0.1	1.0	1.3
รวม	62,208	0.9	0.0	0.8	1.0
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,759	0.5	0.0	0.4	0.6
25 - 34	20,562	0.7	0.0	0.6	0.8
35 - 44	23,540	0.8	0.0	0.7	0.9
45 - 54	18,277	0.9	0.0	0.8	1.0
55 - 64	27,973	1.0	0.0	0.9	1.1
65 - 74	13,096	1.0	0.1	0.9	1.1
รวมทั้งประเทศ	124,207	0.8	0.0	0.7	0.8

ตารางที่ 2.3.2 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	62,579	0.7	0.0	0.7	0.8
นอกเขตเทศบาล	61,628	0.8	0.0	0.7	0.9
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,634	0.4	0.1	0.2	0.5
ภาคกลาง	41,010	0.8	0.1	0.6	0.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,959	0.8	0.1	0.6	0.9
ภาคเหนือ	27,603	1.0	0.1	0.9	1.2
ภาคใต้	23,001	0.7	0.1	0.6	0.8
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,828	1.0	0.2	0.5	1.5
เขต สคร. ที่ 2	8,377	0.7	0.1	0.5	0.8
เขต สคร. ที่ 3	14,726	0.8	0.1	0.6	0.9
เขต สคร. ที่ 4	13,079	0.7	0.1	0.5	0.8
เขต สคร. ที่ 5	6,534	0.7	0.1	0.6	0.8
เขต สคร. ที่ 6	13,164	0.9	0.1	0.7	1.1
เขต สคร. ที่ 7	11,261	0.6	0.1	0.5	0.8
เขต สคร. ที่ 8	6,362	1.0	0.2	0.7	1.4
เขต สคร. ที่ 9	8,169	1.1	0.1	0.9	1.3
เขต สคร. ที่ 10	13,072	1.0	0.1	0.7	1.2
เขต สคร. ที่ 11	11,479	0.8	0.1	0.6	0.9
เขต สคร. ที่ 12	11,522	0.7	0.1	0.6	0.8



ตารางที่ 2.3.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการที่เจ็บป่วยทางจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,634	0.4	0.1	0.2	0.5
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,639	0.4	0.1	0.2	0.6
นนทบุรี	1,662	0.8	0.2	0.4	1.2
ปทุมธานี	1,522	1.6	0.5	0.6	2.7
พระนครศรีอยุธยา	1,644	0.5	0.1	0.3	0.7
อ่างทอง	1,724	0.3	0.1	0.2	0.4
ลพบุรี	1,669	0.9	0.1	0.6	1.2
สิงห์บุรี	1,628	0.7	0.2	0.4	1.0
ชัยนาท	1,618	0.9	0.2	0.5	1.3
สระบุรี	1,738	0.4	0.2	0.1	0.8
ชลบุรี	1,602	1.0	0.3	0.5	1.6
ระยอง	1,602	0.7	0.1	0.4	0.9
จันทบุรี	1,650	1.2	0.2	0.9	1.6
ตราด	1,683	0.5	0.1	0.2	0.8
ฉะเชิงเทรา	1,670	0.6	0.2	0.3	1.0
ปราจีนบุรี	1,709	0.8	0.1	0.6	1.1
นครนายก	1,600	0.7	0.2	0.3	1.1
สระแก้ว	1,571	0.8	0.3	0.3	1.4
ราชบุรี	1,683	0.7	0.2	0.3	1.0
กาญจนบุรี	1,584	0.6	0.1	0.3	0.8
สุพรรณบุรี	1,704	0.5	0.1	0.2	0.8
นครปฐม	1,546	0.8	0.3	0.2	1.5
สมุทรสาคร	1,633	0.6	0.2	0.3	1.0
สมุทรสงคราม	1,703	1.1	0.3	0.5	1.8
เพชรบุรี	1,601	1.1	0.2	0.7	1.4
ประจวบคีรีขันธ์	1,625	0.3	0.1	0.1	0.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,609	0.9	0.1	0.7	1.1
บุรีรัมย์	1,670	0.5	0.1	0.3	0.6
สุรินทร์	1,631	0.6	0.1	0.4	0.9
ศรีสะเกษ	1,566	0.8	0.2	0.4	1.3
อุบลราชธานี	1,622	0.3	0.1	0.2	0.4
ยโสธร	1,706	0.4	0.1	0.1	0.7
ชัยภูมิ	1,624	0.7	0.2	0.3	1.1
อำนาจเจริญ	1,575	0.9	0.1	0.7	1.2
หนองบัวลำภู	1,722	0.7	0.1	0.5	1.0
ขอนแก่น	1,680	1.8	0.4	1.0	2.6
อุดรธานี	1,598	0.7	0.1	0.4	0.9
เลย	1,620	0.7	0.1	0.4	0.9
หนองคาย	1,635	0.6	0.1	0.4	0.9

ตารางที่ 2.3.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>				
มหาสารคาม	1,688	0.7	0.2	0.4 1.0
ร้อยเอ็ด	1,663	0.7	0.1	0.5 0.8
กาฬสินธุ์	1,558	0.5	0.1	0.2 0.8
สกลนคร	1,523	0.5	0.2	0.2 0.8
นครพนม	1,611	1.1	0.3	0.5 1.8
มุกดาหาร	1,658	0.7	0.2	0.4 1.0
<b>ภาคเหนือ</b>				
เชียงใหม่	1,592	1.5	0.4	0.6 2.3
ลำพูน	1,646	0.5	0.1	0.3 0.7
ลำปาง	1,678	0.5	0.1	0.3 0.7
อุตรดิตถ์	1,621	0.8	0.2	0.4 1.1
แพร่	1,682	0.5	0.2	0.2 0.8
น่าน	1,685	0.9	0.2	0.6 1.3
พะเยา	1,625	0.9	0.2	0.6 1.2
เชียงราย	1,631	1.0	0.2	0.7 1.3
แม่ฮ่องสอน	1,533	1.0	0.2	0.6 1.4
นครสวรรค์	1,631	1.4	0.4	0.7 2.1
อุทัยธานี	1,580	0.6	0.1	0.4 0.9
กำแพงเพชร	1,569	0.9	0.2	0.5 1.3
ตาก	1,633	1.2	0.3	0.6 1.8
สุโขทัย	1,671	1.0	0.2	0.6 1.5
พิษณุโลก	1,604	1.0	0.2	0.7 1.4
พิจิตร	1,582	1.0	0.2	0.5 1.4
เพชรบูรณ์	1,640	1.3	0.3	0.8 1.9
<b>ภาคใต้</b>				
นครศรีธรรมราช	1,614	0.6	0.2	0.2 1.0
กระบี่	1,664	0.6	0.2	0.3 0.9
พังงา	1,670	0.7	0.2	0.2 1.1
ภูเก็ต	1,666	0.7	0.2	0.4 1.0
สุราษฎร์ธานี	1,620	1.0	0.2	0.7 1.4
ระนอง	1,640	0.8	0.2	0.4 1.2
ชุมพร	1,605	1.0	0.3	0.5 1.5
สงขลา	1,602	0.5	0.1	0.3 0.8
สตูล	1,614	0.7	0.2	0.3 1.1
ตรัง	1,668	0.8	0.2	0.5 1.2
พัทลุง	1,697	0.9	0.1	0.6 1.2
ปัตตานี	1,640	0.9	0.1	0.6 1.2
ยะลา	1,620	0.4	0.1	0.3 0.6
นราธิวาส	1,681	0.6	0.2	0.3 0.9

ตารางที่ 2.3.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>ชาย</b>							
15 - 24	10,785	4,903,192	94.3 (0.4)	2.7 (0.3)	2.0 (0.2)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)
25 - 34	10,466	4,576,957	91.1 (0.5)	3.8 (0.4)	3.7 (0.3)	0.6 (0.1)	0.7 (0.2)
35 - 44	11,418	5,109,535	89.6 (0.6)	4.6 (0.4)	4.3 (0.3)	0.9 (0.1)	0.5 (0.1)
45 - 54	8,637	3,916,186	88.8 (0.6)	4.8 (0.4)	4.7 (0.4)	1.1 (0.1)	0.7 (0.1)
55 - 64	13,982	2,443,824	87.3 (0.6)	5.3 (0.4)	5.4 (0.3)	1.0 (0.2)	0.9 (0.1)
65 - 74	6,344	1,108,697	87.3 (0.7)	5.0 (0.4)	5.8 (0.5)	1.2 (0.2)	0.8 (0.2)
รวม	61,632	22,058,391	90.5 (0.4)	4.1 (0.2)	3.9 (0.2)	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)
<b>หญิง</b>							
15 - 24	9,893	4,572,966	89.9 (0.6)	4.0 (0.4)	4.7 (0.4)	0.8 (0.1)	0.5 (0.2)
25 - 34	9,954	4,462,034	87.6 (0.6)	5.1 (0.3)	5.5 (0.4)	1.4 (0.2)	0.3 (0.1)
35 - 44	11,939	5,526,174	85.0 (0.6)	5.9 (0.4)	6.4 (0.4)	1.6 (0.2)	1.2 (0.2)
45 - 54	9,494	4,375,249	84.0 (0.7)	6.3 (0.4)	7.3 (0.4)	1.4 (0.2)	1.0 (0.2)
55 - 64	13,696	2,773,408	81.8 (0.6)	7.5 (0.4)	7.8 (0.4)	1.7 (0.2)	1.3 (0.2)
65 - 74	6,632	1,321,600	82.5 (0.8)	7.1 (0.6)	7.7 (0.6)	1.4 (0.2)	1.3 (0.3)
รวม	61,608	23,031,432	85.8 (0.4)	5.7 (0.2)	6.3 (0.2)	1.4 (0.1)	0.9 (0.1)
<b>ชายและหญิง</b>							
15 - 24	20,678	9,476,158	92.2 (0.4)	3.3 (0.2)	3.3 (0.2)	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)
25 - 34	20,420	9,038,991	89.4 (0.4)	4.5 (0.3)	4.6 (0.3)	1.0 (0.1)	0.5 (0.1)
35 - 44	23,357	10,635,709	87.2 (0.5)	5.3 (0.3)	5.4 (0.3)	1.3 (0.1)	0.8 (0.1)
45 - 54	18,131	8,291,435	86.3 (0.6)	5.6 (0.3)	6.1 (0.3)	1.2 (0.1)	0.8 (0.1)
55 - 64	27,678	5,217,233	84.4 (0.5)	6.5 (0.3)	6.7 (0.3)	1.4 (0.1)	1.1 (0.1)
65 - 74	12,976	2,430,298	84.7 (0.6)	6.2 (0.4)	6.8 (0.4)	1.3 (0.1)	1.0 (0.2)
รวมทั้งประเทศ	123,240	45,089,823	88.1 (0.4)	4.9 (0.2)	5.1 (0.2)	1.1 (0.1)	0.7 (0.1)

ตารางที่ 2.3.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	62,047	15,065,337	89.8 (0.5)	4.1 (0.3)	4.3 (0.2)	1.0 (0.1)	0.8 (0.1)
นอกเขตเทศบาล	61,193	30,024,486	87.2 (0.5)	5.4 (0.3)	5.6 (0.3)	1.2 (0.1)	0.7 (0.1)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	1,631	4,112,328	94.9 (1.3)	2.6 (0.8)	1.5 (0.5)	0.3 (0.1)	0.6 (0.2)
ภาคกลาง	40,693	11,248,599	88.6 (0.6)	4.7 (0.3)	4.8 (0.3)	1.1 (0.1)	0.7 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,756	15,414,166	87.7 (0.7)	5.3 (0.4)	5.2 (0.3)	1.1 (0.1)	0.8 (0.2)
ภาคเหนือ	27,346	8,290,259	84.2 (0.9)	6.1 (0.4)	7.3 (0.6)	1.7 (0.2)	0.7 (0.1)
ภาคใต้	22,814	6,024,471	88.8 (0.6)	4.5 (0.3)	5.2 (0.4)	1.0 (0.1)	0.6 (0.1)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	4,784	1,981,592	87.4 (1.5)	5.9 (0.9)	4.3 (0.7)	1.3 (0.3)	1.2 (0.5)
เขต สคร. ที่ 2	8,330	1,624,201	88.9 (1.2)	4.9 (0.9)	4.6 (0.6)	0.9 (0.2)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 3	14,606	4,079,194	88.7 (0.9)	4.2 (0.4)	5.0 (0.4)	1.3 (0.2)	0.7 (0.1)
เขต สคร. ที่ 4	12,973	3,563,613	89.0 (1.1)	4.5 (0.5)	5.0 (0.7)	1.0 (0.2)	0.5 (0.1)
เขต สคร. ที่ 5	6,485	4,709,020	87.2 (1.2)	5.2 (0.9)	5.6 (0.6)	1.6 (0.3)	0.3 (0.1)
เขต สคร. ที่ 6	13,079	6,235,070	87.2 (1.3)	5.5 (0.7)	5.1 (0.5)	0.8 (0.1)	1.4 (0.3)
เขต สคร. ที่ 7	11,192	4,470,076	88.8 (1.1)	5.0 (0.6)	4.7 (0.5)	0.8 (0.1)	0.6 (0.1)
เขต สคร. ที่ 8	6,316	1,792,001	86.2 (1.3)	4.7 (0.5)	6.5 (0.9)	1.8 (0.2)	0.8 (0.2)
เขต สคร. ที่ 9	8,074	2,446,989	82.3 (2.0)	6.7 (0.8)	8.6 (1.3)	1.5 (0.2)	0.8 (0.1)
เขต สคร. ที่ 10	12,956	4,051,270	84.4 (1.3)	6.4 (0.7)	6.9 (0.7)	1.7 (0.3)	0.6 (0.1)
เขต สคร. ที่ 11	11,381	2,932,342	87.3 (1.1)	5.5 (0.6)	5.5 (0.6)	1.0 (0.2)	0.7 (0.2)
เขต สคร. ที่ 12	11,433	3,092,129	90.1 (0.7)	3.5 (0.3)	4.8 (0.4)	1.0 (0.2)	0.6 (0.1)

ตารางที่ 2.3.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
กรุงเทพมหานคร	1,631	4,112,328	94.9 (1.3)	2.6 (0.8)	1.5 (0.5)	0.3 (0.1)	0.6 (0.2)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,632	849,325	93.0 (1.8)	3.4 (1.2)	2.4 (0.6)	0.7 (0.2)	0.5 (0.2)
นนทบุรี	1,645	786,731	88.5 (2.8)	4.8 (1.4)	4.9 (1.6)	1.0 (0.4)	0.7 (0.3)
ปทุมธานี	1,510	632,036	85.6 (2.1)	5.6 (0.9)	4.1 (0.9)	2.2 (0.6)	2.5 (1.0)
พระนครศรีอยุธยา	1,629	562,825	87.8 (2.4)	7.6 (2.1)	3.8 (0.6)	0.5 (0.2)	0.3 (0.1)
อ่างทอง	1,721	216,491	93.2 (1.4)	2.6 (0.7)	3.8 (0.8)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
ลพบุรี	1,648	552,519	87.0 (2.6)	5.5 (2.3)	5.2 (1.0)	1.3 (0.4)	1.0 (0.2)
สิงห์บุรี	1,619	156,906	87.7 (3.2)	4.2 (1.3)	6.2 (1.7)	1.6 (0.5)	0.3 (0.1)
ชัยนาท	1,609	246,624	86.9 (2.3)	6.5 (1.3)	4.0 (1.3)	1.1 (0.5)	1.5 (0.5)
สระบุรี	1,733	451,660	90.9 (2.6)	4.7 (1.2)	3.9 (1.4)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)
ชลบุรี	1,584	896,726	89.0 (2.5)	2.8 (0.7)	4.7 (1.0)	2.5 (0.9)	1.0 (0.4)
ระยอง	1,587	423,475	89.6 (1.6)	4.3 (1.0)	4.5 (0.8)	1.1 (0.4)	0.5 (0.2)
จันทบุรี	1,626	369,008	80.6 (3.1)	7.8 (1.9)	8.9 (1.3)	1.6 (0.4)	1.1 (0.3)
ตราด	1,678	156,643	90.0 (2.4)	4.7 (1.2)	3.9 (1.1)	0.9 (0.3)	0.5 (0.2)
ฉะเชิงเทรา	1,663	485,928	89.9 (2.9)	3.4 (0.9)	5.2 (1.9)	1.0 (0.3)	0.5 (0.2)
ปราจีนบุรี	1,695	341,611	82.1 (2.3)	8.1 (1.1)	8.1 (1.3)	1.3 (0.6)	0.4 (0.2)
นครนายก	1,582	186,198	91.1 (2.0)	3.7 (1.1)	3.6 (0.8)	1.2 (0.4)	0.5 (0.2)
สระแก้ว	1,559	370,281	87.9 (2.6)	3.7 (1.1)	6.5 (1.6)	0.8 (0.3)	1.2 (0.5)
ราชบุรี	1,668	607,596	90.0 (2.3)	4.1 (0.8)	4.6 (1.3)	0.7 (0.4)	0.6 (0.3)
กาญจนบุรี	1,573	546,344	89.4 (2.4)	4.3 (1.1)	4.8 (1.4)	1.1 (0.3)	0.4 (0.2)
สุพรรณบุรี	1,691	635,025	90.0 (2.7)	4.5 (1.5)	4.8 (1.3)	0.6 (0.2)	0.1 (0.1)
นครปฐม	1,534	608,951	86.6 (3.7)	5.5 (1.1)	5.8 (2.5)	1.4 (0.7)	0.7 (0.4)
สมุทรสาคร	1,617	337,908	88.3 (4.6)	4.2 (1.7)	6.4 (2.7)	0.9 (0.3)	0.2 (0.1)
สมุทรสงคราม	1,684	143,888	82.5 (6.0)	7.4 (2.1)	6.7 (3.3)	2.4 (0.8)	1.0 (0.4)
เพชรบุรี	1,586	331,590	86.2 (1.9)	5.0 (1.2)	6.0 (1.1)	1.3 (0.4)	1.5 (0.5)
ประจวบคีรีขันธ์	1,620	352,310	94.8 (1.2)	2.8 (0.9)	1.8 (0.5)	0.6 (0.3)	0.1 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,593	1,820,663	86.2 (1.3)	4.5 (0.8)	6.8 (1.0)	2.1 (0.5)	0.4 (0.2)
บุรีรัมย์	1,656	1,118,948	90.6 (1.9)	4.2 (0.9)	4.2 (1.3)	0.9 (0.3)	0.1 (0.1)
สุรินทร์	1,620	980,621	84.0 (3.8)	9.4 (3.6)	5.4 (1.3)	0.9 (0.4)	0.2 (0.2)
ศรีสะเกษ	1,551	1,035,989	84.8 (3.3)	6.7 (1.8)	6.8 (1.7)	0.8 (0.3)	0.8 (0.3)
อุบลราชธานี	1,617	1,285,371	94.8 (1.1)	2.4 (0.5)	2.1 (0.6)	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)
ยโสธร	1,702	414,684	89.3 (3.6)	5.7 (2.0)	4.3 (1.7)	0.4 (0.3)	0.2 (0.1)
ชัยภูมิ	1,616	788,788	88.8 (3.1)	3.2 (0.8)	5.3 (1.5)	2.2 (1.0)	0.4 (0.2)
อำนาจเจริญ	1,565	255,504	85.7 (1.3)	5.9 (1.1)	5.7 (0.8)	1.4 (0.3)	1.3 (0.3)
หนองบัวลำภู	1,714	378,193	85.6 (1.8)	6.1 (0.8)	7.1 (1.1)	0.6 (0.2)	0.7 (0.3)
ขอนแก่น	1,665	1,319,432	84.5 (3.4)	5.1 (1.3)	5.2 (1.0)	0.9 (0.3)	4.3 (1.1)
อุดรธานี	1,586	1,077,091	88.1 (1.9)	5.9 (1.0)	4.2 (1.0)	1.1 (0.4)	0.7 (0.2)
เลย	1,613	440,234	88.1 (2.7)	5.0 (1.2)	5.4 (1.8)	0.9 (0.3)	0.6 (0.3)
หนองคาย	1,627	637,427	88.4 (2.2)	4.0 (0.7)	6.3 (1.3)	0.9 (0.4)	0.4 (0.2)

ตารางที่ 2.3.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวันที่เจ็บป่วย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	1,676	717,471	81.0 (6.1)	11.4	6.3 (2.0)	1.1 (0.3)	0.2 (0.2)
ร้อยเอ็ด	1,649	986,452	92.2 (1.9)	2.2 (0.8)	4.0 (1.5)	0.3 (0.1)	1.2 (0.6)
กาฬสินธุ์	1,549	678,770	89.3 (2.1)	5.8 (1.1)	3.9 (1.2)	0.7 (0.4)	0.3 (0.2)
สกลนคร	1,516	751,396	90.0 (2.6)	4.8 (1.5)	4.0 (1.2)	0.7 (0.2)	0.5 (0.2)
นครพนม	1,593	492,764	80.9 (3.2)	8.1 (2.0)	7.9 (2.0)	2.6 (0.9)	0.6 (0.5)
มุกดาหาร	1,648	234,368	89.1 (2.4)	3.8 (1.1)	5.7 (1.3)	0.8 (0.3)	0.7 (0.3)
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	1,560	1,091,197	80.9 (3.6)	6.5 (1.5)	8.9 (2.2)	2.9 (0.8)	0.8 (0.3)
ลำพูน	1,638	310,462	88.1 (2.7)	6.5 (1.7)	4.5 (1.1)	0.7 (0.3)	0.1 (0.1)
ลำปาง	1,670	590,817	91.8 (1.7)	3.5 (0.9)	3.7 (0.7)	0.5 (0.2)	0.5 (0.2)
อุตรดิตถ์	1,615	338,380	86.1 (3.0)	5.6 (1.2)	6.6 (1.9)	0.8 (0.3)	0.9 (0.4)
แพร่	1,677	360,629	87.4 (3.4)	7.1 (2.0)	4.7 (1.6)	0.6 (0.4)	0.2 (0.1)
น่าน	1,671	365,485	85.4 (3.1)	5.5 (1.6)	6.8 (1.3)	1.2 (0.4)	1.1 (0.5)
พะเยา	1,613	370,006	86.1 (2.3)	5.7 (1.6)	6.1 (1.0)	1.4 (0.4)	0.7 (0.3)
เชียงราย	1,613	829,067	79.9 (3.0)	8.8 (2.4)	8.9 (1.5)	2.1 (0.6)	0.4 (0.2)
แม่ฮ่องสอน	1,514	133,606	83.7 (3.3)	4.6 (1.0)	8.3 (2.4)	3.1 (0.5)	0.3 (0.2)
นครสวรรค์	1,616	671,048	86.7 (1.8)	4.8 (0.6)	5.1 (1.2)	2.4 (0.4)	1.1 (0.3)
อุทัยธานี	1,576	229,046	87.0 (3.5)	5.5 (2.1)	5.7 (1.4)	1.4 (0.5)	0.4 (0.2)
กำแพงเพชร	1,554	491,447	84.5 (3.0)	4.8 (0.9)	8.7 (2.0)	1.4 (0.3)	0.6 (0.2)
ตาก	1,606	319,344	82.9 (2.3)	7.4 (2.1)	6.9 (1.8)	2.4 (0.7)	0.4 (0.2)
สุโขทัย	1,650	459,032	81.0 (3.4)	7.8 (1.2)	8.7 (2.2)	2.0 (0.6)	0.4 (0.3)
พิษณุโลก	1,586	612,451	85.0 (2.4)	5.5 (1.4)	7.2 (1.2)	1.3 (0.3)	1.0 (0.3)
พิจิตร	1,570	400,460	86.9 (2.5)	4.0 (0.9)	6.7 (1.6)	1.5 (0.4)	0.8 (0.4)
เพชรบูรณ์	1,617	717,782	78.9 (5.7)	7.3 (1.9)	11.5 (4.0)	1.4 (0.6)	0.9 (0.3)
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	1,596	1,081,701	89.3 (2.2)	5.1 (1.1)	4.4 (1.0)	0.7 (0.5)	0.4 (0.2)
กระบี่	1,653	297,580	87.8 (3.2)	4.7 (1.1)	6.6 (2.6)	0.6 (0.2)	0.3 (0.2)
พังงา	1,659	181,532	84.9 (3.9)	7.3 (2.4)	5.3 (1.4)	2.1 (1.4)	0.3 (0.1)
ภูเก็ต	1,656	236,464	90.6 (1.7)	4.1 (0.8)	3.8 (0.9)	0.7 (0.3)	0.8 (0.3)
สุราษฎร์ธานี	1,600	685,905	85.7 (2.2)	5.7 (1.2)	6.3 (1.1)	1.2 (0.4)	1.1 (0.5)
ระนอง	1,623	114,004	81.9 (6.2)	6.8 (3.5)	9.5 (2.7)	1.6 (0.5)	0.1 (0.1)
ชุมพร	1,594	335,156	85.0 (2.8)	6.5 (1.6)	6.4 (1.4)	1.0 (0.3)	1.1 (0.3)
สงขลา	1,594	909,750	93.0 (1.2)	2.8 (0.8)	3.0 (0.8)	0.6 (0.2)	0.6 (0.3)
สตูล	1,607	195,341	89.1 (2.6)	3.4 (0.8)	5.7 (1.5)	1.5 (0.4)	0.4 (0.2)
ตรัง	1,650	431,599	88.8 (1.5)	3.8 (0.5)	4.7 (0.9)	1.7 (0.5)	1.0 (0.5)
พัทลุง	1,678	367,060	89.8 (1.5)	3.0 (0.5)	5.5 (1.1)	1.0 (0.3)	0.7 (0.2)
ปัตตานี	1,623	404,510	86.1 (2.1)	4.9 (1.2)	7.1 (1.3)	1.2 (0.4)	0.8 (0.3)
ยะลา	1,607	306,342	91.0 (1.6)	3.5 (0.8)	4.7 (1.0)	0.6 (0.2)	0.1 (0.0)
นราธิวาส	1,674	477,526	89.3 (1.9)	3.8 (0.7)	5.7 (1.3)	0.8 (0.5)	0.4 (0.2)

ตารางที่ 2.4.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,909	0.2	0.0	0.1	0.2
25 - 34	10,638	0.3	0.1	0.1	0.4
35 - 44	11,621	0.3	0.0	0.2	0.4
45 - 54	8,747	0.3	0.0	0.3	0.4
55 - 64	14,292	0.4	0.0	0.4	0.5
65 - 74	6,479	0.6	0.1	0.5	0.8
รวม	62,686	0.3	0.0	0.3	0.3
<b>หญิง</b>					
15 - 24	10,057	0.2	0.0	0.2	0.3
25 - 34	10,165	0.2	0.0	0.2	0.3
35 - 44	12,174	0.3	0.0	0.3	0.4
45 - 54	9,689	0.3	0.0	0.3	0.4
55 - 64	14,019	0.5	0.0	0.5	0.6
65 - 74	6,771	0.7	0.1	0.6	0.9
รวม	62,875	0.3	0.0	0.3	0.4
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,966	0.2	0.0	0.1	0.2
25 - 34	20,803	0.3	0.0	0.2	0.3
35 - 44	23,795	0.3	0.0	0.3	0.4
45 - 54	18,436	0.3	0.0	0.3	0.4
55 - 64	28,311	0.5	0.0	0.4	0.6
65 - 74	13,250	0.7	0.0	0.6	0.8
รวมทั้งประเทศ	125,561	0.3	0.0	0.3	0.4

ตารางที่ 2.4.2 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	63,318	0.3	0.0	0.2	0.3
นอกเขตเทศบาล	62,243	0.3	0.0	0.3	0.4
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,612	0.1	0.1	0.0	0.3
ภาคกลาง	41,577	0.3	0.0	0.2	0.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,263	0.3	0.0	0.3	0.4
ภาคเหนือ	27,887	0.4	0.1	0.3	0.6
ภาคใต้	23,222	0.4	0.0	0.3	0.4
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,883	0.3	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 2	8,481	0.2	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 3	14,934	0.3	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 4	13,279	0.3	0.0	0.2	0.4
เขต สคร. ที่ 5	6,617	0.3	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 6	13,279	0.3	0.1	0.2	0.5
เขต สคร. ที่ 7	11,367	0.4	0.1	0.3	0.5
เขต สคร. ที่ 8	6,427	0.3	0.0	0.2	0.4
เขต สคร. ที่ 9	8,253	0.4	0.0	0.3	0.4
เขต สคร. ที่ 10	13,207	0.5	0.1	0.2	0.8
เขต สคร. ที่ 11	11,565	0.3	0.1	0.2	0.5
เขต สคร. ที่ 12	11,657	0.4	0.0	0.3	0.4



ตารางที่ 2.4.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,612	0.1	0.1	0.0	0.3
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,652	0.2	0.0	0.1	0.3
นนทบุรี	1,669	0.3	0.0	0.2	0.4
ปทุมธานี	1,543	0.3	0.1	0.2	0.4
พระนครศรีอยุธยา	1,671	0.3	0.1	0.2	0.4
อ่างทอง	1,732	0.1	0.0	0.1	0.2
ลพบุรี	1,685	0.4	0.1	0.1	0.6
สิงห์บุรี	1,663	0.2	0.0	0.1	0.2
ชัยนาท	1,655	0.3	0.0	0.2	0.3
สระบุรี	1,746	0.2	0.1	0.1	0.3
ชลบุรี	1,621	0.2	0.1	0.1	0.4
ระยอง	1,650	0.4	0.1	0.3	0.6
จันทบุรี	1,675	0.4	0.1	0.2	0.5
ตราด	1,699	0.2	0.1	0.0	0.5
ฉะเชิงเทรา	1,696	0.3	0.1	0.2	0.4
ปราจีนบุรี	1,718	0.3	0.1	0.1	0.4
นครนายก	1,612	0.2	0.1	0.1	0.4
สระแก้ว	1,611	0.4	0.1	0.2	0.5
ราชบุรี	1,697	0.4	0.1	0.1	0.6
กาญจนบุรี	1,630	0.3	0.1	0.2	0.5
สุพรรณบุรี	1,709	0.2	0.1	0.0	0.3
นครปฐม	1,580	0.2	0.0	0.1	0.3
สมุทรสาคร	1,663	0.3	0.1	0.1	0.5
สมุทรสงคราม	1,720	0.4	0.2	0.0	0.8
เพชรบุรี	1,629	0.5	0.1	0.3	0.8
ประจวบคีรีขันธ์	1,651	0.2	0.1	0.1	0.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,629	0.3	0.1	0.2	0.4
บุรีรัมย์	1,677	0.2	0.0	0.1	0.3
สุรินทร์	1,653	0.2	0.0	0.1	0.3
ศรีสะเกษ	1,582	0.4	0.1	0.2	0.7
อุบลราชธานี	1,626	0.2	0.0	0.1	0.2
ยโสธร	1,707	0.2	0.1	0.1	0.3
ชัยภูมิ	1,658	0.4	0.1	0.2	0.5
อำนาจเจริญ	1,603	0.6	0.2	0.2	1.0
หนองบัวลำภู	1,727	0.3	0.1	0.2	0.4
ขอนแก่น	1,692	0.4	0.1	0.1	0.6
อุดรธานี	1,614	0.4	0.1	0.1	0.6
เลย	1,636	0.5	0.2	0.1	0.8
หนองคาย	1,649	0.2	0.0	0.1	0.3

ตารางที่ 2.4.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	1,694	0.3	0.1	0.1	0.5
ร้อยเอ็ด	1,684	0.5	0.2	0.1	0.8
กาฬสินธุ์	1,583	0.3	0.1	0.1	0.4
สกลนคร	1,548	0.4	0.1	0.1	0.6
นครพนม	1,641	0.9	0.3	0.3	1.6
มุกดาหาร	1,660	0.5	0.1	0.2	0.7
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	1,622	0.9	0.5	-0.1	1.9
ลำพูน	1,653	0.3	0.1	0.1	0.4
ลำปาง	1,691	0.2	0.1	0.1	0.3
อุตรดิตถ์	1,646	0.3	0.1	0.2	0.5
แพร่	1,698	0.2	0.1	0.1	0.3
น่าน	1,686	0.2	0.1	0.1	0.4
พะเยา	1,644	0.6	0.1	0.3	0.8
เชียงราย	1,647	0.4	0.1	0.2	0.5
แม่ฮ่องสอน	1,566	0.3	0.1	0.2	0.5
นครสวรรค์	1,635	0.4	0.1	0.2	0.5
อุทัยธานี	1,587	0.2	0.0	0.1	0.3
กำแพงเพชร	1,585	0.3	0.1	0.2	0.5
ตาก	1,653	0.4	0.1	0.2	0.7
สุโขทัย	1,679	0.2	0.0	0.1	0.2
พิษณุโลก	1,629	0.5	0.1	0.3	0.6
พิจิตร	1,620	0.4	0.1	0.2	0.6
เพชรบูรณ์	1,646	0.3	0.1	0.2	0.5
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	1,628	0.3	0.1	0.0	0.5
กระบี่	1,667	0.3	0.1	0.1	0.5
พังงา	1,678	0.2	0.1	0.1	0.4
ภูเก็ต	1,681	0.3	0.1	0.2	0.4
สุราษฎร์ธานี	1,639	0.4	0.1	0.3	0.5
ระนอง	1,653	0.3	0.1	0.2	0.5
ชุมพร	1,619	0.6	0.1	0.3	0.9
สงขลา	1,637	0.3	0.1	0.2	0.5
สตูล	1,632	0.3	0.1	0.1	0.5
ตรัง	1,681	0.4	0.1	0.2	0.7
พัทลุง	1,707	0.3	0.1	0.2	0.5
ปัตตานี	1,679	0.5	0.1	0.3	0.8
ยะลา	1,627	0.3	0.1	0.1	0.5
นราธิวาส	1,694	0.3	0.1	0.2	0.4

ตารางที่ 2.4.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>ชาย</b>							
15 - 24	10,902	4,949,042	96.9 (0.3)	1.4 (0.2)	1.4 (0.2)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
25 - 34	10,615	4,636,489	95.8 (0.3)	2.2 (0.2)	1.4 (0.2)	0.2 (0.0)	0.4 (0.2)
35 - 44	11,589	5,177,694	95.1 (0.4)	2.1 (0.2)	2.1 (0.2)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
45 - 54	8,725	3,944,595	94.2 (0.5)	2.7 (0.3)	2.5 (0.3)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
55 - 64	14,236	2,478,685	93.5 (0.4)	2.5 (0.2)	2.8 (0.2)	0.7 (0.1)	0.5 (0.1)
65 - 74	6,441	1,110,308	92.0 (0.6)	3.2 (0.4)	3.1 (0.3)	0.7 (0.2)	0.9 (0.2)
รวม	62,508	22,296,814	95.1 (0.2)	2.2 (0.1)	2.0 (0.1)	0.3 (0.0)	0.3 (0.1)
<b>หญิง</b>							
15 - 24	10,048	4,618,824	95.0 (0.4)	2.4 (0.2)	2.2 (0.2)	0.4 (0.1)	0.1 (0.0)
25 - 34	10,142	4,550,641	94.5 (0.4)	2.9 (0.3)	2.1 (0.2)	0.4 (0.1)	0.1 (0.0)
35 - 44	12,145	5,592,939	93.8 (0.4)	3.1 (0.3)	2.4 (0.3)	0.5 (0.1)	0.2 (0.1)
45 - 54	9,657	4,424,303	93.2 (0.6)	3.6 (0.4)	2.5 (0.3)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
55 - 64	13,957	2,814,888	91.6 (0.4)	3.3 (0.3)	3.6 (0.2)	0.9 (0.1)	0.6 (0.1)
65 - 74	6,724	1,331,016	89.2 (0.7)	4.4 (0.4)	4.7 (0.5)	0.9 (0.2)	0.7 (0.1)
รวม	62,673	23,332,611	93.5 (0.3)	3.1 (0.2)	2.6 (0.2)	0.5 (0.0)	0.2 (0.0)
<b>ชายและหญิง</b>							
15 - 24	20,950	9,567,866	96.0 (0.3)	1.9 (0.2)	1.8 (0.2)	0.3 (0.1)	0.1 (0.0)
25 - 34	20,757	9,187,130	95.2 (0.3)	2.6 (0.2)	1.8 (0.2)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)
35 - 44	23,734	10,770,633	94.4 (0.3)	2.6 (0.2)	2.3 (0.2)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
45 - 54	18,382	8,368,899	93.7 (0.5)	3.1 (0.3)	2.5 (0.3)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
55 - 64	28,193	5,293,573	92.5 (0.3)	2.9 (0.2)	3.3 (0.2)	0.8 (0.1)	0.5 (0.1)
65 - 74	13,165	2,441,324	90.5 (0.5)	3.9 (0.3)	4.0 (0.3)	0.8 (0.1)	0.8 (0.1)
รวม	125,181	45,629,425	94.3 (0.2)	2.7 (0.1)	2.3 (0.1)	0.4 (0.0)	0.3 (0.0)

ตารางที่ 2.4.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>เขตการปกครอง</b>							
ในเขตเทศบาล	63,132	15,197,601	95.4 (0.3)	2.2 (0.2)	1.7 (0.1)	0.4 (0.0)	0.3 (0.0)
นอกเขตเทศบาล	62,049	30,431,824	93.8 (0.3)	2.9 (0.2)	2.6 (0.2)	0.4 (0.0)	0.3 (0.0)
<b>ภาค</b>							
กรุงเทพมหานคร	1,610	4,052,970	97.6 (0.9)	1.3 (0.6)	0.7 (0.4)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
ภาคกลาง	41,459	11,449,458	94.4 (0.3)	2.9 (0.2)	2.1 (0.2)	0.3 (0.0)	0.2 (0.0)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,173	15,586,130	94.1 (0.4)	2.6 (0.3)	2.5 (0.3)	0.4 (0.1)	0.3 (0.1)
ภาคเหนือ	27,798	8,431,148	93.6 (0.6)	2.8 (0.3)	2.7 (0.4)	0.6 (0.1)	0.3 (0.1)
ภาคใต้	23,141	6,109,718	93.5 (0.5)	3.0 (0.3)	2.7 (0.2)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)
<b>เขต สคร.</b>							
เขต สคร. ที่ 1	4,870	2,018,978	95.0 (0.6)	2.3 (0.4)	2.2 (0.4)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)
เขต สคร. ที่ 2	8,452	1,645,822	94.9 (0.7)	2.7 (0.4)	1.9 (0.3)	0.4 (0.2)	0.1 (0.0)
เขต สคร. ที่ 3	14,898	4,156,382	93.7 (0.6)	3.7 (0.5)	2.1 (0.2)	0.3 (0.1)	0.2 (0.0)
เขต สคร. ที่ 4	13,239	3,628,276	94.8 (0.6)	2.5 (0.4)	2.1 (0.3)	0.3 (0.1)	0.3 (0.1)
เขต สคร. ที่ 5	6,594	4,780,815	94.9 (0.6)	2.2 (0.4)	2.3 (0.3)	0.6 (0.1)	0.1 (0.0)
เขต สคร. ที่ 6	13,250	6,309,104	93.9 (0.8)	2.7 (0.5)	2.7 (0.5)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)
เขต สคร. ที่ 7	11,329	4,496,212	93.7 (0.7)	2.8 (0.4)	2.6 (0.3)	0.5 (0.1)	0.5 (0.1)
เขต สคร. ที่ 8	6,412	1,815,403	94.1 (0.8)	2.6 (0.5)	2.5 (0.5)	0.6 (0.2)	0.3 (0.1)
เขต สคร. ที่ 9	8,232	2,490,125	93.8 (0.8)	2.7 (0.5)	2.6 (0.4)	0.5 (0.1)	0.4 (0.1)
เขต สคร. ที่ 10	13,154	4,125,620	93.2 (1.1)	2.9 (0.4)	2.9 (0.7)	0.7 (0.2)	0.3 (0.1)
เขต สคร. ที่ 11	11,529	2,966,428	93.9 (0.8)	3.0 (0.4)	2.3 (0.3)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)
เขต สคร. ที่ 12	11,612	3,143,290	93.1 (0.5)	3.1 (0.4)	3.1 (0.3)	0.5 (0.1)	0.3 (0.1)

ตารางที่ 2.4.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
กรุงเทพมหานคร	1,610	4,052,970	97.6 (0.9)	1.3 (0.6)	0.7 (0.4)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	1,650	863,982	95.7 (1.2)	3.0 (1.1)	1.0 (0.3)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)
นนทบุรี	1,662	795,961	96.5 (0.6)	1.5 (0.3)	1.4 (0.4)	0.4 (0.2)	0.1 (0.1)
ปทุมธานี	1,542	650,501	93.5 (1.2)	2.3 (0.5)	3.8 (0.8)	0.4 (0.3)	0.1 (0.1)
พระนครศรีอยุธยา	1,666	572,517	94.5 (1.2)	3.4 (1.0)	1.6 (0.4)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)
อ่างทอง	1,731	217,588	95.9 (0.9)	2.4 (0.8)	1.3 (0.3)	0.3 (0.2)	0.1 (0.1)
ลพบุรี	1,664	557,449	94.5 (1.5)	2.0 (0.6)	2.9 (0.8)	0.7 (0.5)	0.0
สิงห์บุรี	1,663	161,838	95.7 (1.4)	2.5 (1.2)	1.5 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)
ชัยนาท	1,651	251,706	93.6 (2.1)	4.1 (1.7)	1.9 (0.5)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)
สระบุรี	1,743	457,240	95.4 (0.8)	3.1 (0.6)	1.1 (0.5)	0.3 (0.2)	0.1 (0.0)
ชลบุรี	1,618	916,727	95.2 (1.1)	2.7 (0.7)	1.6 (0.4)	0.3 (0.2)	0.3 (0.1)
ระยอง	1,647	436,650	90.2 (1.2)	5.5 (0.8)	3.6 (0.6)	0.5 (0.2)	0.3 (0.1)
จันทบุรี	1,664	375,600	93.9 (1.5)	2.6 (0.6)	2.8 (1.1)	0.4 (0.2)	0.2 (0.1)
ตราด	1,695	158,378	97.3 (1.2)	1.2 (0.4)	0.9 (0.5)	0.2 (0.2)	0.4 (0.2)
ฉะเชิงเทรา	1,690	493,282	91.6 (2.8)	5.5 (2.5)	2.5 (0.8)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)
ปราจีนบุรี	1,716	344,312	91.5 (2.1)	5.8 (1.7)	2.2 (0.9)	0.4 (0.3)	0.1 (0.1)
นครนายก	1,610	188,654	95.0 (1.6)	1.9 (0.8)	2.4 (0.8)	0.5 (0.2)	0.1 (0.1)
สระแก้ว	1,608	378,795	91.6 (1.8)	4.3 (1.4)	3.8 (1.2)	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)
ราชบุรี	1,692	615,277	96.6 (0.8)	1.0 (0.3)	1.5 (0.6)	0.2 (0.1)	0.8 (0.4)
กาญจนบุรี	1,619	558,858	92.8 (1.9)	3.7 (1.2)	2.7 (0.7)	0.8 (0.3)	0.1 (0.0)
สุพรรณบุรี	1,707	639,489	96.1 (1.2)	1.9 (0.7)	1.9 (0.7)	0.0	0.1 (0.1)
นครปฐม	1,577	623,140	95.4 (1.4)	3.3 (1.2)	1.0 (0.4)	0.0	0.2 (0.1)
สมุทรสาคร	1,657	347,586	94.6 (2.3)	1.3 (0.5)	3.6 (2.3)	0.3 (0.2)	0.2 (0.1)
สมุทรสงคราม	1,717	147,148	91.2 (4.8)	4.4 (2.6)	3.5 (1.9)	0.7 (0.4)	0.1 (0.1)
เพชรบุรี	1,621	337,742	93.8 (1.0)	2.8 (0.6)	2.1 (0.6)	0.4 (0.2)	0.9 (0.3)
ประจวบคีรีขันธ์	1,649	359,038	94.6 (2.2)	3.0 (1.3)	2.1 (1.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	1,624	1,866,980	94.7 (0.9)	2.0 (0.7)	2.4 (0.4)	0.9 (0.3)	0.0
บุรีรัมย์	1,670	1,122,079	96.2 (0.7)	2.0 (0.4)	1.2 (0.4)	0.6 (0.2)	0.1 (0.0)
สุรินทร์	1,648	991,535	94.6 (1.4)	2.6 (1.1)	2.3 (0.6)	0.5 (0.2)	0.0
ศรีสะเกษ	1,572	1,043,898	93.5 (1.6)	2.2 (0.9)	3.3 (0.7)	0.4 (0.2)	0.6 (0.2)
อุบลราชธานี	1,623	1,281,564	96.4 (0.9)	1.9 (0.4)	1.4 (0.7)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)
ยโสธร	1,705	414,600	93.8 (1.8)	4.2 (1.3)	1.7 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)
ชัยภูมิ	1,652	800,220	93.7 (1.7)	2.3 (0.5)	3.5 (1.4)	0.3 (0.2)	0.3 (0.2)
อำนาจเจริญ	1,597	257,042	94.0 (1.1)	2.1 (0.4)	2.6 (0.8)	0.2 (0.1)	1.0 (0.5)
หนองบัวลำภู	1,722	379,522	94.8 (1.1)	2.5 (0.5)	2.1 (0.6)	0.5 (0.2)	0.2 (0.1)
ขอนแก่น	1,691	1,333,552	93.8 (1.8)	2.6 (0.7)	2.7 (1.0)	0.4 (0.1)	0.5 (0.2)
อุดรธานี	1,612	1,096,660	93.1 (2.5)	2.3 (0.8)	3.8 (2.5)	0.5 (0.2)	0.3 (0.1)
เลย	1,633	444,496	91.9 (2.5)	2.3 (0.6)	5.3 (2.4)	0.3 (0.2)	0.2 (0.1)
หนองคาย	1,644	647,983	96.1 (1.0)	2.0 (0.6)	1.7 (0.5)	0.2 (0.1)	0.0

ตารางที่ 2.4.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ ใน 30 วันที่ผ่านมา จำแนกตามจำนวนวัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (weighted Frequency)	จำนวนวัน				
			0 วัน	1 - 2 วัน	3 - 7 วัน	8 - 29 วัน	30 วัน
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>							
มหาสารคาม	1,691	717,554	92.3 (4.1)	5.5 (3.8)	1.7 (0.5)	0.1 (0.1)	0.4 (0.2)
ร้อยเอ็ด	1,679	994,187	95.1 (1.5)	1.9 (0.6)	1.8 (0.4)	0.1 (0)	1.1 (0.6)
กาฬสินธุ์	1,578	695,151	93.6 (1.6)	3.1 (1.0)	2.9 (1.0)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
สกลนคร	1,544	764,894	93.7 (1.5)	3.1 (0.6)	2.2 (0.8)	0.5 (0.2)	0.5 (0.3)
นครพนม	1,631	497,910	87.2 (3.4)	4.8 (2.3)	5.3 (1.4)	1.6 (0.5)	1.0 (0.6)
มุกดาหาร	1,657	236,303	93.6 (1.3)	2.5 (0.6)	2.5 (0.5)	0.8 (0.4)	0.6 (0.3)
<b>ภาคเหนือ</b>							
เชียงใหม่	1,601	1,124,287	90.5 (3.7)	3.2 (1.0)	4.5 (2.5)	1.3 (0.5)	0.5 (0.4)
ลำพูน	1,649	310,169	96.0 (1.1)	2.7 (1.1)	0.7 (0.2)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)
ลำปาง	1,684	596,861	95.8 (0.9)	2.4 (0.7)	1.3 (0.2)	0.3 (0.2)	0.2 (0.1)
อุตรดิตถ์	1,639	340,976	95.0 (1.0)	2.1 (0.5)	2.2 (0.4)	0.4 (0.2)	0.3 (0.1)
แพร่	1,696	363,849	95.6 (1.1)	2.6 (0.6)	1.4 (0.5)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
น่าน	1,682	367,841	95.7 (1.5)	2.1 (0.8)	1.7 (0.6)	0.2 (0.1)	0.3 (0.2)
พะเยา	1,633	373,787	91.7 (2.5)	4.8 (2.3)	2.2 (0.4)	0.7 (0.2)	0.6 (0.2)
เชียงราย	1,644	846,997	92.2 (1.5)	2.7 (0.6)	4.0 (1.1)	1.0 (0.5)	0.1 (0.1)
แม่ฮ่องสอน	1,565	141,827	94.4 (1.2)	2.4 (0.7)	2.4 (0.9)	0.3 (0.1)	0.5 (0.3)
นครสวรรค์	1,630	673,917	93.8 (1.4)	2.8 (1.0)	2.3 (0.7)	0.8 (0.4)	0.2 (0.1)
อุทัยธานี	1,585	229,028	96.9 (0.4)	1.4 (0.3)	1.0 (0.3)	0.5 (0.2)	0.1 (0.1)
กำแพงเพชร	1,581	503,460	93.0 (1.4)	3.1 (0.9)	3.2 (1.1)	0.5 (0.2)	0.2 (0.1)
ตาก	1,647	328,872	93.4 (1.5)	2.4 (0.5)	2.9 (1.1)	0.9 (0.5)	0.5 (0.2)
สุโขทัย	1,677	463,355	95.4 (1.1)	2.6 (0.8)	1.6 (0.4)	0.4 (0.2)	0.0
พิษณุโลก	1,628	625,375	93.2 (2.1)	3.0 (1.7)	2.3 (0.5)	0.7 (0.3)	0.8 (0.2)
พิจิตร	1,616	408,999	94.1 (1.8)	2.3 (0.5)	2.7 (1.1)	0.5 (0.2)	0.5 (0.1)
เพชรบูรณ์	1,641	731,547	93.0 (1.4)	3.0 (0.9)	3.6 (1.0)	0.3 (0.2)	0.2 (0.1)
<b>ภาคใต้</b>							
นครศรีธรรมราช	1,620	1,090,517	96.4 (1.1)	1.9 (0.5)	1.0 (0.4)	0.4 (0.2)	0.3 (0.3)
กระบี่	1,664	297,652	93.3 (2.5)	4.2 (2.0)	1.8 (0.7)	0.5 (0.3)	0.2 (0.2)
พังงา	1,678	183,058	92.2 (4.0)	4.1 (2.5)	3.4 (1.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)
ภูเก็ต	1,680	239,341	94.5 (0.9)	3.1 (0.7)	1.3 (0.3)	0.7 (0.3)	0.4 (0.1)
สุราษฎร์ธานี	1,629	698,275	92.9 (1.3)	3.2 (0.6)	3.2 (0.7)	0.4 (0.2)	0.3 (0.1)
ระนอง	1,645	115,248	92.4 (4.0)	4.3 (2.7)	2.8 (1.4)	0.4 (0.2)	0.1 (0.1)
ชุมพร	1,613	342,338	89.3 (3.5)	4.2 (1.7)	5.1 (1.7)	0.7 (0.3)	0.7 (0.2)
สงขลา	1,629	931,471	92.4 (0.9)	4.1 (0.9)	2.9 (0.4)	0.4 (0.2)	0.2 (0.1)
สตูล	1,622	198,870	95.5 (0.9)	1.5 (0.5)	2.1 (0.4)	0.7 (0.3)	0.3 (0.2)
ตรัง	1,676	434,614	93.2 (1.0)	2.8 (0.8)	2.7 (0.6)	0.6 (0.2)	0.7 (0.4)
พัทลุง	1,698	374,692	95.2 (0.7)	1.9 (0.4)	2.6 (0.5)	0.0	0.2 (0.1)
ปัตตานี	1,673	413,970	91.0 (1.7)	3.8 (1.3)	4.3 (0.9)	0.4 (0.2)	0.5 (0.3)
ยะลา	1,625	306,851	93.6 (1.8)	2.8 (1.1)	2.4 (0.5)	1.1 (0.7)	0.2 (0.1)
นราธิวาส	1,689	482,822	93.1 (1.4)	2.6 (0.5)	3.8 (1.2)	0.5 (0.2)	0.1 (0.1)



**ส่วนที่ 3**  
**การเข้าถึงบริการ**





ตารางที่ 3.1.1 ร้อยละของผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10,509	4,781,932	95.0	0.4	94.2	95.9
25 - 34	10,605	4,596,666	97.0	0.3	96.4	97.6
35 - 44	11,620	5,148,849	97.2	0.4	96.5	97.9
45 - 54	8,807	3,989,864	97.6	0.3	96.9	98.2
55 - 64	14,396	2,484,377	96.8	0.5	95.7	97.9
65 - 74	6,523	1,120,968	95.9	0.6	94.7	97.2
รวม	62,460	22,122,657	96.6	0.2	96.2	97.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,892	4,509,251	96.2	0.4	95.5	97.0
25 - 34	10,254	4,555,495	98.0	0.4	97.4	98.7
35 - 44	12,305	5,632,336	97.9	0.3	97.3	98.4
45 - 54	9,773	4,421,853	97.3	0.3	96.6	97.9
55 - 64	14,218	2,854,841	97.8	0.3	97.2	98.3
65 - 74	6,836	1,341,875	97.3	0.4	96.5	98.0
รวม	63,278	23,315,650	97.4	0.2	97.1	97.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	20,401	9,291,183	95.6	0.3	95.0	96.3
25 - 34	20,859	9,152,161	97.5	0.2	97.0	98.0
35 - 44	23,925	10,781,185	97.6	0.2	97.1	98.0
45 - 54	18,580	8,411,717	97.4	0.3	96.9	98.0
55 - 64	28,614	5,339,218	97.3	0.3	96.6	98.0
65 - 74	13,359	2,462,843	96.7	0.4	95.9	97.4
รวมทั้งประเทศ	125,738	45,438,307	97.0	0.2	96.7	97.4

ตารางที่ 3.1.2 ร้อยละของผู้ที่ทราบว่าเป็นผู้ที่มีประกันสุขภาพ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	63,155	14,720,364	94.5	0.5	93.6	95.4
นอกเขตเทศบาล	62,583	30,717,942	98.3	0.1	98.0	98.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,425	3,571,935	86.5	1.5	83.4	89.6
ภาคกลาง	41,235	11,258,133	97.2	0.2	96.7	97.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,679	15,856,646	98.7	0.1	98.4	98.9
ภาคเหนือ	28,065	8,590,866	97.9	0.3	97.3	98.6
ภาคใต้	23,334	6,160,727	98.4	0.2	98.1	98.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,795	1,974,355	95.1	0.5	94.1	96.1
เขต สคร. ที่ 2	8,365	1,624,506	98.1	0.5	97.2	99.0
เขต สคร. ที่ 3	14,840	4,068,498	97.2	0.4	96.4	98.0
เขต สคร. ที่ 4	13,235	3,590,775	97.9	0.3	97.2	98.6
เขต สคร. ที่ 5	6,708	4,866,776	98.7	0.3	98.1	99.3
เขต สคร. ที่ 6	13,351	6,379,399	98.6	0.2	98.3	99.0
เขต สคร. ที่ 7	11,620	4,610,471	98.6	0.3	98.1	99.1
เขต สคร. ที่ 8	6,461	1,907,256	96.2	1.0	94.3	98.2
เขต สคร. ที่ 9	8,300	2,497,279	98.4	0.3	97.8	98.9
เขต สคร. ที่ 10	13,304	4,186,331	98.5	0.3	97.9	99.1
เขต สคร. ที่ 11	11,595	2,979,039	98.4	0.2	97.9	98.9
เขต สคร. ที่ 12	11,739	3,181,688	98.4	0.2	97.9	98.9

ตารางที่ 3.1.3 ร้อยละของผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,425	3,571,935	86.5	1.5	83.4	89.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,608	821,431	95.7	1.5	92.7	98.7
นนทบุรี	1,619	768,165	95.1	0.8	93.5	96.7
ปทุมธานี	1,537	644,527	92.6	1.2	90.2	95.0
พระนครศรีอยุธยา	1,639	561,663	98.1	0.5	97.2	99.0
อ่างทอง	1,729	217,144	99.5	0.2	99.1	99.9
ลพบุรี	1,583	543,174	96.7	1.3	94.2	99.3
สิงห์บุรี	1,655	159,907	97.8	1.2	95.5	100.0
ชัยนาท	1,675	252,680	99.2	0.4	98.4	99.9
สระบุรี	1,723	451,601	98.6	0.4	97.7	99.4
ชลบุรี	1,617	899,628	96.7	0.8	95.2	98.2
ระยอง	1,600	415,308	95.7	1.7	92.4	99.1
จันทบุรี	1,669	374,894	98.3	0.5	97.3	99.2
ตราด	1,668	155,782	98.1	0.7	96.7	99.4
ฉะเชิงเทรา	1,668	489,313	98.0	0.6	96.8	99.3
ปราจีนบุรี	1,686	339,075	98.8	0.6	97.7	99.9
นครนายก	1,672	189,850	99.1	0.4	98.4	99.8
สระแก้ว	1,652	383,219	98.2	0.6	97.0	99.3
ราชบุรี	1,671	607,771	99.0	0.3	98.3	99.6
กาญจนบุรี	1,653	556,403	98.2	0.6	97.1	99.2
สุพรรณบุรี	1,687	632,153	98.7	0.5	97.8	99.7
นครปฐม	1,602	612,831	96.2	1.5	93.4	99.1
สมุทรสาคร	1,641	338,172	96.8	1.7	93.5	100.0
สมุทรสงคราม	1,684	145,583	99.1	0.3	98.5	99.7
เพชรบุรี	1,637	335,160	97.1	0.7	95.7	98.5
ประจวบคีรีขันธ์	1,660	362,702	98.5	0.4	97.7	99.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,675	1,902,656	98.6	0.4	97.8	99.4
บุรีรัมย์	1,694	1,136,595	99.5	0.2	99.1	100.0
สุรินทร์	1,669	992,762	98.6	0.7	97.2	100.0
ศรีสะเกษ	1,647	1,062,684	99.0	0.4	98.3	99.7
อุบลราชธานี	1,684	1,300,118	99.2	0.3	98.6	99.7
ยโสธร	1,689	413,619	99.2	0.4	98.5	99.9
ชัยภูมิ	1,670	834,763	98.0	1.1	95.8	100.0
อำนาจเจริญ	1,635	271,529	98.5	0.5	97.5	99.5
หนองบัวลำภู	1,685	373,418	98.3	0.4	97.5	99.1
ขอนแก่น	1,686	1,332,034	98.9	0.4	98.2	99.6
อุดรธานี	1,663	1,132,726	98.9	0.3	98.3	99.5
เลย	1,660	456,391	98.4	0.5	97.4	99.4
หนองคาย	1,678	662,134	98.7	0.4	97.9	99.6

ตารางที่ 3.1.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ทราบว่ามีประกันสุขภาพ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,678	721,684	99.4	0.2	99.0 99.8
ร้อยเอ็ด	1,679	984,679	98.7	0.6	97.6 99.8
กาฬสินธุ์	1,622	716,333	97.2	1.0	95.2 99.2
สกลนคร	1,657	817,836	97.9	0.9	96.1 99.6
นครพนม	1,675	511,904	98.2	1.0	96.2 100.0
มุกดาหาร	1,633	232,779	96.0	2.4	91.3 100.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,654	1,171,015	98.6	0.8	97.0 100.0
ลำพูน	1,650	310,985	99.2	0.2	98.8 99.7
ลำปาง	1,687	601,397	99.0	0.4	98.2 99.7
อุตรดิตถ์	1,657	346,818	98.1	0.5	97.0 99.1
แพร่	1,695	366,019	99.0	0.3	98.5 99.5
น่าน	1,682	359,402	97.7	1.3	95.1 100.0
พะเยา	1,678	382,462	99.0	0.3	98.3 99.6
เชียงราย	1,662	847,210	97.6	0.8	96.0 99.2
แม่ฮ่องสอน	1,596	147,840	97.8	0.7	96.5 99.1
นครสวรรค์	1,638	752,827	94.6	1.8	91.1 98.0
อุทัยธานี	1,632	240,339	98.7	0.6	97.5 99.8
กำแพงเพชร	1,615	516,700	96.5	1.3	94.0 99.0
ตาก	1,633	324,031	96.8	1.1	94.7 99.0
สุโขทัย	1,687	459,784	99.3	0.4	98.5 100.0
พิษณุโลก	1,679	639,532	98.8	0.4	98.1 99.6
พิจิตร	1,576	397,390	97.7	0.6	96.6 98.9
เพชรบูรณ์	1,644	727,113	98.2	0.7	96.9 99.5
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,660	1,106,426	99.2	0.4	98.5 99.9
กระบี่	1,684	300,632	98.8	0.5	97.7 99.8
พังงา	1,674	182,116	99.8	0.1	99.5 100.0
ภูเก็ต	1,610	228,426	95.5	1.3	93.0 98.0
สุราษฎร์ธานี	1,618	693,417	98.0	0.4	97.1 98.8
ระนอง	1,691	119,868	99.5	0.3	98.9 100.0
ชุมพร	1,658	348,154	97.3	1.2	95.0 99.6
สงขลา	1,688	956,521	99.0	0.3	98.4 99.6
สตูล	1,669	203,295	99.0	0.4	98.3 99.7
ตรัง	1,658	437,860	98.2	0.4	97.4 99.1
พัทลุง	1,695	374,216	98.7	0.3	98.2 99.2
ปัตตานี	1,650	412,767	96.6	1.3	94.0 99.1
ยะลา	1,681	311,756	96.9	1.3	94.4 99.4
นราธิวาส	1,698	485,272	99.5	0.2	99.1 99.8

ตารางที่ 3.1.4 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,706	3,903,547	78.4	1.4	75.7	81.2
25 - 34	7,132	3,143,335	67.2	1.0	65.3	69.1
35 - 44	8,451	3,848,127	73.5	1.0	71.6	75.4
45 - 54	6,388	3,000,021	74.2	1.5	71.3	77.1
55 - 64	11,317	2,011,666	79.0	0.9	77.2	80.9
65 - 74	5,172	929,275	80.4	1.0	78.4	82.3
รวม	47,166	16,835,972	74.4	0.8	72.8	76.0
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,974	3,623,685	78.3	0.9	76.6	80.0
25 - 34	6,527	3,004,030	65.7	0.9	64.0	67.4
35 - 44	8,912	4,167,155	73.1	0.8	71.5	74.7
45 - 54	7,214	3,368,029	75.1	0.9	73.3	77.0
55 - 64	11,557	2,343,905	80.7	0.7	79.4	82.1
65 - 74	5,522	1,116,967	81.5	0.8	80.0	83.1
รวม	47,706	17,623,771	74.5	0.6	73.3	75.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	16,680	7,527,232	78.3	1.0	76.4	80.3
25 - 34	13,659	6,147,366	66.5	0.7	65.0	67.9
35 - 44	17,363	8,015,282	73.3	0.8	71.8	74.8
45 - 54	13,602	6,368,049	74.7	1.1	72.6	76.8
55 - 64	22,874	4,355,571	79.9	0.7	78.6	81.3
65 - 74	10,694	2,046,242	81.0	0.7	79.7	82.3
รวมทั้งประเทศ	94,872	34,459,742	74.4	0.7	73.2	75.7

ตารางที่ 3.1.5 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	43,892	9,792,624	64.0	0.9	62.2	65.8
นอกเขตเทศบาล	50,980	24,667,118	79.6	0.9	77.8	81.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	977	2,367,012	58.8	2.9	52.8	64.7
ภาคกลาง	28,644	7,470,748	65.4	0.8	63.9	67.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25,781	13,006,567	81.5	1.4	78.7	84.4
ภาคเหนือ	21,497	6,768,389	78.1	1.5	75.0	81.1
ภาคใต้	17,973	4,847,027	77.8	1.1	75.7	80.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	2,734	1,040,683	51.1	1.9	47.4	54.8
เขต สคร. ที่ 2	5,920	1,157,359	70.3	1.6	67.2	73.5
เขต สคร. ที่ 3	10,247	2,601,583	63.5	1.2	61.1	65.9
เขต สคร. ที่ 4	9,743	2,671,123	73.5	1.2	71.1	75.9
เขต สคร. ที่ 5	5,243	3,916,202	80.2	2.1	76.0	84.4
เขต สคร. ที่ 6	11,051	5,129,292	79.6	3.0	73.7	85.5
เขต สคร. ที่ 7	9,487	3,961,074	85.6	0.8	83.9	87.3
เขต สคร. ที่ 8	5,285	1,512,857	77.6	5.8	66.3	88.9
เขต สคร. ที่ 9	6,372	2,033,666	80.9	1.6	77.8	84.0
เขต สคร. ที่ 10	9,840	3,221,867	76.6	1.3	74.0	79.2
เขต สคร. ที่ 11	8,871	2,374,745	79.0	1.4	76.3	81.7
เขต สคร. ที่ 12	9,102	2,472,282	76.8	1.7	73.5	80.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.1.6 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	977	2,367,012	58.8	2.9	52.8	64.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	928	424,528	50.2	2.9	44.6	55.9
นนทบุรี	913	379,684	47.6	3.7	40.4	54.8
ปทุมธานี	878	350,757	52.1	2.5	47.2	56.9
พระนครศรีอยุธยา	943	310,243	54.7	2.4	50.0	59.3
อ่างทอง	1,188	148,582	68.4	2.9	62.7	74.0
ลพบุรี	1,190	428,557	76.9	2.8	71.4	82.3
สิงห์บุรี	1,141	113,235	69.4	2.3	64.9	74.0
ชัยนาท	1,341	199,748	79.6	2.3	75.0	84.1
สระบุรี	1,060	267,238	58.6	3.5	51.7	65.4
ชลบุรี	1,045	520,753	58.8	2.1	54.7	62.9
ระยอง	1,073	262,995	64.0	4.6	54.9	73.1
จันทบุรี	1,309	279,599	73.8	3.3	67.2	80.3
ตราด	1,247	122,548	77.4	4.3	69.0	85.8
ฉะเชิงเทรา	1,131	341,806	68.7	2.3	64.1	73.2
ปราจีนบุรี	1,091	213,625	62.4	4.2	54.2	70.5
นครนายก	1,117	129,959	68.0	3.2	61.6	74.4
สระแก้ว	1,306	305,771	78.9	2.2	74.6	83.2
ราชบุรี	1,291	467,900	77.0	2.1	72.8	81.2
กาญจนบุรี	1,248	432,069	76.8	3.1	70.7	83.0
สุพรรณบุรี	1,337	511,835	80.3	2.1	76.3	84.4
นครปฐม	1,130	412,090	65.4	3.4	58.8	72.0
สมุทรสาคร	1,054	219,143	63.0	6.4	50.4	75.5
สมุทรสงคราม	1,246	110,019	75.5	2.2	71.2	79.7
เพชรบุรี	1,192	241,530	70.3	2.8	64.9	75.7
ประจวบคีรีขันธ์	1,245	276,537	76.9	3.1	70.8	83.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,213	1,388,272	73.2	4.5	64.4	82.0
บุรีรัมย์	1,400	983,795	86.3	2.8	80.8	91.9
สุรินทร์	1,322	828,238	82.8	3.6	75.7	90.0
ศรีสะเกษ	1,383	949,917	89.3	2.1	85.2	93.4
อุบลราชธานี	1,303	1,043,971	81.4	1.2	79.0	83.7
ยโสธร	1,320	349,493	84.1	2.4	79.3	88.8
ชัยภูมิ	1,308	715,897	84.6	2.8	79.2	90.1
อำนาจเจริญ	1,378	241,535	87.6	1.7	84.2	91.1
หนองบัวลำภู	1,467	326,110	85.9	1.5	82.9	88.9
ขอนแก่น	1,373	1,043,363	77.6	5.1	67.6	87.6
อุดรธานี	1,386	969,184	84.8	2.0	80.8	88.8
เลย	1,414	391,918	84.5	2.6	79.4	89.7
หนองคาย	1,386	550,632	82.4	3.0	76.6	88.3

ตารางที่ 3.1.6 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,281	599,057	82.8	3.7	75.6 - 89.9
ร้อยเอ็ด	1,311	612,761	61.8	13.0	36.2 - 87.3
กาฬสินธุ์	1,433	636,267	87.5	1.9	83.8 - 91.1
สกลนคร	1,373	717,164	86.7	2.4	82.0 - 91.3
นครพนม	1,310	449,782	86.3	1.7	82.9 - 89.7
มุกดาหาร	1,420	209,211	86.6	3.3	80.0 - 93.1
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,219	856,083	73.5	3.4	66.9 - 80.1
ลำพูน	1,163	213,592	71.5	3.2	65.2 - 77.7
ลำปาง	1,237	452,222	74.4	2.3	69.9 - 79.0
อุตรดิตถ์	1,227	261,658	74.1	3.3	67.8 - 80.5
แพร่	1,230	272,869	74.2	2.5	69.3 - 79.2
น่าน	1,181	290,987	79.2	3.7	72.0 - 86.4
พะเยา	1,307	303,232	78.7	2.1	74.6 - 82.8
เชียงราย	1,366	715,263	82.5	3.2	76.3 - 88.7
แม่ฮ่องสอน	1,137	117,618	79.1	4.3	70.5 - 87.6
นครสวรรค์	1,296	522,750	65.7	10.1	45.8 - 85.5
อุทัยธานี	1,279	205,720	86.4	3.0	80.5 - 92.3
กำแพงเพชร	1,424	459,053	86.6	1.9	82.9 - 90.4
ตาก	1,250	264,466	79.3	3.2	73.1 - 85.5
สุโขทัย	1,341	382,376	84.5	2.8	79.0 - 90.1
พิษณุโลก	1,180	502,482	78.7	3.1	72.6 - 84.8
พิจิตร	1,286	325,334	84.4	2.3	79.9 - 88.8
เพชรบูรณ์	1,374	622,685	84.4	4.0	76.6 - 92.3
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,347	902,793	81.1	2.9	75.4 - 86.9
กระบี่	1,292	241,047	79.7	2.9	74.0 - 85.4
พังงา	1,243	149,610	82.0	2.4	77.4 - 86.7
ภูเก็ต	1,086	141,912	59.6	3.8	52.2 - 67.0
สุราษฎร์ธานี	1,298	564,467	80.7	2.4	76.0 - 85.4
ระนอง	1,337	88,782	74.0	3.9	66.2 - 81.7
ชุมพร	1,268	286,134	81.6	3.6	74.5 - 88.6
สงขลา	1,162	614,701	64.1	3.5	57.2 - 71.1
สตูล	1,356	174,742	85.7	2.2	81.4 - 90.0
ตรัง	1,284	355,898	79.9	3.0	74.0 - 85.8
พัทลุง	1,259	298,438	78.8	3.2	72.5 - 85.1
ปัตตานี	1,338	362,614	85.1	2.2	80.8 - 89.4
ยะลา	1,323	259,029	80.9	2.3	76.2 - 85.5
นราธิวาส	1,380	406,859	83.5	3.6	76.5 - 90.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.1.7 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,215	546,315	11.2	0.6	10.0	12.4
25 - 34	3,159	1,349,812	29.1	0.9	27.4	30.8
35 - 44	2,146	943,859	18.3	0.7	16.9	19.8
45 - 54	1,074	471,678	11.9	0.7	10.5	13.2
55 - 64	728	130,165	5.2	0.4	4.4	6.1
65 - 74	107	26,330	2.3	0.4	1.5	3.1
<b>รวม</b>	<b>8,429</b>	<b>3,468,159</b>	<b>15.6</b>	<b>0.4</b>	<b>14.7</b>	<b>16.4</b>
<b>หญิง</b>						
15 - 24	1,338	619,845	13.6	0.6	12.4	14.8
25 - 34	3,147	1,351,861	29.7	0.9	28.0	31.3
35 - 44	2,030	949,364	17.0	0.6	15.7	18.2
45 - 54	964	464,519	10.6	0.7	9.2	12.0
55 - 64	462	129,377	4.5	0.4	3.8	5.3
65 - 74	87	20,431	1.5	0.3	0.9	2.2
<b>รวม</b>	<b>8,028</b>	<b>3,535,398</b>	<b>15.2</b>	<b>0.4</b>	<b>14.5</b>	<b>15.9</b>
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	2,553	1,166,160	12.4	0.5	11.4	13.3
25 - 34	6,306	2,701,673	29.4	0.7	28.0	30.7
35 - 44	4,176	1,893,223	17.6	0.6	16.5	18.7
45 - 54	2,038	936,197	11.2	0.6	10.1	12.3
55 - 64	1,190	259,542	4.9	0.3	4.3	5.5
65 - 74	194	46,761	1.9	0.3	1.4	2.4
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>16,457</b>	<b>7,003,556</b>	<b>15.4</b>	<b>0.3</b>	<b>14.7</b>	<b>16.1</b>

ตารางที่ 3.1.8 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
<i>ในเขตเทศบาล</i>	9,638	3,377,059	22.4	0.6	21.2	23.6
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	6,819	3,626,497	11.9	0.4	11.1	12.7
<b>ภาค</b>						
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	385	1,065,509	27.1	1.8	23.4	30.9
<i>ภาคกลาง</i>	8,060	2,795,303	24.7	0.6	23.5	26.0
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	2,804	1,572,068	10.0	0.5	9.0	10.9
<i>ภาคเหนือ</i>	2,811	872,239	10.3	0.6	9.2	11.5
<i>ภาคใต้</i>	2,397	698,438	11.4	0.7	9.9	12.8
<b>เขต สคร.</b>						
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	1,343	672,293	32.9	1.8	29.4	36.5
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	1,551	342,501	21.2	1.3	18.6	23.8
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	3,049	1,155,560	28.4	1.1	26.3	30.5
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	2,117	624,949	17.4	0.9	15.7	19.1
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	744	629,346	12.9	1.1	10.7	15.2
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	1,106	595,862	9.4	0.6	8.2	10.7
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	954	346,859	7.7	0.7	6.4	8.9
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	539	139,705	7.6	0.9	5.9	9.3
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	796	209,482	8.5	0.8	7.0	10.1
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	1,476	523,052	12.6	0.9	10.9	14.4
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	1,293	301,321	10.3	0.7	8.9	11.7
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	1,104	397,117	12.4	1.2	10.0	14.8

ตารางที่ 3.1.9 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	385	1,065,509	27.1	1.8	23.4	30.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	606	359,402	42.1	2.1	38.0	46.2
นนทบุรี	434	271,301	33.8	3.4	27.2	40.4
ปทุมธานี	469	218,267	32.3	2.9	26.6	38.0
พระนครศรีอยุธยา	440	182,725	32.5	2.4	27.8	37.2
อ่างทอง	341	48,807	22.4	2.5	17.5	27.3
ลพบุรี	243	82,696	15.8	1.8	12.4	19.3
สิงห์บุรี	300	30,925	19.0	1.5	16.0	22.0
ชัยนาท	153	27,849	11.0	1.4	8.4	13.7
สระบุรี	514	152,223	33.2	3.4	26.6	39.9
ชลบุรี	408	284,510	32.2	2.5	27.2	37.1
ระยอง	416	134,707	35.8	3.4	29.2	42.4
จันทบุรี	175	49,059	12.9	1.3	10.3	15.5
ตราด	150	12,145	7.7	1.6	4.5	10.8
ฉะเชิงเทรา	442	128,506	25.8	1.7	22.5	29.1
ปราจีนบุรี	399	103,208	30.1	4.7	20.9	39.4
นครนายก	272	38,936	20.3	1.4	17.5	23.2
สระแก้ว	181	45,087	11.7	2.2	7.5	15.9
ราชบุรี	288	103,614	17.1	1.6	14.0	20.2
กาญจนบุรี	209	75,021	13.6	2.6	8.5	18.6
สุพรรณบุรี	171	65,623	10.4	1.5	7.6	13.3
นครปฐม	324	137,148	21.8	1.8	18.2	25.4
สมุทรสาคร	435	110,289	32.6	2.7	27.4	37.9
สมุทรสงคราม	237	26,136	18.0	2.1	13.9	22.2
เพชรบุรี	204	48,861	14.3	1.2	11.9	16.7
ประจวบคีรีขันธ์	249	58,258	16.9	3.2	10.7	23.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	246	296,737	15.8	1.5	12.8	18.7
บุรีรัมย์	120	94,095	8.3	2.7	2.9	13.6
สุรินทร์	215	167,213	16.7	2.8	11.2	22.1
ศรีสะเกษ	89	37,173	3.7	1.0	1.7	5.7
อุบลราชธานี	172	141,978	11.2	1.0	9.2	13.3
ยโสธร	147	34,165	8.2	2.1	4.1	12.3
ชัยภูมิ	163	71,302	8.4	2.0	4.5	12.3
อำนาจเจริญ	76	11,919	4.3	1.2	2.0	6.7
หนองบัวลำภู	118	29,215	7.7	1.1	5.6	9.8
ขอนแก่น	198	151,318	11.3	1.2	8.9	13.7
อุดรธานี	120	89,497	7.9	1.5	4.8	10.9
เลย	70	20,204	4.4	0.5	3.5	5.3
หนองคาย	151	67,731	10.3	2.5	5.4	15.1

ตารางที่ 3.1.9 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	189	84,961	11.8	2.8	6.3 17.4
ร้อยเอ็ด	150	92,349	9.4	1.3	6.8 12.1
กาฬสินธุ์	110	60,586	9.2	1.9	5.4 13.0
สกลนคร	149	68,581	8.4	2.3	3.9 12.9
นครพนม	140	31,303	6.1	1.2	3.8 8.3
มุกดาหาร	181	21,742	9.7	1.9	6.0 13.4
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	212	172,730	15.0	2.6	9.9 20.0
ลำพูน	302	65,987	24.2	2.5	19.2 29.2
ลำปาง	219	81,868	13.5	1.6	10.3 16.6
อุตรดิตถ์	174	37,416	10.7	1.5	7.8 13.6
แพร่	145	34,659	9.7	1.3	7.1 12.2
น่าน	161	36,825	10.2	2.2	5.9 14.4
พะเยา	134	33,898	8.9	1.1	6.7 11.1
เชียงราย	143	77,672	9.0	1.8	5.5 12.6
แม่ฮ่องสอน	160	19,413	14.1	3.2	7.7 20.4
นครสวรรค์	160	51,854	6.6	1.1	4.3 8.8
อุทัยธานี	148	17,142	7.5	2.1	3.3 11.7
กำแพงเพชร	116	41,167	7.9	1.4	5.1 10.7
ตาก	161	31,985	9.8	1.5	6.8 12.8
สุโขทัย	162	39,400	9.1	2.0	5.2 13.1
พิษณุโลก	186	59,887	9.8	2.1	5.7 14.0
พิจิตร	115	29,541	9.8	2.2	5.6 14.1
เพชรบูรณ์	113	40,794	5.5	1.4	2.8 8.3
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	126	85,400	7.7	1.4	4.9 10.4
กระบี่	137	29,954	9.9	1.6	6.8 13.0
พังงา	173	19,251	10.6	2.0	6.7 14.5
ภูเก็ต	391	68,847	29.1	2.1	24.9 33.3
สุราษฎร์ธานี	120	52,986	7.8	1.2	5.4 10.2
ระนอง	197	19,907	16.6	2.5	11.8 21.5
ชุมพร	149	24,977	8.3	1.4	5.5 11.2
สงขลา	331	239,101	24.9	2.6	19.9 30.0
สตูล	143	15,228	7.7	1.2	5.3 10.1
ตรัง	155	40,875	9.3	2.0	5.3 13.2
พัทลุง	147	31,803	8.4	1.6	5.2 11.6
ปัตตานี	112	23,913	5.7	1.0	3.7 7.6
ยะลา	118	21,979	6.9	1.3	4.4 9.4
นราธิวาส	98	24,218	5.0	1.1	2.9 7.1

ตารางที่ 3.1.10 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	581	282,251	5.8	1.4	3.1	8.5
25 - 34	483	169,778	3.7	0.3	3.0	4.3
35 - 44	887	307,402	6.0	0.6	4.8	7.1
45 - 54	1,170	436,861	11.0	1.4	8.2	13.8
55 - 64	2,162	313,955	12.6	0.6	11.3	13.8
65 - 74	1,187	166,821	14.7	0.7	13.4	16.1
รวม	6,470	1,677,068	7.5	0.6	6.3	8.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	549	213,592	4.7	0.4	3.9	5.5
25 - 34	630	212,755	4.7	0.4	4.0	5.4
35 - 44	1,040	396,639	7.1	0.5	6.2	8.0
45 - 54	1,295	485,637	11.0	0.8	9.4	12.7
55 - 64	1,935	335,633	11.8	0.5	10.8	12.8
65 - 74	1,206	201,192	15.1	0.7	13.6	16.6
รวม	6,655	1,845,447	7.9	0.4	7.2	8.7
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,130	495,843	5.3	0.8	3.6	6.9
25 - 34	1,113	382,533	4.2	0.3	3.6	4.7
35 - 44	1,927	704,041	6.6	0.5	5.7	7.4
45 - 54	2,465	922,498	11.0	1.0	9.0	13.1
55 - 64	4,097	649,588	12.2	0.5	11.2	13.1
65 - 74	2,393	368,012	14.9	0.6	13.8	16.1
รวมทั้งประเทศ	13,125	3,522,516	7.7	0.5	6.8	8.7

ตารางที่ 3.1.11 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
<i>ในเขตเทศบาล</i>	9,086	1,530,672	10.2	0.3	9.6	10.8
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	4,039	1,991,844	6.5	0.7	5.1	8.0
<b>ภาค</b>						
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	108	223,736	5.8	0.6	4.5	7.1
<i>ภาคกลาง</i>	4,171	937,885	8.3	0.4	7.5	9.1
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	2,945	1,065,045	6.8	1.0	4.8	8.8
<i>ภาคเหนือ</i>	3,152	758,334	9.0	1.6	5.8	12.2
<i>ภาคใต้</i>	2,749	537,515	8.7	0.5	7.8	9.7
<b>เขต สคร.</b>						
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	598	216,489	10.6	0.9	8.9	12.3
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	753	98,776	6.1	0.5	5.1	7.2
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	1,492	327,957	8.1	0.9	6.3	9.8
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	1,328	294,663	8.2	0.5	7.2	9.3
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	674	244,815	5.1	0.6	3.8	6.3
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	1,151	592,966	9.4	2.4	4.7	14.0
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	1,120	227,264	5.0	0.4	4.2	5.9
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	583	249,722	13.6	6.6	0.7	26.5
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	920	170,774	7.0	0.8	5.5	8.4
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	1,649	337,838	8.2	0.7	6.8	9.5
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	1,272	221,627	7.6	0.6	6.3	8.8
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	1,477	315,888	9.8	0.7	8.4	11.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.1.12 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาของข้าราชการ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	108	223,736	5.8	0.6	4.5	7.1
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	92	41,405	4.9	0.6	3.6	6.1
นนทบุรี	223	99,528	12.4	1.4	9.5	15.2
ปทุมธานี	163	61,009	9.1	1.1	7.0	11.3
พระนครศรีอยุธยา	212	55,952	9.9	1.8	6.3	13.5
อ่างทอง	151	15,137	6.9	0.8	5.3	8.6
ลพบุรี	125	24,203	4.7	1.0	2.6	6.7
สิงห์บุรี	207	14,544	8.9	1.2	6.5	11.3
ชัยนาท	145	21,266	8.4	1.3	5.8	11.1
สระบุรี	125	23,626	5.2	0.8	3.6	6.7
ชลบุรี	171	107,311	12.1	2.9	6.3	17.8
ระยอง	122	32,631	9.0	2.1	4.8	13.1
จันทบุรี	188	46,901	12.3	3.1	6.2	18.5
ตราด	217	13,955	8.8	1.5	5.9	11.7
ฉะเชิงเทรา	91	18,399	3.7	0.9	1.9	5.5
ปราจีนบุรี	176	19,685	5.7	1.7	2.4	9.1
นครนายก	294	21,513	11.2	2.0	7.4	15.1
สระแก้ว	141	26,157	6.7	2.6	1.7	11.8
ราชบุรี	199	69,561	11.5	1.4	8.8	14.2
กาญจนบุรี	172	43,017	7.8	1.0	5.9	9.7
สุพรรณบุรี	147	40,977	6.5	1.3	3.8	9.1
นครปฐม	141	49,643	7.9	1.4	5.1	10.7
สมุทรสาคร	133	18,930	5.5	1.1	3.2	7.7
สมุทรสงคราม	173	8,787	6.1	1.1	4.0	8.2
เพชรบุรี	207	37,388	10.9	2.3	6.3	15.5
ประจวบคีรีขันธ์	156	26,360	7.8	1.1	5.6	10.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	125	105,765	5.7	1.3	3.2	8.2
บุรีรัมย์	153	51,443	4.5	1.5	1.6	7.4
สุรินทร์	202	42,916	4.3	0.8	2.7	6.0
ศรีสะเกษ	138	37,715	3.7	0.8	2.1	5.3
อุบลราชธานี	162	70,093	5.6	1.0	3.6	7.5
ยโสธร	180	20,747	5.0	1.0	2.9	7.0
ชัยภูมิ	194	44,692	5.3	0.7	3.8	6.7
อำนาจเจริญ	122	11,897	4.3	0.8	2.7	5.9
หนองบัวลำภู	90	13,875	3.7	0.7	2.3	5.0
ขอนแก่น	182	149,182	11.1	3.7	3.8	18.4
อุดรธานี	140	66,344	5.8	1.1	3.6	8.0
เลย	142	33,276	7.2	2.2	2.8	11.5
หนองคาย	132	41,293	6.3	1.7	3.0	9.5

ตารางที่ 3.1.12 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาของข้าราชการ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	208	43,612	6.0	1.5	3.1 8.9
ร้อยเอ็ด	172	213,403	21.8	10.7	0.7 42.9
กาฬสินธุ์	85	31,980	4.9	0.8	3.2 6.5
สกลนคร	168	45,975	5.6	1.0	3.6 7.7
นครพนม	205	25,119	4.8	0.9	3.2 6.5
มุกดาหาร	145	15,719	7.0	2.1	3.0 11.1
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	160	97,923	8.5	1.9	4.7 12.2
ลำพูน	162	25,630	9.4	1.4	6.6 12.3
ลำปาง	143	40,378	6.6	1.1	4.5 8.8
อุตรดิตถ์	207	34,693	9.9	1.6	6.6 13.1
แพร่	232	41,287	11.5	1.0	9.4 13.5
น่าน	332	32,058	8.9	1.7	5.5 12.2
พะเยา	176	32,850	8.6	1.2	6.2 11.0
เชียงราย	120	45,452	5.3	1.2	2.9 7.6
แม่ฮ่องสอน	324	22,261	16.0	3.3	9.6 22.4
นครสวรรค์	183	188,112	23.7	11.9	0.3 47.0
อุทัยธานี	189	14,800	6.6	1.3	4.0 9.1
กำแพงเพชร	87	20,898	4.0	0.9	2.3 5.8
ตาก	199	24,744	7.5	2.1	3.4 11.6
สุโขทัย	145	23,393	5.4	1.5	2.5 8.3
พิษณุโลก	253	49,546	8.2	1.4	5.4 11.0
พิจิตร	124	25,911	8.6	2.4	3.9 13.3
เพชรบูรณ์	116	38,398	5.2	1.8	1.7 8.6
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	162	72,815	6.6	1.0	4.5 8.6
กระบี่	222	24,524	8.1	2.2	3.9 12.4
พังงา	219	9,407	5.2	1.0	3.1 7.2
ภูเก็ต	91	12,490	5.3	1.3	2.7 7.9
สุราษฎร์ธานี	180	60,826	9.0	1.7	5.7 12.2
ระนอง	184	12,401	10.3	3.3	3.8 16.8
ชุมพร	214	29,163	9.6	1.7	6.2 13.0
สงขลา	242	126,888	13.2	1.7	10.0 16.5
สตูล	193	13,511	6.9	1.2	4.6 9.1
ตรัง	202	37,814	8.5	0.9	6.7 10.4
พัทลุง	270	41,078	10.9	1.6	7.7 14.0
ปัตตานี	184	25,375	6.0	1.2	3.7 8.3
ยะลา	188	22,522	7.0	1.1	4.9 9.2
นราธิวาส	198	48,701	10.0	2.6	5.0 15.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.1.13 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	104	58,872	1.2	0.2	0.8	1.7
25 - 34	129	65,486	1.4	0.2	0.9	1.9
35 - 44	194	81,891	1.6	0.2	1.2	2.0
45 - 54	197	84,767	2.1	0.3	1.5	2.8
55 - 64	252	37,119	1.5	0.1	1.2	1.8
65 - 74	104	16,609	1.5	0.3	1.0	2.0
รวม	980	344,745	1.6	0.2	1.2	1.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	99	53,547	1.2	0.2	0.8	1.5
25 - 34	176	80,747	1.8	0.2	1.4	2.2
35 - 44	172	73,786	1.3	0.2	1.0	1.6
45 - 54	165	60,981	1.4	0.2	1.1	1.7
55 - 64	215	35,000	1.2	0.1	1.0	1.5
65 - 74	103	20,540	1.5	0.2	1.1	2.0
รวม	930	324,601	1.4	0.1	1.2	1.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	203	112,420	1.2	0.1	0.9	1.5
25 - 34	305	146,233	1.6	0.2	1.3	1.9
35 - 44	366	155,678	1.5	0.2	1.1	1.8
45 - 54	362	145,748	1.7	0.2	1.4	2.1
55 - 64	467	72,119	1.4	0.1	1.2	1.5
65 - 74	207	37,148	1.5	0.2	1.1	1.9
รวมทั้งประเทศ	1,910	669,346	1.5	0.1	1.3	1.7

ตารางที่ 3.1.14 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>เขตการปกครอง</b>					
<i>ในเขตเทศบาล</i>	1,222	300,885	2.0	0.1	1.8 2.2
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	688	368,461	1.2	0.2	0.9 1.5
<b>ภาค</b>					
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	19	36,156	0.9	0.2	0.4 1.4
<i>ภาคกลาง</i>	699	236,876	2.1	0.2	1.7 2.5
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	338	170,579	1.1	0.3	0.6 1.6
<i>ภาคเหนือ</i>	445	107,467	1.3	0.1	1.0 1.5
<i>ภาคใต้</i>	409	118,268	1.9	0.2	1.5 2.4
<b>เขต สคร.</b>					
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	167	87,249	4.3	0.8	2.8 5.9
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	110	22,645	1.4	0.2	0.9 1.9
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	267	86,096	2.1	0.3	1.5 2.8
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	155	40,886	1.1	0.2	0.8 1.5
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	90	36,630	0.8	0.1	0.5 1.0
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	134	109,317	1.7	0.6	0.5 2.9
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	114	24,633	0.5	0.1	0.4 0.7
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	84	20,933	1.1	0.3	0.5 1.8
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	133	26,184	1.1	0.2	0.7 1.4
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	228	60,350	1.5	0.2	1.1 1.8
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	159	35,300	1.2	0.2	0.8 1.6
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	250	82,968	2.6	0.4	1.9 3.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.1.15 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาของรัฐบาลของรัฐบาล  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	19	36,156	0.9	0.2	0.4	1.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	34	17,129	2.0	0.5	1.0	3.1
นนทบุรี	79	53,246	6.6	1.6	3.5	9.8
ปทุมธานี	45	20,111	3.1	0.6	1.9	4.3
พระนครศรีอยุธยา	43	13,892	2.5	0.6	1.2	3.7
อ่างทอง	27	2,873	1.3	0.4	0.6	2.0
ลพบุรี	20	5,145	1.0	0.4	0.2	1.8
สิงห์บุรี	15	1,252	0.8	0.2	0.3	1.2
ชัยนาท	12	1,660	0.7	0.3	0.1	1.2
สระบุรี	36	11,716	2.6	0.7	1.2	3.9
ชลบุรี	35	22,496	2.6	0.5	1.5	3.7
ระยอง	79	28,964	7.9	2.6	2.9	13.0
จันทบุรี	19	3,519	0.9	0.3	0.3	1.6
ตราด	19	1,103	0.7	0.3	0.0	1.4
ฉะเชิงเทรา	21	5,431	1.1	0.4	0.3	1.9
ปราจีนบุรี	17	3,263	1.0	0.4	0.3	1.6
นครนายก	31	2,846	1.5	0.5	0.5	2.5
สระแก้ว	12	1,345	0.3	0.1	0.1	0.6
ราชบุรี	10	4,565	0.8	0.4	0.0	1.6
กาญจนบุรี	24	7,202	1.3	0.4	0.5	2.1
สุพรรณบุรี	30	8,359	1.3	0.7	0.0	2.7
นครปฐม	28	8,088	1.3	0.5	0.4	2.2
สมุทรสาคร	22	5,035	1.5	0.6	0.3	2.6
สมุทรสงคราม	11	810	0.6	0.2	0.1	1.0
เพชรบุรี	18	4,003	1.2	0.4	0.4	2.0
ประจวบคีรีขันธ์	12	2,823	0.8	0.3	0.2	1.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	17	10,531	0.6	0.2	0.1	1.0
บุรีรัมย์	17	6,603	0.6	0.2	0.2	1.0
สุรินทร์	30	9,766	1.0	0.2	0.5	1.5
ศรีสะเกษ	18	5,042	0.5	0.2	0.1	0.9
อุบลราชธานี	17	6,485	0.5	0.2	0.1	0.9
ยโสธร	7	1,111	0.3	0.1	0.0	0.6
ชัยภูมิ	26	9,731	1.1	0.4	0.4	1.9
อำนาจเจริญ	8	645	0.2	0.1	0.1	0.4
หนองบัวลำภู	7	1,680	0.4	0.3	0.0	1.0
ขอนแก่น	19	30,221	2.3	1.2	0.0	4.7
อุดรธานี	21	12,468	1.1	0.4	0.4	1.8
เลย	14	5,676	1.2	0.8	0.0	2.8
หนองคาย	15	5,027	0.8	0.3	0.3	1.3

ตารางที่ 3.1.15 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาของรัฐบาลของรัฐวิสาหกิจ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	19	4,509	0.6	0.2	0.2 1.1
ร้อยเอ็ด	23	42,928	4.4	2.7	0.0 9.7
กาฬสินธุ์	16	6,809	1.0	0.3	0.4 1.7
สกลนคร	29	6,451	0.8	0.3	0.2 1.4
นครพนม	19	2,664	0.5	0.2	0.1 0.9
มุกดาหาร	16	2,235	1.0	0.4	0.3 1.7
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	35	23,078	2.0	0.4	1.2 2.9
ลำพูน	19	3,839	1.4	0.4	0.7 2.2
ลำปาง	55	14,311	2.4	0.8	0.7 4.0
อุตรดิตถ์	32	4,996	1.4	0.3	0.8 2.1
แพร่	26	3,773	1.0	0.3	0.5 1.6
น่าน	32	5,180	1.4	0.5	0.5 2.3
พะเยา	15	2,995	0.8	0.3	0.2 1.4
เชียงราย	17	6,393	0.7	0.2	0.3 1.2
แม่ฮ่องสอน	29	781	0.6	0.2	0.1 1.0
นครสวรรค์	12	5,358	0.7	0.3	0.2 1.2
อุทัยธานี	24	2,096	0.9	0.5	0.0 1.8
กำแพงเพชร	24	9,338	1.8	0.9	0.0 3.6
ตาก	16	1,385	0.4	0.1	0.2 0.7
สุโขทัย	18	3,704	0.9	0.4	0.1 1.7
พิษณุโลก	41	9,642	1.6	0.6	0.4 2.8
พิจิตร	24	4,141	1.4	0.4	0.6 2.2
เพชรบูรณ์	26	6,457	0.9	0.2	0.4 1.3
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	26	14,260	1.3	0.4	0.4 2.1
กระบี่	16	1,331	0.4	0.1	0.2 0.7
พังงา	27	1,671	0.9	0.3	0.3 1.5
ภูเก็ต	18	2,211	0.9	0.3	0.4 1.4
สุราษฎร์ธานี	15	7,033	1.0	0.3	0.4 1.7
ระนอง	15	966	0.8	0.3	0.3 1.3
ชุมพร	42	7,828	2.6	1.1	0.4 4.9
สงขลา	107	61,399	6.4	1.1	4.2 8.6
สตูล	36	2,667	1.4	0.4	0.6 2.1
ตรัง	28	4,738	1.1	0.3	0.4 1.7
พัทลุง	20	3,992	1.1	0.3	0.5 1.6
ปัตตานี	15	1,939	0.5	0.1	0.2 0.7
ยะลา	28	3,144	1.0	0.2	0.5 1.5
นราธิวาส	16	5,090	1.0	0.4	0.3 1.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.1.16 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	546	236,435	4.9	0.5	3.9	5.8
25 - 34	766	301,181	6.5	0.4	5.7	7.3
35 - 44	960	378,917	7.4	0.5	6.5	8.3
45 - 54	700	251,491	6.4	0.6	5.2	7.5
55 - 64	902	130,310	5.2	0.4	4.5	6.0
65 - 74	275	37,826	3.4	0.4	2.6	4.1
รวม	4,149	1,336,160	6.0	0.3	5.5	6.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	482	208,958	4.6	0.4	3.9	5.4
25 - 34	766	323,524	7.2	0.5	6.2	8.1
35 - 44	817	334,317	6.0	0.4	5.1	6.9
45 - 54	640	266,602	6.1	0.5	5.0	7.1
55 - 64	783	134,412	4.7	0.3	4.1	5.3
65 - 74	219	42,796	3.2	0.4	2.4	4.1
รวม	3,707	1,310,608	5.7	0.2	5.2	6.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,028	445,393	4.7	0.3	4.1	5.4
25 - 34	1,532	624,705	6.9	0.4	6.1	7.6
35 - 44	1,777	713,234	6.7	0.4	6.0	7.4
45 - 54	1,340	518,093	6.2	0.5	5.2	7.2
55 - 64	1,685	264,722	5.0	0.3	4.5	5.5
65 - 74	494	80,622	3.3	0.3	2.7	3.8
รวมทั้งประเทศ	7,856	2,646,768	5.8	0.2	5.4	6.3

ตารางที่ 3.1.17 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	5,021	1,311,877	8.8	0.4	8.0	9.5
นอกเขตเทศบาล	2,835	1,334,891	4.4	0.3	3.9	4.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	132	367,919	9.5	1.0	7.5	11.6
ภาคกลาง	3,310	918,286	8.2	0.4	7.3	9.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,071	454,598	2.9	0.3	2.3	3.5
ภาคเหนือ	1,573	473,269	5.6	0.4	4.9	6.4
ภาคใต้	1,770	432,696	7.1	0.7	5.8	8.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	400	181,001	9.0	1.2	6.6	11.4
เขต สคร. ที่ 2	430	85,495	5.3	0.7	4.0	6.6
เขต สคร. ที่ 3	1,448	390,939	9.6	0.8	8.1	11.2
เขต สคร. ที่ 4	1,032	260,851	7.3	0.6	6.1	8.5
เขต สคร. ที่ 5	300	175,204	3.6	0.5	2.6	4.7
เขต สคร. ที่ 6	417	202,984	3.2	0.6	2.1	4.3
เขต สคร. ที่ 7	354	76,410	1.7	0.2	1.2	2.2
เขต สคร. ที่ 8	331	111,145	6.1	0.9	4.3	7.9
เขต สคร. ที่ 9	425	105,208	4.3	0.7	3.0	5.6
เขต สคร. ที่ 10	817	256,916	6.2	0.5	5.2	7.3
เขต สคร. ที่ 11	995	227,702	7.8	1.2	5.5	10.1
เขต สคร. ที่ 12	775	204,993	6.4	0.6	5.2	7.6

ตารางที่ 3.1.18 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	132	367,919	9.5	1.0	7.5	11.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	77	42,354	5.0	1.4	2.3	7.7
นนทบุรี	153	75,425	9.4	2.2	5.1	13.8
ปทุมธานี	135	75,033	11.4	1.7	8.1	14.8
พระนครศรีอยุธยา	112	30,543	5.5	1.4	2.7	8.2
อ่างทอง	80	8,025	3.7	0.9	2.0	5.4
ลพบุรี	115	27,402	5.3	1.2	2.9	7.7
สิงห์บุรี	72	6,450	4.0	1.1	1.8	6.1
ชัยนาท	66	12,161	4.8	1.4	2.1	7.5
สระบุรี	97	31,457	6.9	1.5	4.0	9.7
ชลบุรี	183	120,597	13.7	2.7	8.3	19.0
ระยอง	354	101,056	26.6	3.0	20.7	32.4
จันทบุรี	221	45,594	12.0	1.7	8.7	15.3
ตราด	227	20,243	12.8	3.0	6.9	18.7
ฉะเชิงเทรา	131	27,255	5.5	1.5	2.6	8.4
ปราจีนบุรี	47	6,663	1.9	0.5	0.9	3.0
นครนายก	77	9,152	4.8	1.6	1.7	7.8
สระแก้ว	131	18,025	4.7	0.9	2.8	6.5
ราชบุรี	173	61,022	10.1	1.4	7.3	12.9
กาญจนบุรี	112	28,396	5.1	1.2	2.7	7.5
สุพรรณบุรี	168	60,807	9.7	1.3	7.1	12.3
นครปฐม	155	50,862	8.1	2.4	3.3	12.9
สมุทรสาคร	146	23,629	6.8	1.5	3.8	9.9
สมุทรสงคราม	136	9,445	6.5	0.9	4.7	8.3
เพชรบุรี	87	15,104	4.4	0.7	3.1	5.8
ประจวบคีรีขันธ์	55	11,587	3.4	1.1	1.3	5.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	66	84,394	4.5	1.0	2.7	6.4
บุรีรัมย์	81	27,175	2.4	0.9	0.6	4.1
สุรินทร์	94	32,695	3.3	1.1	1.0	5.5
ศรีสะเกษ	34	8,562	0.8	0.3	0.3	1.4
อุบลราชธานี	21	13,987	1.1	0.4	0.4	1.9
ยโสธร	89	15,350	3.7	1.6	0.6	6.8
ชัยภูมิ	59	30,941	3.7	1.2	1.4	5.9
อำนาจเจริญ	14	1,755	0.6	0.2	0.2	1.1
หนองบัวลำภู	34	6,443	1.7	0.5	0.7	2.7
ขอนแก่น	137	109,003	8.2	1.9	4.5	11.8
อุดรธานี	34	22,926	2.0	0.4	1.2	2.8
เลย	10	2,392	0.5	0.3	0.0	1.1
หนองคาย	57	19,851	3.0	0.9	1.3	4.7

ตารางที่ 3.1.18 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	65	15,263	2.1	0.6	0.9 3.3
ร้อยเอ็ด	35	9,923	1.0	0.4	0.2 1.8
กาฬสินธุ์	45	17,183	2.6	0.9	0.8 4.4
สกลนคร	69	20,200	2.5	0.7	1.2 3.8
นครพนม	36	5,373	1.0	0.3	0.5 1.5
มุกดาหาร	91	11,182	5.0	1.5	2.1 8.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	70	52,956	4.6	1.1	2.5 6.8
ลำพูน	111	19,544	7.3	2.1	3.1 11.5
ลำปาง	98	33,432	5.5	0.9	3.8 7.2
อุตรดิตถ์	46	8,901	2.5	0.7	1.1 3.9
แพร่	100	29,589	8.2	2.0	4.3 12.2
น่าน	106	17,960	5.0	1.8	1.5 8.4
พะเยา	145	34,429	9.0	1.3	6.5 11.5
เชียงราย	118	63,760	7.4	1.4	4.8 10.1
แม่ฮ่องสอน	69	5,246	3.8	0.9	2.0 5.6
นครสวรรค์	80	44,711	5.7	1.4	3.0 8.5
อุทัยธานี	55	5,680	2.5	0.8	1.0 4.0
กำแพงเพชร	80	31,170	6.0	2.5	1.2 10.9
ตาก	117	17,121	5.2	1.3	2.7 7.7
สุโขทัย	49	6,993	1.6	0.5	0.6 2.7
พิษณุโลก	116	38,617	6.4	1.3	3.9 8.9
พิจิตร	116	29,583	10.0	1.2	7.5 12.4
เพชรบูรณ์	97	33,576	4.6	1.8	1.1 8.0
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	122	89,428	8.1	2.8	2.6 13.5
กระบี่	123	22,020	7.3	2.8	1.8 12.8
พังงา	174	9,901	5.4	1.4	2.8 8.1
ภูเก็ต	164	28,661	12.1	3.0	6.2 18.0
สุราษฎร์ธานี	101	41,080	6.1	1.2	3.8 8.4
ระนอง	173	10,982	9.1	1.7	5.8 12.5
ชุมพร	138	25,630	8.5	1.4	5.7 11.3
สงขลา	242	132,664	13.9	1.7	10.6 17.2
สตูล	95	8,558	4.3	0.8	2.7 6.0
ตรัง	124	17,288	3.9	0.9	2.1 5.7
พัทลุง	114	20,964	5.5	0.9	3.8 7.3
ปัตตานี	70	8,221	1.9	0.6	0.8 3.1
ยะลา	77	8,318	2.6	0.6	1.5 3.7
นราธิวาส	53	8,981	1.9	0.6	0.7 3.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.1.19 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบอื่น ๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	943	440,657	9.0	0.6	7.9	10.1
25 - 34	226	107,220	2.3	0.3	1.8	2.9
35 - 44	472	210,628	4.1	0.3	3.5	4.7
45 - 54	461	222,602	5.6	0.4	4.8	6.4
55 - 64	614	103,195	4.1	0.3	3.6	4.7
65 - 74	159	26,958	2.4	0.3	1.8	3.0
รวม	2,875	1,111,260	5.0	0.2	4.6	5.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	927	485,075	10.7	0.8	9.1	12.2
25 - 34	399	189,939	4.2	0.3	3.5	4.9
35 - 44	918	421,335	7.5	0.4	6.7	8.4
45 - 54	770	303,619	6.9	0.4	6.1	7.7
55 - 64	699	136,605	4.8	0.3	4.1	5.5
65 - 74	173	36,913	2.8	0.5	1.9	3.7
รวม	3,886	1,573,486	6.8	0.3	6.3	7.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,870	925,732	9.8	0.6	8.7	10.9
25 - 34	625	297,159	3.3	0.2	2.8	3.7
35 - 44	1,390	631,963	5.9	0.3	5.3	6.5
45 - 54	1,231	526,220	6.3	0.3	5.7	6.9
55 - 64	1,313	239,800	4.5	0.2	4.0	5.0
65 - 74	332	63,871	2.6	0.3	2.0	3.2
รวมทั้งประเทศ	6,761	2,684,745	5.9	0.2	5.5	6.3

ตารางที่ 3.1.20 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบอื่น ๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	3,254	836,277	5.6	0.3	5.1	6.1
นอกเขตเทศบาล	3,507	1,848,468	6.1	0.3	5.6	6.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	63	194,489	5.0	0.7	3.5	6.6
ภาคกลาง	1,938	559,804	5.0	0.4	4.3	5.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,736	942,438	6.0	0.4	5.2	6.8
ภาคเหนือ	1,859	623,402	7.4	0.5	6.5	8.3
ภาคใต้	1,165	364,613	5.9	0.3	5.3	6.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	178	110,018	5.4	1.6	2.2	8.7
เขต สคร. ที่ 2	359	70,260	4.4	0.5	3.3	5.4
เขต สคร. ที่ 3	762	201,745	5.0	0.4	4.2	5.8
เขต สคร. ที่ 4	639	177,780	4.9	0.4	4.1	5.8
เขต สคร. ที่ 5	406	339,418	7.0	1.0	5.1	8.9
เขต สคร. ที่ 6	723	367,715	5.8	0.5	4.8	6.8
เขต สคร. ที่ 7	607	235,304	5.2	0.5	4.3	6.1
เขต สคร. ที่ 8	367	96,413	5.3	1.0	3.3	7.3
เขต สคร. ที่ 9	546	177,028	7.2	0.7	5.8	8.6
เขต สคร. ที่ 10	946	349,961	8.5	0.6	7.3	9.6
เขต สคร. ที่ 11	649	202,616	6.9	0.5	5.8	8.0
เขต สคร. ที่ 12	516	161,997	5.1	0.4	4.3	5.8

ตารางที่ 3.1.21 ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบอื่น ๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	63	194,489	5.0	0.7	3.5	6.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	41	22,320	2.6	0.6	1.6	3.7
นนทบุรี	61	33,875	4.2	0.8	2.6	5.8
ปทุมธานี	62	57,621	8.7	4.0	0.9	16.5
พระนครศรีอยุธยา	55	18,522	3.3	0.8	1.8	4.8
อ่างทอง	64	8,451	3.9	1.0	1.9	5.8
ลพบุรี	75	27,849	5.4	1.4	2.6	8.1
สิงห์บุรี	65	6,235	3.8	0.8	2.2	5.5
ชัยนาท	121	18,893	7.5	1.2	5.2	9.8
สระบุรี	34	8,832	1.9	0.4	1.1	2.7
ชลบุรี	77	40,610	4.7	1.1	2.6	6.8
ระยอง	121	32,162	8.9	1.0	6.9	11.0
จันทบุรี	131	29,818	7.8	1.0	5.8	9.8
ตราด	92	11,319	7.1	1.4	4.5	9.8
ฉะเชิงเทรา	73	21,564	4.3	1.1	2.1	6.5
ปราจีนบุรี	63	14,464	4.2	1.7	0.8	7.6
นครนายก	72	9,726	5.1	1.2	2.7	7.5
สระแก้ว	92	19,764	5.1	1.2	2.8	7.4
ราชบุรี	83	30,079	5.0	0.9	3.2	6.7
กาญจนบุรี	101	35,840	6.5	1.1	4.4	8.6
สุพรรณบุรี	93	34,901	5.5	1.4	2.8	8.3
นครปฐม	73	26,109	4.1	0.9	2.4	5.9
สมุทรสาคร	51	7,794	2.2	0.7	0.9	3.6
สมุทรสงคราม	63	5,278	3.6	0.5	2.7	4.6
เพชรบุรี	99	20,128	5.9	1.6	2.8	9.0
ประจวบคีรีขันธ์	76	17,651	5.2	1.1	3.1	7.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	120	158,568	8.5	2.2	4.1	12.9
บุรีรัมย์	94	60,545	5.3	1.0	3.4	7.2
สุรินทร์	104	65,820	6.6	1.2	4.2	9.0
ศรีสะเกษ	112	69,428	6.8	1.3	4.2	9.4
อุบลราชธานี	106	75,735	6.0	1.1	3.8	8.2
ยโสธร	56	13,626	3.3	0.8	1.7	4.8
ชัยภูมิ	88	54,485	6.4	1.3	3.9	9.0
อำนาจเจริญ	112	15,638	5.7	0.9	3.9	7.5
หนองบัวลำภู	100	24,747	6.5	1.0	4.6	8.4
ขอนแก่น	100	89,814	6.7	1.5	3.7	9.7
อุดรธานี	97	72,580	6.4	1.3	3.8	8.9
เลย	56	16,555	3.6	0.9	1.7	5.4
หนองคาย	71	27,169	4.1	0.8	2.5	5.7

ตารางที่ 3.1.21 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบอื่น ๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	120	40,280	5.6	1.9	1.9 9.3
ร้อยเอ็ด	124	65,731	6.7	1.3	4.2 9.2
กาฬสินธุ์	55	30,839	4.7	1.1	2.5 6.9
สกลนคร	84	28,011	3.4	0.7	2.1 4.8
นครพนม	70	22,834	4.4	0.8	2.8 5.9
มุกดาหาร	67	10,031	4.5	0.8	2.9 6.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	157	129,364	11.2	1.6	8.1 14.3
ลำพูน	94	20,441	7.5	1.9	3.8 11.3
ลำปาง	119	49,811	8.2	1.2	5.9 10.5
อุตรดิตถ์	129	26,512	7.5	1.3	4.9 10.1
แพร่	136	31,913	8.8	1.0	6.9 10.8
น่าน	122	29,801	8.2	1.8	4.6 11.7
พะเยา	158	36,928	9.6	1.4	6.8 12.4
เชียงราย	92	44,361	5.2	1.1	3.1 7.2
แม่ฮ่องสอน	68	7,343	5.3	0.9	3.6 7.0
นครสวรรค์	80	25,342	3.2	1.4	0.4 6.1
อุทัยธานี	71	7,981	3.5	0.8	1.8 5.2
กำแพงเพชร	77	26,138	5.0	0.9	3.2 6.9
ตาก	107	22,226	6.7	1.0	4.7 8.7
สุโขทัย	99	25,012	5.8	1.0	3.8 7.8
พิษณุโลก	113	53,771	8.9	1.9	5.2 12.6
พิจิตร	139	36,951	12.1	2.7	6.8 17.3
เพชรบูรณ์	98	49,507	6.7	1.4	3.9 9.5
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	79	75,253	6.8	1.1	4.7 8.9
กระบี่	77	14,393	4.8	1.4	2.0 7.5
พังงา	77	7,724	4.2	0.9	2.6 5.9
ภูเก็ต	48	6,816	2.9	1.0	0.8 4.9
สุราษฎร์ธานี	132	61,073	9.0	1.1	6.9 11.1
ระนอง	119	8,906	7.4	1.0	5.4 9.4
ชุมพร	117	28,451	9.4	1.9	5.6 13.2
สงขลา	95	57,972	6.1	0.9	4.3 7.8
สตูล	83	9,502	4.8	1.2	2.4 7.2
ตรัง	78	24,634	5.6	1.3	3.0 8.1
พัทลุง	98	27,135	7.2	0.8	5.5 8.8
ปัตตานี	54	12,656	3.0	0.7	1.5 4.5
ยะลา	42	8,241	2.6	0.9	0.8 4.3
นราธิวาส	66	21,856	4.5	0.6	3.3 5.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.2.1 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,902	918,372	18.7	1.5	15.7	21.7
25 - 34	2,125	864,165	18.6	0.8	17.0	20.1
35 - 44	2,336	1,037,255	20.0	0.8	18.5	21.5
45 - 54	1,739	799,374	19.9	1.0	18.0	21.8
55 - 64	2,595	433,420	17.1	0.7	15.8	18.5
65 - 74	1,050	175,852	15.3	0.8	13.7	16.9
รวม	11,747	4,228,439	18.8	0.6	17.6	20.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	1,896	850,011	18.5	0.8	16.9	20.1
25 - 34	2,195	922,710	20.2	0.8	18.7	21.7
35 - 44	2,464	1,052,626	18.5	0.7	17.1	19.9
45 - 54	1,952	891,928	19.9	1.0	18.0	21.8
55 - 64	2,568	507,547	17.6	0.7	16.3	18.9
65 - 74	1,160	223,357	16.4	0.9	14.6	18.2
รวม	12,235	4,448,180	18.9	0.5	17.9	19.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	3,798	1,768,383	18.6	1.0	16.7	20.5
25 - 34	4,320	1,786,876	19.4	0.6	18.2	20.6
35 - 44	4,800	2,089,882	19.3	0.6	18.1	20.4
45 - 54	3,691	1,691,302	19.9	0.7	18.5	21.3
55 - 64	5,163	940,967	17.4	0.6	16.3	18.5
65 - 74	2,210	399,210	15.9	0.7	14.5	17.3
รวมทั้งประเทศ	23,982	8,676,619	18.9	0.5	17.9	19.9

ตารางที่ 3.2.2 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	13,307	3,320,744	21.8	0.7	20.4	23.2
นอกเขตเทศบาล	10,675	5,355,875	17.4	0.7	16.1	18.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	367	927,980	23.0	2.1	18.6	27.3
ภาคกลาง	8,744	2,454,807	21.6	0.9	19.8	23.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,748	2,256,887	14.3	0.8	12.8	15.8
ภาคเหนือ	5,027	1,608,470	18.7	1.3	16.2	21.2
ภาคใต้	5,096	1,428,475	23.2	1.4	20.4	26.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,012	497,858	24.7	2.3	20.1	29.3
เขต สคร. ที่ 2	1,654	305,180	18.6	1.8	15.0	22.2
เขต สคร. ที่ 3	3,272	912,968	22.2	1.5	19.2	25.2
เขต สคร. ที่ 4	2,806	738,800	20.5	1.7	17.2	23.9
เขต สคร. ที่ 5	924	672,336	13.8	1.5	10.9	16.7
เขต สคร. ที่ 6	2,071	996,619	15.7	1.3	13.1	18.2
เขต สคร. ที่ 7	1,753	587,932	12.8	1.2	10.5	15.1
เขต สคร. ที่ 8	1,350	440,065	23.1	3.6	16.0	30.1
เขต สคร. ที่ 9	1,641	439,416	17.6	1.5	14.7	20.4
เขต สคร. ที่ 10	2,036	728,989	17.4	1.6	14.2	20.5
เขต สคร. ที่ 11	2,781	827,893	27.8	2.6	22.8	32.9
เขต สคร. ที่ 12	2,315	600,582	18.9	1.3	16.3	21.4

ตารางที่ 3.2.3 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	367	927,980	23.0	2.1	18.6	27.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	441	254,808	30.4	4.1	22.4	38.3
นนทบุรี	359	182,795	23.1	3.0	17.1	29.0
ปทุมธานี	361	205,586	31.2	4.0	23.3	39.1
พระนครศรีอยุธยา	292	109,478	19.4	2.7	14.1	24.8
อ่างทอง	503	60,994	28.0	3.5	21.2	34.8
ลพบุรี	368	113,564	20.6	4.5	11.8	29.3
สิงห์บุรี	255	26,734	16.6	3.8	9.1	24.1
ชัยนาท	324	44,259	17.5	3.3	10.9	24.1
สระบุรี	204	59,630	13.1	2.9	7.4	18.7
ชลบุรี	375	197,964	21.5	4.0	13.6	29.4
ระยอง	469	128,949	30.1	3.6	23.0	37.2
จันทบุรี	381	77,784	20.8	2.2	16.5	25.1
ตราด	307	26,666	16.8	4.7	7.5	26.1
ฉะเชิงเทรา	278	71,143	14.5	3.1	8.4	20.6
ปราจีนบุรี	260	53,501	15.7	2.3	11.2	20.1
นครนายก	483	39,863	21.0	4.1	12.9	29.2
สระแก้ว	278	62,292	16.3	3.3	9.7	22.9
ราชบุรี	293	111,651	18.5	3.8	11.1	25.9
กาญจนบุรี	386	103,513	18.5	3.8	11.1	26.0
สุพรรณบุรี	387	146,293	23.2	5.3	12.9	33.5
นครปฐม	394	154,322	24.6	5.6	13.6	35.6
สมุทรสาคร	356	79,023	23.5	3.6	16.3	30.6
สมุทรสงคราม	438	30,677	21.1	3.8	13.7	28.5
เพชรบุรี	329	71,585	21.1	2.7	15.8	26.4
ประจวบคีรีขันธ์	223	41,736	11.7	2.3	7.2	16.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	255	297,106	15.5	2.6	10.4	20.7
บุรีรัมย์	174	105,087	9.3	2.1	5.3	13.3
สุรินทร์	228	132,800	13.2	3.0	7.3	19.1
ศรีสะเกษ	252	131,672	12.5	3.0	6.6	18.3
อุบลราชธานี	188	110,852	8.5	1.4	5.8	11.3
ยโสธร	228	56,328	13.6	3.0	7.6	19.5
ชัยภูมิ	267	137,343	16.6	3.5	9.8	23.5
อำนาจเจริญ	165	27,004	10.1	1.5	7.2	13.0
หนองบัวลำภู	249	49,549	13.1	1.3	10.5	15.7
ขอนแก่น	185	169,983	12.8	2.5	7.9	17.7
อุดรธานี	322	238,882	21.2	2.8	15.6	26.7
เลย	172	50,049	11.0	1.8	7.4	14.6
หนองคาย	240	93,604	14.5	2.2	10.2	18.9

ตารางที่ 3.2.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบาย หรือเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	275	91,040	12.6	3.4	5.9	19.3
ร้อยเอ็ด	354	160,495	16.3	5.7	5.1	27.4
กาฬสินธุ์	274	143,018	20.0	4.4	11.4	28.6
สกลนคร	317	122,062	15.2	3.5	8.2	22.1
นครพนม	274	105,897	20.8	4.5	12.0	29.6
มุกดาหาร	329	34,118	14.4	3.1	8.2	20.6
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	264	211,037	18.1	2.7	12.7	23.4
ลำพูน	283	52,795	17.0	3.4	10.3	23.8
ลำปาง	416	164,817	27.2	4.4	18.6	35.9
อุตรดิตถ์	309	65,861	19.2	3.0	13.3	25.0
แพร่	230	52,101	14.2	2.6	9.0	19.4
น่าน	166	36,188	9.9	2.3	5.4	14.5
พะเยา	177	41,249	10.8	1.3	8.3	13.3
เชียงราย	248	144,552	16.8	5.5	6.0	27.7
แม่ฮ่องสอน	252	26,248	18.1	4.4	9.5	26.6
นครสวรรค์	311	195,422	26.2	6.9	12.6	39.8
อุทัยธานี	333	41,436	17.5	4.2	9.2	25.8
กำแพงเพชร	446	135,860	26.0	6.3	13.7	38.3
ตาก	388	90,997	28.0	1.9	24.4	31.7
สุโขทัย	377	93,251	20.3	4.7	11.1	29.5
พิษณุโลก	337	111,033	17.3	2.9	11.6	23.1
พิจิตร	260	67,346	16.8	2.6	11.7	21.8
เพชรบูรณ์	230	78,275	10.6	2.4	5.9	15.4
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	481	296,004	26.9	4.9	17.2	36.5
กระบี่	409	65,643	21.8	4.8	12.5	31.2
พังงา	391	35,849	19.8	3.6	12.7	26.8
ภูเก็ต	397	58,281	24.8	3.5	17.9	31.7
สุราษฎร์ธานี	419	214,020	31.1	4.8	21.6	40.7
ระนอง	269	22,815	19.3	3.1	13.2	25.4
ชุมพร	415	135,281	38.5	9.7	19.5	57.6
สงขลา	343	206,192	21.7	3.1	15.5	27.8
สตูล	411	42,462	21.1	3.1	15.1	27.1
ตรัง	411	96,862	22.1	4.6	12.9	31.2
พัทลุง	297	65,538	17.5	2.2	13.1	21.8
ปัตตานี	302	62,995	15.0	1.9	11.2	18.7
ยะลา	234	36,547	11.5	1.8	8.0	15.0
นราธิวาส	317	89,985	18.7	3.0	12.9	24.5

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.2.4 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากเลือกใช้สิทธิตามความรุนแรงมากน้อยของโรค ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,152	514,967	49.1	2.4	44.4	53.7
25 - 34	1,373	551,251	60.6	1.9	56.9	64.4
35 - 44	1,516	662,173	60.5	1.9	56.6	64.3
45 - 54	1,135	495,419	60.6	2.4	55.9	65.3
55 - 64	1,655	274,769	58.6	2.5	53.7	63.4
65 - 74	630	98,459	49.5	3.0	43.6	55.5
รวม	7,461	2,597,039	57.2	1.3	54.6	59.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	1,160	520,337	55.5	2.0	51.6	59.5
25 - 34	1,388	565,704	61.0	1.8	57.4	64.5
35 - 44	1,593	643,832	60.2	1.9	56.5	64.0
45 - 54	1,264	536,747	58.9	2.5	54.1	63.8
55 - 64	1,628	308,677	58.2	1.9	54.5	61.9
65 - 74	720	136,765	57.6	2.5	52.8	62.4
รวม	7,753	2,712,062	58.8	1.3	56.3	61.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	2,312	1,035,305	52.1	1.9	48.5	55.8
25 - 34	2,761	1,116,954	60.8	1.4	58.1	63.4
35 - 44	3,109	1,306,005	60.4	1.6	57.2	63.5
45 - 54	2,399	1,032,167	59.7	1.8	56.2	63.2
55 - 64	3,283	583,445	58.4	1.8	54.8	61.9
65 - 74	1,350	235,224	53.9	2.2	49.6	58.3
รวมทั้งประเทศ	15,214	5,309,101	58.0	1.2	55.7	60.3

ตารางที่ 3.2.5 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากเลือกใช้สิทธิตามความรุนแรงมากน้อยของโรค ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	8,343	1,902,273	50.7	1.6	47.5	53.9
นอกเขตเทศบาล	6,871	3,406,828	63.1	1.5	60.1	66.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	168	411,958	32.3	3.3	25.4	39.1
ภาคกลาง	5,734	1,602,445	61.6	1.7	58.3	65.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,777	1,350,959	59.8	2.0	55.9	63.6
ภาคเหนือ	3,270	1,028,262	64.1	3.3	57.6	70.7
ภาคใต้	3,265	915,478	64.8	2.5	60.0	69.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	631	313,264	57.7	3.1	51.5	63.9
เขต สคร. ที่ 2	1,194	225,028	70.0	3.2	63.7	76.3
เขต สคร. ที่ 3	2,139	604,055	62.7	2.3	58.3	67.2
เขต สคร. ที่ 4	1,770	460,099	59.6	4.2	51.4	67.8
เขต สคร. ที่ 5	562	418,303	62.7	4.2	54.4	70.9
เขต สคร. ที่ 6	1,240	595,185	59.5	2.6	54.5	64.6
เขต สคร. ที่ 7	975	337,470	56.9	3.7	49.7	64.1
เขต สคร. ที่ 8	810	225,294	49.6	7.1	35.7	63.4
เขต สคร. ที่ 9	1,062	281,760	65.7	2.6	60.7	70.8
เขต สคร. ที่ 10	1,398	521,207	72.4	3.1	66.2	78.6
เขต สคร. ที่ 11	1,884	562,400	68.3	3.6	61.3	75.4
เขต สคร. ที่ 12	1,381	353,077	59.9	3.0	54.1	65.8

ตารางที่ 3.2.6 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากเลือกใช้สิทธิตามความรุนแรงมากน้อยของโรค ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	168	411,958	32.3	3.3	25.4	39.1
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	299	170,642	61.0	4.9	51.4	70.5
นนทบุรี	241	128,787	59.6	4.5	50.8	68.5
ปทุมธานี	187	109,507	51.1	6.8	37.7	64.6
พระนครศรีอยุธยา	203	74,970	66.4	6.0	54.7	78.2
อ่างทอง	400	49,370	85.2	4.3	76.7	93.6
ลพบุรี	267	81,766	65.9	6.7	52.7	79.1
สิงห์บุรี	176	19,438	67.3	9.3	49.0	85.7
ชัยนาท	210	32,692	72.7	5.6	61.7	83.7
สระบุรี	141	41,761	63.7	6.4	51.3	76.2
ชลบุรี	226	122,766	61.9	4.0	54.0	69.8
ระยอง	337	98,150	69.4	7.6	54.6	84.3
จันทบุรี	284	57,740	71.4	6.3	58.9	83.8
ตราด	191	16,251	55.9	5.7	44.7	67.1
ฉะเชิงเทรา	163	41,393	56.0	6.0	44.3	67.7
ปราจีนบุรี	197	38,704	71.0	5.1	61.0	81.1
นครนายก	273	27,834	73.0	6.5	60.2	85.9
สระแก้ว	169	30,576	46.0	8.5	29.3	62.7
ราชบุรี	159	64,226	57.4	11.4	35.1	79.7
กาญจนบุรี	260	71,673	66.7	7.0	53.0	80.5
สุพรรณบุรี	273	110,223	75.6	6.4	63.0	88.2
นครปฐม	242	75,761	43.7	9.2	25.7	61.7
สมุทรสาคร	245	57,673	67.7	8.1	51.8	83.5
สมุทรสงคราม	306	21,993	71.5	6.1	59.4	83.5
เพชรบุรี	186	39,934	52.0	4.0	44.1	59.9
ประจวบคีรีขันธ์	99	18,615	45.2	7.7	30.0	60.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	144	169,727	61.3	5.9	49.7	73.0
บุรีรัมย์	100	65,922	68.9	7.9	53.4	84.3
สุรินทร์	152	90,044	62.0	12.9	36.5	87.4
ศรีสะเกษ	152	89,678	66.0	8.9	48.6	83.5
อุบลราชธานี	76	54,472	49.8	6.9	36.2	63.4
ยโสธร	169	41,040	73.9	9.1	56.0	91.8
ชัยภูมิ	166	92,611	61.9	7.1	47.8	75.9
อำนาจเจริญ	78	13,487	51.7	5.7	40.6	62.9
หนองบัวลำภู	157	32,494	62.9	6.5	50.1	75.7
ขอนแก่น	113	101,694	59.3	6.1	47.3	71.3
อุดรธานี	212	146,746	61.1	4.4	52.5	69.7
เลย	111	33,537	63.6	6.1	51.7	75.5
หนองคาย	123	54,243	60.2	6.3	47.8	72.5

ตารางที่ 3.2.6 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากเลือกใช้สิทธิตามความรุนแรงมากน้อยของโรค ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	135	37,858	43.6	14.1	15.8	71.4
ร้อยเอ็ด	277	124,503	75.7	4.6	66.8	84.7
กาฬสินธุ์	112	64,111	45.1	6.0	33.3	56.8
สกลนคร	167	66,430	53.2	11.0	31.5	74.8
นครพนม	144	56,440	53.6	5.6	42.7	64.5
มุกดาหาร	189	15,923	44.3	9.9	24.8	63.8
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	177	150,111	73.3	6.5	60.6	86.0
ลำพูน	232	44,016	84.9	4.0	77.1	92.7
ลำปาง	369	148,493	89.4	3.7	82.2	96.6
อุตรดิตถ์	192	43,049	66.2	4.8	56.7	75.6
แพร่	158	35,938	74.0	5.5	63.2	84.8
น่าน	110	23,963	61.2	15.0	31.8	90.6
พะเยา	80	20,558	50.0	8.9	32.4	67.5
เชียงราย	141	89,626	60.6	9.5	42.0	79.2
แม่ฮ่องสอน	131	8,503	42.1	9.5	23.4	60.9
นครสวรรค์	179	80,559	39.7	9.0	22.1	57.4
อุทัยธานี	207	24,164	58.7	10.7	37.8	79.7
กำแพงเพชร	308	96,306	66.6	7.3	52.2	81.0
ตาก	238	58,114	62.1	5.3	51.6	72.5
สุโขทัย	286	68,385	76.2	5.8	64.7	87.6
พิษณุโลก	207	67,493	65.0	3.7	57.9	72.2
พิจิตร	116	24,265	36.8	4.5	27.9	45.7
เพชรบูรณ์	139	44,720	58.5	8.3	42.1	74.9
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	298	193,878	65.6	7.6	50.7	80.6
กระบี่	300	46,189	72.9	8.7	55.8	90.1
พังงา	289	24,238	68.9	12.1	45.2	92.7
ภูเก็ต	273	41,251	60.8	7.3	46.4	75.2
สุราษฎร์ธานี	287	146,207	68.3	3.3	61.8	74.8
ระนอง	188	15,249	70.4	5.0	60.6	80.1
ชุมพร	249	95,387	76.0	10.5	55.3	96.6
สงขลา	169	107,381	58.0	6.2	45.8	70.2
สตูล	261	26,490	65.3	6.5	52.5	78.2
ตรัง	263	60,345	62.2	9.2	44.1	80.3
พัทลุง	154	32,998	51.6	3.2	45.4	57.9
ปัตตานี	195	38,655	56.0	7.2	41.8	70.2
ยะลา	106	17,415	39.5	5.9	28.0	51.1
นราธิวาส	233	69,794	78.0	5.2	67.9	88.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.2.7 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในสิทธิ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	362	178,379	17.1	1.9	13.4	20.9
25 - 34	403	170,202	18.7	1.4	16.0	21.5
35 - 44	386	223,431	20.4	1.8	16.9	24.0
45 - 54	268	176,276	21.6	1.9	17.8	25.4
55 - 64	468	90,743	19.3	1.5	16.3	22.3
65 - 74	206	39,853	20.0	2.1	15.9	24.1
รวม	2,093	878,883	19.4	1.1	17.3	21.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	399	218,786	23.1	1.9	19.3	26.9
25 - 34	458	235,334	25.4	1.8	22.0	28.9
35 - 44	473	246,465	23.1	1.8	19.6	26.5
45 - 54	334	191,101	21.0	1.9	17.3	24.8
55 - 64	489	117,847	22.3	1.7	19.0	25.6
65 - 74	236	52,068	21.9	2.2	17.7	26.2
รวม	2,389	1,061,600	23.0	1.1	20.9	25.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	761	397,165	20.0	1.4	17.1	22.8
25 - 34	861	405,536	22.1	1.2	19.8	24.4
35 - 44	859	469,895	21.7	1.5	18.8	24.7
45 - 54	602	367,377	21.3	1.5	18.3	24.3
55 - 64	957	208,589	20.9	1.2	18.5	23.3
65 - 74	442	91,921	21.0	1.7	17.8	24.3
รวมทั้งประเทศ	4,482	1,940,483	21.2	0.9	19.4	23.0

ตารางที่ 3.2.8 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในสิทธิ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,190	692,997	18.5	1.1	16.3	20.7
นอกเขตเทศบาล	2,292	1,247,486	23.1	1.3	20.5	25.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	101	260,308	20.4	2.3	15.5	25.2
ภาคกลาง	1,820	609,159	23.4	1.8	19.9	26.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	874	482,149	21.1	1.4	18.3	23.9
ภาคเหนือ	848	304,917	18.9	2.4	14.3	23.6
ภาคใต้	839	283,951	20.7	2.5	15.8	25.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	227	113,946	20.9	2.4	16.2	25.6
เขต สคร. ที่ 2	403	72,666	22.6	2.9	17.0	28.3
เขต สคร. ที่ 3	709	268,604	27.8	3.8	20.4	35.3
เขต สคร. ที่ 4	481	153,942	20.0	2.6	14.9	25.1
เขต สคร. ที่ 5	197	142,930	21.2	2.6	16.0	26.4
เขต สคร. ที่ 6	380	228,078	22.6	2.2	18.2	27.0
เขต สคร. ที่ 7	297	111,140	18.5	2.5	13.6	23.4
เขต สคร. ที่ 8	291	89,644	19.8	6.4	7.2	32.4
เขต สคร. ที่ 9	265	99,270	23.5	4.6	14.4	32.6
เขต สคร. ที่ 10	292	116,003	15.8	2.0	11.9	19.7
เขต สคร. ที่ 11	502	179,525	23.2	3.9	15.5	30.9
เขต สคร. ที่ 12	337	104,426	17.5	2.5	12.5	22.4

ตารางที่ 3.2.9 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในสิทธิ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	101	260,308	20.4	2.3	15.5	25.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	188	127,564	45.2	9.0	27.6	62.9
นนทบุรี	75	35,810	16.6	4.7	7.4	25.8
ปทุมธานี	68	43,928	20.1	2.5	15.2	25.0
พระนครศรีอยุธยา	84	34,208	30.5	5.1	20.5	40.5
อ่างทอง	104	12,768	21.9	3.9	14.4	29.5
ลพบุรี	93	28,656	23.0	4.8	13.6	32.5
สิงห์บุรี	50	6,749	23.2	10.7	2.2	44.3
ชัยนาท	100	10,589	24.2	9.8	4.9	43.5
สระบุรี	56	13,905	21.2	6.0	9.5	33.0
ชลบุรี	60	36,255	18.4	2.9	12.6	24.2
ระยอง	166	40,556	29.4	5.7	18.1	40.7
จันทบุรี	37	8,720	10.6	2.0	6.7	14.5
ตราด	21	1,497	5.1	1.4	2.5	7.8
ฉะเชิงเทรา	57	15,924	21.2	4.8	11.8	30.6
ปราจีนบุรี	54	13,759	25.0	10.3	4.7	45.4
นครนายก	62	7,646	19.9	5.2	9.7	30.1
สระแก้ว	64	16,683	24.6	11.7	1.6	47.7
ราชบุรี	59	21,641	19.9	7.1	6.0	33.7
กาญจนบุรี	110	33,949	33.1	6.4	20.5	45.8
สุพรรณบุรี	93	43,253	29.3	8.1	13.4	45.2
นครปฐม	61	23,945	13.7	2.7	8.3	19.1
สมุทรสาคร	70	15,751	18.2	4.3	9.7	26.6
สมุทรสงคราม	29	3,438	11.2	4.0	3.3	19.2
เพชรบุรี	40	7,985	10.4	2.4	5.7	15.0
ประจวบคีรีขันธ์	19	3,980	9.7	2.1	5.6	13.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	50	58,379	20.5	5.0	10.7	30.3
บุรีรัมย์	26	10,833	11.3	2.9	5.6	17.0
สุรินทร์	60	37,279	25.7	5.3	15.3	36.2
ศรีสะเกษ	35	21,018	16.0	5.2	5.7	26.3
อุบลราชธานี	32	27,557	25.9	5.3	15.5	36.3
ยโสธร	37	9,353	16.6	4.7	7.4	25.7
ชัยภูมิ	61	36,439	24.6	4.5	15.8	33.3
อำนาจเจริญ	23	4,568	17.8	4.6	8.7	26.8
หนองบัวลำภู	33	7,334	14.1	3.4	7.4	20.8
ขอนแก่น	30	40,973	23.3	4.2	15.1	31.5
อุดรธานี	62	63,555	26.1	6.9	12.6	39.6
เลย	37	11,068	21.4	3.7	14.2	28.6
หนองคาย	60	25,050	27.7	5.3	17.3	38.1

ตารางที่ 3.2.9 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในสิทธิ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>							
มหาสารคาม	58	20,792	23.8	8.6	6.8	40.7	
ร้อยเอ็ด	57	32,390	19.5	3.1	13.4	25.6	
กาฬสินธุ์	43	26,915	18.8	3.9	11.2	26.4	
สกลนคร	45	13,288	10.3	3.0	4.4	16.2	
นครพนม	55	24,527	22.1	7.2	7.9	36.4	
มุกดาหาร	70	10,828	27.0	12.3	2.9	51.1	
<b>ภาคเหนือ</b>							
เชียงใหม่	60	50,614	24.3	4.4	15.7	33.0	
ลำพูน	44	7,644	15.0	4.7	5.7	24.3	
ลำปาง	33	11,788	7.0	1.5	4.0	9.9	
อุตรดิตถ์	32	6,908	10.7	2.2	6.4	15.0	
แพร่	50	12,701	26.9	8.4	10.4	43.4	
น่าน	15	2,551	6.4	2.7	1.2	11.7	
พะเยา	21	5,263	12.3	2.3	7.8	16.9	
เชียงราย	32	19,777	12.8	4.9	3.1	22.4	
แม่ฮ่องสอน	37	5,664	25.2	8.3	8.9	41.5	
นครสวรรค์	63	22,414	11.1	5.3	0.8	21.4	
อุทัยธานี	58	7,871	19.0	5.8	7.6	30.4	
กำแพงเพชร	138	52,748	36.7	11.8	13.5	60.0	
ตาก	67	19,286	20.1	5.1	10.0	30.2	
สุโขทัย	49	13,653	16.8	4.7	7.6	26.1	
พิษณุโลก	65	39,213	37.8	14.8	8.8	66.8	
พิจิตร	32	6,611	10.1	1.8	6.5	13.7	
เพชรบูรณ์	52	20,210	26.5	8.5	9.7	43.2	
<b>ภาคใต้</b>							
นครศรีธรรมราช	152	96,859	32.8	9.0	15.0	50.6	
กระบี่	49	7,564	12.0	4.1	3.9	20.1	
พังงา	84	8,151	23.3	5.2	13.1	33.5	
ภูเก็ต	57	10,470	15.6	4.5	6.8	24.4	
สุราษฎร์ธานี	71	40,642	19.2	4.5	10.4	28.1	
ระนอง	33	2,371	10.8	3.0	4.8	16.7	
ชุมพร	56	13,469	17.0	5.5	6.1	27.9	
สงขลา	47	28,109	15.0	2.4	10.3	19.8	
สตูล	51	6,489	15.5	2.9	9.9	21.1	
ตรัง	49	13,646	13.6	3.2	7.3	19.8	
พัทลุง	56	13,648	21.1	5.1	11.1	31.1	
ปัตตานี	36	9,933	14.4	3.9	6.8	22.0	
ยะลา	25	3,417	7.6	2.2	3.2	12.0	
นราธิวาส	73	29,184	32.4	12.9	7.1	57.7	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.2.10 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบาย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่พอใจการให้บริการสุขภาพ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	152	76,670	7.4	1.1	5.3	9.6
25 - 34	218	95,163	10.6	1.2	8.2	13.0
35 - 44	239	127,258	11.7	1.4	8.9	14.5
45 - 54	166	85,492	10.5	1.2	8.1	13.0
55 - 64	279	45,431	9.8	1.2	7.5	12.1
65 - 74	104	20,730	10.6	1.9	6.8	14.4
รวม	1,158	450,744	10.0	0.7	8.6	11.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	168	80,312	8.6	1.0	6.7	10.5
25 - 34	285	124,499	13.7	1.5	10.8	16.7
35 - 44	295	130,214	12.3	1.3	9.9	14.8
45 - 54	219	113,893	12.7	1.4	9.9	15.4
55 - 64	305	70,441	13.5	1.5	10.5	16.5
65 - 74	138	25,531	10.8	1.5	7.8	13.8
รวม	1,410	544,889	12.0	0.7	10.6	13.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	320	156,982	8.0	0.8	6.4	9.5
25 - 34	503	219,662	12.2	1.1	10.1	14.2
35 - 44	534	257,473	12.0	1.0	10.1	13.9
45 - 54	385	199,385	11.7	1.1	9.6	13.7
55 - 64	584	115,872	11.8	1.1	9.6	14.0
65 - 74	242	46,261	10.7	1.3	8.2	13.3
รวมทั้งประเทศ	2,568	995,634	11.0	0.6	9.8	12.2

ตารางที่ 3.2.11 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบาย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่พอใจการให้บริการสุขภาพ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,588	493,031	13.3	1.1	11.2	15.4
นอกเขตเทศบาล	980	502,603	9.4	0.8	7.9	10.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	96	209,648	16.3	2.8	10.6	22.0
ภาคกลาง	838	249,107	9.7	0.7	8.3	11.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	471	197,199	8.8	0.8	7.1	10.4
ภาคเหนือ	389	106,216	6.7	0.7	5.3	8.2
ภาคใต้	774	233,463	17.1	2.3	12.6	21.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	102	50,892	9.6	1.2	7.2	12.0
เขต สคร. ที่ 2	123	22,290	7.0	0.8	5.3	8.6
เขต สคร. ที่ 3	316	84,600	8.9	1.1	6.8	11.1
เขต สคร. ที่ 4	297	91,325	12.0	1.6	8.8	15.1
เขต สคร. ที่ 5	107	61,743	9.3	1.5	6.3	12.3
เขต สคร. ที่ 6	204	86,395	8.7	1.3	6.1	11.2
เขต สคร. ที่ 7	160	49,062	8.4	1.5	5.5	11.3
เขต สคร. ที่ 8	118	34,710	7.9	1.8	4.4	11.4
เขต สคร. ที่ 9	128	30,283	7.2	1.1	5.1	9.3
เขต สคร. ที่ 10	143	41,223	5.8	1.0	3.8	7.7
เขต สคร. ที่ 11	361	132,878	17.2	3.6	10.2	24.2
เขต สคร. ที่ 12	413	100,585	16.9	2.5	12.0	21.8

ตารางที่ 3.2.12 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบาย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่พอใจการให้บริการสุขภาพ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	96	209,648	16.3	2.8	10.6	22.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	32	12,895	4.6	2.0	0.6	8.5
นนทบุรี	33	19,362	9.2	2.6	4.0	14.3
ปทุมธานี	27	19,155	9.0	1.1	6.8	11.3
พระนครศรีอยุธยา	42	12,376	11.3	2.4	6.5	16.0
อ่างทอง	21	2,349	4.0	0.9	2.2	5.9
ลพบุรี	33	8,896	7.1	1.7	3.8	10.4
สิงห์บุรี	16	1,413	5.0	1.6	1.7	8.2
ชัยนาท	28	3,343	7.7	2.1	3.6	11.9
สระบุรี	25	6,288	9.6	1.8	6.2	13.0
ชลบุรี	41	23,533	12.3	2.3	7.8	16.8
ระยอง	71	17,878	13.1	3.2	6.8	19.4
จันทบุรี	30	5,706	7.3	2.0	3.3	11.2
ตราด	29	2,890	10.0	3.5	3.1	16.9
ฉะเชิงเทรา	34	7,668	10.3	2.4	5.6	15.1
ปราจีนบุรี	38	7,778	14.3	3.6	7.3	21.3
นครนายก	28	3,020	7.9	2.6	2.8	13.0
สระแก้ว	13	3,232	4.8	1.4	2.2	7.5
ราชบุรี	48	24,271	22.3	6.6	9.4	35.2
กาญจนบุรี	40	8,697	8.5	2.3	3.9	13.1
สุพรรณบุรี	46	14,148	9.6	2.3	5.0	14.2
นครปฐม	42	21,083	12.2	3.6	5.1	19.3
สมุทรสาคร	23	7,896	9.2	4.1	1.1	17.4
สมุทรสงคราม	39	3,216	10.5	3.1	4.4	16.5
เพชรบุรี	41	8,844	11.6	3.8	4.1	19.0
ประจวบคีรีขันธ์	18	3,169	7.9	2.8	2.4	13.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	22	24,247	8.8	2.2	4.5	13.2
บุรีรัมย์	10	4,568	4.8	2.5	0.0	9.7
สุรินทร์	35	6,296	4.3	1.7	1.0	7.7
ศรีสะเกษ	21	8,649	6.6	3.0	0.7	12.4
อุบลราชธานี	24	20,002	19.3	5.4	8.8	29.9
ยโสธร	31	5,215	9.3	5.0	0.0	19.1
ชัยภูมิ	40	26,633	17.9	3.6	10.7	25.0
อำนาจเจริญ	8	1,865	7.5	3.4	0.9	14.1
หนองบัวลำภู	39	6,841	13.3	2.8	7.7	18.9
ขอนแก่น	24	16,572	9.7	4.7	0.5	18.9
อุดรธานี	31	18,702	7.9	2.8	2.4	13.4
เลย	17	5,646	10.7	3.1	4.7	16.7
หนองคาย	22	6,293	6.9	2.4	2.2	11.5

ตารางที่ 3.2.12 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่พอใจการให้บริการสุขภาพ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	27	10,349	11.7	4.9	2.1 21.4
ร้อยเอ็ด	22	12,089	7.3	3.0	1.5 13.1
กาฬสินธุ์	22	9,902	7.1	2.0	3.2 11.1
สกลนคร	31	8,743	7.0	2.7	1.7 12.3
นครพนม	20	2,238	2.0	1.0	0.1 4.0
มุกดาหาร	25	2,349	6.8	2.1	2.8 10.9
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	21	12,302	6.2	2.2	1.8 10.6
ลำพูน	11	2,260	4.5	2.2	0.2 8.9
ลำปาง	22	7,066	4.2	2.0	0.3 8.1
อุตรดิตถ์	26	5,257	8.2	2.0	4.3 12.0
แพร่	12	2,864	6.1	2.6	1.0 11.2
น่าน	8	1,247	3.2	1.3	0.7 5.8
พะเยา	9	1,847	4.5	1.6	1.2 7.7
เชียงราย	23	10,374	6.8	2.4	2.1 11.5
แม่ฮ่องสอน	37	3,263	15.4	4.3	6.9 23.9
นครสวรรค์	32	11,599	6.0	2.0	2.1 9.8
อุทัยธานี	23	2,165	5.3	3.0	0.0 11.2
กำแพงเพชร	41	17,363	12.4	3.3	5.8 18.9
ตาก	33	6,302	6.6	2.0	2.6 10.6
สุโขทัย	30	6,512	8.0	2.0	4.2 11.8
พิษณุโลก	23	8,962	8.8	3.3	2.2 15.3
พิจิตร	22	3,583	5.7	2.2	1.4 10.0
เพชรบูรณ์	16	3,250	4.2	1.5	1.2 7.3
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	57	44,762	15.2	5.5	4.5 26.0
กระบี่	59	5,956	9.6	3.0	3.7 15.5
พังงา	46	3,177	9.3	2.6	4.2 14.4
ภูเก็ต	45	7,972	11.8	3.4	5.2 18.4
สุราษฎร์ธานี	80	49,262	23.5	9.2	5.4 41.5
ระนอง	30	3,529	16.3	3.9	8.6 24.0
ชุมพร	44	18,221	21.7	8.7	4.5 38.9
สงขลา	51	33,799	18.0	6.3	5.6 30.5
สตูล	43	4,636	11.4	2.5	6.5 16.2
ตรัง	73	12,691	12.9	3.2	6.7 19.2
พัทลุง	60	15,501	24.0	4.1	15.9 32.1
ปัตตานี	47	5,345	7.9	2.5	2.9 12.8
ยะลา	59	7,862	17.5	3.8	10.0 25.0
นราธิวาส	80	20,751	22.9	7.8	7.6 38.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.2.13 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	115	55,503	5.4	0.9	3.7	7.1
25 - 34	151	67,535	7.5	0.9	5.7	9.2
35 - 44	142	78,357	7.2	1.0	5.3	9.2
45 - 54	99	65,390	8.0	1.2	5.7	10.4
55 - 64	185	34,442	7.4	0.9	5.5	9.2
65 - 74	87	15,302	7.7	1.2	5.3	10.1
รวม	779	316,530	7.0	0.5	6.0	8.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	118	60,218	6.4	0.8	4.8	8.1
25 - 34	115	56,232	6.1	0.8	4.5	7.8
35 - 44	144	83,498	7.8	1.0	5.8	9.9
45 - 54	98	58,712	6.5	1.0	4.6	8.4
55 - 64	193	40,159	7.7	0.9	5.8	9.5
65 - 74	103	14,345	6.1	0.8	4.4	7.7
รวม	771	313,165	6.8	0.5	5.9	7.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	233	115,721	5.9	0.7	4.6	7.2
25 - 34	266	123,768	6.8	0.6	5.6	8.1
35 - 44	286	161,856	7.5	0.8	6.0	9.1
45 - 54	197	124,102	7.2	0.8	5.6	8.8
55 - 64	378	74,601	7.5	0.7	6.1	9.0
65 - 74	190	29,647	6.8	0.8	5.3	8.4
รวมทั้งประเทศ	1,550	629,694	6.9	0.4	6.1	7.8

ตารางที่ 3.2.14 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	764	202,665	5.4	0.4	4.6	6.3
นอกเขตเทศบาล	786	427,029	8.0	0.7	6.7	9.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	23	53,393	4.2	1.0	2.0	6.4
ภาคกลาง	434	127,438	4.9	0.4	4.2	5.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	538	277,181	12.2	1.2	9.8	14.7
ภาคเหนือ	347	106,754	6.7	0.8	5.1	8.3
ภาคใต้	208	64,929	4.8	1.0	2.8	6.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	57	27,575	5.1	0.9	3.4	6.9
เขต สคร. ที่ 2	81	12,911	4.0	0.8	2.4	5.6
เขต สคร. ที่ 3	159	47,593	5.0	0.5	4.0	6.0
เขต สคร. ที่ 4	137	39,359	5.1	0.7	3.7	6.6
เขต สคร. ที่ 5	125	98,501	14.8	3.0	9.0	20.7
เขต สคร. ที่ 6	187	96,815	9.6	1.4	6.9	12.3
เขต สคร. ที่ 7	226	81,865	13.8	2.4	9.2	18.5
เขต สคร. ที่ 8	103	27,754	6.3	1.1	4.0	8.5
เขต สคร. ที่ 9	136	38,829	9.2	1.9	5.5	13.0
เขต สคร. ที่ 10	108	40,171	5.5	1.2	3.2	7.8
เขต สคร. ที่ 11	104	28,672	3.7	0.8	2.2	5.3
เขต สคร. ที่ 12	104	36,256	6.1	2.1	2.0	10.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.2.15 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	23	53,393	4.2	1.0	2.0	6.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	12	5,061	1.8	0.4	0.9	2.7
นนทบุรี	16	9,055	4.3	1.5	1.3	7.2
ปทุมธานี	25	12,303	5.7	1.4	3.0	8.5
พระนครศรีอยุธยา	16	6,217	5.6	1.8	2.1	9.0
อ่างทอง	13	1,657	2.8	1.1	0.7	5.0
ลพบุรี	16	3,911	3.1	1.1	1.0	5.3
สิงห์บุรี	11	1,527	5.2	2.0	1.3	9.2
ชัยนาท	24	2,556	5.9	3.1	0.0	12.1
สระบุรี	17	3,261	5.0	2.5	0.0	10.0
ชลบุรี	34	19,454	10.1	1.3	7.5	12.7
ระยอง	38	9,377	6.9	1.3	4.3	9.4
จันทบุรี	11	2,766	3.4	1.4	0.6	6.2
ตราด	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา	12	2,490	3.4	1.5	0.5	6.3
ปราจีนบุรี	11	1,406	2.6	1.3	0.0	5.3
นครนายก	17	1,470	3.8	2.5	0.0	8.8
สระแก้ว	23	5,477	8.1	2.0	4.1	12.1
ราชบุรี	31	9,193	8.3	2.7	3.1	13.6
กาญจนบุรี	22	5,288	5.2	1.4	2.5	7.9
สุพรรณบุรี	23	6,311	4.3	1.2	2.0	6.6
นครปฐม	9	5,580	3.2	1.1	1.0	5.4
สมุทรสาคร	25	7,462	8.7	3.9	1.0	16.3
สมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-
เพชรบุรี	17	3,348	4.4	1.8	0.9	7.8
ประจวบคีรีขันธ์	7	1,716	4.2	2.0	0.2	8.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	20	25,708	9.3	3.1	3.2	15.4
บุรีรัมย์	30	13,885	14.6	4.7	5.3	23.8
สุรินทร์	34	30,377	21.2	10.8	0.0	42.4
ศรีสะเกษ	34	21,445	16.2	6.5	3.4	29.0
อุบลราชธานี	32	16,951	16.0	4.0	8.2	23.8
ยโสธร	18	5,503	9.7	5.6	0.0	20.7
ชัยภูมิ	41	28,531	19.1	3.9	11.4	26.9
อำนาจเจริญ	21	4,469	18.2	6.4	5.6	30.7
หนองบัวลำภู	11	1,118	2.2	0.8	0.6	3.7
ขอนแก่น	17	19,763	11.2	4.4	2.5	19.9
อุดรธานี	28	21,848	9.0	2.6	3.8	14.2
เลย	18	4,838	9.3	3.4	2.7	15.9
หนองคาย	28	7,440	8.2	3.2	1.8	14.5

ตารางที่ 3.2.15 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	17	3,953	4.5	2.0	0.5	8.5
ร้อยเอ็ด	34	15,907	9.5	2.9	3.9	15.2
กาฬสินธุ์	34	21,948	15.6	3.9	7.9	23.4
สกลนคร	34	11,718	9.2	1.8	5.7	12.7
นครพนม	48	17,758	16.3	7.5	1.4	31.1
มุกดาหาร	39	4,019	11.4	4.1	3.4	19.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	27	19,981	9.8	3.7	2.6	17.1
ลำพูน	10	1,779	3.5	1.6	0.5	6.6
ลำปาง	-	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์	31	7,042	11.0	3.1	4.9	17.0
แพร่	-	-	-	-	-	-
น่าน	-	-	-	-	-	-
พะเยา	12	2,845	6.7	2.2	2.4	11.0
เชียงราย	12	6,264	4.1	0.7	2.7	5.5
แม่ฮ่องสอน	32	6,199	27.2	12.0	3.7	50.8
นครสวรรค์	17	6,558	3.4	0.6	2.2	4.6
อุทัยธานี	22	3,919	9.7	4.0	1.8	17.5
กำแพงเพชร	47	13,136	9.1	2.0	5.3	13.0
ตาก	47	15,680	16.0	5.3	5.5	26.5
สุโขทัย	15	1,748	2.2	0.9	0.4	4.0
พิษณุโลก	14	3,813	3.8	2.1	0.0	7.9
พิจิตร	17	4,142	6.4	2.4	1.6	11.1
เพชรบูรณ์	29	10,545	13.5	6.3	1.1	26.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	15	7,812	2.7	1.2	0.4	5.0
กระบี่	9	1,186	1.9	1.2	0.0	4.2
พังงา	12	1,214	3.4	1.9	0.0	7.3
ภูเก็ต	32	5,322	7.9	3.8	0.5	15.3
สุราษฎร์ธานี	11	5,802	2.8	1.1	0.7	4.8
ระนอง	13	1,711	7.8	3.9	0.1	15.5
ชุมพร	12	5,624	7.2	3.9	0.0	14.8
สงขลา	13	7,280	3.9	1.6	0.8	7.0
สตูล	16	2,385	5.8	2.3	1.4	10.3
ตรัง	15	6,200	6.3	2.2	1.8	10.7
พัทลุง	7	1,406	2.2	0.8	0.6	3.8
ปัตตานี	10	1,653	2.4	1.0	0.5	4.3
ยะลา	11	2,351	5.2	2.3	0.6	9.8
นราธิวาส	32	14,981	16.8	11.6	0.0	39.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.2.16 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่ใส่ใจการรักษา ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	79	43,489	4.2	0.7	2.8	5.6
25 - 34	116	47,944	5.4	0.8	3.9	6.8
35 - 44	143	64,117	6.0	0.9	4.2	7.7
45 - 54	95	49,205	6.1	1.0	4.1	8.1
55 - 64	172	26,562	5.7	0.7	4.4	7.0
65 - 74	82	12,210	6.2	1.2	3.9	8.6
รวม	687	243,527	5.4	0.5	4.6	6.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	108	62,666	6.7	1.4	4.0	9.4
25 - 34	148	56,577	6.3	0.9	4.5	8.0
35 - 44	184	81,890	7.7	0.9	5.9	9.6
45 - 54	117	62,993	7.0	1.2	4.7	9.4
55 - 64	205	45,254	8.7	1.0	6.7	10.7
65 - 74	87	15,371	6.5	1.3	4.0	9.0
รวม	849	324,751	7.1	0.5	6.1	8.2
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	187	106,154	5.4	0.8	3.9	6.9
25 - 34	264	104,521	5.8	0.6	4.6	7.1
35 - 44	327	146,007	6.8	0.7	5.4	8.3
45 - 54	212	112,198	6.6	0.8	5.0	8.2
55 - 64	377	71,816	7.3	0.7	6.0	8.6
65 - 74	169	27,581	6.4	0.8	4.8	8.0
รวมทั้งประเทศ	1,536	568,278	6.3	0.4	5.5	7.1

ตารางที่ 3.2.17 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่ใส่ใจการรักษา ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	861	234,659	6.4	0.7	5.0	7.7
นอกเขตเทศบาล	675	333,619	6.3	0.5	5.3	7.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	44	83,480	6.6	1.8	2.9	10.2
ภาคกลาง	526	158,471	6.2	0.6	5.0	7.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	347	155,200	6.9	0.9	5.2	8.6
ภาคเหนือ	299	92,916	5.9	0.7	4.5	7.3
ภาคใต้	320	78,210	5.8	0.7	4.4	7.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	84	46,619	8.7	1.5	5.6	11.7
เขต สคร. ที่ 2	111	17,713	5.5	0.7	4.2	6.9
เขต สคร. ที่ 3	190	51,912	5.5	0.9	3.7	7.2
เขต สคร. ที่ 4	141	42,228	5.5	0.9	3.7	7.3
เขต สคร. ที่ 5	59	40,216	6.1	1.7	2.8	9.4
เขต สคร. ที่ 6	169	69,541	6.9	1.4	4.2	9.7
เขต สคร. ที่ 7	119	45,442	7.8	1.4	4.9	10.6
เขต สคร. ที่ 8	87	34,670	7.9	1.5	5.0	10.8
เขต สคร. ที่ 9	98	22,849	5.5	1.0	3.6	7.4
เขต สคร. ที่ 10	114	35,397	4.9	1.0	3.0	6.8
เขต สคร. ที่ 11	159	35,749	4.7	0.7	3.3	6.0
เขต สคร. ที่ 12	161	42,461	7.2	1.3	4.7	9.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.2.18 ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่ใส่ใจการรักษา ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	44	83,480	6.6	1.8	2.9	10.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	24	7,862	2.8	1.2	0.5	5.1
นนทบุรี	23	13,976	6.6	1.9	2.7	10.4
ปทุมธานี	28	22,493	10.5	2.6	5.5	15.5
พระนครศรีอยุธยา	33	10,150	9.2	2.1	5.1	13.3
อ่างทอง	41	3,297	5.7	1.5	2.8	8.5
ลพบุรี	18	6,024	4.8	1.2	2.4	7.3
สิงห์บุรี	18	1,315	4.6	1.6	1.5	7.6
ชัยนาท	17	1,909	4.4	0.9	2.6	6.2
สระบุรี	17	1,909	7.9	1.4	5.1	10.7
ชลบุรี	24	15,133	8.0	2.6	2.9	13.2
ระยอง	39	9,805	7.2	2.3	2.7	11.7
จันทบุรี	17	2,457	3.1	1.3	0.5	5.6
ตราด	21	2,091	7.2	2.3	2.7	11.8
ฉะเชิงเทรา	22	8,732	11.7	3.0	5.9	17.5
ปราจีนบุรี	22	3,080	5.7	2.2	1.4	10.0
นครนายก	15	1,284	3.4	0.9	1.7	5.1
สระแก้ว	6	1,467	2.2	1.2	0.0	4.7
ราชบุรี	24	10,057	9.2	2.0	5.2	13.2
กาญจนบุรี	14	3,575	3.6	1.4	0.9	6.3
สุพรรณบุรี	19	6,096	4.2	2.1	0.1	8.2
นครปฐม	21	11,465	6.6	2.8	1.1	12.1
สมุทรสาคร	14	4,381	5.1	1.7	1.8	8.4
สมุทรสงคราม	23	1,614	5.3	1.0	3.3	7.3
เพชรบุรี	17	3,735	4.9	1.2	2.5	7.2
ประจวบคีรีขันธ์	9	1,305	3.2	1.8	0.0	6.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	8	10,041	3.7	2.2	0.0	8.0
บุรีรัมย์	11	4,664	4.9	1.8	1.4	8.4
สุรินทร์	13	2,633	1.8	1.3	0.0	4.5
ศรีสะเกษ	18	9,182	7.0	3.0	1.1	12.9
อุบลราชธานี	25	23,027	22.0	5.9	10.4	33.7
ยโสธร	24	4,743	8.5	2.8	3.0	14.0
ชัยภูมิ	27	22,878	15.4	4.5	6.6	24.3
อำนาจเจริญ	8	1,002	4.0	1.6	0.9	7.2
หนองบัวลำภู	53	10,517	20.2	5.1	10.2	30.3
ขอนแก่น	14	12,087	6.9	2.0	2.9	10.8
อุดรธานี	28	20,518	8.6	5.3	0.0	18.9
เลย	20	5,828	11.0	3.7	3.6	18.4
หนองคาย	9	2,934	3.2	1.9	0.0	7.0

ตารางที่ 3.2.18 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบางครั้งหรือไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพเลย เมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากไม่ไวใจการรักษา ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ใช้สิทธิบางครั้งหรือไม่ใช้เลยอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	14	2,546	2.9	1.2	0.5 5.3
ร้อยเอ็ด	9	4,603	2.8	1.4	0.1 5.5
กาฬสินธุ์	22	10,509	7.6	2.8	2.1 13.1
สกลนคร	13	3,580	2.8	1.5	0.0 5.7
นครพนม	13	2,378	2.2	0.7	0.8 3.5
มุกดาหาร	18	1,531	4.4	2.3	0.0 8.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	17	9,902	5.0	1.6	1.8 8.1
ลำพูน	8	1,936	3.9	1.7	0.5 7.2
ลำปาง	19	7,829	4.6	2.7	0.0 10.0
อุตรดิตถ์	16	3,065	4.8	1.4	2.1 7.5
แพร่	13	3,452	7.3	3.7	0.2 14.5
น่าน	10	1,764	4.5	2.1	0.3 8.6
พะเยา	9	1,923	4.6	1.6	1.5 7.8
เชียงราย	13	6,880	4.6	2.1	0.3 8.8
แม่ฮ่องสอน	25	1,711	8.1	3.1	2.1 14.1
นครสวรรค์	20	16,485	8.2	1.1	6.1 10.3
อุทัยธานี	16	2,274	5.6	2.4	0.9 10.4
กำแพงเพชร	35	12,859	9.4	4.2	1.1 17.6
ตาก	21	4,846	5.0	1.9	1.4 8.7
สุโขทัย	25	4,632	5.7	1.7	2.4 9.1
พิษณุโลก	23	7,294	7.3	3.1	1.3 13.3
พิจิตร	16	3,052	4.9	1.6	1.7 8.1
เพชรบูรณ์	13	3,012	3.9	1.5	1.1 6.8
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	25	8,612	2.9	0.9	1.1 4.7
กระบี่	30	3,120	5.0	1.2	2.6 7.4
พังงา	21	2,330	6.7	3.1	0.7 12.7
ภูเก็ต	24	3,592	5.4	2.3	0.9 9.8
สุราษฎร์ธานี	19	10,529	5.1	1.3	2.5 7.6
ระนอง	22	2,237	10.5	2.4	5.7 15.3
ชุมพร	18	5,329	6.9	3.0	1.1 12.8
สงขลา	23	15,850	8.6	3.5	1.6 15.5
สตูล	25	2,916	7.2	2.2	2.9 11.5
ตรัง	22	3,279	3.3	1.4	0.6 6.0
พัทลุง	40	9,735	15.2	2.1	11.2 19.3
ปัตตานี	12	1,347	2.0	0.9	0.2 3.8
ยะลา	14	1,715	3.8	1.1	1.7 5.9
นราธิวาส	25	7,620	8.4	2.2	4.1 12.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.3.1 ร้อยละของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วย โดยไม่สามารถเบิกเงินคืน จากประกันสุขภาพที่มีอยู่ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,887	1,359,387	44.0	1.3	41.5	46.6
25 - 34	3,317	1,397,878	46.5	1.3	43.9	49.0
35 - 44	3,794	1,711,194	48.5	1.2	46.1	50.9
45 - 54	2,992	1,349,920	47.7	1.6	44.5	50.9
55 - 64	4,957	865,912	45.4	1.0	43.4	47.3
65 - 74	2,243	380,627	41.9	1.4	39.1	44.8
<b>รวม</b>	<b>20,190</b>	<b>7,064,919</b>	<b>46.3</b>	<b>1.0</b>	<b>44.4</b>	<b>48.1</b>
<b>หญิง</b>						
15 - 24	3,124	1,464,726	47.0	1.3	44.4	49.6
25 - 34	3,702	1,641,022	49.0	1.2	46.7	51.3
35 - 44	4,545	2,057,224	47.8	1.1	45.5	50.0
45 - 54	3,679	1,732,362	48.8	1.4	46.2	51.5
55 - 64	5,556	1,115,288	46.4	1.1	44.3	48.5
65 - 74	2,609	516,954	44.2	1.3	41.6	46.8
<b>รวม</b>	<b>23,215</b>	<b>8,527,576</b>	<b>47.7</b>	<b>0.9</b>	<b>45.9</b>	<b>49.4</b>
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	6,011	2,824,113	45.5	1.1	43.3	47.8
25 - 34	7,019	3,038,900	47.8	1.0	45.7	49.9
35 - 44	8,339	3,768,419	48.1	1.0	46.1	50.0
45 - 54	6,671	3,082,282	48.3	1.3	45.8	50.9
55 - 64	10,513	1,981,200	45.9	0.9	44.2	47.7
65 - 74	4,852	897,581	43.2	1.1	41.0	45.5
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>43,405</b>	<b>15,592,495</b>	<b>47.0</b>	<b>0.9</b>	<b>45.3</b>	<b>48.7</b>

ตารางที่ 3.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วย โดยไม่สามารถเบิกเงินคืน จากประกันสุขภาพที่มีอยู่ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	22,320	5,183,329	49.4	1.4	46.6	52.1
นอกเขตเทศบาล	21,085	10,409,166	45.9	1.1	43.8	48.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	590	1,453,374	57.4	4.8	47.5	67.4
ภาคกลาง	14,026	3,865,839	46.3	1.4	43.5	49.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,582	5,141,937	44.8	1.5	41.9	47.8
ภาคเหนือ	9,359	2,843,848	44.5	1.9	40.9	48.2
ภาคใต้	8,848	2,287,496	51.6	2.0	47.7	55.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,654	764,367	48.9	4.1	40.8	57.0
เขต สคร. ที่ 2	2,576	494,069	44.9	2.8	39.5	50.4
เขต สคร. ที่ 3	5,579	1,488,968	48.1	2.2	43.8	52.4
เขต สคร. ที่ 4	4,217	1,118,434	43.2	2.6	38.0	48.3
เขต สคร. ที่ 5	1,980	1,469,863	41.0	3.4	34.5	47.6
เขต สคร. ที่ 6	4,530	2,293,439	49.5	2.0	45.5	53.6
เขต สคร. ที่ 7	4,072	1,378,635	42.3	2.3	37.8	46.9
เขต สคร. ที่ 8	2,312	645,493	44.8	2.5	39.9	49.8
เขต สคร. ที่ 9	3,038	856,671	46.9	3.7	39.7	54.2
เขต สคร. ที่ 10	4,009	1,341,684	43.0	2.9	37.3	48.7
เขต สคร. ที่ 11	4,626	1,225,912	56.0	3.2	49.7	62.4
เขต สคร. ที่ 12	4,222	1,061,584	47.3	2.3	42.8	51.7

ตารางที่ 3.3.3 ร้อยละของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วย โดยไม่สามารถเบิกเงินคืน จากประกันสุขภาพที่มีอยู่ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	590	1,453,374	57.4	4.8	47.5	67.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	788	411,804	57.9	4.6	48.9	66.9
นนทบุรี	471	237,981	39.5	5.4	28.8	50.1
ปทุมธานี	536	299,033	59.9	4.9	50.2	69.6
พระนครศรีอยุธยา	647	227,353	49.3	7.8	33.9	64.6
อ่างทอง	555	64,226	41.3	5.3	30.9	51.8
ลพบุรี	576	198,181	50.5	5.1	40.5	60.4
สิงห์บุรี	452	41,918	46.2	6.4	33.6	58.8
ชัยนาท	580	77,316	42.8	4.1	34.8	50.8
สระบุรี	413	112,428	40.2	6.7	27.0	53.3
ชลบุรี	499	261,363	42.7	5.3	32.3	53.0
ระยอง	666	175,065	53.3	3.3	46.7	59.8
จันทบุรี	651	140,106	50.5	4.1	42.4	58.7
ตราด	577	53,918	43.8	4.9	34.2	53.4
ฉะเชิงเทรา	584	159,063	40.5	7.0	26.7	54.3
ปราจีนบุรี	489	81,664	37.3	5.6	26.3	48.3
นครนายก	683	62,121	47.7	6.3	35.2	60.1
สระแก้ว	642	143,865	48.1	7.2	34.0	62.1
ราชบุรี	517	180,893	41.1	6.1	29.2	53.0
กาญจนบุรี	502	147,690	38.8	6.2	26.6	51.1
สุพรรณบุรี	554	210,412	50.4	6.4	37.9	62.9
นครปฐม	486	213,798	43.8	8.1	28.0	59.6
สมุทรสาคร	529	123,599	50.6	8.8	33.3	67.9
สมุทรสงคราม	676	48,218	41.2	4.7	32.0	50.4
เพชรบุรี	509	105,599	44.1	4.1	36.0	52.2
ประจวบคีรีขันธ์	444	88,224	33.4	6.1	21.4	45.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	465	531,655	38.4	4.2	30.1	46.7
บุรีรัมย์	414	243,568	32.0	5.0	22.1	41.9
สุรินทร์	520	366,505	46.9	10.6	26.1	67.7
ศรีสะเกษ	489	273,358	32.5	5.1	22.5	42.5
อุบลราชธานี	418	296,517	38.1	5.1	28.2	48.1
ยโสธร	611	144,288	50.9	6.0	39.1	62.6
ชัยภูมิ	581	328,135	50.1	6.0	38.2	62.0
อำนาจเจริญ	446	72,502	32.0	2.2	27.7	36.4
หนองบัวลำภู	576	129,566	56.2	5.4	45.6	66.9
ขอนแก่น	529	431,993	46.2	5.4	35.6	56.7
อุดรธานี	764	572,137	63.6	3.5	56.6	70.6
เลย	413	101,559	29.7	3.4	23.1	36.4
หนองคาย	505	199,499	39.3	3.9	31.6	47.0

ตารางที่ 3.3.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วย โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากประกันสุขภาพที่มีอยู่ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	727	348,067	60.3	7.9	44.8 - 75.8
ร้อยเอ็ด	645	303,805	44.7	5.6	33.6 - 55.7
กาฬสินธุ์	371	206,812	45.2	5.0	35.4 - 55.1
สกลนคร	622	292,385	52.7	6.2	40.5 - 64.9
นครพนม	791	224,459	58.2	5.4	47.6 - 68.8
มุกดาหาร	695	75,125	40.2	5.5	29.4 - 51.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	457	363,980	40.9	7.1	27.0 - 54.8
ลำพูน	543	96,272	43.6	6.4	31.0 - 56.2
ลำปาง	507	189,949	47.1	4.8	37.6 - 56.6
อุตรดิตถ์	596	125,370	49.9	3.8	42.5 - 57.4
แพร่	516	108,945	45.0	3.7	37.7 - 52.2
น่าน	479	89,719	33.9	7.0	20.2 - 47.6
พะเยา	512	124,130	42.6	5.6	31.6 - 53.5
เชียงราย	570	330,448	47.3	7.3	32.9 - 61.7
แม่ฮ่องสอน	425	38,242	34.5	5.6	23.5 - 45.5
นครสวรรค์	593	262,564	45.7	4.1	37.6 - 53.8
อุทัยธานี	504	62,495	33.9	5.5	23.0 - 44.8
กำแพงเพชร	697	185,270	44.1	5.9	32.5 - 55.6
ตาก	692	143,544	56.0	5.3	45.6 - 66.4
สุโขทัย	642	165,469	49.4	5.6	38.4 - 60.4
พิษณุโลก	597	212,832	42.5	9.1	24.7 - 60.3
พิจิตร	518	135,165	51.9	2.3	47.4 - 56.4
เพชรบูรณ์	511	209,456	43.5	9.1	25.5 - 61.4
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	611	387,845	49.9	7.0	36.2 - 63.6
กระบี่	804	164,839	68.1	5.6	57.1 - 79.1
พังงา	765	75,349	59.3	7.0	45.4 - 73.2
ภูเก็ต	678	97,510	59.0	5.7	47.9 - 70.1
สุราษฎร์ธานี	625	286,032	54.2	5.0	44.3 - 64.1
ระนอง	496	42,493	53.7	10.1	33.8 - 73.6
ชุมพร	647	171,844	63.8	8.1	47.8 - 79.8
สงขลา	571	300,690	48.5	6.0	36.7 - 60.3
สตูล	717	83,861	55.9	6.4	43.3 - 68.5
ตรัง	591	143,503	47.1	5.9	35.6 - 58.7
พัทลุง	591	128,810	46.3	3.4	39.6 - 53.1
ปัตตานี	599	144,241	45.6	4.7	36.3 - 54.8
ยะลา	577	105,212	49.4	4.7	40.2 - 58.6
นราธิวาส	576	155,267	42.7	5.4	32.2 - 53.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.3.4 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับร้านขายยา โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,259	1,049,209	34.6	1.2	32.1	37.0
25 - 34	2,659	1,113,357	37.6	1.3	35.1	40.1
35 - 44	2,933	1,330,518	38.2	1.2	35.9	40.5
45 - 54	2,263	1,047,654	37.5	1.6	34.4	40.5
55 - 64	3,546	630,507	33.4	1.0	31.4	35.3
65 - 74	1,591	262,810	29.4	1.5	26.5	32.3
รวม	15,251	5,434,054	36.1	0.9	34.3	37.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,409	1,117,334	36.3	1.3	33.8	38.8
25 - 34	2,844	1,278,754	38.6	1.2	36.3	40.8
35 - 44	3,359	1,536,556	36.0	1.0	33.9	38.1
45 - 54	2,586	1,225,364	34.9	1.4	32.1	37.6
55 - 64	3,676	754,380	31.7	1.0	29.7	33.7
65 - 74	1,618	322,808	27.9	1.2	25.5	30.3
รวม	16,492	6,235,196	35.2	0.9	33.5	36.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	4,668	2,166,542	35.5	1.1	33.4	37.5
25 - 34	5,503	2,392,111	38.1	1.0	36.1	40.1
35 - 44	6,292	2,867,073	37.0	0.9	35.1	38.8
45 - 54	4,849	2,273,018	36.0	1.3	33.5	38.6
55 - 64	7,222	1,384,887	32.4	0.9	30.7	34.2
65 - 74	3,209	585,618	28.6	1.1	26.4	30.7
รวมทั้งประเทศ	31,743	11,669,250	35.6	0.8	34.0	37.2

ตารางที่ 3.3.5 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับร้านขายยา โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	16,745	4,183,805	40.3	1.3	37.7	42.9
นอกเขตเทศบาล	14,998	7,485,445	33.4	1.0	31.4	35.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	526	1,300,086	51.9	4.2	43.6	60.2
ภาคกลาง	10,990	3,143,292	38.1	1.4	35.3	40.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,146	3,574,242	31.6	1.4	28.8	34.3
ภาคเหนือ	6,638	2,060,467	32.8	1.8	29.4	36.2
ภาคใต้	6,443	1,591,163	36.2	1.9	32.5	39.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,363	647,722	42.0	4.2	33.8	50.3
เขต สคร. ที่ 2	1,879	356,046	32.5	2.4	27.8	37.3
เขต สคร. ที่ 3	4,484	1,243,329	40.6	2.1	36.4	44.8
เขต สคร. ที่ 4	3,264	896,195	35.0	2.6	30.0	40.0
เขต สคร. ที่ 5	1,320	997,854	28.0	2.7	22.8	33.3
เขต สคร. ที่ 6	3,024	1,622,650	35.6	2.4	30.8	40.4
เขต สคร. ที่ 7	2,802	953,739	29.7	1.9	25.9	33.5
เขต สคร. ที่ 8	1,730	491,953	34.7	2.4	30.1	39.4
เขต สคร. ที่ 9	2,212	624,868	35.3	3.9	27.6	43.0
เขต สคร. ที่ 10	2,696	943,646	30.5	2.6	25.4	35.5
เขต สคร. ที่ 11	3,428	814,938	37.7	3.1	31.7	43.7
เขต สคร. ที่ 12	3,015	776,224	34.7	2.2	30.4	39.1

ตารางที่ 3.3.6 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับร้านขายยา โดยไม่สามารถเบิกเงินคืน จากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	526	1,300,086	51.9	4.2	43.6	60.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	730	385,503	54.4	4.8	44.9	63.9
นนทบุรี	385	202,308	33.8	5.2	23.4	44.1
ปทุมธานี	463	261,607	52.8	4.7	43.5	62.1
พระนครศรีอยุธยา	515	183,807	41.1	8.9	23.6	58.7
อ่างทอง	381	41,224	26.7	3.9	19.1	34.4
ลพบุรี	438	140,823	36.0	5.1	26.0	46.1
สิงห์บุรี	311	29,985	33.5	6.6	20.6	46.4
ชัยนาท	424	59,621	33.2	3.4	26.5	39.8
สระบุรี	325	84,392	30.2	4.9	20.5	39.9
ชลบุรี	387	205,037	34.3	4.4	25.8	42.9
ระยอง	538	149,145	46.0	3.7	38.7	53.2
จันทบุรี	547	120,718	43.9	3.9	36.1	51.6
ตราด	366	36,781	30.6	4.7	21.4	39.8
ฉะเชิงเทรา	438	116,664	29.7	6.0	17.9	41.5
ปราจีนบุรี	348	61,941	28.8	3.9	21.1	36.5
นครนายก	599	51,888	39.9	5.9	28.3	51.5
สระแก้ว	531	115,652	38.8	6.7	25.7	51.9
ราชบุรี	405	144,695	33.6	6.1	21.6	45.6
กาญจนบุรี	406	121,747	32.4	5.6	21.4	43.4
สุพรรณบุรี	426	174,667	42.0	6.9	28.3	55.6
นครปฐม	381	168,343	35.1	6.7	22.0	48.1
สมุทรสาคร	431	108,324	44.7	9.7	25.7	63.8
สมุทรสงคราม	520	37,523	32.6	4.2	24.4	40.9
เพชรบุรี	363	77,243	32.3	4.9	22.7	41.9
ประจวบคีรีขันธ์	332	63,653	24.2	6.0	12.4	36.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	319	364,401	26.5	4.3	18.2	34.9
บุรีรัมย์	267	160,709	21.2	4.0	13.4	29.0
สุรินทร์	355	242,363	31.1	6.2	18.8	43.3
ศรีสะเกษ	329	183,171	22.0	3.4	15.3	28.7
อุบลราชธานี	303	210,070	27.6	4.1	19.6	35.7
ยโสธร	502	119,373	42.4	6.5	29.6	55.2
ชัยภูมิ	379	230,380	35.6	6.8	22.2	49.1
อำนาจเจริญ	218	39,631	18.2	2.3	13.6	22.8
หนองบัวลำภู	362	80,282	35.1	3.7	27.9	42.3
ขอนแก่น	368	302,435	32.4	5.4	21.9	42.9
อุดรธานี	552	442,613	51.2	5.5	40.3	62.0
เลย	216	46,867	13.8	2.9	8.0	19.5
หนองคาย	330	139,785	28.0	5.3	17.5	38.6

ตารางที่ 3.3.6 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับร้านขายยา โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	555	291,525	51.0	9.2	32.8	69.1
ร้อยเอ็ด	426	186,466	27.7	5.9	16.2	39.2
กาฬสินธุ์	215	132,678	29.7	4.6	20.8	38.7
สกลนคร	447	222,324	40.5	6.1	28.5	52.5
นครพนม	453	123,973	32.4	3.9	24.8	40.0
มุกดาหาร	550	55,195	29.8	5.9	18.1	41.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	352	286,113	32.4	6.6	19.5	45.3
ลำพูน	395	70,797	32.3	5.8	20.8	43.8
ลำปาง	340	137,778	34.1	6.2	22.0	46.3
อุตรดิตถ์	466	98,538	39.3	3.8	31.9	46.7
แพร่	315	71,366	29.7	4.1	21.7	37.8
น่าน	297	58,628	22.2	5.1	12.2	32.2
พะเยา	335	83,547	28.8	4.6	19.8	37.8
เชียงราย	374	209,760	30.3	5.7	19.2	41.4
แม่ฮ่องสอน	288	25,657	24.5	4.5	15.5	33.4
นครสวรรค์	431	200,239	35.1	3.5	28.2	41.9
อุทัยธานี	395	49,332	27.0	6.0	15.2	38.8
กำแพงเพชร	493	134,045	32.8	5.4	22.2	43.5
ตาก	522	116,267	45.6	6.6	32.5	58.7
สุโขทัย	436	101,913	31.0	5.3	20.6	41.3
พิษณุโลก	443	166,728	34.1	10.3	13.8	54.4
พิจิตร	411	108,336	42.6	3.0	36.6	48.6
เพชรบูรณ์	345	141,422	31.8	8.8	14.6	49.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	371	181,739	23.5	4.5	14.7	32.4
กระบี่	645	143,769	59.9	7.3	45.6	74.2
พังงา	580	54,586	45.3	6.8	32.0	58.7
ภูเก็ต	567	83,351	51.2	6.1	39.3	63.1
สุราษฎร์ธานี	403	179,266	34.2	4.6	25.3	43.2
ระนอง	364	32,171	41.4	9.7	22.2	60.5
ชุมพร	498	140,056	52.6	10.3	32.5	72.8
สงขลา	454	233,784	37.9	5.9	26.3	49.5
สตูล	522	65,741	44.0	7.1	30.1	57.9
ตรัง	381	92,592	30.4	4.7	21.1	39.7
พัทลุง	314	71,677	25.8	3.1	19.8	31.9
ปัตตานี	439	108,021	34.4	4.7	25.2	43.7
ยะลา	455	87,753	41.3	5.0	31.4	51.2
นราธิวาส	450	116,657	32.3	5.9	20.7	44.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.3.7 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์ พยาบาลโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,741	844,657	27.9	1.1	25.7	30.1
25 - 34	2,010	864,139	29.3	1.2	27.1	31.6
35 - 44	2,406	1,094,756	31.5	1.1	29.4	33.6
45 - 54	1,871	827,672	29.7	1.4	27.1	32.4
55 - 64	3,185	552,836	29.3	0.9	27.5	31.1
65 - 74	1,395	232,164	26.1	1.3	23.5	28.6
<b>รวม</b>	<b>12,608</b>	<b>4,416,223</b>	<b>29.4</b>	<b>0.8</b>	<b>27.9</b>	<b>30.9</b>
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,100	978,397	31.9	1.1	29.7	34.1
25 - 34	2,554	1,132,392	34.3	1.2	32.0	36.6
35 - 44	3,105	1,378,337	32.5	1.1	30.4	34.6
45 - 54	2,547	1,185,655	34.1	1.1	31.9	36.2
55 - 64	3,800	723,609	30.5	0.9	28.8	32.1
65 - 74	1,790	350,637	30.4	1.1	28.2	32.5
<b>รวม</b>	<b>15,896</b>	<b>5,749,026</b>	<b>32.6</b>	<b>0.7</b>	<b>31.2</b>	<b>34.1</b>
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	3,841	1,823,053	29.9	0.9	28.0	31.8
25 - 34	4,564	1,996,531	32.0	1.0	30.1	33.9
35 - 44	5,511	2,473,093	32.0	0.9	30.3	33.8
45 - 54	4,418	2,013,326	32.1	1.0	30.1	34.1
55 - 64	6,985	1,276,445	30.0	0.7	28.5	31.4
65 - 74	3,185	582,800	28.5	1.0	26.6	30.4
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>28,504</b>	<b>10,165,249</b>	<b>31.1</b>	<b>0.7</b>	<b>29.8</b>	<b>32.5</b>

ตารางที่ 3.3.8 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์ พยาบาลโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	14,293	3,124,730	30.4	1.0	28.5	32.3
นอกเขตเทศบาล	14,211	7,040,519	31.5	0.9	29.8	33.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	341	852,210	34.5	3.1	28.4	40.6
ภาคกลาง	8,156	2,140,834	26.1	1.0	24.0	28.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,525	3,575,071	31.6	1.2	29.2	33.9
ภาคเหนือ	6,401	1,958,203	31.3	1.7	28.0	34.6
ภาคใต้	6,081	1,638,930	37.6	1.8	34.0	41.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	774	351,382	23.0	2.1	18.9	27.2
เขต สคร. ที่ 2	1,790	344,400	31.5	2.4	26.9	36.1
เขต สคร. ที่ 3	3,344	840,546	27.7	1.9	23.9	31.4
เขต สคร. ที่ 4	2,248	604,506	23.7	1.8	20.2	27.1
เขต สคร. ที่ 5	1,266	965,187	27.1	2.2	22.9	31.3
เขต สคร. ที่ 6	3,292	1,635,974	35.9	2.0	32.0	39.8
เขต สคร. ที่ 7	2,967	973,910	30.3	2.0	26.4	34.3
เขต สคร. ที่ 8	1,559	435,700	30.9	2.2	26.6	35.1
เขต สคร. ที่ 9	2,140	611,935	34.7	3.8	27.2	42.2
เขต สคร. ที่ 10	2,702	910,568	29.5	2.4	24.7	34.3
เขต สคร. ที่ 11	3,230	935,699	43.8	3.0	37.9	49.8
เขต สคร. ที่ 12	2,851	703,231	31.5	2.0	27.6	35.5

ตารางที่ 3.3.9 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์ พยาบาลโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	341	852,210	34.5	3.1	28.4	40.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	396	204,350	28.9	5.8	17.6	40.3
นนทบุรี	194	106,613	17.8	3.5	11.0	24.6
ปทุมธานี	269	137,357	27.9	3.3	21.4	34.3
พระนครศรีอยุธยา	311	107,412	24.8	4.4	16.2	33.4
อ่างทอง	400	48,122	31.2	4.2	23.0	39.4
ลพบุรี	380	144,778	37.2	4.8	27.7	46.7
สิงห์บุรี	361	34,351	38.4	7.0	24.5	52.2
ชัยนาท	412	55,124	30.6	3.5	23.7	37.6
สระบุรี	237	62,025	22.2	3.6	15.1	29.3
ชลบุรี	267	134,116	22.9	3.6	15.8	29.9
ระยอง	388	99,214	31.4	2.4	26.6	36.2
จันทบุรี	393	87,495	31.8	4.3	23.5	40.2
ตราด	366	37,542	31.2	3.0	25.2	37.2
ฉะเชิงเทรา	316	82,765	21.1	4.0	13.3	28.9
ปราจีนบุรี	311	52,241	24.3	3.6	17.2	31.4
นครนายก	471	38,064	29.4	5.6	18.4	40.3
สระแก้ว	436	104,759	35.1	6.7	21.9	48.3
ราชบุรี	236	88,443	20.6	3.4	13.9	27.3
กาญจนบุรี	209	59,935	16.0	2.9	10.3	21.7
สุพรรณบุรี	343	130,384	31.4	4.7	22.1	40.7
นครปฐม	238	100,735	21.1	2.7	15.8	26.3
สมุทรสาคร	291	79,707	33.0	10.9	11.5	54.5
สมุทรสงคราม	373	27,954	24.4	3.1	18.4	30.4
เพชรบุรี	323	68,266	28.6	3.4	21.9	35.3
ประจวบคีรีขันธ์	235	49,082	18.7	4.0	10.9	26.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	276	348,523	25.3	3.3	18.8	31.9
บุรีรัมย์	280	168,895	22.2	3.5	15.3	29.2
สุรินทร์	306	220,826	28.3	5.9	16.8	39.8
ศรีสะเกษ	313	167,242	20.0	4.0	12.2	27.9
อุบลราชธานี	269	189,639	25.0	4.4	16.3	33.7
ยโสธร	436	100,990	36.0	5.8	24.6	47.3
ชัยภูมิ	404	226,943	35.1	3.9	27.4	42.8
อำนาจเจริญ	297	49,893	22.8	2.6	17.7	28.0
หนองบัวลำภู	442	99,921	43.9	5.4	33.2	54.5
ขอนแก่น	364	301,778	32.3	4.4	23.8	40.9
อุดรธานี	511	377,643	43.7	4.2	35.5	51.9
เลย	349	86,947	25.5	3.7	18.3	32.8
หนองคาย	340	136,535	27.4	3.6	20.3	34.6

ตารางที่ 3.3.9 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์ พยาบาลโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	480	220,925	38.6	9.7	19.6 57.7
ร้อยเอ็ด	515	246,664	36.7	4.5	27.9 45.4
กาฬสินธุ์	291	165,562	37.0	5.1	26.9 47.1
สกลนคร	510	238,009	43.3	5.5	32.6 54.1
นครพนม	660	176,956	46.0	5.4	35.5 56.6
มุกดาหาร	482	51,182	27.6	3.4	20.9 34.2
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	271	216,588	24.8	3.9	17.2 32.4
ลำพูน	386	71,716	32.7	6.5	19.9 45.5
ลำปาง	342	121,851	30.3	3.5	23.4 37.1
อุตรดิตถ์	461	93,786	37.5	3.2	31.2 43.7
แพร่	405	84,246	35.1	3.2	28.7 41.4
น่าน	329	63,457	24.0	5.5	13.2 34.8
พะเยา	339	82,672	28.4	4.8	19.0 37.8
เชียงราย	408	252,018	36.4	8.0	20.5 52.2
แม่ฮ่องสอน	222	18,020	17.6	3.7	10.3 24.9
นครสวรรค์	378	174,836	30.8	3.7	23.5 38.1
อุทัยธานี	334	36,468	20.1	4.3	11.6 28.6
กำแพงเพชร	514	135,029	33.0	4.5	24.1 41.9
ตาก	505	110,432	43.3	6.0	31.6 55.0
สุโขทัย	467	118,274	36.3	4.5	27.5 45.2
พิษณุโลก	372	150,898	30.6	10.6	9.8 51.5
พิจิตร	333	89,366	35.4	2.9	29.7 41.2
เพชรบูรณ์	335	138,546	31.5	8.5	14.7 48.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	463	311,074	40.2	6.4	27.7 52.7
กระบี่	609	138,020	57.5	5.5	46.7 68.4
พังงา	531	51,800	43.2	5.9	31.6 54.8
ภูเก็ต	477	67,271	41.3	6.0	29.6 53.1
สุราษฎร์ธานี	470	230,014	44.1	5.6	33.0 55.1
ระนอง	254	25,136	32.3	8.3	15.9 48.7
ชุมพร	426	112,384	47.1	7.3	32.8 61.5
สงขลา	368	203,412	33.2	5.0	23.4 43.0
สตูล	504	57,993	38.9	6.2	26.8 51.0
ตรัง	415	96,343	31.7	6.3	19.4 44.0
พัทลุง	402	95,707	34.5	4.6	25.4 43.6
ปัตตานี	405	100,012	32.0	4.3	23.6 40.4
ยะลา	378	65,262	30.8	3.8	23.3 38.3
นราธิวาส	379	84,502	23.3	3.7	16.0 30.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.3.10 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	642	302,670	10.1	0.7	8.7	11.5
25 - 34	719	311,365	10.7	0.7	9.3	12.0
35 - 44	878	423,793	12.3	0.9	10.5	14.1
45 - 54	712	379,024	13.7	1.0	11.8	15.7
55 - 64	1147	230,904	12.3	0.8	10.7	13.9
65 - 74	592	104,737	11.8	0.9	10.0	13.6
รวม	4,690	1,752,493	11.8	0.6	10.6	12.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	766	395,974	13.0	0.9	11.1	14.8
25 - 34	860	420,741	12.8	0.8	11.3	14.4
35 - 44	1,024	507,418	12.0	0.8	10.4	13.6
45 - 54	893	478,390	13.8	0.9	12.1	15.5
55 - 64	1,376	293,103	12.4	0.8	10.9	13.9
65 - 74	705	164,296	14.3	1.0	12.2	16.3
รวม	5,624	2,259,922	12.9	0.6	11.7	14.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,408	698,644	11.5	0.7	10.2	12.9
25 - 34	1,579	732,106	11.8	0.6	10.5	13.1
35 - 44	1,902	931,211	12.1	0.8	10.7	13.6
45 - 54	1,605	857,414	13.8	0.8	12.2	15.4
55 - 64	2,523	524,007	12.4	0.7	11.0	13.7
65 - 74	1,297	269,032	13.2	0.8	11.6	14.8
รวมทั้งประเทศ	10,314	4,012,415	12.4	0.6	11.2	13.5

ตารางที่ 3.3.11 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	5,345	1,402,020	13.7	0.8	12.2	15.3
นอกเขตเทศบาล	4,969	2,610,395	11.8	0.8	10.3	13.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	198	457,357	18.7	2.6	13.6	23.8
ภาคกลาง	2,904	882,111	10.8	0.7	9.4	12.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,040	1,470,671	13.0	1.2	10.6	15.5
ภาคเหนือ	2,227	684,691	11.0	1.2	8.7	13.3
ภาคใต้	1,945	517,586	12.0	1.2	9.6	14.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	471	213,990	14.1	1.9	10.4	17.8
เขต สคร. ที่ 2	521	101,490	9.4	1.3	6.7	12.0
เขต สคร. ที่ 3	1,157	383,924	12.7	1.4	10.0	15.4
เขต สคร. ที่ 4	755	182,707	7.2	0.8	5.6	8.7
เขต สคร. ที่ 5	646	481,640	13.6	3.0	7.6	19.5
เขต สคร. ที่ 6	1,151	584,111	12.9	1.7	9.6	16.1
เขต สคร. ที่ 7	1,243	404,920	12.7	1.5	9.7	15.7
เขต สคร. ที่ 8	686	184,898	13.2	1.2	10.8	15.7
เขต สคร. ที่ 9	645	168,111	9.7	1.5	6.6	12.7
เขต สคร. ที่ 10	896	331,682	10.8	2.1	6.6	14.9
เขต สคร. ที่ 11	1,084	288,703	13.7	2.2	9.5	18.0
เขต สคร. ที่ 12	861	228,883	10.3	1.1	8.1	12.5

ตารางที่ 3.3.12 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	198	457,357	18.7	2.6	13.6	23.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	290	163,446	23.2	4.1	15.1	31.3
นนทบุรี	134	74,277	12.5	3.5	5.6	19.3
ปทุมธานี	202	93,503	19.2	4.1	11.1	27.3
พระนครศรีอยุธยา	135	46,210	10.7	2.1	6.6	14.8
อ่างทอง	63	7,886	5.1	1.8	1.6	8.7
ลพบุรี	92	35,007	9.1	1.9	5.4	12.8
สิงห์บุรี	97	7,623	8.5	1.8	4.9	12.2
ชัยนาท	142	16,569	9.3	1.9	5.6	13.0
สระบุรี	127	34,405	12.3	4.0	4.5	20.2
ชลบุรี	147	79,313	13.7	2.5	8.8	18.5
ระยอง	91	19,662	6.4	1.4	3.6	9.1
จันทบุรี	96	19,903	7.3	1.9	3.6	11.0
ตราด	72	11,250	9.4	3.4	2.8	16.0
ฉะเชิงเทรา	104	30,044	7.7	1.7	4.2	11.1
ปราจีนบุรี	78	17,014	7.9	1.9	4.2	11.7
นครนายก	104	7,194	5.5	1.6	2.4	8.7
สระแก้ว	175	36,098	12.1	2.5	7.2	17.1
ราชบุรี	100	34,215	8.0	2.2	3.6	12.4
กาญจนบุรี	85	26,343	7.1	2.1	3.0	11.2
สุพรรณบุรี	78	23,685	5.8	1.9	2.0	9.5
นครปฐม	92	32,606	6.8	2.3	2.3	11.3
สมุทรสาคร	118	16,165	6.7	2.2	2.4	11.0
สมุทรสงคราม	79	7,872	6.9	2.3	2.3	11.5
เพชรบุรี	88	20,674	8.7	1.5	5.7	11.7
ประจวบคีรีขันธ์	115	21,148	8.1	1.8	4.6	11.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	114	125,457	9.2	1.9	5.4	12.9
บุรีรัมย์	150	82,449	10.9	2.3	6.3	15.4
สุรินทร์	216	165,848	21.3	11.9	0.0	44.6
ศรีสะเกษ	187	128,016	15.5	4.4	6.8	24.2
อุบลราชธานี	112	70,848	9.4	2.6	4.2	14.5
ยโสธร	165	23,770	8.5	2.3	4.0	12.9
ชัยภูมิ	166	107,886	16.7	5.1	6.6	26.8
อำนาจเจริญ	149	25,589	11.8	1.7	8.5	15.1
หนองบัวลำภู	98	18,693	8.2	1.3	5.6	10.7
ขอนแก่น	150	115,265	12.4	3.5	5.5	19.3
อุดรธานี	161	138,781	16.1	5.4	5.5	26.7
เลย	116	24,898	7.3	1.6	4.1	10.5
หนองคาย	141	51,496	10.3	2.4	5.6	15.1

ตารางที่ 3.3.12 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	197	107,032	18.8	7.0	5.1	32.5
ร้อยเอ็ด	202	82,616	12.3	2.3	7.8	16.8
กาฬสินธุ์	86	45,330	10.5	2.4	5.8	15.1
สกลนคร	150	52,113	9.6	1.8	5.9	13.2
นครพนม	223	81,432	21.3	4.9	11.5	31.0
มุกดาหาร	257	23,152	12.6	3.6	5.5	19.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	112	105,117	12.1	5.1	2.1	22.0
ลำพูน	72	11,671	5.3	1.3	2.8	7.9
ลำปาง	58	21,943	5.4	1.8	1.9	9.0
อุตรดิตถ์	166	33,162	13.3	2.8	7.7	18.9
แพร่	135	23,660	9.9	1.4	7.1	12.7
น่าน	115	20,747	7.9	2.6	2.8	12.9
พะเยา	189	47,424	16.4	4.7	7.2	25.7
เชียงราย	123	91,767	13.3	6.1	1.2	25.3
แม่ฮ่องสอน	92	9,353	9.0	3.3	2.5	15.5
นครสวรรค์	121	61,735	10.9	1.4	8.1	13.7
อุทัยธานี	176	22,262	12.4	3.7	5.2	19.6
กำแพงเพชร	244	68,422	16.8	3.0	10.9	22.7
ตาก	161	38,442	15.1	4.7	5.9	24.3
สุโขทัย	91	15,659	4.9	1.3	2.4	7.5
พิษณุโลก	124	43,867	9.1	3.1	3.0	15.2
พิจิตร	145	32,479	13.3	3.1	7.2	19.4
เพชรบูรณ์	103	36,981	8.5	3.7	1.1	15.8
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	117	61,768	8.0	4.2	0.0	16.2
กระบี่	251	72,100	30.2	8.5	13.6	46.9
พังงา	188	21,050	17.6	5.3	7.1	28.1
ภูเก็ต	177	23,989	14.8	4.1	6.8	22.8
สุราษฎร์ธานี	130	66,822	12.9	2.4	8.2	17.6
ระนอง	106	12,899	16.6	6.3	4.1	29.1
ชุมพร	115	30,075	14.0	4.3	5.7	22.4
สงขลา	144	77,139	12.6	3.1	6.6	18.6
สตูล	143	20,272	13.7	4.8	4.2	23.2
ตรัง	97	23,662	7.8	2.3	3.2	12.4
พัทลุง	124	23,419	8.4	1.1	6.2	10.6
ปัตตานี	106	34,706	11.1	2.9	5.4	16.8
ยะลา	130	25,736	12.1	3.0	6.2	18.1
นราธิวาส	117	23,949	6.7	1.5	3.7	9.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.3.13 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชน โดยไม่สามารถเบิกคืนเงินจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	396	209,843	7.0	0.6	5.7	8.2
25 - 34	511	223,125	7.6	0.6	6.4	8.9
35 - 44	614	286,026	8.3	0.7	6.9	9.7
45 - 54	497	258,382	9.4	0.9	7.6	11.1
55 - 64	820	150,751	8.0	0.6	6.9	9.2
65 - 74	381	74,195	8.4	0.8	6.8	10.0
รวม	3,219	1,202,322	8.1	0.4	7.2	8.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	478	226,885	7.4	0.6	6.2	8.7
25 - 34	663	322,198	9.8	0.7	8.5	11.1
35 - 44	684	334,539	7.9	0.6	6.8	9.1
45 - 54	580	333,099	9.6	0.8	8.1	11.2
55 - 64	938	187,875	7.9	0.5	7.0	8.9
65 - 74	428	100,235	8.7	0.8	7.2	10.3
รวม	3,771	1,504,831	8.6	0.4	7.7	9.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	874	436,728	7.2	0.5	6.2	8.2
25 - 34	1,174	545,322	8.8	0.5	7.8	9.8
35 - 44	1,298	620,566	8.1	0.5	7.0	9.1
45 - 54	1,077	591,480	9.5	0.7	8.1	10.9
55 - 64	1,758	338,626	8.0	0.4	7.1	8.9
65 - 74	809	174,430	8.6	0.7	7.3	9.9
รวมทั้งประเทศ	6,990	2,707,153	8.3	0.4	7.5	9.1

ตารางที่ 3.3.14 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชน โดยไม่สามารถเบิกคืนเงินจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	3,820	1,022,671	10.0	0.7	8.6	11.4
นอกเขตเทศบาล	3,170	1,684,481	7.6	0.5	6.6	8.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	129	314,270	12.8	2.4	8.2	17.5
ภาคกลาง	2,409	704,433	8.6	0.5	7.6	9.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,599	773,011	6.9	0.6	5.7	8.0
ภาคเหนือ	1,389	505,695	8.1	1.2	5.7	10.5
ภาคใต้	1,464	409,743	9.5	1.0	7.5	11.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	427	191,945	12.6	1.6	9.4	15.8
เขต สคร. ที่ 2	398	74,742	6.9	1.2	4.6	9.2
เขต สคร. ที่ 3	941	269,560	8.9	0.9	7.2	10.6
เขต สคร. ที่ 4	643	168,186	6.6	0.7	5.2	8.0
เขต สคร. ที่ 5	402	289,069	8.1	1.1	5.9	10.3
เขต สคร. ที่ 6	528	277,740	6.1	1.0	4.1	8.1
เขต สคร. ที่ 7	669	206,201	6.5	1.0	4.6	8.3
เขต สคร. ที่ 8	390	115,818	8.3	1.2	5.9	10.6
เขต สคร. ที่ 9	365	133,266	7.6	3.1	1.5	13.8
เขต สคร. ที่ 10	634	256,611	8.3	1.7	5.1	11.6
เขต สคร. ที่ 11	770	218,260	10.4	1.1	8.2	12.6
เขต สคร. ที่ 12	694	191,483	8.6	1.6	5.4	11.8

ตารางที่ 3.3.15 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลเอกชน โดยไม่สามารถเบิกคืนเงินจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	129	314,270	12.8	2.4	8.2	17.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	251	107,783	15.3	3.1	9.1	21.5
นนทบุรี	121	69,153	11.6	2.7	6.3	16.9
ปทุมธานี	182	81,783	16.6	3.7	9.3	24.0
พระนครศรีอยุธยา	124	41,009	9.5	2.6	4.3	14.6
อ่างทอง	77	8,401	5.5	1.3	3.0	7.9
ลพบุรี	76	22,538	5.8	1.3	3.2	8.5
สิงห์บุรี	63	5,317	5.9	1.0	4.0	7.9
ชัยนาท	81	9,165	5.1	0.9	3.3	7.0
สระบุรี	101	29,321	10.5	3.8	2.9	18.0
ชลบุรี	87	46,373	7.9	1.7	4.5	11.3
ระยอง	111	34,323	11.1	2.9	5.5	16.7
จันทบุรี	130	28,059	10.2	2.6	5.2	15.3
ตราด	91	8,249	6.9	1.4	4.1	9.7
ฉะเชิงเทรา	87	23,433	6.0	1.0	4.1	7.9
ปราจีนบุรี	33	4,632	2.2	0.6	0.9	3.4
นครนายก	75	5,553	4.3	1.1	2.2	6.4
สระแก้ว	76	11,153	3.8	0.8	2.2	5.3
ราชบุรี	68	23,812	5.6	1.5	2.7	8.5
กาญจนบุรี	113	29,389	7.9	1.8	4.4	11.3
สุพรรณบุรี	83	34,022	8.2	2.1	4.2	12.3
นครปฐม	96	36,205	7.6	2.3	3.1	12.1
สมุทรสาคร	93	13,454	5.6	1.0	3.7	7.5
สมุทรสงคราม	71	7,601	6.6	2.8	1.2	12.1
เพชรบุรี	52	10,969	4.6	0.9	2.9	6.3
ประจวบคีรีขันธ์	67	12,735	4.9	1.3	2.4	7.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	112	144,653	10.5	2.2	6.1	14.9
บุรีรัมย์	96	46,512	6.1	1.5	3.2	9.1
สุรินทร์	121	62,969	8.1	2.2	3.7	12.5
ศรีสะเกษ	80	46,020	5.6	1.9	1.9	9.3
อุบลราชธานี	44	34,134	4.5	1.3	1.9	7.1
ยโสธร	118	27,227	9.7	1.9	6.0	13.4
ชัยภูมิ	73	34,935	5.4	1.6	2.3	8.6
อำนาจเจริญ	63	11,393	5.3	1.9	1.5	9.0
หนองบัวลำภู	77	14,382	6.3	1.6	3.1	9.5
ขอนแก่น	52	69,020	7.4	3.8	0.0	15.0
อุดรธานี	71	57,626	6.7	1.5	3.7	9.7
เลย	54	12,027	3.5	1.3	0.9	6.2
หนองคาย	58	16,697	3.4	0.9	1.6	5.1

ตารางที่ 3.3.15 (ต่อ) ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่สามารถเบิกคืนเงินจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	81	41,852	7.3	3.4	0.8	13.9
ร้อยเอ็ด	108	49,939	7.5	1.6	4.2	10.7
กาฬสินธุ์	27	16,197	3.7	1.3	1.2	6.2
สกลนคร	105	53,547	9.8	3.9	2.1	17.6
นครพนม	66	21,175	5.5	1.8	1.9	9.2
มุกดาหาร	193	12,707	6.9	1.4	4.2	9.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	63	56,825	6.5	1.4	3.7	9.4
ลำพูน	108	22,363	10.2	3.9	2.6	17.8
ลำปาง	45	12,981	3.2	0.9	1.5	5.0
อุตรดิตถ์	42	8,648	3.5	1.1	1.2	5.7
แพร่	68	16,636	7.0	1.7	3.6	10.3
น่าน	32	2,811	1.1	0.3	0.5	1.6
พะเยา	135	35,463	12.2	3.8	4.7	19.8
เชียงราย	136	107,250	15.5	6.3	3.1	27.9
แม่ฮ่องสอน	47	2,281	2.3	0.8	0.6	3.9
นครสวรรค์	114	49,551	8.7	2.3	4.2	13.2
อุทัยธานี	67	6,993	3.9	1.5	0.9	6.8
กำแพงเพชร	118	36,017	8.8	2.3	4.2	13.4
ตาก	62	12,856	5.1	0.9	3.2	6.9
สุโขทัย	60	11,889	3.8	1.0	1.9	5.6
พิษณุโลก	151	84,247	17.3	10.1	0.0	37.2
พิจิตร	91	23,257	9.6	1.7	6.1	13.0
เพชรบูรณ์	50	15,625	3.5	1.2	1.1	6.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	93	59,503	7.7	2.1	3.5	11.9
กระบี่	123	22,641	9.5	2.6	4.3	14.7
พังงา	142	12,962	10.8	2.1	6.6	15.0
ภูเก็ต	77	11,647	7.2	1.3	4.6	9.7
สุราษฎร์ธานี	155	80,839	15.6	2.6	10.6	20.7
ระนอง	72	6,408	8.3	1.6	5.1	11.4
ชุมพร	108	24,261	11.2	2.4	6.5	15.9
สงขลา	165	87,102	14.2	5.2	4.0	24.4
สตูล	62	6,077	4.1	0.8	2.6	5.7
ตรัง	126	23,218	7.6	1.6	4.5	10.8
พัทลุง	156	29,684	10.7	1.8	7.1	14.2
ปัตตานี	37	5,874	1.9	0.3	1.3	2.5
ยะลา	53	8,577	4.0	1.1	2.0	6.1
นราธิวาส	95	30,952	8.6	4.3	0.1	17.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 3.3.16 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนไทยของรัฐบาล โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	60	28,594	1.0	0.3	0.4	1.5
25 - 34	65	27,496	0.9	0.2	0.5	1.3
35 - 44	101	50,582	1.5	0.3	0.9	2.1
45 - 54	87	36,285	1.3	0.2	0.8	1.8
55 - 64	159	31,871	1.7	0.3	1.1	2.3
65 - 74	90	17,031	1.9	0.4	1.2	2.7
รวม	562	191,859	1.3	0.2	1.0	1.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	52	35,029	1.1	0.3	0.5	1.8
25 - 34	94	38,208	1.2	0.2	0.8	1.5
35 - 44	133	57,182	1.4	0.2	0.9	1.8
45 - 54	126	63,801	1.8	0.4	1.1	2.6
55 - 64	168	30,055	1.3	0.2	0.9	1.6
65 - 74	85	19,911	1.7	0.4	1.0	2.4
รวม	658	244,186	1.4	0.2	1.1	1.7
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	112	63,623	1.0	0.2	0.6	1.5
25 - 34	159	65,703	1.1	0.1	0.8	1.3
35 - 44	234	107,764	1.4	0.2	1.0	1.8
45 - 54	213	100,086	1.6	0.2	1.1	2.1
55 - 64	327	61,926	1.5	0.2	1.1	1.8
65 - 74	175	36,942	1.8	0.3	1.2	2.4
รวมทั้งประเทศ	1,220	436,045	1.3	0.1	1.1	1.6

ตารางที่ 3.3.17 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนไทยของรัฐบาล โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	715	151,431	1.5	0.1	1.2	1.8
นอกเขตเทศบาล	505	284,613	1.3	0.2	0.9	1.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	13	33,477	1.4	0.5	0.5	2.3
ภาคกลาง	326	82,157	1.0	0.1	0.8	1.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	398	182,622	1.6	0.2	1.2	2.0
ภาคเหนือ	278	91,632	1.5	0.5	0.4	2.5
ภาคใต้	205	46,155	1.1	0.2	0.7	1.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	63	22,403	1.5	0.5	0.5	2.5
เขต สคร. ที่ 2	47	7,180	0.7	0.2	0.2	1.1
เขต สคร. ที่ 3	149	35,585	1.2	0.2	0.8	1.6
เขต สคร. ที่ 4	67	16,990	0.7	0.1	0.4	0.9
เขต สคร. ที่ 5	94	58,044	1.6	0.4	0.8	2.5
เขต สคร. ที่ 6	151	77,639	1.7	0.3	1.0	2.4
เขต สคร. ที่ 7	153	46,940	1.5	0.3	0.8	2.1
เขต สคร. ที่ 8	77	22,271	1.6	0.4	0.7	2.5
เขต สคร. ที่ 9	97	47,169	2.7	1.9	0.0	6.4
เขต สคร. ที่ 10	104	22,191	0.7	0.1	0.5	1.0
เขต สคร. ที่ 11	100	20,376	1.0	0.2	0.5	1.4
เขต สคร. ที่ 12	105	25,779	1.2	0.2	0.7	1.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.3.18 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนไทยของเอกชน โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	52	21,882	0.7	0.1	0.4	1.0
25 - 34	75	32,708	1.1	0.2	0.7	1.6
35 - 44	94	40,210	1.2	0.2	0.7	1.6
45 - 54	78	39,615	1.4	0.3	0.9	2.0
55 - 64	131	22,977	1.2	0.2	0.8	1.6
65 - 74	62	12,217	1.4	0.3	0.7	2.1
รวม	492	169,609	1.1	0.1	0.9	1.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	53	30,378	1.0	0.3	0.4	1.6
25 - 34	79	33,193	1.0	0.2	0.7	1.3
35 - 44	90	44,127	1.0	0.2	0.6	1.5
45 - 54	101	65,841	1.9	0.5	0.9	3.0
55 - 64	143	24,852	1.1	0.1	0.8	1.3
65 - 74	76	16,636	1.4	0.3	0.8	2.1
รวม	542	215,028	1.2	0.2	0.9	1.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	105	52,260	0.9	0.2	0.5	1.2
25 - 34	154	65,901	1.1	0.2	0.8	1.4
35 - 44	184	84,337	1.1	0.2	0.7	1.5
45 - 54	179	105,455	1.7	0.3	1.1	2.3
55 - 64	274	47,829	1.1	0.1	0.9	1.4
65 - 74	138	28,854	1.4	0.3	0.9	2.0
รวมทั้งประเทศ	1,034	384,636	1.2	0.1	0.9	1.5

ตารางที่ 3.3.19 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนไทยของเอกชน โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	612	138,993	1.4	0.2	1.0	1.7
นอกเขตเทศบาล	422	245,643	1.1	0.2	0.7	1.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	10	25,604	1.0	0.4	0.2	1.9
ภาคกลาง	325	93,925	1.1	0.2	0.8	1.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	268	124,099	1.1	0.2	0.7	1.5
ภาคเหนือ	237	91,921	1.5	0.6	0.4	2.6
ภาคใต้	194	49,088	1.1	0.1	0.9	1.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	94	35,177	2.3	0.8	0.7	3.9
เขต สคร. ที่ 2	32	6,446	0.6	0.2	0.2	1.0
เขต สคร. ที่ 3	111	30,880	1.0	0.2	0.7	1.4
เขต สคร. ที่ 4	88	21,421	0.8	0.1	0.6	1.1
เขต สคร. ที่ 5	46	21,942	0.6	0.1	0.3	0.9
เขต สคร. ที่ 6	92	56,689	1.3	0.5	0.3	2.2
เขต สคร. ที่ 7	130	45,469	1.4	0.3	0.8	2.0
เขต สคร. ที่ 8	65	14,918	1.1	0.3	0.4	1.8
เขต สคร. ที่ 9	97	51,843	3.0	1.9	0.0	6.8
เขต สคร. ที่ 10	75	25,159	0.8	0.2	0.4	1.2
เขต สคร. ที่ 11	101	25,025	1.2	0.2	0.8	1.6
เขต สคร. ที่ 12	93	24,063	1.1	0.2	0.7	1.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.3.20 ร้อยละผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนโบราณอื่น ๆ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากรบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	74	42,700	1.4	0.5	0.5	2.3
25 - 34	112	47,602	1.6	0.2	1.2	2.1
35 - 44	163	67,435	2.0	0.2	1.5	2.4
45 - 54	138	49,998	1.8	0.3	1.3	2.3
55 - 64	299	50,497	2.7	0.3	2.0	3.4
65 - 74	164	33,719	3.8	0.6	2.6	5.0
รวม	950	291,950	2.0	0.2	1.6	2.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	98	57,852	1.9	0.4	1.1	2.7
25 - 34	142	54,295	1.7	0.2	1.2	2.1
35 - 44	211	91,710	2.2	0.3	1.6	2.7
45 - 54	175	85,329	2.5	0.4	1.7	3.3
55 - 64	341	60,036	2.5	0.2	2.1	3.0
65 - 74	164	36,212	3.2	0.5	2.3	4.1
รวม	1,131	385,434	2.2	0.2	1.8	2.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	172	100,552	1.7	0.3	1.0	2.3
25 - 34	254	101,897	1.6	0.2	1.3	2.0
35 - 44	374	159,145	2.1	0.2	1.7	2.5
45 - 54	313	135,327	2.2	0.3	1.7	2.7
55 - 64	640	110,533	2.6	0.2	2.2	3.0
65 - 74	328	69,931	3.4	0.4	2.6	4.3
รวมทั้งประเทศ	2,081	677,384	2.1	0.2	1.8	2.4

ตารางที่ 3.3.21 ร้อยละของผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคลินิกแพทย์แผนโบราณอื่น ๆ โดยไม่สามารถเบิกเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,123	231,512	2.3	0.2	1.8	2.7
นอกเขตเทศบาล	958	445,872	2.0	0.2	1.6	2.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	18	43,232	1.8	0.5	0.8	2.8
ภาคกลาง	651	158,837	1.9	0.2	1.5	2.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	528	214,879	1.9	0.2	1.4	2.4
ภาคเหนือ	377	138,457	2.2	0.5	1.2	3.3
ภาคใต้	507	121,980	2.8	0.3	2.1	3.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	129	48,121	3.2	1.1	1.0	5.4
เขต สคร. ที่ 2	89	13,440	1.2	0.2	0.8	1.7
เขต สคร. ที่ 3	235	53,856	1.8	0.2	1.3	2.3
เขต สคร. ที่ 4	198	43,420	1.7	0.3	1.1	2.4
เขต สคร. ที่ 5	95	58,431	1.6	0.4	0.9	2.3
เขต สคร. ที่ 6	180	90,440	2.0	0.4	1.2	2.8
เขต สคร. ที่ 7	253	66,008	2.1	0.4	1.2	3.0
เขต สคร. ที่ 8	83	34,397	2.5	0.9	0.6	4.3
เขต สคร. ที่ 9	153	59,649	3.4	1.7	0.2	6.7
เขต สคร. ที่ 10	141	44,411	1.4	0.3	0.9	2.0
เขต สคร. ที่ 11	245	57,363	2.7	0.5	1.8	3.7
เขต สคร. ที่ 12	262	64,617	2.9	0.5	2.0	3.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.4.1 ร้อยละของผู้ที่ตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วย ครั้งสุดท้ายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,348	1,197,881	24.9	1.0	22.9	26.8
25 - 34	3,059	1,340,149	29.8	1.0	27.9	31.7
35 - 44	3,986	1,724,704	34.3	1.0	32.3	36.2
45 - 54	3,488	1,609,962	41.4	1.4	38.8	44.1
55 - 64	6,455	1,090,835	44.7	0.9	43.0	46.5
65 - 74	3,131	515,129	47.5	1.2	45.1	49.8
รวม	22,467	7,478,659	34.4	0.7	33.0	35.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,665	1,271,610	28.5	0.9	26.7	30.3
25 - 34	3,749	1,678,285	38.0	1.0	36.1	39.9
35 - 44	5,410	2,384,655	43.6	0.9	41.8	45.5
45 - 54	4,612	2,056,382	47.8	1.1	45.6	50.0
55 - 64	7,246	1,437,821	52.0	1.0	50.0	54.0
65 - 74	3,529	697,006	53.3	1.2	50.9	55.7
รวม	27,211	9,525,759	41.9	0.7	40.6	43.2
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	5,013	2,469,491	26.6	0.8	25.1	28.2
25 - 34	6,808	3,018,434	33.8	0.8	32.3	35.4
35 - 44	9,396	4,109,359	39.1	0.8	37.6	40.6
45 - 54	8,100	3,666,344	44.8	0.9	42.9	46.6
55 - 64	13,701	2,528,655	48.6	0.8	47.0	50.1
65 - 74	6,660	1,212,135	50.6	1.0	48.7	52.6
รวมทั้งประเทศ	49,678	17,004,418	38.2	0.6	37.0	39.4

ตารางที่ 3.4.2 ร้อยละของผู้ที่ตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วย ครั้งสุดท้ายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	25,347	5,567,766	37.4	0.9	35.7	39.1
นอกเขตเทศบาล	24,331	11,436,653	38.6	0.8	37.1	40.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	544	1,325,055	32.2	2.4	27.4	37.0
ภาคกลาง	16,751	4,421,620	40.0	1.1	38.0	42.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13,244	6,416,730	42.1	1.2	39.8	44.5
ภาคเหนือ	10,653	2,878,944	35.2	1.2	32.9	37.4
ภาคใต้	8,486	1,962,069	33.2	1.3	30.7	35.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	2,080	794,544	40.5	2.8	35.0	46.0
เขต สคร. ที่ 2	3,353	666,186	41.7	2.6	36.5	46.8
เขต สคร. ที่ 3	6,166	1,745,948	43.2	1.7	40.0	46.5
เขต สคร. ที่ 4	5,152	1,214,942	35.3	1.7	31.8	38.7
เขต สคร. ที่ 5	2,725	1,811,754	38.3	2.1	34.2	42.4
เขต สคร. ที่ 6	5,366	2,601,521	42.8	1.9	39.2	46.5
เขต สคร. ที่ 7	5,153	2,003,455	45.3	2.2	40.9	49.6
เขต สคร. ที่ 8	2,397	660,159	36.7	2.3	32.2	41.1
เขต สคร. ที่ 9	3,094	806,271	33.1	2.1	29.0	37.3
เขต สคร. ที่ 10	5,162	1,412,514	35.7	1.7	32.4	39.1
เขต สคร. ที่ 11	4,331	922,860	32.0	1.9	28.3	35.8
เขต สคร. ที่ 12	4,155	1,039,209	34.3	1.6	31.1	37.5



ตารางที่ 3.4.3 ร้อยละของผู้ที่ตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วย ครั้งสุดท้ายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	544	1,325,055	32.2	2.4	27.4	37.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	787	401,726	48.2	5.5	37.4	59.0
นนทบุรี	670	299,614	38.1	4.7	28.7	47.4
ปทุมธานี	731	273,902	43.8	5.8	32.4	55.1
พระนครศรีอยุธยา	679	221,028	40.3	4.3	31.8	48.8
อ่างทอง	655	81,605	37.9	3.1	31.9	44.0
ลพบุรี	706	248,719	45.4	6.2	33.2	57.7
สิงห์บุรี	655	61,835	41.2	5.4	30.6	51.8
ชัยนาท	548	72,597	29.4	5.1	19.3	39.5
สระบุรี	789	201,431	45.8	3.4	39.0	52.5
ชลบุรี	744	418,484	46.5	2.9	40.8	52.2
ระยอง	677	174,315	41.8	3.2	35.5	48.0
จันทบุรี	632	128,412	34.9	2.6	29.7	40.0
ตราด	607	46,721	30.2	5.7	19.0	41.3
ฉะเชิงเทรา	699	196,467	41.0	2.7	35.7	46.2
ปราจีนบุรี	691	136,951	40.4	2.1	36.3	44.5
นครนายก	632	74,899	42.0	4.0	34.1	49.9
สระแก้ว	697	167,973	45.5	7.1	31.5	59.4
ราชบุรี	720	237,519	39.8	3.5	33.0	46.6
กาญจนบุรี	579	163,875	30.0	3.1	23.9	36.0
สุพรรณบุรี	600	184,682	29.7	4.8	20.3	39.2
นครปฐม	579	201,293	34.3	5.4	23.7	44.9
สมุทรสาคร	708	125,109	42.0	6.1	30.0	53.9
สมุทรสงคราม	670	49,489	35.2	4.2	26.9	43.5
เพชรบุรี	722	138,786	41.6	4.1	33.5	49.7
ประจวบคีรีขันธ์	574	114,189	35.5	4.2	27.4	43.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	656	690,310	37.0	3.7	29.6	44.3
บุรีรัมย์	624	348,020	31.8	3.4	25.1	38.4
สุรินทร์	795	449,025	46.2	4.7	37.0	55.4
ศรีสะเกษ	741	454,825	44.4	6.7	31.2	57.6
อุบลราชธานี	944	733,032	57.4	2.4	52.6	62.2
ยโสธร	720	170,169	41.2	6.9	27.6	54.8
ชัยภูมิ	650	324,398	40.8	4.9	31.2	50.3
อำนาจเจริญ	853	129,737	50.2	3.5	43.4	57.1
หนองบัวลำภู	645	131,892	34.8	3.2	28.6	41.1
ขอนแก่น	675	560,054	45.8	4.8	36.4	55.3
อุดรธานี	621	457,329	42.4	5.5	31.7	53.2
เลย	621	185,868	40.7	5.1	30.6	50.8
หนองคาย	705	258,267	42.2	3.6	35.1	49.2

ตารางที่ 3.4.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วย ครั้งสุดท้าย ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	687	266,691	37.9	5.6	26.9	48.9
ร้อยเอ็ด	708	432,945	44.7	4.0	36.9	52.5
กาฬสินธุ์	704	308,474	47.2	4.0	39.3	55.0
สกลนคร	597	270,004	36.6	5.1	26.6	46.6
นครพนม	698	178,606	37.4	5.8	26.0	48.7
มุกดาหาร	600	67,081	28.0	5.3	17.6	38.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	655	446,828	41.4	4.4	32.8	49.9
ลำพูน	565	97,942	33.3	3.5	26.5	40.1
ลำปาง	561	168,449	28.2	2.6	23.1	33.3
อุตรดิตถ์	595	121,772	36.9	4.0	29.0	44.7
แพร่	715	145,684	42.7	5.1	32.7	52.6
น่าน	721	117,448	33.8	4.9	24.1	43.6
พะเยา	681	144,175	39.8	5.0	30.0	49.7
เชียงราย	535	234,605	29.6	3.5	22.6	36.5
แม่ฮ่องสอน	729	57,382	42.2	6.4	29.6	54.9
นครสวรรค์	551	236,449	33.5	3.7	26.1	40.8
อุทัยธานี	660	90,082	43.0	5.6	32.0	54.0
กำแพงเพชร	559	167,492	34.4	5.5	23.5	45.3
ตาก	685	127,518	41.1	3.8	33.6	48.7
สุโขทัย	578	136,737	29.7	2.8	24.1	35.2
พิษณุโลก	619	187,906	30.7	4.2	22.5	38.9
พิจิตร	627	166,136	41.8	3.4	35.1	48.4
เพชรบูรณ์	617	232,338	32.3	5.4	21.6	42.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	498	307,310	28.7	3.9	21.1	36.4
กระบี่	721	107,658	37.2	5.0	27.2	47.1
พังงา	660	61,388	34.9	6.4	22.4	47.5
ภูเก็ต	613	82,322	35.9	4.9	26.2	45.6
สุราษฎร์ธานี	534	200,063	29.6	3.2	23.3	35.8
ระนอง	712	42,416	38.7	6.3	26.2	51.1
ชุมพร	593	121,703	36.8	4.4	28.0	45.5
สงขลา	455	285,820	32.3	4.0	24.6	40.1
สตูล	525	55,169	28.5	5.0	18.7	38.2
ตรัง	715	184,589	43.9	3.4	37.3	50.5
พัทลุง	689	124,165	33.8	3.0	27.9	39.6
ปัตตานี	567	138,940	35.0	2.9	29.2	40.8
ยะลา	648	97,409	33.2	3.8	25.7	40.7
นราธิวาส	556	153,117	32.2	5.3	21.8	42.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.4.4 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ซึ่งไม่รวมกรณีฉุกเฉินใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,590	0.8	0.0	0.7	0.8
25 - 34	10,337	0.9	0.0	0.9	1.0
35 - 44	11,322	1.1	0.0	1.1	1.2
45 - 54	8,541	1.4	0.1	1.3	1.5
55 - 64	13,801	2.0	0.1	1.9	2.2
65 - 74	6,268	2.5	0.1	2.4	2.7
รวม	60,859	1.2	0.0	1.2	1.3
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,702	1.1	0.0	1.0	1.2
25 - 34	9,804	1.5	0.1	1.4	1.6
35 - 44	11,801	1.7	0.0	1.6	1.8
45 - 54	9,340	2.1	0.1	2.0	2.2
55 - 64	13,502	2.7	0.1	2.6	2.9
65 - 74	6,520	3.2	0.1	3.0	3.4
รวม	60,669	1.8	0.0	1.8	1.9
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,292	0.9	0.0	0.9	1.0
25 - 34	20,141	1.2	0.0	1.1	1.3
35 - 44	23,123	1.4	0.0	1.4	1.5
45 - 54	17,881	1.8	0.0	1.7	1.9
55 - 64	27,303	2.4	0.1	2.3	2.5
65 - 74	12,788	2.9	0.1	2.8	3.0
รวมทั้งประเทศ	121,528	1.5	0.0	1.5	1.6

ตารางที่ 3.4.5 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ซึ่งไม่รวมกรณีฉุกเฉินใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	61,392	1.2	0.0	1.1	1.3
นอกเขตเทศบาล	60,136	1.7	0.0	1.6	1.8
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,653	0.4	0.1	0.2	0.5
ภาคกลาง	39,930	1.5	0.0	1.4	1.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,462	1.5	0.1	1.4	1.6
ภาคเหนือ	26,829	2.0	0.1	1.9	2.2
ภาคใต้	22,654	1.7	0.1	1.5	1.9
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,698	1.5	0.1	1.2	1.7
เขต สคร. ที่ 2	8,226	1.5	0.1	1.4	1.7
เขต สคร. ที่ 3	14,367	1.7	0.1	1.5	1.8
เขต สคร. ที่ 4	12,639	1.4	0.1	1.2	1.6
เขต สคร. ที่ 5	6,468	1.6	0.1	1.4	1.8
เขต สคร. ที่ 6	12,847	1.6	0.1	1.4	1.7
เขต สคร. ที่ 7	11,147	1.5	0.1	1.3	1.6
เขต สคร. ที่ 8	6,161	1.7	0.1	1.4	1.9
เขต สคร. ที่ 9	7,885	2.0	0.2	1.6	2.3
เขต สคร. ที่ 10	12,783	2.2	0.1	1.9	2.5
เขต สคร. ที่ 11	11,344	1.8	0.1	1.5	2.0
เขต สคร. ที่ 12	11,310	1.6	0.1	1.5	1.8

ตารางที่ 3.4.6 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ซึ่งไม่รวมกรณีฉุกเฉินใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,653	0.4	0.1	0.2	0.5
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,553	1.4	0.2	1.1	1.7
นนทบุรี	1,639	1.4	0.2	1.0	1.7
ปทุมธานี	1,450	1.3	0.2	1.0	1.6
พระนครศรีอยุธยา	1,609	1.8	0.3	1.3	2.3
อ่างทอง	1,729	2.2	0.2	1.8	2.5
ลพบุรี	1,613	1.7	0.1	1.4	1.9
สิงห์บุรี	1,580	1.5	0.2	1.2	1.8
ชัยนาท	1,567	1.8	0.2	1.3	2.2
สระบุรี	1,737	0.9	0.1	0.7	1.1
ชลบุรี	1,603	1.5	0.1	1.3	1.8
ระยอง	1,527	2.1	0.2	1.7	2.5
จันทบุรี	1,627	1.6	0.1	1.4	1.9
ตราด	1,644	1.6	0.2	1.2	2.0
ฉะเชิงเทรา	1,637	1.8	0.3	1.2	2.4
ปราจีนบุรี	1,703	2.1	0.2	1.6	2.5
นครนายก	1,527	1.5	0.2	1.1	2.0
สระแก้ว	1,546	1.9	0.3	1.3	2.5
ราชบุรี	1,622	1.6	0.3	1.1	2.2
กาญจนบุรี	1,617	1.4	0.3	0.9	1.9
สุพรรณบุรี	1,696	1.2	0.2	0.9	1.5
นครปฐม	1,444	1.2	0.2	0.8	1.7
สมุทรสาคร	1,553	1.2	0.2	0.9	1.6
สมุทรสงคราม	1,680	2.4	0.2	2.0	2.9
เพชรบุรี	1,497	1.6	0.2	1.2	2.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,530	1.2	0.2	0.7	1.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,581	1.6	0.1	1.3	1.9
บุรีรัมย์	1,647	1.4	0.2	1.0	1.7
สุรินทร์	1,617	1.7	0.2	1.3	2.2
ศรีสะเกษ	1,540	1.5	0.2	1.1	1.9
อุบลราชธานี	1,598	1.2	0.1	1.0	1.5
ยโสธร	1,693	2.0	0.2	1.5	2.5
ชัยภูมิ	1,623	1.6	0.2	1.2	2.1
อำนาจเจริญ	1,594	2.3	0.3	1.7	2.8
หนองบัวลำภู	1,712	2.2	0.2	1.8	2.5
ขอนแก่น	1,645	1.3	0.2	0.9	1.7
อุดรธานี	1,570	1.8	0.3	1.3	2.3
เลย	1,604	1.6	0.2	1.2	2.1
หนองคาย	1,595	1.7	0.2	1.2	2.2

ตารางที่ 3.4.6 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษา การเจ็บป่วยซึ่งไม่รวมกรณีฉุกเฉินใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,675	1.6	0.3	1.0	2.2
ร้อยเอ็ด	1,577	1.4	0.2	1.1	1.7
กาฬสินธุ์	1,469	1.4	0.2	0.9	1.9
สกลนคร	1,511	1.2	0.2	0.8	1.6
นครพนม	1,568	1.7	0.2	1.2	2.1
มุกดาหาร	1,643	1.3	0.2	0.9	1.7
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,565	2.5	0.4	1.6	3.3
ลำพูน	1,604	1.9	0.2	1.5	2.2
ลำปาง	1,645	1.6	0.1	1.4	1.9
อุตรดิตถ์	1,596	1.6	0.2	1.2	2.0
แพร่	1,656	2.3	0.2	1.8	2.8
น่าน	1,665	1.9	0.2	1.5	2.3
พะเยา	1,571	2.1	0.6	1.0	3.3
เชียงราย	1,584	2.8	0.2	2.3	3.2
แม่ฮ่องสอน	1,493	1.6	0.2	1.3	1.9
นครสวรรค์	1,572	1.7	0.2	1.3	2.1
อุทัยธานี	1,488	2.4	0.5	1.4	3.4
กำแพงเพชร	1,502	1.7	0.2	1.4	2.1
ตาก	1,571	1.9	0.2	1.6	2.3
สุโขทัย	1,676	2.2	0.3	1.5	2.8
พิษณุโลก	1,608	1.9	0.2	1.5	2.3
พิจิตร	1,599	1.1	0.1	0.9	1.4
เพชรบูรณ์	1,434	2.1	0.5	1.1	3.0
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,568	1.9	0.3	1.2	2.5
กระบี่	1,668	1.7	0.5	0.7	2.7
พังงา	1,654	1.5	0.3	0.9	2.0
ภูเก็ต	1,649	1.4	0.3	0.9	1.9
สุราษฎร์ธานี	1,595	1.8	0.2	1.4	2.3
ระนอง	1,616	1.4	0.2	0.9	1.8
ชุมพร	1,594	1.8	0.2	1.3	2.3
สงขลา	1,582	1.7	0.2	1.3	2.1
สตูล	1,547	1.6	0.2	1.1	2.0
ตรัง	1,642	1.6	0.1	1.3	1.9
พัทลุง	1,695	1.9	0.2	1.5	2.3
ปัตตานี	1,636	1.8	0.2	1.5	2.2
ยะลา	1,564	1.2	0.2	0.9	1.5
นราธิวาส	1,644	1.4	0.2	1.1	1.7

ตารางที่ 3.4.7 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษา การเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,814	0.2	0.0	0.1	0.2
25 - 34	10,562	0.2	0.0	0.1	0.2
35 - 44	11,542	0.2	0.0	0.1	0.2
45 - 54	8,724	0.2	0.0	0.1	0.2
55 - 64	14,181	0.2	0.0	0.2	0.2
65 - 74	6,456	0.2	0.0	0.2	0.2
รวม	62,279	0.2	0.0	0.2	0.2
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,993	0.1	0.0	0.1	0.1
25 - 34	10,087	0.1	0.0	0.1	0.2
35 - 44	12,153	0.2	0.0	0.1	0.2
45 - 54	9,646	0.2	0.0	0.1	0.2
55 - 64	13,986	0.2	0.0	0.2	0.3
65 - 74	6,755	0.3	0.0	0.2	0.3
รวม	62,620	0.2	0.0	0.1	0.2
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,807	0.1	0.0	0.1	0.2
25 - 34	20,649	0.2	0.0	0.1	0.2
35 - 44	23,695	0.2	0.0	0.1	0.2
45 - 54	18,370	0.2	0.0	0.1	0.2
55 - 64	28,167	0.2	0.0	0.2	0.2
65 - 74	13,211	0.2	0.0	0.2	0.3
รวมทั้งประเทศ	124,899	0.2	0.0	0.2	0.2

ตารางที่ 3.4.8 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษา การเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	63,130	0.1	0.0	0.1	0.1
นอกเขตเทศบาล	61,769	0.2	0.0	0.2	0.2
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,652	0.0	0.0	0.0	0.1
ภาคกลาง	41,176	0.1	0.0	0.1	0.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31,107	0.2	0.0	0.2	0.2
ภาคเหนือ	27,789	0.2	0.0	0.2	0.2
ภาคใต้	23,175	0.2	0.0	0.1	0.2
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,840	0.1	0.0	0.1	0.2
เขต สคร. ที่ 2	8,419	0.1	0.0	0.1	0.2
เขต สคร. ที่ 3	14,776	0.1	0.0	0.1	0.2
เขต สคร. ที่ 4	13,141	0.1	0.0	0.1	0.1
เขต สคร. ที่ 5	6,620	0.2	0.0	0.1	0.3
เขต สคร. ที่ 6	13,134	0.2	0.0	0.1	0.3
เขต สคร. ที่ 7	11,353	0.2	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 8	6,340	0.2	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 9	8,239	0.1	0.0	0.1	0.2
เขต สคร. ที่ 10	13,210	0.2	0.0	0.2	0.3
เขต สคร. ที่ 11	11,548	0.2	0.0	0.1	0.3
เขต สคร. ที่ 12	11,627	0.2	0.0	0.1	0.2



ตารางที่ 3.4.9 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษา การเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,652	0.0	0.0	0.0	0.1
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,642	0.1	0.0	0.0	0.1
นนทบุรี	1,669	0.1	0.0	0.1	0.1
ปทุมธานี	1,519	0.2	0.1	0.1	0.3
พระนครศรีอยุธยา	1,652	0.1	0.0	0.1	0.1
อ่างทอง	1,732	0.1	0.0	0.0	0.1
ลพบุรี	1,622	0.1	0.0	0.1	0.2
สิงห์บุรี	1,671	0.1	0.0	0.1	0.1
ชัยนาท	1,651	0.1	0.0	0.1	0.2
สระบุรี	1,743	0.1	0.0	0.1	0.2
ชลบุรี	1,636	0.1	0.0	0.0	0.1
ระยอง	1,583	0.4	0.1	0.2	0.5
จันทบุรี	1,666	0.2	0.0	0.1	0.2
ตราด	1,692	0.2	0.0	0.1	0.2
ฉะเชิงเทรา	1,688	0.1	0.0	0.1	0.2
ปราจีนบุรี	1,718	0.1	0.0	0.1	0.2
นครนายก	1,584	0.1	0.0	0.1	0.2
สระแก้ว	1,567	0.2	0.1	0.0	0.5
ราชบุรี	1,686	0.1	0.0	0.1	0.2
กาญจนบุรี	1,656	0.1	0.0	0.1	0.2
สุพรรณบุรี	1,709	0.1	0.0	0.1	0.2
นครปฐม	1,543	0.1	0.0	0.1	0.1
สมุทรสาคร	1,663	0.1	0.0	0.0	0.2
สมุทรสงคราม	1,703	0.2	0.1	0.1	0.3
เพชรบุรี	1,615	0.1	0.0	0.1	0.2
ประจวบคีรีขันธ์	1,566	0.1	0.0	0.1	0.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,632	0.2	0.1	0.1	0.4
บุรีรัมย์	1,680	0.1	0.0	0.1	0.2
สุรินทร์	1,659	0.1	0.0	0.1	0.2
ศรีสะเกษ	1,589	0.2	0.0	0.1	0.3
อุบลราชธานี	1,624	0.3	0.1	0.2	0.4
ยโสธร	1,710	0.1	0.0	0.0	0.1
ชัยภูมิ	1,649	0.3	0.1	0.1	0.5
อำนาจเจริญ	1,611	0.3	0.1	0.2	0.5
หนองบัวลำภู	1,724	0.2	0.0	0.1	0.2
ขอนแก่น	1,676	0.1	0.0	0.1	0.2
อุดรธานี	1,593	0.2	0.1	0.1	0.3
เลย	1,628	0.1	0.0	0.0	0.2
หนองคาย	1,639	0.2	0.0	0.1	0.2

ตารางที่ 3.4.9 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษา การเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,696	0.4	0.2	0.0	0.8
ร้อยเอ็ด	1,636	0.1	0.0	0.1	0.2
กาฬสินธุ์	1,542	0.3	0.1	0.1	0.4
สกลนคร	1,541	0.2	0.0	0.1	0.2
นครพนม	1,615	0.3	0.1	0.2	0.5
มุกดาหาร	1,663	0.2	0.0	0.1	0.2
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,627	0.3	0.1	0.1	0.4
ลำพูน	1,654	0.1	0.0	0.1	0.2
ลำปาง	1,693	0.1	0.0	0.1	0.2
อุตรดิตถ์	1,639	0.2	0.0	0.1	0.3
แพร่	1,696	0.2	0.0	0.1	0.3
น่าน	1,691	0.1	0.0	0.1	0.1
พะเยา	1,641	0.3	0.1	0.1	0.5
เชียงราย	1,633	0.3	0.1	0.1	0.6
แม่ฮ่องสอน	1,575	0.1	0.0	0.1	0.2
นครสวรรค์	1,585	0.2	0.0	0.1	0.3
อุทัยธานี	1,553	0.3	0.2	0.0	0.6
กำแพงเพชร	1,583	0.2	0.0	0.1	0.3
ตาก	1,634	0.2	0.0	0.1	0.2
สุโขทัย	1,687	0.1	0.0	0.1	0.1
พิษณุโลก	1,633	0.2	0.0	0.1	0.2
พิจิตร	1,619	0.2	0.0	0.1	0.2
เพชรบูรณ์	1,646	0.1	0.0	0.1	0.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,615	0.2	0.0	0.1	0.2
กระบี่	1,683	0.1	0.0	0.0	0.2
พังงา	1,692	0.1	0.0	0.1	0.2
ภูเก็ต	1,677	0.2	0.1	0.0	0.3
สุราษฎร์ธานี	1,620	0.2	0.1	0.1	0.4
ระนอง	1,633	0.2	0.0	0.1	0.2
ชุมพร	1,628	0.4	0.2	0.1	0.7
สงขลา	1,618	0.1	0.0	0.1	0.2
สตูล	1,636	0.2	0.0	0.1	0.3
ตรัง	1,682	0.2	0.0	0.1	0.2
พัทลุง	1,714	0.2	0.0	0.1	0.2
ปัตตานี	1,673	0.2	0.1	0.1	0.3
ยะลา	1,644	0.1	0.0	0.1	0.2
นราธิวาส	1,660	0.1	0.0	0.1	0.2

ตารางที่ 3.5.1 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วยและได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างชัดเจนและเพียงพอ ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	3,818	1,793,981	36.5	1.0	34.6	38.4
25 - 34	4,266	1,835,949	39.9	0.9	38.1	41.8
35 - 44	5,144	2,287,732	44.1	1.1	42.0	46.1
45 - 54	4,249	1,926,171	48.1	1.2	45.8	50.4
55 - 64	7,891	1,377,485	55.0	0.9	53.2	56.7
65 - 74	3,868	677,306	59.5	1.2	57.2	61.7
รวม	29,236	9,898,624	44.3	0.7	42.9	45.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	4,194	2,002,471	43.7	1.0	41.6	45.7
25 - 34	5,100	2,337,139	51.3	1.0	49.3	53.2
35 - 44	6,644	3,071,963	54.6	1.0	52.7	56.5
45 - 54	5,585	2,588,837	58.2	1.1	56.0	60.5
55 - 64	8,935	1,828,553	63.9	0.8	62.3	65.6
65 - 74	4,442	900,588	66.1	1.0	64.1	68.1
รวม	34,900	12,729,551	54.3	0.7	53.0	55.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	8,012	3,796,452	40.0	0.8	38.4	41.6
25 - 34	9,366	4,173,088	45.6	0.8	44.0	47.2
35 - 44	11,788	5,359,695	49.5	0.9	47.9	51.2
45 - 54	9,834	4,515,008	53.4	0.9	51.6	55.3
55 - 64	16,826	3,206,038	59.7	0.7	58.3	61.1
65 - 74	8,310	1,577,895	63.1	0.9	61.4	64.8
รวมทั้งประเทศ	64,136	22,628,175	49.4	0.6	48.2	50.6

ตารางที่ 3.5.2 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย และได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างชัดเจนและเพียงพอ ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	30,805	6,586,808	43.3	0.8	41.7	44.8
นอกเขตเทศบาล	33,331	16,041,367	52.5	0.8	50.8	54.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	587	1,380,204	33.3	2.0	29.4	37.2
ภาคกลาง	20,839	5,605,063	49.4	1.1	47.2	51.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16,847	8,337,977	53.5	1.2	51.1	55.8
ภาคเหนือ	14,820	4,542,899	53.0	1.3	50.4	55.5
ภาคใต้	11,043	2,762,033	45.1	1.5	42.2	48.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	2,401	993,476	49.5	2.5	44.6	54.4
เขต สคร. ที่ 2	4,241	826,909	50.5	2.1	46.3	54.7
เขต สคร. ที่ 3	7,842	2,187,663	53.1	2.0	49.2	57.0
เขต สคร. ที่ 4	6,355	1,597,015	44.7	1.9	40.9	48.4
เขต สคร. ที่ 5	3,575	2,627,147	54.4	2.1	50.3	58.5
เขต สคร. ที่ 6	7,309	3,450,041	55.4	2.2	51.0	59.7
เขต สคร. ที่ 7	5,963	2,260,789	49.8	2.0	45.9	53.8
เขต สคร. ที่ 8	3,353	1,009,650	53.2	1.9	49.5	56.8
เขต สคร. ที่ 9	4,066	1,213,979	48.6	3.0	42.6	54.5
เขต สคร. ที่ 10	7,401	2,319,270	55.5	1.7	52.1	58.9
เขต สคร. ที่ 11	5,606	1,373,366	46.4	2.6	41.3	51.6
เขต สคร. ที่ 12	5,437	1,388,667	43.8	1.5	40.9	46.7

ตารางที่ 3.5.3 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย และได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างชัดเจนและเพียงพอ ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	587	1,380,204	33.3	2.0	29.4	37.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,032	541,804	64.4	5.3	54.1	74.8
นนทบุรี	807	359,967	45.2	3.8	37.6	52.7
ปทุมธานี	739	331,963	50.6	2.7	45.4	55.9
พระนครศรีอยุธยา	855	301,546	54.3	5.7	43.1	65.6
อ่างทอง	938	119,698	55.1	2.5	50.1	60.1
ลพบุรี	830	282,820	51.1	4.6	42.1	60.1
สิงห์บุรี	570	63,649	39.2	4.4	30.5	47.8
ชัยนาท	949	131,257	52.6	4.5	43.7	61.5
สระบุรี	954	229,484	50.3	4.3	41.9	58.8
ชลบุรี	783	445,737	48.0	5.7	36.9	59.2
ระยอง	800	218,581	51.6	3.2	45.5	57.8
จันทบุรี	810	163,689	43.5	3.6	36.4	50.5
ตราด	888	77,295	50.0	6.3	37.6	62.5
ฉะเชิงเทรา	917	283,639	59.2	4.9	49.5	68.9
ปราจีนบุรี	771	158,810	46.4	2.9	40.8	52.0
นครนายก	802	83,573	44.4	3.7	37.1	51.7
สระแก้ว	1,039	214,535	55.3	5.5	44.5	66.2
ราชบุรี	882	311,194	51.8	5.0	42.0	61.5
กาญจนบุรี	759	238,363	42.9	2.9	37.1	48.7
สุพรรณบุรี	787	244,655	38.6	4.5	29.7	47.4
นครปฐม	714	271,932	43.9	6.9	30.4	57.4
สมุทรสาคร	609	115,165	33.5	4.2	25.2	41.8
สมุทรสงคราม	1,010	82,174	56.1	3.4	49.5	62.8
เพชรบุรี	770	150,972	45.1	3.0	39.2	51.0
ประจวบคีรีขันธ์	824	182,561	53.6	4.9	43.9	63.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	890	1,029,233	54.9	3.2	48.6	61.2
บุรีรัมย์	838	518,707	45.3	4.4	36.7	53.9
สุรินทร์	958	615,203	62.0	5.2	51.8	72.2
ศรีสะเกษ	937	607,383	58.0	4.6	49.0	67.0
อุบลราชธานี	822	662,572	51.6	3.6	44.5	58.6
ยโสธร	890	199,958	47.9	4.5	39.1	56.7
ชัยภูมิ	889	464,005	56.8	3.5	49.8	63.7
อำนาจเจริญ	958	153,391	57.2	3.4	50.5	63.9
หนองบัวลำภู	703	153,154	40.5	2.4	35.8	45.2
ขอนแก่น	882	660,441	50.7	5.4	40.1	61.2
อุดรธานี	927	615,068	57.2	4.5	48.3	66.1
เลย	998	272,626	60.3	4.6	51.2	69.3
หนองคาย	855	346,465	55.5	4.6	46.4	64.5

ตารางที่ 3.5.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย และได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาอย่างชัดเจนและเพียงพอ ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	941	450,285	62.6	6.4	50.1	75.1
ร้อยเอ็ด	1,138	569,650	58.2	8.7	41.2	75.2
กาฬสินธุ์	865	382,352	54.6	3.8	47.0	62.2
สกลนคร	801	321,092	41.1	5.5	30.2	52.0
นครพนม	951	226,453	45.9	5.6	35.0	56.8
มุกดาหาร	604	89,940	36.8	6.3	24.5	49.1
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	835	625,193	54.0	3.8	46.5	61.4
ลำพูน	1,033	187,870	60.7	3.4	54.0	67.4
ลำปาง	858	289,484	48.2	3.4	41.6	54.8
อุตรดิตถ์	685	134,805	39.9	3.3	33.3	46.4
แพร่	865	187,939	51.7	3.6	44.6	58.7
น่าน	947	213,281	58.3	5.3	47.8	68.8
พะเยา	1,007	229,050	60.8	4.2	52.5	69.1
เชียงราย	988	512,449	59.5	4.8	50.2	68.9
แม่ฮ่องสอน	868	74,004	51.6	4.8	42.1	61.1
นครสวรรค์	921	410,425	55.4	2.7	50.0	60.8
อุทัยธานี	856	142,633	61.9	5.6	50.8	72.9
กำแพงเพชร	819	262,951	50.6	4.3	42.2	59.0
ตาก	873	157,176	47.5	3.2	41.2	53.9
สุโขทัย	818	225,343	48.5	4.1	40.4	56.7
พิษณุโลก	1,006	401,360	63.1	4.9	53.5	72.6
พิจิตร	757	193,641	47.4	3.0	41.5	53.2
เพชรบูรณ์	684	295,294	40.4	8.4	24.0	56.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	767	509,357	47.1	5.5	36.2	57.9
กระบี่	930	171,312	57.4	5.5	46.6	68.2
พังงา	910	96,256	52.6	6.9	39.0	66.2
ภูเก็ต	539	66,191	27.9	3.5	21.0	34.7
สุราษฎร์ธานี	814	336,491	49.1	5.3	38.7	59.5
ระนอง	824	50,580	42.7	5.1	32.6	52.7
ชุมพร	822	143,179	40.7	5.7	29.5	51.9
สงขลา	761	405,942	43.2	2.9	37.5	48.9
สตูล	801	101,335	50.7	4.6	41.6	59.8
ตรัง	811	202,006	45.8	3.6	38.7	53.0
พัทลุง	768	159,561	42.1	3.3	35.6	48.7
ปัตตานี	846	190,367	45.7	4.6	36.6	54.8
ยะลา	737	118,395	38.0	4.9	28.3	47.7
นราธิวาส	713	211,060	43.6	3.5	36.6	50.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.5.4 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีความมั่นใจในการดูแลตนเองปานกลางถึงมาก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	4,660	2,229,442	46.3	1.1	44.2	48.5
25 - 34	5,165	2,241,942	49.8	1.0	47.9	51.8
35 - 44	6,033	2,686,706	53.1	1.1	50.9	55.2
45 - 54	4,993	2,306,618	59.0	1.1	56.9	61.1
55 - 64	9,089	1,574,590	64.9	0.9	63.1	66.6
65 - 74	4,383	752,229	69.0	1.2	66.6	71.3
รวม	34,323	11,791,527	54.1	0.7	52.6	55.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	5,164	2,468,965	55.2	1.1	53.0	57.4
25 - 34	6,055	2,766,978	62.0	1.0	60.1	63.9
35 - 44	7,767	3,598,854	65.6	1.0	63.7	67.5
45 - 54	6,427	3,003,622	69.5	1.0	67.4	71.5
55 - 64	10,059	2,057,330	74.3	0.8	72.8	75.8
65 - 74	4,917	981,702	75.4	1.0	73.5	77.4
รวม	40,389	14,877,450	65.2	0.7	63.9	66.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	9,824	4,698,407	50.6	0.9	48.8	52.3
25 - 34	11,220	5,008,920	55.9	0.8	54.3	57.5
35 - 44	13,800	6,285,560	59.6	0.9	57.9	61.3
45 - 54	11,420	5,310,240	64.5	0.9	62.8	66.2
55 - 64	19,148	3,631,919	69.9	0.7	68.5	71.2
65 - 74	9,300	1,733,930	72.5	0.8	70.9	74.1
รวมทั้งประเทศ	74,712	26,668,976	59.8	0.6	58.5	61.0

ตารางที่ 3.5.5 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมาที่มีความมั่นใจในการดูแลตนเองปานกลางถึงมาก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	36,284	7,996,802	53.9	0.8	52.3	55.5
นอกเขตเทศบาล	38,428	18,672,174	62.7	0.9	61.0	64.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	739	1,770,986	43.6	2.1	39.5	47.8
ภาคกลาง	24,524	6,612,767	59.9	1.1	57.7	62.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19,151	9,533,278	62.7	1.2	60.3	65.0
ภาคเหนือ	17,114	5,316,023	63.9	1.4	61.2	66.6
ภาคใต้	13,184	3,435,923	57.4	1.5	54.4	60.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	2,879	1,200,789	61.4	2.6	56.2	66.6
เขต สคร. ที่ 2	4,902	942,393	58.4	2.3	53.9	62.8
เขต สคร. ที่ 3	9,077	2,537,742	63.4	1.7	59.9	66.8
เขต สคร. ที่ 4	7,666	1,931,843	55.6	2.2	51.4	59.9
เขต สคร. ที่ 5	4,015	2,941,879	62.3	2.1	58.3	66.4
เขต สคร. ที่ 6	8,245	3,930,935	64.5	2.3	60.0	69.0
เขต สคร. ที่ 7	6,891	2,660,465	60.5	1.7	57.1	64.0
เขต สคร. ที่ 8	3,825	1,181,168	64.4	2.7	59.1	69.7
เขต สคร. ที่ 9	4,912	1,446,909	59.3	3.3	52.9	65.8
เขต สคร. ที่ 10	8,377	2,687,946	66.5	1.6	63.4	69.5
เขต สคร. ที่ 11	6,695	1,746,809	60.3	2.6	55.2	65.4
เขต สคร. ที่ 12	6,489	1,689,114	54.6	1.5	51.7	57.6



ตารางที่ 3.5.6 ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีความมั่นใจในการดูแลตนเองปานกลางถึงมาก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	739	1,770,986	43.6	2.1	39.5	47.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,181	610,748	75.3	3.8	67.9	82.7
นนทบุรี	1,022	461,771	59.5	5.1	49.5	69.5
ปทุมธานี	897	402,778	62.6	2.5	57.7	67.6
พระนครศรีอยุธยา	960	336,240	62.6	5.1	52.6	72.6
อ่างทอง	1,131	141,980	65.7	2.8	60.2	71.1
ลพบุรี	953	321,278	59.2	5.2	48.9	69.5
สิงห์บุรี	687	72,180	44.9	4.4	36.2	53.5
ชัยนาท	1,075	149,250	61.4	4.1	53.4	69.3
สระบุรี	1,056	257,705	57.2	4.2	49.0	65.3
ชลบุรี	917	522,496	57.8	5.0	48.0	67.7
ระยอง	1,050	278,044	68.0	3.0	62.0	74.0
จันทบุรี	924	189,220	51.0	4.1	42.9	59.0
ตราด	1,019	100,231	66.2	5.9	54.6	77.7
ฉะเชิงเทรา	1,002	301,889	65.4	4.6	56.3	74.6
ปราจีนบุรี	852	176,163	52.5	4.2	44.2	60.7
นครนายก	947	100,715	54.6	4.4	45.9	63.3
สระแก้ว	1,185	258,236	68.6	6.8	55.3	81.9
ราชบุรี	1,029	368,423	64.2	3.4	57.5	71.0
กาญจนบุรี	909	275,248	51.1	4.5	42.3	59.8
สุพรรณบุรี	958	307,306	49.5	5.8	38.2	60.9
นครปฐม	939	338,974	55.8	8.0	40.2	71.4
สมุทรสาคร	713	138,293	40.5	2.9	34.8	46.3
สมุทรสงคราม	1,180	97,917	68.3	3.9	60.6	76.0
เพชรบุรี	994	194,278	59.1	3.4	52.4	65.8
ประจวบคีรีขันธ์	944	211,404	66.2	4.9	56.5	75.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	995	1,178,756	63.9	3.3	57.4	70.5
บุรีรัมย์	901	553,090	49.0	4.6	39.9	58.1
สุรินทร์	1,095	672,762	70.4	4.2	62.2	78.6
ศรีสะเกษ	1,102	711,168	69.0	3.8	61.6	76.4
อุบลราชธานี	954	727,365	58.2	2.6	53.1	63.3
ยโสธร	1,066	245,794	59.6	4.6	50.5	68.7
ชัยภูมิ	1,024	537,271	67.7	3.4	61.1	74.3
อำนาจเจริญ	1,104	183,777	69.8	3.2	63.5	76.1
หนองบัวลำภู	798	177,434	47.5	2.3	43.0	52.1
ขอนแก่น	951	744,060	58.2	5.2	48.0	68.4
อุดรธานี	1,094	719,865	67.9	3.6	60.8	75.0
เลย	1,049	278,922	64.9	4.2	56.6	73.2
หนองคาย	1,005	386,100	63.7	5.7	52.5	74.9

ตารางที่ 3.5.6 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีความมั่นใจในการดูแลตนเองปานกลางถึงมาก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,062	529,099	74.2	6.5	61.5	87.0
ร้อยเอ็ด	1,285	659,226	68.4	10.0	48.8	88.0
กาฬสินธุ์	1,001	436,227	65.0	4.2	56.8	73.3
สกลนคร	932	427,188	56.9	6.4	44.2	69.5
นครพนม	1,043	267,370	59.3	3.9	51.7	67.0
มุกดาหาร	690	97,803	41.2	6.8	27.9	54.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,036	753,614	67.0	3.8	59.6	74.5
ลำพูน	1,120	202,079	67.4	3.3	60.9	73.9
ลำปาง	970	341,083	57.6	2.4	52.8	62.4
อุตรดิตถ์	899	180,481	54.3	4.4	45.8	62.9
แพร่	906	193,791	56.6	3.9	48.9	64.3
น่าน	1,034	225,915	63.7	3.9	56.1	71.3
พะเยา	1,097	248,762	67.9	4.1	59.8	76.1
เชียงราย	1,189	632,268	76.2	3.3	69.7	82.7
แม่ฮ่องสอน	1,025	90,435	68.1	5.9	56.5	79.6
นครสวรรค์	1,023	490,088	67.3	4.3	59.0	75.7
อุทัยธานี	982	159,709	73.5	5.2	63.2	83.8
กำแพงเพชร	1,045	336,606	68.1	5.4	57.4	78.7
ตาก	1,029	209,086	64.5	4.4	55.8	73.3
สุโขทัย	1,042	273,768	59.5	4.3	51.1	68.0
พิษณุโลก	1,130	434,650	71.7	5.3	61.3	82.2
พิจิตร	775	194,765	49.4	3.7	42.0	56.8
เพชรบูรณ์	812	348,924	48.7	8.9	31.3	66.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	910	620,132	58.5	6.0	46.7	70.3
กระบี่	1,075	213,749	73.8	5.3	63.4	84.2
พังงา	992	105,916	59.4	6.4	46.8	72.0
ภูเก็ต	688	88,224	37.5	4.6	28.5	46.5
สุราษฎร์ธานี	1,000	430,057	64.0	3.6	56.9	71.1
ระนอง	942	58,185	49.8	4.5	40.9	58.7
ชุมพร	1,088	230,546	66.7	5.5	56.0	77.5
สงขลา	893	493,449	54.2	2.8	48.6	59.8
สตูล	986	124,590	64.7	4.2	56.5	73.0
ตรัง	974	247,318	57.3	4.5	48.4	66.2
พัทลุง	896	186,238	49.7	2.7	44.3	55.1
ปัตตานี	955	220,593	54.4	4.5	45.5	63.2
ยะลา	904	153,792	50.5	5.3	40.0	61.0
นราธิวาส	881	263,134	55.8	4.0	47.8	63.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.6.1 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกและฟันโดยไม่รู้ว่ามีปัญหาสุขภาพในช่องปากใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,562	720,763	14.5	0.8	13.0	15.9
25 - 34	1,415	633,069	13.7	0.6	12.5	14.9
35 - 44	1,570	705,283	13.6	0.6	12.4	14.8
45 - 54	1,365	615,557	15.5	0.8	13.9	17.1
55 - 64	2,358	403,074	16.3	0.6	15.1	17.4
65 - 74	1,102	189,297	16.7	0.9	15.0	18.4
รวม	9,372	3,267,042	14.6	0.4	13.7	15.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,372	1,148,419	25.0	0.9	23.2	26.9
25 - 34	2,484	1,141,251	25.0	0.9	23.2	26.8
35 - 44	2,633	1,257,839	22.3	0.7	20.8	23.8
45 - 54	2,099	976,037	22.1	0.8	20.4	23.7
55 - 64	2,701	522,825	18.5	0.7	17.1	19.8
65 - 74	1,170	219,266	16.4	0.7	14.9	17.8
รวม	13,459	5,265,636	22.5	0.5	21.5	23.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	3,934	1,869,182	19.5	0.6	18.3	20.8
25 - 34	3,899	1,774,319	19.3	0.6	18.1	20.5
35 - 44	4,203	1,963,122	18.1	0.6	17.0	19.2
45 - 54	3,464	1,591,594	18.9	0.7	17.6	20.3
55 - 64	5,059	925,899	17.4	0.5	16.4	18.5
65 - 74	2,272	408,563	16.5	0.6	15.3	17.7
รวมทั้งประเทศ	22,831	8,532,678	18.6	0.4	17.8	19.5

ตารางที่ 3.6.2 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตกรรม หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน โดยไม่รู้ว่ามีปัญหาสุขภาพในช่องปากใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	12,592	3,371,326	22.1	0.7	20.6	23.5
นอกเขตเทศบาล	10,239	5,161,352	16.9	0.5	15.9	18.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	393	1,077,394	26.0	2.2	21.7	30.2
ภาคกลาง	7,605	2,170,219	19.1	0.7	17.8	20.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,213	2,943,300	18.8	0.9	17.1	20.4
ภาคเหนือ	4,825	1,405,051	16.6	0.8	15.0	18.1
ภาคใต้	3,795	936,715	15.4	0.7	14.1	16.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,082	476,904	23.3	2.1	19.2	27.3
เขต สคร. ที่ 2	1,236	232,382	14.2	1.2	11.8	16.5
เขต สคร. ที่ 3	2,982	856,846	20.8	1.2	18.3	23.2
เขต สคร. ที่ 4	2,305	604,086	17.0	1.0	15.1	19.0
เขต สคร. ที่ 5	1,305	880,878	18.2	1.4	15.4	21.1
เขต สคร. ที่ 6	2,616	1,278,225	20.4	1.6	17.3	23.4
เขต สคร. ที่ 7	2,292	784,198	17.1	1.2	14.7	19.6
เขต สคร. ที่ 8	1,230	376,597	20.2	2.4	15.5	24.9
เขต สคร. ที่ 9	1,438	386,929	15.5	1.0	13.5	17.5
เขต สคร. ที่ 10	2,157	641,525	15.6	0.9	13.9	17.3
เขต สคร. ที่ 11	1,960	458,422	15.5	1.0	13.6	17.5
เขต สคร. ที่ 12	1,835	478,292	15.2	0.9	13.5	16.9

ตารางที่ 3.6.3 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตกรรม หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน โดยไม่รู้ว่ามีปัญหาสุขภาพในช่องปากใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	393	1,077,394	26.0	2.2	21.7	30.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	369	164,568	19.7	3.2	13.5	25.9
นนทบุรี	347	182,357	22.5	3.5	15.6	29.5
ปทุมธานี	478	213,180	31.7	4.3	23.2	40.2
พระนครศรีอยุธยา	257	81,367	14.4	2.4	9.6	19.1
อ่างทอง	260	35,907	16.6	2.9	10.9	22.3
ลพบุรี	243	82,564	14.8	2.8	9.2	20.3
สิงห์บุรี	268	25,155	16.3	1.5	13.4	19.3
ชัยนาท	219	28,591	11.3	1.9	7.5	15.1
สระบุรี	246	60,166	13.2	1.7	9.9	16.4
ชลบุรี	331	196,929	21.2	2.6	16.1	26.3
ระยอง	448	124,974	28.7	3.5	21.8	35.5
จันทบุรี	311	75,618	20.3	2.9	14.6	26.1
ตราด	277	21,015	13.3	2.9	7.6	19.1
ฉะเชิงเทรา	297	91,501	18.7	2.0	14.8	22.7
ปราจีนบุรี	353	65,538	19.3	3.3	12.7	25.8
นครนายก	283	24,844	13.5	2.5	8.6	18.5
สระแก้ว	313	91,860	23.9	6.5	11.0	36.7
ราชบุรี	248	92,484	15.3	1.5	12.4	18.3
กาญจนบุรี	279	77,827	13.7	1.7	10.4	17.0
สุพรรณบุรี	260	73,239	11.5	2.3	7.0	16.0
นครปฐม	304	133,537	21.5	2.6	16.3	26.6
สมุทรสาคร	305	65,791	22.8	3.8	15.3	30.2
สมุทรสงคราม	260	26,611	18.8	5.4	8.1	29.5
เพชรบุรี	341	73,867	22.0	2.3	17.5	26.4
ประจวบคีรีขันธ์	308	60,732	17.5	2.7	12.1	22.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	374	445,351	23.6	2.5	18.8	28.4
บุรีรัมย์	308	158,533	14.0	1.5	11.1	16.8
สุรินทร์	340	149,825	15.0	3.6	8.0	22.0
ศรีสะเกษ	340	184,563	17.3	4.2	9.1	25.6
อุบลราชธานี	361	237,134	18.3	1.9	14.6	22.0
ยโสธร	306	54,917	13.3	3.0	7.5	19.1
ชัยภูมิ	283	127,167	15.8	2.5	10.8	20.7
อำนาจเจริญ	415	75,097	27.9	3.6	20.8	35.0
หนองบัวลำภู	284	52,717	13.9	1.3	11.3	16.4
ขอนแก่น	340	282,347	21.9	3.7	14.5	29.2
อุดรธานี	306	237,924	21.5	3.6	14.3	28.6
เลย	292	91,708	19.9	4.2	11.6	28.3
หนองคาย	395	139,725	21.3	3.2	15.1	27.6

ตารางที่ 3.6.3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตกรรม หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน โดยไม่รู้ว่ามีปัญหาสุขภาพในช่องปากใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	336	142,529	20.1	4.2	11.9	28.3
ร้อยเอ็ด	303	156,828	15.8	4.0	7.9	23.6
กาฬสินธุ์	360	174,447	25.7	5.3	15.3	36.1
สกลนคร	295	124,303	15.6	1.8	12.0	19.3
นครพนม	378	83,604	16.8	2.7	11.5	22.1
มุกดาหาร	197	24,579	10.1	2.7	4.8	15.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	316	223,656	19.6	2.3	15.1	24.1
ลำพูน	192	35,698	11.3	1.9	7.6	15.0
ลำปาง	276	93,766	15.6	1.7	12.2	19.0
อุตรดิตถ์	253	54,827	16.2	2.0	12.3	20.1
แพร่	269	54,216	15.0	3.1	8.9	21.0
น่าน	313	47,664	13.5	1.4	10.7	16.3
พะเยา	270	61,739	16.8	3.0	10.8	22.7
เชียงราย	233	102,481	12.3	1.2	9.8	14.7
แม่ฮ่องสอน	288	22,305	16.1	3.2	9.8	22.3
นครสวรรค์	324	164,554	22.8	3.9	15.1	30.4
อุทัยธานี	419	65,718	28.6	8.3	12.2	44.9
กำแพงเพชร	279	85,444	16.9	4.0	9.1	24.7
ตาก	281	54,710	16.4	2.1	12.2	20.6
สุโขทัย	254	52,994	11.4	1.6	8.2	14.6
พิษณุโลก	376	123,216	19.5	2.5	14.6	24.3
พิจิตร	208	60,881	14.9	2.7	9.7	20.2
เพชรบูรณ์	274	101,182	13.9	2.1	9.8	17.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	208	111,318	10.4	1.4	7.5	13.2
กระบี่	332	56,039	18.8	3.1	12.8	24.8
พังงา	289	25,156	14.0	3.4	7.4	20.6
ภูเก็ต	267	41,616	17.6	2.7	12.2	23.0
สุราษฎร์ธานี	305	130,144	18.6	2.3	14.1	23.1
ระนอง	246	18,812	16.4	3.0	10.5	22.3
ชุมพร	313	75,338	21.6	3.2	15.3	28.0
สงขลา	232	147,827	15.8	2.0	11.9	19.6
สตูล	291	32,015	16.3	3.3	9.8	22.8
ตรัง	267	62,645	14.7	2.4	10.0	19.4
พัทลุง	255	51,974	13.8	1.3	11.2	16.4
ปัตตานี	256	52,109	12.7	1.3	10.1	15.2
ยะลา	278	48,579	15.5	2.1	11.3	19.7
นราธิวาส	256	83,142	17.3	2.5	12.4	22.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 3.6.4 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาล เพื่อรักษาฟันและโรคเกี่ยวกับเหงือก รวมทั้งการขูดหินปูน ครั้งสุดท้ายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,725	791,080	15.9	0.7	14.5	17.2
25 - 34	1,634	717,561	15.5	0.6	14.3	16.8
35 - 44	1,804	784,845	15.2	0.7	13.9	16.5
45 - 54	1,565	692,828	17.4	0.9	15.7	19.1
55 - 64	2,715	467,761	18.9	0.6	17.7	20.1
65 - 74	1,271	222,129	19.7	1.0	17.8	21.7
รวม	10,714	3,676,203	16.4	0.5	15.5	17.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,643	1,251,563	27.3	0.9	25.4	29.2
25 - 34	2,713	1,228,219	26.9	0.9	25.1	28.7
35 - 44	2,953	1,372,484	24.4	0.8	22.8	25.9
45 - 54	2,420	1,071,633	24.2	0.8	22.6	25.8
55 - 64	3,100	597,612	21.2	0.7	19.8	22.5
65 - 74	1,286	248,678	18.6	0.8	17.1	20.1
รวม	15,115	5,770,189	24.7	0.5	23.6	25.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	4,368	2,042,642	21.4	0.6	20.1	22.6
25 - 34	4,347	1,945,780	21.2	0.6	20.0	22.4
35 - 44	4,757	2,157,330	20.0	0.6	18.8	21.1
45 - 54	3,985	1,764,461	21.0	0.7	19.6	22.3
55 - 64	5,815	1,065,373	20.1	0.6	19.0	21.2
65 - 74	2,557	470,807	19.1	0.7	17.8	20.5
รวมทั้งประเทศ	25,829	9,446,392	20.7	0.4	19.8	21.5

ตารางที่ 3.6.5 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาล เพื่อรักษาฟันและโรคเกี่ยวกับเหงือก รวมทั้งการขูดหินปูน ครั้งสุดท้ายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	14,190	3,641,581	23.9	0.8	22.4	25.3
นอกเขตเทศบาล	11,639	5,804,811	19.1	0.5	18.0	20.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	407	1,105,032	26.7	2.3	22.1	31.3
ภาคกลาง	8,589	2,431,111	21.4	0.8	19.9	22.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,854	3,181,139	20.3	0.8	18.7	21.9
ภาคเหนือ	5,577	1,629,618	19.2	0.8	17.7	20.8
ภาคใต้	4,402	1,099,492	18.1	0.6	16.8	19.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,223	538,204	26.4	2.5	21.6	31.3
เขต สคร. ที่ 2	1,371	241,164	14.7	1.0	12.7	16.8
เขต สคร. ที่ 3	3,372	981,853	23.7	1.2	21.3	26.1
เขต สคร. ที่ 4	2,623	669,890	19.0	1.1	16.8	21.2
เขต สคร. ที่ 5	1,400	929,613	19.4	1.5	16.5	22.3
เขต สคร. ที่ 6	2,940	1,402,715	22.3	1.5	19.3	25.2
เขต สคร. ที่ 7	2,514	848,811	18.6	1.3	16.1	21.0
เขต สคร. ที่ 8	1,407	420,915	22.5	1.8	18.9	26.1
เขต สคร. ที่ 9	1,685	463,905	18.6	1.2	16.3	20.9
เขต สคร. ที่ 10	2,485	744,798	18.1	1.1	15.9	20.3
เขต สคร. ที่ 11	2,192	518,375	17.6	0.9	15.8	19.3
เขต สคร. ที่ 12	2,210	581,117	18.6	0.9	16.9	20.3



ตารางที่ 3.6.6 ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาล เพื่อรักษาฟันและโรคเกี่ยวกับเหงือก รวมทั้งการขูดหินปูน ครั้งสุดท้ายใน 12 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	407	1,105,032	26.7	2.3	22.1	31.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	433	200,480	23.7	3.3	17.2	30.2
นนทบุรี	394	196,486	24.4	3.5	17.5	31.3
ปทุมธานี	540	250,281	37.4	3.9	29.8	45.0
พระนครศรีอยุธยา	289	91,437	16.3	2.8	10.8	21.7
อ่างทอง	304	38,571	17.8	2.6	12.7	22.9
ลพบุรี	264	79,545	14.2	2.0	10.4	18.1
สิงห์บุรี	275	25,552	16.7	1.7	13.5	19.9
ชัยนาท	267	35,628	14.1	2.3	9.6	18.6
สระบุรี	261	61,868	13.6	2.1	9.4	17.7
ชลบุรี	397	238,285	25.5	2.5	20.6	30.4
ระยอง	449	130,893	30.3	3.7	23.1	37.4
จันทบุรี	370	87,877	23.6	2.9	18.0	29.2
ตราด	357	27,965	17.9	3.2	11.7	24.2
ฉะเชิงเทรา	330	101,431	20.8	1.7	17.5	24.0
ปราจีนบุรี	386	68,507	20.0	3.7	12.8	27.2
นครนายก	290	31,366	17.1	2.5	12.1	22.0
สระแก้ว	360	95,050	24.7	6.0	12.9	36.5
ราชบุรี	284	103,449	17.1	1.4	14.3	20.0
กาญจนบุรี	302	85,605	15.2	1.8	11.6	18.7
สุพรรณบุรี	299	80,598	12.6	2.6	7.5	17.8
นครปฐม	330	148,093	23.8	2.9	18.2	29.5
สมุทรสาคร	342	65,381	22.7	3.2	16.3	29.1
สมุทรสงคราม	364	33,603	23.3	6.9	9.7	36.8
เพชรบุรี	343	72,837	21.9	2.0	18.0	25.8
ประจวบคีรีขันธ์	359	80,325	23.8	3.8	16.3	31.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	402	470,076	25.2	2.4	20.5	29.9
บุรีรัมย์	320	162,552	14.4	1.6	11.3	17.5
สุรินทร์	365	166,879	16.7	3.9	9.0	24.5
ศรีสะเกษ	341	185,984	17.4	4.2	9.2	25.6
อุบลราชธานี	375	253,207	19.5	1.7	16.2	22.9
ยโสธร	398	68,588	16.6	1.8	13.0	20.2
ชัยภูมิ	313	130,106	16.2	2.7	10.9	21.4
อำนาจเจริญ	461	81,903	30.8	3.0	24.9	36.8
หนองบัวลำภู	332	64,193	16.9	1.2	14.6	19.2
ขอนแก่น	408	302,530	22.8	2.6	17.7	27.9
อุดรธานี	336	246,037	22.3	3.6	15.2	29.3
เลย	364	114,386	24.9	4.3	16.6	33.3
หนองคาย	399	148,981	22.8	3.4	16.2	29.5

ตารางที่ 3.6.6 (ต่อ) ร้อยละของผู้ที่ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาล เพื่อรักษาฟันและโรคเกี่ยวกับเหงือก รวมทั้งการขูดหินปูน ครั้งสุดท้ายใน 12 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	369	161,977	22.8	3.6	15.8	29.9
ร้อยเอ็ด	341	177,401	17.9	4.9	8.3	27.5
กาฬสินธุ์	391	187,211	27.7	5.2	17.5	37.9
สกลนคร	322	137,224	17.4	2.6	12.3	22.4
นครพนม	397	90,361	18.3	2.9	12.7	23.9
มุกดาหาร	220	31,544	12.8	3.4	6.2	19.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	335	243,257	21.2	3.5	14.3	28.0
ลำพูน	202	37,335	11.9	1.8	8.4	15.4
ลำปาง	354	119,750	20.0	1.4	17.3	22.8
อุตรดิตถ์	297	59,213	17.6	1.9	13.9	21.3
แพร่	288	55,439	15.3	2.6	10.2	20.5
น่าน	354	55,674	15.7	1.6	12.6	18.9
พะเยา	279	62,219	16.9	2.8	11.4	22.4
เชียงราย	311	146,381	17.6	1.7	14.2	21.0
แม่ฮ่องสอน	362	24,743	18.0	2.7	12.6	23.4
นครสวรรค์	362	167,540	23.2	2.4	18.5	27.9
อุทัยธานี	415	64,395	28.0	8.3	11.7	44.2
กำแพงเพชร	330	100,841	19.9	4.1	11.8	27.9
ตาก	315	57,372	17.3	2.1	13.2	21.3
สุโขทัย	327	74,524	16.0	2.2	11.6	20.4
พิษณุโลก	416	136,406	21.6	2.3	17.2	26.1
พิจิตร	300	88,140	21.7	1.5	18.6	24.7
เพชรบูรณ์	330	136,390	18.6	2.9	12.9	24.4
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	241	138,313	12.8	1.3	10.3	15.3
กระบี่	399	64,288	21.6	2.8	16.0	27.2
พังงา	323	27,411	15.2	3.1	9.2	21.3
ภูเก็ต	274	43,842	18.7	2.8	13.1	24.2
สุราษฎร์ธานี	338	143,481	20.5	2.4	15.8	25.2
ระนอง	273	24,086	20.9	2.5	16.0	25.8
ชุมพร	344	76,953	22.3	2.7	16.9	27.7
สงขลา	270	170,844	18.2	2.2	14.0	22.5
สตูล	328	38,821	19.6	3.1	13.6	25.7
ตรัง	340	81,448	19.1	2.0	15.0	23.1
พัทลุง	382	86,162	23.0	1.4	20.3	25.8
ปัตตานี	306	63,163	15.5	1.4	12.7	18.2
ยะลา	302	54,365	17.6	2.2	13.3	21.9
นราธิวาส	282	86,315	18.2	2.1	14.0	22.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ส่วนที่ 4  
ภาวะน้ำหนักเกิน  
และภาวะอ้วน



ตารางที่ 4.1.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,373	21.1	0.1	20.9	21.2
25 - 34	10,208	22.5	0.1	22.4	22.7
35 - 44	11,092	23.0	0.1	22.9	23.1
45 - 54	8,328	23.2	0.1	23.1	23.3
55 - 64	13,042	22.9	0.1	22.8	23.0
65 - 74	5,687	22.5	0.1	22.3	22.7
รวม	58,730	22.5	0.0	22.4	22.5
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9,519	20.4	0.1	20.3	20.6
25 - 34	9,489	22.2	0.1	22.1	22.4
35 - 44	11,480	23.6	0.1	23.4	23.7
45 - 54	8,902	24.1	0.1	24.0	24.3
55 - 64	11,915	24.0	0.1	23.8	24.1
65 - 74	5,309	23.2	0.1	23.0	23.4
รวม	56614	22.8	0.0	22.7	22.9
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	19,892	20.8	0.0	20.7	20.8
25 - 34	19,697	22.4	0.1	22.3	22.5
35 - 44	22,572	23.3	0.0	23.2	23.4
45 - 54	17,230	23.7	0.1	23.6	23.8
55 - 64	24,957	23.5	0.1	23.4	23.6
65 - 74	10,996	22.8	0.1	22.7	23.0
รวมทั้งประเทศ	115,344	22.6	0.0	22.6	22.7

ตารางที่ 4.1.2 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	58,745	22.9	0.0	22.8	23.0
นอกเขตเทศบาล	56,599	22.5	0.0	22.4	22.6
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,577	23.3	0.1	23.0	23.5
ภาคกลาง	37,882	22.7	0.0	22.6	22.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29,206	22.5	0.0	22.4	22.6
ภาคเหนือ	25,541	22.7	0.1	22.6	22.8
ภาคใต้	21,138	22.5	0.1	22.4	22.7
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	4,022	22.6	0.1	22.3	22.8
เขต สคร. ที่ 2	7,731	22.9	0.1	22.7	23.0
เขต สคร. ที่ 3	13,715	22.8	0.1	22.6	22.9
เขต สคร. ที่ 4	12,414	22.6	0.1	22.5	22.7
เขต สคร. ที่ 5	6,177	22.4	0.1	22.2	22.6
เขต สคร. ที่ 6	12,392	22.6	0.1	22.5	22.7
เขต สคร. ที่ 7	10,637	22.3	0.1	22.2	22.5
เขต สคร. ที่ 8	5,830	23.1	0.1	22.9	23.3
เขต สคร. ที่ 9	7,554	22.8	0.1	22.6	23.0
เขต สคร. ที่ 10	12,157	22.4	0.1	22.2	22.6
เขต สคร. ที่ 11	10,824	22.6	0.1	22.4	22.8
เขต สคร. ที่ 12	10,314	22.5	0.1	22.3	22.6

ตารางที่ 4.1.3 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,577	23.3	0.1	23.0	23.5
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,603	22.6	0.3	22.0	23.3
นนทบุรี	1,534	22.3	0.2	21.9	22.7
ปทุมธานี	927	22.7	0.2	22.4	23.0
พระนครศรีอยุธยา	1,561	22.9	0.2	22.5	23.3
อ่างทอง	1,625	22.9	0.1	22.7	23.2
ลพบุรี	1,489	23.0	0.2	22.5	23.5
สิงห์บุรี	1,582	22.7	0.1	22.4	22.9
ชัยนาท	1,471	23.0	0.2	22.6	23.4
สระบุรี	1,564	22.6	0.1	22.4	22.9
ชลบุรี	1,538	23.2	0.2	22.8	23.6
ระยอง	1,452	22.1	0.4	21.4	22.8
จันทบุรี	1,467	22.7	0.2	22.4	23.1
ตราด	1,515	23.0	0.1	22.8	23.3
ฉะเชิงเทรา	1,564	22.5	0.2	22.1	22.8
ปราจีนบุรี	1,584	23.0	0.2	22.7	23.3
นครนายก	1,556	22.9	0.1	22.7	23.2
สระแก้ว	1,436	22.7	0.2	22.3	23.1
ราชบุรี	1,487	22.7	0.2	22.3	23.0
กาญจนบุรี	1,577	22.5	0.1	22.2	22.8
สุพรรณบุรี	1,608	22.8	0.2	22.5	23.1
นครปฐม	1,547	22.6	0.2	22.2	22.9
สมุทรสาคร	1,485	22.6	0.2	22.2	23.0
สมุทรสงคราม	1,573	22.5	0.3	21.9	23.1
เพชรบุรี	1,574	22.7	0.2	22.3	23.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,563	22.2	0.2	21.7	22.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,580	22.4	0.2	22.0	22.8
บุรีรัมย์	1,547	22.4	0.1	22.1	22.7
สุรินทร์	1,530	22.1	0.2	21.8	22.5
ศรีสะเกษ	1,426	22.0	0.2	21.6	22.3
อุบลราชธานี	1,437	22.3	0.2	22.0	22.6
ยโสธร	1,669	22.2	0.1	22.0	22.5
ชัยภูมิ	1,520	22.7	0.1	22.4	23.0
อำนาจเจริญ	1,455	22.9	0.2	22.6	23.2
หนองบัวลำภู	1,557	23.0	0.2	22.7	23.3
ขอนแก่น	1,532	22.8	0.2	22.4	23.3
อุดรธานี	1,519	22.7	0.1	22.5	22.9
เลย	1,542	22.8	0.1	22.5	23.0
หนองคาย	1,520	23.0	0.2	22.6	23.5

ตารางที่ 4.1.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,655	22.2	0.1	22.0	22.4
ร้อยเอ็ด	1,538	22.3	0.1	22.2	22.5
กาฬสินธุ์	1,529	22.0	0.1	21.8	22.3
สกลนคร	1,507	22.6	0.1	22.3	22.9
นครพนม	1,511	22.4	0.2	22.0	22.7
มุกดาหาร	1,632	22.2	0.2	21.7	22.6
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,534	22.7	0.3	22.1	23.2
ลำพูน	1,580	21.9	0.2	21.6	22.3
ลำปาง	1,564	22.5	0.2	22.2	22.8
อุตรดิตถ์	1,481	22.3	0.1	22.0	22.6
แพร่	1,594	22.5	0.1	22.3	22.8
น่าน	1,476	21.8	0.1	21.5	22.1
พะเยา	1,596	22.0	0.2	21.7	22.4
เชียงราย	1,504	22.6	0.2	22.3	22.9
แม่ฮ่องสอน	1,309	22.6	0.2	22.2	23.0
นครสวรรค์	1,461	23.1	0.1	22.9	23.4
อุทัยธานี	1,468	23.1	0.2	22.7	23.5
กำแพงเพชร	1,425	22.7	0.2	22.3	23.0
ตาก	1,476	22.8	0.2	22.3	23.3
สุโขทัย	1,548	22.8	0.2	22.4	23.2
พิษณุโลก	1,529	22.7	0.2	22.4	23.1
พิจิตร	1,476	23.6	0.2	23.2	24.0
เพชรบูรณ์	1,520	23.1	0.3	22.6	23.6
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,413	22.4	0.3	21.9	22.9
กระบี่	1,504	22.7	0.2	22.3	23.1
พังงา	1,593	23.0	0.3	22.5	23.5
ภูเก็ต	1,579	22.7	0.2	22.2	23.1
สุราษฎร์ธานี	1,552	22.6	0.1	22.4	22.9
ระนอง	1,615	22.8	0.1	22.6	23.0
ชุมพร	1,568	22.7	0.2	22.3	23.1
สงขลา	1,579	22.4	0.2	22.0	22.8
สตูล	1,462	22.6	0.1	22.3	22.8
ตรัง	1,565	22.7	0.2	22.3	23.0
พัทลุง	1,486	22.7	0.2	22.4	23.0
ปัตตานี	1,365	22.3	0.2	21.8	22.8
ยะลา	1,452	22.2	0.1	21.9	22.5
นราธิวาส	1,405	22.4	0.2	21.9	22.9



ตารางที่ 4.1.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 25$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,008	423,061	8.9	0.5	7.9	9.8
25 - 34	1,848	770,448	17.2	0.7	15.9	18.6
35 - 44	2,490	1,090,924	21.8	0.6	20.6	22.9
45 - 54	2,104	954,384	25.0	0.9	23.3	26.7
55 - 64	3,097	527,565	22.9	0.7	21.6	24.2
65 - 74	1,184	204,984	20.8	1.0	18.8	22.8
รวม	11,731	3,971,366	18.6	0.4	17.9	19.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	854	361,075	8.2	0.4	7.4	9.1
25 - 34	1,743	767,565	17.9	0.8	16.5	19.4
35 - 44	3,295	1,520,070	28.5	0.7	27.0	30.0
45 - 54	3,075	1,405,878	34.5	0.8	32.9	36.1
55 - 64	4,259	821,768	34.3	0.8	32.8	35.8
65 - 74	1,583	297,243	28.1	1.2	25.8	30.4
รวม	14,809	5,173,598	24.0	0.4	23.3	24.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,862	784,136	8.6	0.3	7.9	9.2
25 - 34	3,591	1,538,013	17.6	0.5	16.6	18.6
35 - 44	5,785	2,610,994	25.2	0.5	24.3	26.2
45 - 54	5,179	2,360,261	29.9	0.7	28.6	31.2
55 - 64	7,356	1,349,333	28.7	0.6	27.6	29.9
65 - 74	2,767	502,227	24.6	0.8	22.9	26.2
รวมทั้งประเทศ	26,540	9,144,964	21.3	0.3	20.7	21.9

ตารางที่ 4.1.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย  $\geq$  25 กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	14,533	3,486,281	24.2	0.5	23.1	25.2
นอกเขตเทศบาล	12,007	5,658,683	19.9	0.4	19.2	20.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	456	1,149,921	28.9	1.5	25.9	31.9
ภาคกลาง	9,120	2,277,845	21.7	0.5	20.7	22.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,266	2,882,125	19.3	0.5	18.3	20.4
ภาคเหนือ	5,698	1,704,304	21.6	0.6	20.4	22.8
ภาคใต้	5,000	1,130,768	20.2	0.6	19.1	21.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	956	348,680	20.0	1.5	17.1	22.9
เขต สคร. ที่ 2	1,857	342,851	22.7	0.9	21.0	24.4
เขต สคร. ที่ 3	3,318	866,408	22.3	0.9	20.5	24.2
เขต สคร. ที่ 4	2,989	719,906	21.4	0.7	20.0	22.8
เขต สคร. ที่ 5	1,338	912,054	19.9	1.3	17.4	22.4
เขต สคร. ที่ 6	2,675	1,188,575	19.6	0.8	18.1	21.1
เขต สคร. ที่ 7	2,253	781,496	18.3	0.7	17.0	19.7
เขต สคร. ที่ 8	1,506	426,061	25.4	1.1	23.2	27.5
เขต สคร. ที่ 9	1,802	516,841	22.4	1.4	19.7	25.0
เขต สคร. ที่ 10	2,390	761,402	19.5	0.9	17.8	21.2
เขต สคร. ที่ 11	2,646	575,840	20.9	0.9	19.1	22.7
เขต สคร. ที่ 12	2,354	554,929	19.6	0.7	18.2	21.0

ตารางที่ 4.1.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย  $\geq$  25 กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	456	1,149,921	28.9	1.5	25.9	31.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	344	168,950	20.3	3.0	14.4	26.3
นนทบุรี	332	137,202	17.8	2.5	12.9	22.8
ปทุมธานี	200	81,958	18.9	2.5	14.1	23.7
พระนครศรีอยุธยา	424	129,519	24.0	2.1	19.8	28.2
อ่างทอง	401	49,516	23.8	1.5	20.8	26.8
ลพบุรี	387	124,315	24.2	2.0	20.3	28.1
สิงห์บุรี	344	30,329	20.0	1.3	17.5	22.5
ชัยนาท	371	49,824	22.6	2.2	18.3	27.0
สระบุรี	354	88,868	21.2	1.3	18.6	23.8
ชลบุรี	457	237,271	26.9	2.4	22.2	31.7
ระยอง	278	65,549	16.8	2.6	11.7	21.9
จันทบุรี	344	77,956	23.3	1.9	19.7	27.0
ตราด	411	36,354	25.4	1.4	22.6	28.2
ฉะเชิงเทรา	344	97,095	21.1	2.7	15.8	26.3
ปราจีนบุรี	402	74,823	22.9	2.0	19.1	26.8
นครนายก	434	45,904	25.6	1.7	22.2	29.0
สระแก้ว	304	62,504	18.8	2.1	14.7	22.9
ราชบุรี	360	122,900	22.4	1.8	18.9	26.0
กาญจนบุรี	370	112,630	21.0	2.1	16.9	25.1
สุพรรณบุรี	403	132,536	22.4	1.6	19.2	25.6
นครปฐม	347	130,167	21.1	1.8	17.5	24.7
สมุทรสาคร	383	56,690	21.1	2.3	16.6	25.6
สมุทรสงคราม	407	30,919	22.1	3.1	16.0	28.3
เพชรบุรี	406	77,323	24.0	1.2	21.6	26.4
ประจวบคีรีขันธ์	313	56,741	16.4	2.0	12.5	20.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	326	375,584	20.6	2.7	15.2	25.9
บุรีรัมย์	337	202,821	19.3	1.9	15.6	23.0
สุรินทร์	291	153,368	16.5	1.8	12.9	20.1
ศรีสะเกษ	258	149,659	15.5	1.6	12.3	18.8
อุบลราชธานี	309	241,581	20.0	1.5	17.1	23.0
ยโสธร	357	71,900	17.5	1.5	14.5	20.5
ชัยภูมิ	384	180,281	23.0	1.5	20.0	26.0
อำนาจเจริญ	358	51,618	21.0	1.9	17.3	24.7
หนองบัวลำภู	390	81,738	23.2	1.5	20.2	26.2
ขอนแก่น	339	277,487	22.0	2.3	17.4	26.6
อุดรธานี	350	214,920	19.9	1.5	17.0	22.9
เลย	334	89,814	20.5	1.6	17.5	23.6
หนองคาย	414	145,068	24.7	2.2	20.3	29.0

ตารางที่ 4.1.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย  $\geq$  25 กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	328	105,747	14.8	2.2	10.5 - 19.1
ร้อยเอ็ด	272	177,074	18.7	1.4	16.0 - 21.4
กาฬสินธุ์	248	96,727	14.1	1.3	11.5 - 16.7
สกลนคร	337	141,500	19.2	1.5	16.2 - 22.2
นครพนม	308	83,693	18.2	2.1	14.0 - 22.3
มุกดาหาร	326	41,547	17.6	2.0	13.6 - 21.6
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	322	248,605	22.6	2.4	17.9 - 27.3
ลำพูน	277	48,811	16.1	1.5	13.1 - 19.1
ลำปาง	347	123,817	22.0	1.5	19.0 - 25.0
อุตรดิตถ์	292	60,072	19.5	1.8	15.9 - 23.0
แพร่	319	65,053	19.0	1.8	15.4 - 22.5
น่าน	302	44,681	14.5	1.7	11.2 - 17.8
พะเยา	275	60,917	16.6	1.7	13.3 - 19.9
เชียงราย	287	149,524	18.6	1.4	15.8 - 21.3
แม่ฮ่องสอน	261	19,995	16.9	2.8	11.4 - 22.3
นครสวรรค์	377	160,982	24.8	1.8	21.3 - 28.3
อุทัยธานี	353	49,083	22.8	2.1	18.6 - 27.0
กำแพงเพชร	340	94,930	21.5	1.9	17.6 - 25.3
ตาก	358	65,472	22.3	2.5	17.4 - 27.2
สุโขทัย	398	102,206	23.5	2.4	18.7 - 28.2
พิษณุโลก	377	127,225	21.7	2.9	16.1 - 27.4
พิจิตร	436	121,067	32.3	2.0	28.3 - 36.3
เพชรบูรณ์	377	161,866	23.6	3.2	17.3 - 29.9
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	310	178,772	18.7	2.0	14.8 - 22.6
กระบี่	393	66,554	24.1	2.1	20.0 - 28.1
พังงา	419	41,962	24.7	2.7	19.5 - 30.0
ภูเก็ต	388	48,552	21.3	2.0	17.4 - 25.2
สุราษฎร์ธานี	359	141,670	21.0	1.7	17.7 - 24.3
ระนอง	409	27,259	23.8	1.1	21.5 - 26.0
ชุมพร	368	71,071	21.0	1.7	17.7 - 24.3
สงขลา	293	163,170	18.1	1.5	15.3 - 21.0
สตูล	352	39,887	21.6	1.2	19.2 - 24.0
ตรัง	392	84,300	21.3	1.2	19.0 - 23.7
พัทลุง	365	76,593	23.1	1.5	20.1 - 26.1
ปัตตานี	341	63,299	18.2	2.7	12.8 - 23.6
ยะลา	318	51,857	19.5	1.2	17.2 - 21.9
นราธิวาส	293	75,823	18.4	2.1	14.4 - 22.5

ตารางที่ 4.1.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 30$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	236	99,795	2.1	0.2	1.6	2.6
25 - 34	374	145,481	3.3	0.4	2.5	4.0
35 - 44	391	167,569	3.3	0.3	2.7	4.0
45 - 54	329	138,701	3.6	0.4	2.9	4.4
55 - 64	447	70,320	3.1	0.3	2.6	3.6
65 - 74	162	27,973	2.8	0.4	2.0	3.7
รวม	1,939	649,838	3.0	0.2	2.7	3.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	245	96,799	2.2	0.2	1.8	2.6
25 - 34	474	198,883	4.6	0.4	3.9	5.4
35 - 44	798	347,452	6.5	0.4	5.7	7.3
45 - 54	694	331,620	8.1	0.5	7.2	9.1
55 - 64	969	180,005	7.5	0.4	6.8	8.2
65 - 74	342	64,492	6.1	0.6	5.0	7.2
รวม	3,522	1,219,251	5.7	0.2	5.3	6.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	481	196,594	2.1	0.2	1.8	2.5
25 - 34	848	344,363	3.9	0.3	3.4	4.5
35 - 44	1,189	515,021	5.0	0.2	4.5	5.5
45 - 54	1,023	470,320	6.0	0.3	5.3	6.6
55 - 64	1,416	250,325	5.3	0.2	4.8	5.8
65 - 74	504	92,465	4.5	0.4	3.8	5.3
รวมทั้งประเทศ	5,461	1,869,088	4.4	0.1	4.1	4.6

ตารางที่ 4.1.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 30$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	3,202	804,944	5.6	0.3	5.1	6.1
นอกเขตเทศบาล	2,259	1,064,145	3.7	0.1	3.5	4.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	103	277,490	7.0	0.9	5.3	8.7
ภาคกลาง	1,998	505,529	4.8	0.2	4.4	5.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,132	489,477	3.3	0.2	2.9	3.6
ภาคเหนือ	1,108	350,407	4.4	0.3	3.9	5.0
ภาคใต้	1,120	246,185	4.4	0.3	3.9	4.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	224	73,548	4.2	0.5	3.3	5.1
เขต สคร. ที่ 2	413	78,058	5.2	0.5	4.3	6.1
เขต สคร. ที่ 3	712	198,415	5.1	0.4	4.3	5.9
เขต สคร. ที่ 4	649	155,508	4.6	0.3	4.1	5.1
เขต สคร. ที่ 5	258	175,860	3.8	0.4	3.0	4.6
เขต สคร. ที่ 6	456	181,222	3.0	0.3	2.5	3.5
เขต สคร. ที่ 7	418	132,396	3.1	0.2	2.7	3.6
เขต สคร. ที่ 8	338	105,539	6.3	0.6	5.2	7.4
เขต สคร. ที่ 9	371	105,305	4.6	0.5	3.7	5.5
เขต สคร. ที่ 10	399	139,564	3.6	0.4	2.8	4.3
เขต สคร. ที่ 11	590	125,657	4.6	0.4	3.7	5.4
เขต สคร. ที่ 12	530	120,528	4.2	0.3	3.6	4.9

ตารางที่ 4.1.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 30$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	103	277,490	7.0	0.9	5.2	8.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	71	42,287	5.1	1.4	2.3	7.8
นนทบุรี	71	23,828	3.1	0.7	1.7	4.5
ปทุมธานี	44	18,208	4.2	0.4	3.4	5.0
พระนครศรีอยุธยา	109	31,512	5.8	1.0	3.9	7.8
อ่างทอง	80	9,020	4.3	0.7	2.9	5.8
ลพบุรี	102	34,499	6.7	1.1	4.6	8.9
สิงห์บุรี	96	8,285	5.5	0.7	4.1	6.9
ชัยนาท	65	9,143	4.2	0.8	2.6	5.7
สระบุรี	70	17,111	4.1	0.8	2.5	5.7
ชลบุรี	103	61,324	7.0	1.0	5.0	8.9
ระยอง	49	10,445	2.7	0.6	1.5	3.9
จันทบุรี	75	17,524	5.2	0.6	4.1	6.4
ตราด	91	7,944	5.5	0.5	4.5	6.6
ฉะเชิงเทรา	73	18,778	4.1	0.8	2.5	5.7
ปราจีนบุรี	84	14,057	4.3	0.6	3.2	5.5
นครนายก	99	11,372	6.4	1.1	4.1	8.6
สระแก้ว	67	14,683	4.4	0.7	3.0	5.8
ราชบุรี	93	32,809	6.0	0.9	4.2	7.8
กาญจนบุรี	83	24,299	4.5	0.6	3.3	5.8
สุพรรณบุรี	100	31,679	5.3	0.7	3.9	6.8
นครปฐม	59	22,674	3.7	0.5	2.6	4.7
สมุทรสาคร	84	12,441	4.6	0.9	2.9	6.3
สมุทรสงคราม	97	6,842	4.9	1.0	3.0	6.8
เพชรบุรี	80	14,711	4.6	0.5	3.5	5.6
ประจวบคีรีขันธ์	53	10,052	2.9	0.4	2.1	3.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	62	68,123	3.7	0.7	2.3	5.1
บุรีรัมย์	74	47,127	4.5	0.9	2.7	6.3
สุรินทร์	50	26,986	2.9	0.8	1.3	4.5
ศรีสะเกษ	53	26,743	2.8	0.5	1.8	3.8
อุบลราชธานี	59	40,316	3.3	0.5	2.3	4.3
ยโสธร	62	10,482	2.6	0.5	1.6	3.5
ชัยภูมิ	72	33,624	4.3	0.7	2.8	5.7
อำนาจเจริญ	80	12,099	4.9	0.7	3.6	6.3
หนองบัวลำภู	72	14,986	4.3	0.7	2.8	5.7
ขอนแก่น	60	48,192	3.8	0.9	2.1	5.5
อุดรธานี	56	30,905	2.9	0.6	1.7	4.0
เลย	52	13,024	3.0	0.6	1.8	4.1
หนองคาย	82	26,302	4.5	0.8	2.9	6.0

ตารางที่ 4.1.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 30$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	68	18,527	2.6	0.6	1.5 - 3.7
ร้อยเอ็ด	36	17,886	1.9	0.4	1.0 - 2.7
กาฬสินธุ์	30	11,400	1.7	0.3	1.0 - 2.3
สกลนคร	64	25,001	3.4	0.5	2.3 - 4.5
นครพนม	43	10,495	2.3	0.7	1.0 - 3.6
มุกดาหาร	57	7,260	3.1	0.7	1.7 - 4.5
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	62	53,852	4.9	1.2	2.6 - 7.2
ลำพูน	40	7,415	2.4	0.5	1.5 - 3.4
ลำปาง	57	19,428	3.4	0.6	2.3 - 4.6
อุตรดิตถ์	51	9,878	3.2	0.5	2.2 - 4.2
แพร่	54	10,880	3.2	0.6	2.0 - 4.3
น่าน	45	5,475	1.8	0.5	0.7 - 2.8
พะเยา	40	9,399	2.6	0.5	1.6 - 3.5
เชียงราย	50	28,100	3.5	0.4	2.6 - 4.4
แม่ฮ่องสอน	51	5,016	4.2	1.0	2.2 - 6.2
นครสวรรค์	79	43,808	6.8	1.0	4.8 - 8.7
อุทัยธานี	80	12,898	6.0	1.4	3.2 - 8.7
กำแพงเพชร	84	22,611	5.1	0.8	3.6 - 6.6
ตาก	72	16,509	5.6	1.3	3.1 - 8.1
สุโขทัย	83	18,618	4.3	1.0	2.4 - 6.2
พิษณุโลก	80	23,916	4.1	0.9	2.3 - 5.9
พิจิตร	95	26,221	7.0	1.1	4.8 - 9.2
เพชรบูรณ์	85	36,383	5.3	1.0	3.4 - 7.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	66	39,278	4.1	0.9	2.3 - 5.9
กระบี่	95	17,015	6.1	0.9	4.4 - 7.9
พังงา	96	9,173	5.4	1.3	2.9 - 8.0
ภูเก็ต	83	10,298	4.5	1.0	2.5 - 6.5
สุราษฎร์ธานี	67	28,454	4.2	0.7	2.8 - 5.6
ระนอง	102	7,216	6.3	1.4	3.6 - 9.0
ชุมพร	81	14,222	4.2	0.6	3.1 - 5.3
สงขลา	60	38,070	4.2	0.8	2.7 - 5.7
สตูล	69	6,472	3.5	0.6	2.3 - 4.7
ตรัง	88	14,607	3.7	0.4	2.8 - 4.6
พัทลุง	75	12,298	3.7	0.5	2.7 - 4.7
ปัตตานี	91	16,850	4.9	1.1	2.8 - 6.9
ยะลา	72	10,713	4.0	0.4	3.2 - 4.9
นราธิวาส	75	21,517	5.2	0.9	3.4 - 7.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 4.2.1 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	10,841	77.7	0.1	77.5	78.0
25 - 34	10,633	81.2	0.1	81.0	81.5
35 - 44	11,579	82.3	0.2	82.0	82.6
45 - 54	8,753	83.1	0.2	82.8	83.5
55 - 64	14,289	83.3	0.2	83.0	83.6
65 - 74	6,452	82.5	0.2	82.1	82.9
รวม	62,547	81.3	0.1	81.2	81.5
<b>หญิง</b>					
15 - 24	10,015	73.2	0.2	72.9	73.5
25 - 34	10,122	77.6	0.2	77.3	77.9
35 - 44	12,198	80.2	0.2	79.9	80.5
45 - 54	9,709	81.9	0.2	81.6	82.3
55 - 64	14,065	82.7	0.2	82.4	83.1
65 - 74	6,777	81.9	0.2	81.5	82.4
รวม	62,886	79.0	0.1	78.9	79.2
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	20,856	75.5	0.1	75.3	75.8
25 - 34	20,755	79.4	0.1	79.2	79.6
35 - 44	23,777	81.2	0.1	81.0	81.5
45 - 54	18,462	82.5	0.1	82.2	82.8
55 - 64	28,354	83.0	0.1	82.8	83.3
65 - 74	13,229	82.2	0.2	81.9	82.5
รวมทั้งประเทศ	125,433	80.2	0.1	80.0	80.3

ตารางที่ 4.2.2 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรชายอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	31,461	82.5	0.2	82.2	82.8
นอกเขตเทศบาล	31,086	80.8	0.1	80.6	81.1
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	640	83.2	0.6	82.1	84.3
ภาคกลาง	20,643	82.6	0.1	82.4	82.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,688	80.3	0.2	79.9	80.6
ภาคเหนือ	13,965	81.2	0.2	80.8	81.7
ภาคใต้	11,611	81.1	0.2	80.6	81.5
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	2,372	82.8	0.3	82.3	83.3
เขต สคร. ที่ 2	4,241	82.9	0.4	82.2	83.6
เขต สคร. ที่ 3	7,428	82.9	0.3	82.4	83.4
เขต สคร. ที่ 4	6,602	82.1	0.3	81.6	82.6
เขต สคร. ที่ 5	3,335	80.2	0.3	79.6	80.8
เขต สคร. ที่ 6	6,739	81.0	0.2	80.5	81.4
เขต สคร. ที่ 7	5,614	79.2	0.3	78.6	79.8
เขต สคร. ที่ 8	3,191	82.2	0.5	81.2	83.3
เขต สคร. ที่ 9	4,149	81.4	0.4	80.7	82.1
เขต สคร. ที่ 10	6,625	80.7	0.3	80.1	81.2
เขต สคร. ที่ 11	5,788	81.1	0.3	80.5	81.7
เขต สคร. ที่ 12	5,823	81.0	0.3	80.4	81.7

ตารางที่ 4.2.3 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรชายอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	640	83.2	0.6	82.0	84.4
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	821	83.0	0.6	81.7	84.2
นนทบุรี	829	83.0	0.5	82.1	84.0
ปทุมธานี	713	82.8	0.4	81.9	83.6
พระนครศรีอยุธยา	830	82.5	0.4	81.7	83.3
อ่างทอง	870	83.6	0.5	82.6	84.6
ลพบุรี	845	83.1	0.7	81.7	84.5
สิงห์บุรี	836	82.8	0.6	81.6	84.0
ชัยนาท	847	83.3	0.4	82.5	84.2
สระบุรี	843	82.1	0.8	80.6	83.6
ชลบุรี	818	83.5	0.4	82.7	84.2
ระยอง	783	84.6	1.3	82.0	87.2
จันทบุรี	850	81.7	0.5	80.7	82.7
ตราด	844	81.2	0.5	80.3	82.2
ฉะเชิงเทรา	834	83.2	0.7	81.8	84.7
ปราจีนบุรี	855	82.6	0.7	81.3	83.9
นครนายก	824	82.0	1.0	80.0	84.0
สระแก้ว	799	81.6	0.8	80.0	83.2
ราชบุรี	848	82.2	0.5	81.3	83.2
กาญจนบุรี	816	80.8	0.6	79.7	81.9
สุพรรณบุรี	856	83.4	0.6	82.2	84.6
นครปฐม	758	82.6	0.8	81.1	84.1
สมุทรสาคร	807	83.1	0.6	82.0	84.3
สมุทรสงคราม	854	82.1	0.7	80.7	83.5
เพชรบุรี	840	81.4	0.5	80.5	82.4
ประจวบคีรีขันธ์	823	80.8	0.6	79.7	81.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	826	80.8	0.3	80.1	81.4
บุรีรัมย์	845	79.7	0.7	78.4	81.0
สุรินทร์	837	78.8	0.4	78.0	79.6
ศรีสะเกษ	805	78.0	0.6	76.8	79.2
อุบลราชธานี	838	79.8	0.5	78.8	80.8
ยโสธร	859	80.4	0.5	79.4	81.3
ชัยภูมิ	827	81.5	1.1	79.2	83.7
อำนาจเจริญ	828	81.4	0.6	80.1	82.6
หนองบัวลำภู	866	80.4	0.4	79.7	81.2
ขอนแก่น	835	81.9	0.5	80.9	82.9
อุดรธานี	829	81.0	0.6	79.7	82.2
เลย	847	79.9	0.4	79.0	80.7
หนองคาย	849	82.8	0.8	81.2	84.4

ตารางที่ 4.2.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรชายอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	852	79.4	0.8	77.7	81.0
ร้อยเอ็ด	855	80.6	0.3	80.0	81.2
กาฬสินธุ์	806	81.0	0.7	79.6	82.3
สกลนคร	769	79.1	0.9	77.3	80.9
นครพนม	666	78.2	1.1	76.1	80.3
มุกดาหาร	849	79.3	0.8	77.8	80.7
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	808	81.3	0.7	79.8	82.7
ลำพูน	825	81.4	0.3	80.8	82.0
ลำปาง	845	81.0	0.6	79.7	82.2
อุตรดิตถ์	801	81.3	0.6	80.2	82.4
แพร่	859	81.4	0.5	80.5	82.4
น่าน	857	78.1	0.7	76.7	79.5
พะเยา	837	79.4	0.4	78.6	80.3
เชียงราย	835	80.9	0.7	79.6	82.3
แม่ฮ่องสอน	759	79.3	0.8	77.6	80.9
นครสวรรค์	804	83.5	1.0	81.6	85.4
อุทัยธานี	789	80.5	0.9	78.8	82.2
กำแพงเพชร	799	81.7	0.7	80.3	83.1
ตาก	833	81.6	0.7	80.1	83.0
สุโขทัย	843	81.5	0.8	79.9	83.0
พิษณุโลก	824	80.4	0.5	79.4	81.5
พิจิตร	799	81.6	0.6	80.4	82.8
เพชรบูรณ์	848	82.1	0.9	80.4	83.9
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	827	80.8	0.5	79.7	81.9
กระบี่	832	80.9	1.0	79.0	82.8
พังงา	831	82.5	0.5	81.5	83.5
ภูเก็ต	808	81.4	0.6	80.1	82.6
สุราษฎร์ธานี	824	81.6	0.6	80.4	82.9
ระนอง	838	81.7	0.6	80.5	82.9
ชุมพร	828	80.0	0.9	78.3	81.7
สงขลา	833	82.5	0.8	81.0	84.0
สตูล	788	80.5	0.7	79.1	82.0
ตรัง	823	81.8	0.4	81.0	82.7
พัทลุง	855	80.4	0.7	79.1	81.7
ปัตตานี	845	78.7	0.6	77.5	79.8
ยะลา	835	79.9	0.8	78.4	81.4
นราธิวาส	844	81.0	0.6	79.7	82.3

ตารางที่ 4.2.4 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	31,653	79.0	0.2	78.7	79.3
นอกเขตเทศบาล	31,233	79.1	0.1	78.8	79.3
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	689	78.8	0.5	77.8	79.7
ภาคกลาง	20,716	79.2	0.2	78.9	79.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,752	78.9	0.2	78.5	79.2
ภาคเหนือ	14,063	79.3	0.2	78.9	79.6
ภาคใต้	11,666	79.0	0.2	78.5	79.4
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	2,406	78.1	0.5	77.2	79.0
เขต สคร. ที่ 2	4,198	80.5	0.4	79.8	81.2
เขต สคร. ที่ 3	7,462	79.5	0.4	78.8	80.3
เขต สคร. ที่ 4	6,650	78.9	0.2	78.5	79.3
เขต สคร. ที่ 5	3,370	79.4	0.4	78.6	80.1
เขต สคร. ที่ 6	6,712	79.1	0.2	78.7	79.5
เขต สคร. ที่ 7	5,670	78.0	0.3	77.4	78.6
เขต สคร. ที่ 8	3,222	81.1	0.3	80.5	81.8
เขต สคร. ที่ 9	4,168	80.1	0.3	79.5	80.7
เขต สคร. ที่ 10	6,673	78.0	0.3	77.4	78.6
เขต สคร. ที่ 11	5,825	79.4	0.4	78.6	80.2
เขต สคร. ที่ 12	5,841	78.6	0.3	78.0	79.1

ตารางที่ 4.2.5 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	689	78.8	0.5	77.8	79.8
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	831	78.1	1.0	76.1	80.0
นนทบุรี	823	77.5	0.8	75.9	79.0
ปทุมธานี	741	77.7	0.7	76.3	79.1
พระนครศรีอยุธยา	842	79.6	0.7	78.2	80.9
อ่างทอง	864	80.3	0.6	79.2	81.4
ลพบุรี	847	80.9	0.9	79.2	82.5
สิงห์บุรี	829	80.5	0.6	79.3	81.6
ชัยนาท	829	81.1	0.9	79.3	82.9
สระบุรี	829	79.8	0.6	78.7	80.9
ชลบุรี	835	80.0	1.1	77.8	82.2
ระยอง	768	78.4	0.6	77.1	79.6
จันทบุรี	855	79.7	0.6	78.6	80.8
ตราด	850	79.7	0.6	78.6	80.8
ฉะเชิงเทรา	847	80.3	0.7	79.0	81.6
ปราจีนบุรี	857	80.1	0.4	79.3	81.0
นครนายก	823	80.8	0.6	79.6	82.0
สระแก้ว	796	80.8	1.0	78.9	82.7
ราชบุรี	846	79.7	0.6	78.4	80.9
กาญจนบุรี	829	77.9	0.7	76.5	79.4
สุพรรณบุรี	862	80.3	0.4	79.4	81.1
นครปฐม	786	77.8	0.3	77.1	78.4
สมุทรสาคร	792	79.7	0.6	78.5	80.9
สมุทรสงคราม	855	78.8	0.4	77.9	79.6
เพชรบุรี	846	79.0	0.5	77.9	80.1
ประจวบคีรีขันธ์	834	77.9	0.4	77.1	78.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	844	78.8	0.7	77.4	80.1
บุรีรัมย์	846	79.8	0.6	78.6	81.0
สุรินทร์	839	78.8	0.9	76.9	80.6
ศรีสะเกษ	823	76.7	0.7	75.3	78.1
อุบลราชธานี	836	78.4	0.5	77.5	79.3
ยโสธร	859	78.8	0.7	77.4	80.2
ชัยภูมิ	841	81.0	0.8	79.5	82.5
อำนาจเจริญ	842	79.1	0.7	77.7	80.4
หนองบัวลำภู	861	80.3	0.6	79.2	81.4
ขอนแก่น	840	79.0	0.4	78.3	79.8
อุดรธานี	820	80.7	0.5	79.6	81.7
เลย	837	80.1	0.5	79.2	81.0
หนองคาย	862	79.9	0.7	78.5	81.4

ตารางที่ 4.2.5 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว (เซ็นติเมตร) ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	856	77.0	1.0	75.1	78.9
ร้อยเอ็ด	850	78.3	0.4	77.4	79.1
กาฬสินธุ์	786	78.0	0.5	77.0	79.0
สกลนคร	783	78.7	0.8	77.2	80.2
นครพนม	673	77.3	1.2	74.9	79.7
มุกดาหาร	854	77.4	0.7	76.0	78.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	816	79.0	0.8	77.4	80.7
ลำพูน	839	76.8	0.4	76.1	77.6
ลำปาง	845	77.8	0.4	77.0	78.6
อุตรดิตถ์	801	79.0	0.6	77.8	80.2
แพร่	849	77.9	0.6	76.8	79.1
น่าน	861	76.3	0.8	74.7	77.9
พะเยา	855	77.6	0.5	76.5	78.6
เชียงราย	844	78.1	0.5	77.1	79.1
แม่ฮ่องสอน	764	77.5	1.4	74.7	80.2
นครสวรรค์	798	82.0	0.6	80.8	83.1
อุทัยธานี	801	79.3	0.7	78.0	80.6
กำแพงเพชร	792	80.3	0.4	79.5	81.2
ตาก	835	79.2	0.7	77.8	80.6
สุโขทัย	851	79.8	0.6	78.7	80.9
พิษณุโลก	831	79.0	0.8	77.5	80.5
พิจิตร	831	81.8	0.5	81.0	82.7
เพชรบูรณ์	850	82.1	0.5	81.2	83.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	824	79.9	0.8	78.3	81.6
กระบี่	844	80.7	0.9	79.0	82.5
พังงา	835	80.9	0.5	79.9	81.9
ภูเก็ต	810	77.7	0.7	76.3	79.2
สุราษฎร์ธานี	845	79.2	0.6	77.9	80.5
ระนอง	834	79.6	0.5	78.8	80.5
ชุมพร	833	77.5	1.4	74.9	80.2
สงขลา	825	78.7	0.7	77.3	80.0
สตูล	795	79.1	0.5	78.3	80.0
ตรัง	821	79.5	0.8	78.0	81.0
พัทลุง	859	80.0	0.4	79.2	80.7
ปัตตานี	852	76.6	0.6	75.4	77.9
ยะลา	842	77.3	0.6	76.0	78.6
นราธิวาส	847	78.6	0.8	77.0	80.3

ตารางที่ 4.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกิน ( $\geq 90$  เซนติเมตร ในชาย และ  $\geq 80$  เซนติเมตร ในหญิง) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	926	367,078	7.5	0.5	6.6	8.4
25 - 34	1,611	616,173	13.4	0.6	12.3	14.5
35 - 44	2,070	829,479	16.3	0.6	15.1	17.5
45 - 54	1,916	773,325	19.8	0.8	18.1	21.4
55 - 64	3,513	572,174	23.2	0.7	21.9	24.6
65 - 74	1,545	241,338	21.9	0.9	20.1	23.7
รวม	11,581	3,399,567	15.4	0.4	14.7	16.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,066	927,372	20.2	0.7	18.8	21.6
25 - 34	3,766	1,679,375	37.1	0.9	35.4	38.8
35 - 44	6,214	2,795,174	50.3	0.8	48.6	51.9
45 - 54	5,775	2,619,301	59.9	0.9	58.2	61.6
55 - 64	9,004	1,751,165	62.7	0.8	61.1	64.2
65 - 74	4,104	782,153	59.0	1.0	57.0	61.0
รวม	30,929	10,554,541	45.5	0.5	44.6	46.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	2,992	1,294,450	13.6	0.5	12.7	14.6
25 - 34	5,377	2,295,548	25.1	0.5	24.1	26.2
35 - 44	8,284	3,624,653	34.0	0.6	32.9	35.1
45 - 54	7,691	3,392,626	40.9	0.7	39.6	42.3
55 - 64	12,517	2,323,339	44.2	0.6	43.0	45.3
65 - 74	5,649	1,023,491	42.2	0.7	40.7	43.6
รวมทั้งประเทศ	42,510	13,954,107	30.8	0.3	30.2	31.5



ตารางที่ 4.2.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกิน ( $\geq 90$  เซนติเมตร ในชาย และ  $\geq 80$  เซนติเมตร ในหญิง) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	22,159	4,794,815	32.7	0.5	31.8	33.7
นอกเขตเทศบาล	20,351	9,159,293	29.9	0.4	29.1	30.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	462	1,145,239	33.4	1.4	30.7	36.2
ภาคกลาง	14,910	3,754,845	33.0	0.6	31.9	34.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,939	4,428,260	28.1	0.6	26.9	29.2
ภาคเหนือ	9,108	2,708,227	31.8	0.8	30.1	33.4
ภาคใต้	8,091	1,917,536	31.2	0.7	29.7	32.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,689	601,102	30.2	1.6	26.9	33.4
เขต สคร. ที่ 2	3,245	598,423	36.6	1.1	34.6	38.7
เขต สคร. ที่ 3	5,449	1,407,754	34.1	1.2	31.8	36.4
เขต สคร. ที่ 4	4,527	1,147,567	31.9	0.8	30.4	33.3
เขต สคร. ที่ 5	2,183	1,449,751	29.7	1.2	27.3	32.0
เขต สคร. ที่ 6	4,419	1,861,118	29.0	1.0	27.1	30.9
เขต สคร. ที่ 7	3,337	1,117,391	25.0	0.9	23.2	26.8
เขต สคร. ที่ 8	2,427	690,130	37.8	1.8	34.2	41.4
เขต สคร. ที่ 9	2,919	847,238	33.7	1.2	31.2	36.1
เขต สคร. ที่ 10	3,762	1,170,859	28.0	1.2	25.7	30.3
เขต สคร. ที่ 11	4,172	974,665	32.6	1.1	30.5	34.7
เขต สคร. ที่ 12	3,919	942,872	29.8	1.1	27.7	31.9

ตารางที่ 4.2.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกิน ( $\geq 90$  เซนติเมตร ในชาย และ  $\geq 80$  เซนติเมตร ในหญิง) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	462	1,145,239	33.4	1.4	30.7	36.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	589	277,813	32.1	2.7	26.9	37.4
นนทบุรี	604	229,516	28.9	3.2	22.7	35.2
ปทุมธานี	470	183,353	29.2	2.1	25.1	33.3
พระนครศรีอยุธยา	615	188,233	32.9	2.6	27.8	38.0
อ่างทอง	704	84,907	39.0	2.0	35.1	42.9
ลพบุรี	647	210,215	37.7	2.3	33.2	42.3
สิงห์บุรี	595	55,804	34.4	2.3	29.8	39.0
ชัยนาท	676	96,753	37.9	2.3	33.4	42.4
สระบุรี	623	150,743	34.2	1.7	30.8	37.5
ชลบุรี	650	319,735	34.3	3.3	27.7	40.8
ระยอง	536	139,607	34.1	4.9	24.5	43.7
จันทบุรี	607	127,674	33.5	2.4	28.8	38.1
ตราด	590	50,352	31.7	1.6	28.6	34.7
ฉะเชิงเทรา	653	180,765	36.9	2.9	31.1	42.6
ปราจีนบุรี	637	116,958	33.9	1.2	31.6	36.3
นครนายก	610	69,228	36.4	2.6	31.3	41.4
สระแก้ว	577	125,623	34.8	3.2	28.5	41.0
ราชบุรี	580	205,276	33.5	2.0	29.5	37.5
กาญจนบุรี	511	155,687	28.0	2.1	24.0	32.1
สุพรรณบุรี	645	230,782	35.9	1.9	32.2	39.5
นครปฐม	533	186,599	30.4	1.6	27.2	33.7
สมุทรสาคร	587	117,185	36.2	2.7	30.8	41.6
สมุทรสงคราม	584	46,248	31.2	2.0	27.3	35.1
เพชรบุรี	586	112,026	32.4	1.5	29.5	35.4
ประจวบคีรีขันธ์	501	93,763	26.0	1.7	22.5	29.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	528	574,872	30.0	2.3	25.4	34.5
บุรีรัมย์	544	328,229	28.9	1.4	26.1	31.7
สุรินทร์	494	257,815	25.9	2.3	21.3	30.5
ศรีสะเกษ	443	223,680	21.1	2.4	16.3	25.9
อุบลราชธานี	480	335,540	25.6	1.4	22.8	28.3
ยโสธร	516	109,840	26.4	2.3	21.8	31.0
ชัยภูมิ	617	288,836	34.5	2.7	29.2	39.9
อำนาจเจริญ	570	85,153	30.8	2.5	25.8	35.8
หนองบัวลำภู	587	119,887	31.5	2.1	27.5	35.6
ขอนแก่น	543	402,137	30.5	1.8	27.0	34.1
อุดรธานี	603	365,889	32.4	1.8	28.8	36.0
เลย	550	139,861	30.0	1.6	26.8	33.2
หนองคาย	640	231,722	34.5	2.5	29.5	39.4

ตารางที่ 4.2.8 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  $\geq 30$  กิโลกรัม/เมตร<sup>2</sup>) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	519	169,609	23.3	2.6	18.3 - 28.3
ร้อยเอ็ด	510	232,206	23.2	2.9	17.5 - 28.9
กาฬสินธุ์	467	199,808	27.7	1.5	24.8 - 30.7
สกลนคร	480	206,934	27.0	2.5	22.1 - 31.8
นครพนม	328	90,911	23.2	2.5	18.2 - 28.2
มุกดาหาร	520	65,334	26.1	2.4	21.3 - 30.8
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	526	374,429	32.5	3.7	25.2 - 39.9
ลำพูน	425	79,762	25.2	1.4	22.5 - 27.9
ลำปาง	489	162,004	27.0	2.0	23.0 - 31.0
อุตรดิตถ์	506	109,469	32.8	2.7	27.4 - 38.2
แพร่	494	105,130	28.7	1.8	25.2 - 32.2
น่าน	467	87,644	23.7	2.3	19.1 - 28.3
พะเยา	437	93,423	24.3	1.3	21.8 - 26.8
เชียงราย	498	233,195	27.3	1.3	24.8 - 29.8
แม่ฮ่องสอน	426	35,273	25.8	3.9	18.1 - 33.5
นครสวรรค์	632	287,964	42.0	3.5	35.1 - 48.8
อุทัยธานี	556	71,617	30.9	3.0	25.1 - 36.8
กำแพงเพชร	598	172,416	34.8	1.8	31.3 - 38.2
ตาก	567	100,954	29.9	3.0	24.0 - 35.8
สุโขทัย	611	163,157	35.0	1.8	31.4 - 38.6
พิษณุโลก	574	189,285	29.9	2.5	25.0 - 34.8
พิจิตร	641	158,133	38.4	2.0	34.6 - 42.2
เพชรบูรณ์	661	284,372	38.0	2.6	32.9 - 43.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	605	370,565	33.6	1.7	30.3 - 36.9
กระบี่	669	106,223	35.6	3.1	29.5 - 41.7
พังงา	616	63,746	35.4	2.6	30.3 - 40.5
ภูเก็ต	559	67,566	29.1	2.0	25.2 - 33.1
สุราษฎร์ธานี	611	238,605	33.4	2.5	28.5 - 38.3
ระนอง	591	36,808	32.1	2.0	28.1 - 36.0
ชุมพร	521	91,151	26.0	3.7	18.7 - 33.4
สงขลา	499	292,645	30.9	2.9	25.3 - 36.6
สตูล	580	62,931	31.9	1.3	29.3 - 34.4
ตรัง	620	135,040	32.1	1.3	29.5 - 34.6
พัทลุง	622	126,044	33.3	1.1	31.1 - 35.5
ปัตตานี	536	100,195	23.8	2.0	19.9 - 27.7
ยะลา	515	81,497	25.9	1.6	22.8 - 29.0
นราธิวาส	547	144,519	29.8	2.6	24.6 - 34.9



# ส่วนที่ 5

กิจกรรมทางกาย  
และการออกกำลังกาย



ตารางที่ 5.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,965	4,168,995	83.9	0.8	82.3	85.5
25 - 34	8,610	3,777,186	82.7	0.8	81.1	84.2
35 - 44	9,517	4,278,364	84.1	0.7	82.7	85.4
45 - 54	7,197	3,273,255	83.2	0.8	81.6	84.9
55 - 64	11,552	2,076,450	83.7	0.7	82.4	85.1
65 - 74	4,918	865,854	76.9	1.0	74.8	78.9
รวม	50,759	18,440,104	83.2	0.6	82.1	84.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,548	3,541,203	77.1	0.9	75.3	78.9
25 - 34	7,991	3,607,992	79.7	0.9	77.9	81.5
35 - 44	10,127	4,701,212	84.0	0.8	82.5	85.5
45 - 54	8,161	3,752,186	85.1	0.8	83.6	86.6
55 - 64	11,477	2,328,890	82.6	0.7	81.2	84.1
65 - 74	4,963	1,001,855	74.4	1.0	72.5	76.4
รวม	50,267	18,933,339	81.3	0.6	80.1	82.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	16,513	7,710,197	80.6	0.7	79.2	82.1
25 - 34	16,601	7,385,178	81.2	0.7	79.8	82.6
35 - 44	19,644	8,979,576	84.0	0.6	82.8	85.3
45 - 54	15,358	7,025,442	84.2	0.7	82.9	85.5
55 - 64	23,029	4,405,340	83.2	0.6	82.0	84.3
65 - 74	9,881	1,867,710	75.6	0.8	74.0	77.2
รวมทั้งประเทศ	101,026	37,373,443	82.2	0.5	81.2	83.3

ตารางที่ 5.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	49,704	11,693,423	77.1	0.9	75.4	78.8
นอกเขตเทศบาล	51,322	25,680,021	84.8	0.7	83.5	86.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,248	3,166,424	76.5	2.1	72.4	80.7
ภาคกลาง	31,739	8,569,744	75.6	1.1	73.4	77.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,418	13,521,334	87.1	1.0	85.2	88.9
ภาคเหนือ	22,925	7,154,717	84.6	0.9	82.9	86.4
ภาคใต้	18,696	4,961,225	82.6	1.3	80.0	85.2
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,213	1,263,030	62.4	3.4	55.6	69.2
เขต สคร. ที่ 2	6,977	1,369,219	83.8	1.6	80.6	87.0
เขต สคร. ที่ 3	11,693	3,255,422	78.6	1.9	74.9	82.2
เขต สคร. ที่ 4	9,856	2,682,072	76.0	2.1	71.9	80.2
เขต สคร. ที่ 5	5,699	4,134,687	86.2	2.2	81.9	90.5
เขต สคร. ที่ 6	10,867	5,396,063	86.9	1.2	84.5	89.2
เขต สคร. ที่ 7	9,852	3,990,584	88.3	1.6	85.0	91.5
เขต สคร. ที่ 8	5,042	1,512,853	79.4	2.3	74.9	83.9
เขต สคร. ที่ 9	6,670	2,125,232	86.7	1.4	83.9	89.5
เขต สคร. ที่ 10	11,213	3,516,632	85.8	1.0	83.8	87.9
เขต สคร. ที่ 11	9,016	2,409,830	82.4	2.3	78.0	86.9
เขต สคร. ที่ 12	9,680	2,551,395	82.7	1.4	79.9	85.6



ตารางที่ 5.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,248	3,166,424	76.5	2.1	72.4	80.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,101	605,104	70.6	3.6	63.5	77.7
นนทบุรี	849	360,014	45.0	5.2	34.7	55.3
ปทุมธานี	1,049	466,717	71.1	4.5	62.2	80.0
พระนครศรีอยุธยา	1,315	436,298	76.8	4.4	68.1	85.5
อ่างทอง	1,591	199,103	92.3	1.5	89.3	95.2
ลพบุรี	1,376	461,095	82.9	3.8	75.5	90.2
สิงห์บุรี	1,207	114,695	71.4	2.5	66.4	76.3
ชัยนาท	1,388	216,216	86.6	2.3	82.2	91.1
สระบุรี	1,415	378,110	83.8	3.2	77.6	90.1
ชลบุรี	1,231	674,190	73.5	6.8	60.1	87.0
ระยอง	1,179	318,874	72.3	4.4	63.5	81.0
จันทบุรี	1,395	312,928	83.8	2.0	79.9	87.8
ตราด	1,330	127,224	82.2	2.8	76.8	87.7
ฉะเชิงเทรา	1,433	442,085	89.7	1.6	86.7	92.8
ปราจีนบุรี	1,464	277,833	80.9	6.5	68.0	93.7
นครนายก	1,242	160,025	85.0	3.9	77.2	92.7
สระแก้ว	1,318	337,160	89.7	2.2	85.3	94.1
ราชบุรี	1,246	430,072	75.6	4.6	66.6	84.5
กาญจนบุรี	1,154	389,512	71.2	7.1	57.3	85.2
สุพรรณบุรี	1,373	529,815	83.8	4.5	75.0	92.5
นครปฐม	1,035	435,017	72.1	5.8	60.6	83.6
สมุทรสาคร	1,204	253,322	73.9	4.3	65.3	82.4
สมุทรสงคราม	1,430	117,413	81.6	3.7	74.4	88.9
เพชรบุรี	1,330	283,497	84.7	3.2	78.4	90.9
ประจวบคีรีขันธ์	1,084	243,423	68.8	6.2	56.6	81.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,364	1,562,628	83.1	4.4	74.4	91.8
บุรีรัมย์	1,490	1,019,002	89.9	2.1	85.7	94.1
สุรินทร์	1,416	851,609	86.3	5.4	75.7	97.0
ศรีสะเกษ	1,386	939,262	90.3	2.5	85.3	95.2
อุบลราชธานี	1,465	1,218,436	95.0	1.1	92.8	97.2
ยโสธร	1,560	376,718	91.7	3.7	84.5	98.9
ชัยภูมิ	1,429	701,448	88.1	1.9	84.4	91.7
อำนาจเจริญ	1,465	242,681	91.7	1.9	88.0	95.4
หนองบัวลำภู	1,616	362,580	95.6	0.6	94.4	96.9
ขอนแก่น	1,247	1,091,952	82.9	3.6	75.8	90.0
อุดรธานี	1,299	889,825	83.9	3.6	76.8	91.0
เลย	1,132	334,009	79.2	4.4	70.5	87.9
หนองคาย	1,320	540,849	85.7	3.8	78.2	93.2

ตารางที่ 5.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	1,526	671,503	93.3	2.0	89.4 - 97.2
ร้อยเอ็ด	1,474	912,457	91.7	1.8	88.2 - 95.2
กาฬสินธุ์	1,253	592,886	86.2	2.4	81.4 - 91.0
สกลนคร	1,255	617,700	78.0	7.1	64.1 - 92.0
นครพนม	1,327	391,390	79.9	6.5	67.2 - 92.7
มุกดาหาร	1,394	204,396	84.7	4.7	75.5 - 93.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,328	932,555	83.3	2.5	78.3 - 88.3
ลำพูน	1,305	248,431	81.4	4.2	73.1 - 89.6
ลำปาง	1,455	516,576	86.3	2.4	81.6 - 91.0
อุตรดิตถ์	1,275	273,353	83.0	4.0	75.2 - 90.8
แพร่	1,481	313,907	87.5	2.5	82.7 - 92.3
น่าน	1,523	330,998	92.1	2.6	87.0 - 97.2
พะเยา	1,457	335,625	89.3	1.8	85.8 - 92.8
เชียงราย	1,403	724,655	87.0	2.2	82.7 - 91.4
แม่ฮ่องสอน	1,261	113,885	78.0	5.8	66.7 - 89.3
นครสวรรค์	1,339	613,405	80.8	4.0	72.9 - 88.7
อุทัยธานี	1,107	157,156	69.9	4.5	61.0 - 78.8
กำแพงเพชร	1,291	401,001	78.0	5.8	66.6 - 89.3
ตาก	1,324	267,725	84.5	2.7	79.2 - 89.9
สุโขทัย	1,470	429,933	92.8	1.8	89.3 - 96.2
พิษณุโลก	1,255	505,614	82.4	4.0	74.5 - 90.3
พิจิตร	1,305	341,290	83.8	2.4	79.0 - 88.6
เพชรบูรณ์	1,346	648,608	89.0	2.3	84.5 - 93.5
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	1,340	938,490	85.7	5.1	75.7 - 95.7
กระบี่	1,386	237,164	79.8	8.3	63.5 - 96.1
พังงา	1,428	155,787	85.2	3.3	78.8 - 91.6
ภูเก็ต	1,069	157,057	67.8	3.2	61.5 - 74.0
สุราษฎร์ธานี	1,317	560,078	83.2	3.0	77.2 - 89.1
ระนอง	1,234	83,861	75.5	6.1	63.5 - 87.5
ชุมพร	1,242	277,393	83.6	4.0	75.8 - 91.5
สงขลา	1,243	707,797	79.1	3.2	72.9 - 85.3
สตูล	1,352	164,401	85.4	3.6	78.4 - 92.4
ตรัง	1,418	350,596	82.0	4.1	73.8 - 90.1
พัทลุง	1,574	345,904	92.4	1.6	89.2 - 95.5
ปัตตานี	1,349	314,409	77.3	5.2	67.0 - 87.6
ยะลา	1,295	242,565	79.1	2.4	74.4 - 83.7
นราธิวาส	1,449	425,723	88.5	3.1	82.4 - 94.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 5.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายครั้งละ  $\geq 30$  นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	6,396	2,900,484	58.2	1.1	56.1	60.3
25 - 34	4,320	1,845,614	40.2	0.9	38.4	42.0
35 - 44	3,933	1,735,377	33.8	1.0	32.0	35.7
45 - 54	2,798	1,227,606	31.0	1.1	28.8	33.3
55 - 64	4,225	731,644	29.4	0.9	27.7	31.1
65 - 74	1,890	314,958	27.9	1.0	26.0	29.8
รวม	23,562	8,755,683	39.3	0.7	37.8	40.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	3,592	1,660,165	36.1	0.9	34.2	37.9
25 - 34	2,885	1,296,721	28.5	0.9	26.7	30.4
35 - 44	3,563	1,659,046	29.5	0.9	27.8	31.3
45 - 54	2,926	1,290,486	29.2	1.0	27.2	31.1
55 - 64	3,740	742,116	26.2	0.8	24.6	27.8
65 - 74	1,450	275,756	20.5	0.9	18.6	22.3
รวม	18,156	6,924,289	29.6	0.6	28.4	30.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	9,988	4,560,649	47.6	0.9	45.8	49.3
25 - 34	7,205	3,142,335	34.4	0.8	32.9	35.9
35 - 44	7,496	3,394,423	31.6	0.8	30.1	33.1
45 - 54	5,724	2,518,092	30.0	0.9	28.3	31.8
55 - 64	7,965	1,473,760	27.7	0.7	26.3	29.1
65 - 74	3,340	590,713	23.8	0.7	22.4	25.3
รวมทั้งประเทศ	41,718	15,679,973	34.3	0.6	33.2	35.5

ตารางที่ 5.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายครั้งละ  $\geq 30$  นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	21,853	4,738,558	31.1	0.8	29.6	32.6
นอกเขตเทศบาล	19,865	10,941,415	36.0	0.8	34.4	37.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	341	874,237	21.1	1.7	17.8	24.4
ภาคกลาง	11,981	3,384,478	29.8	0.9	27.9	31.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11,747	6,227,831	40.1	1.2	37.7	42.4
ภาคเหนือ	9,212	2,847,992	33.4	1.2	31.1	35.7
ภาคใต้	8,437	2,345,435	38.5	1.4	35.7	41.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,376	565,863	27.9	2.0	24.1	31.8
เขต สคร. ที่ 2	2,498	476,269	29.0	1.9	25.3	32.7
เขต สคร. ที่ 3	4,383	1,292,946	31.1	2.0	27.2	35.0
เขต สคร. ที่ 4	3,724	1,049,400	29.6	1.2	27.2	32.1
เขต สคร. ที่ 5	2,505	1,893,587	39.4	2.4	34.7	44.1
เขต สคร. ที่ 6	4,730	2,439,627	39.3	2.0	35.2	43.3
เขต สคร. ที่ 7	4,512	1,894,617	41.9	1.8	38.4	45.3
เขต สคร. ที่ 8	1,800	573,938	30.0	2.6	24.9	35.2
เขต สคร. ที่ 9	2,548	774,378	31.4	2.0	27.5	35.2
เขต สคร. ที่ 10	4,864	1,499,677	36.2	1.8	32.7	39.8
เขต สคร. ที่ 11	3,925	1,098,215	36.9	2.7	31.7	42.2
เขต สคร. ที่ 12	4,512	1,247,219	40.1	1.2	37.7	42.5

ตารางที่ 5.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายครั้งละ  $\geq 30$  นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	341	874,237	21.1	1.7	17.8	24.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	421	193,450	22.4	3.2	16.1	28.8
นนทบุรี	361	172,750	21.6	3.2	15.4	27.8
ปทุมธานี	535	228,054	34.7	3.6	27.7	41.7
พระนครศรีอยุธยา	480	165,060	29.1	3.3	22.6	35.5
อ่างทอง	542	72,946	33.8	4.7	24.5	43.1
ลพบุรี	396	124,007	22.0	2.6	16.9	27.1
สิงห์บุรี	537	46,059	28.6	3.7	21.3	35.9
ชัยนาท	499	77,597	30.9	3.4	24.3	37.6
สระบุรี	524	155,661	34.5	4.6	25.5	43.5
ชลบุรี	488	331,580	36.0	5.8	24.5	47.5
ระยอง	587	187,808	42.6	5.6	31.5	53.6
จันทบุรี	512	122,079	32.6	2.4	27.8	37.4
ตราด	447	34,041	22.0	3.0	16.0	27.9
ฉะเชิงเทรา	517	147,107	29.8	4.9	20.1	39.5
ปราจีนบุรี	543	104,975	30.6	5.3	20.1	41.0
นครนายก	416	51,813	27.5	4.6	18.5	36.5
สระแก้ว	452	120,092	31.9	5.8	20.6	43.2
ราชบุรี	445	163,291	28.6	3.3	22.1	35.1
กาญจนบุรี	451	137,837	25.1	3.1	19.1	31.1
สุพรรณบุรี	524	192,738	30.4	2.9	24.8	36.0
นครปฐม	420	180,981	29.7	2.4	25.1	34.4
สมุทรสาคร	386	91,396	26.7	2.3	22.1	31.2
สมุทรสงคราม	433	36,785	25.5	3.9	17.8	33.2
เพชรบุรี	528	118,588	35.2	2.9	29.5	40.8
ประจวบคีรีขันธ์	537	127,785	36.0	6.4	23.5	48.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	636	728,525	38.7	3.9	31.0	46.3
บุรีรัมย์	679	492,885	43.5	5.1	33.4	53.6
สุรินทร์	634	372,720	37.8	6.2	25.7	49.9
ศรีสะเกษ	643	390,518	37.5	3.5	30.6	44.3
อุบลราชธานี	896	752,984	58.7	3.8	51.1	66.2
ยโสธร	676	136,755	33.2	6.5	20.4	46.1
ชัยภูมิ	556	299,457	37.3	3.8	29.8	44.8
อำนาจเจริญ	639	105,980	40.0	3.6	33.1	47.0
หนองบัวลำภู	677	160,006	42.2	4.3	33.7	50.7
ขอนแก่น	454	432,417	32.8	3.6	25.8	39.9
อุดรธานี	532	360,860	34.0	4.4	25.3	42.8
เลย	385	115,968	27.5	3.3	21.1	33.9
หนองคาย	742	290,476	46.0	5.0	36.1	55.9

ตารางที่ 5.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ออกกำลังกายครั้งละ  $\geq 30$  นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	665	263,977	36.7	4.8	27.3 46.1
ร้อยเอ็ด	741	548,672	55.1	5.4	44.5 65.6
กาฬสินธุ์	534	267,250	38.8	5.2	28.7 48.9
สกลนคร	531	267,099	33.7	3.3	27.3 40.1
นครพนม	678	181,264	37.0	4.9	27.3 46.7
มุกดาหาร	449	60,017	24.9	3.1	18.7 31.1
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	482	361,704	31.7	4.9	21.9 41.4
ลำพูน	534	113,959	37.0	4.5	28.1 45.9
ลำปาง	665	220,528	36.5	3.5	29.6 43.3
อุตรดิตถ์	433	92,734	27.8	4.1	19.7 35.8
แพร่	668	138,145	38.3	3.5	31.6 45.1
น่าน	726	124,422	34.3	4.1	26.2 42.4
พะเยา	672	160,036	42.3	4.8	32.9 51.8
เชียงราย	603	336,244	40.1	3.8	32.6 47.6
แม่ฮ่องสอน	514	44,640	30.4	5.3	20.0 40.8
นครสวรรค์	418	241,560	31.7	4.9	22.2 41.3
อุทัยธานี	498	79,799	35.4	8.1	19.6 51.3
กำแพงเพชร	445	141,520	27.5	4.1	19.4 35.5
ตาก	554	107,403	33.4	2.7	28.2 38.7
สุโขทัย	561	155,298	33.4	4.0	25.6 41.2
พิษณุโลก	506	188,188	30.4	4.5	21.6 39.1
พิจิตร	439	111,059	27.1	1.8	23.6 30.7
เพชรบูรณ์	494	230,755	31.6	4.4	23.0 40.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	576	423,490	38.6	6.3	26.2 50.9
กระบี่	641	111,302	37.4	5.1	27.3 47.4
พังงา	623	65,446	35.7	5.0	25.9 45.6
ภูเก็ต	430	65,448	27.5	2.2	23.1 31.9
สุราษฎร์ธานี	582	266,284	38.2	4.2	29.9 46.4
ระนอง	489	35,791	31.3	4.7	22.0 40.7
ชุมพร	584	130,453	38.0	5.2	27.8 48.2
สงขลา	576	361,740	39.6	3.0	33.7 45.5
สตูล	616	70,146	36.3	3.3	29.8 42.8
ตรัง	629	165,125	38.2	1.8	34.6 41.8
พัทลุง	833	181,778	48.3	1.8	44.9 51.8
ปัตตานี	689	168,380	41.2	4.0	33.4 49.0
ยะลา	589	119,693	39.0	2.8	33.5 44.4
นราธิวาส	580	180,358	37.5	3.2	31.1 43.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ส่วนที่ 6  
การรับประทานผัก  
และผลไม้





ตารางที่ 6.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,943	876,429	16.8	0.8	15.3	18.3
25 - 34	2,202	912,623	18.9	0.8	17.2	20.5
35 - 44	2,521	1,062,476	19.6	0.8	18.0	21.2
45 - 54	2,003	882,672	21.3	1.2	19.0	23.5
55 - 64	3,449	613,396	23.6	0.9	21.7	25.4
65 - 74	1,386	231,969	19.5	0.9	17.7	21.3
รวม	13,504	4,579,565	19.6	0.7	18.2	20.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	2,318	974,273	20.3	0.9	18.5	22.1
25 - 34	2,672	1,142,347	24.0	0.9	22.3	25.8
35 - 44	3,296	1,509,037	25.8	1.0	23.8	27.8
45 - 54	2,641	1,165,583	25.3	1.1	23.1	27.6
55 - 64	3,578	710,463	24.0	0.9	22.3	25.7
65 - 74	1,483	303,297	21.6	1.2	19.3	23.8
รวม	15,988	5,804,999	23.8	0.8	22.3	25.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	4,261	1,850,702	18.5	0.7	17.1	19.9
25 - 34	4,874	2,054,970	21.4	0.7	20.0	22.9
35 - 44	5,817	2,571,513	22.8	0.8	21.2	24.5
45 - 54	4,644	2,048,254	23.4	1.0	21.4	25.4
55 - 64	7,027	1,323,859	23.8	0.8	22.2	25.4
65 - 74	2,869	535,266	20.6	0.9	18.9	22.4
รวมทั้งประเทศ	29,492	10,384,564	21.7	0.7	20.4	23.1

ตารางที่ 6.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	14,779	3,437,531	21.4	0.8	19.7	23.0
นอกเขตเทศบาล	14,713	6,947,033	21.9	0.9	20.1	23.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	328	786,833	18.1	2.1	14.0	22.2
ภาคกลาง	8,771	2,457,983	20.7	1.0	18.7	22.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,295	3,457,948	21.2	1.4	18.4	24.1
ภาคเหนือ	6,760	2,047,746	23.0	1.5	20.1	25.8
ภาคใต้	6,338	1,634,055	25.8	1.8	22.2	29.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	961	397,021	18.5	2.2	14.1	22.8
เขต สคร.ที่ 2	1,840	411,540	24.6	2.9	19.0	30.2
เขต สคร.ที่ 3	2,886	878,874	20.5	1.6	17.3	23.6
เขต สคร.ที่ 4	3,084	770,547	20.5	1.8	17.0	24.1
เขต สคร.ที่ 5	1,624	1,114,380	22.4	2.2	18.0	26.8
เขต สคร.ที่ 6	3,552	1,636,266	24.9	3.0	19.1	30.8
เขต สคร.ที่ 7	2,119	707,303	14.9	1.3	12.4	17.4
เขต สคร.ที่ 8	1,147	296,249	14.5	2.4	9.8	19.3
เขต สคร.ที่ 9	2,223	719,533	27.9	3.4	21.3	34.6
เขต สคร.ที่ 10	3,390	1,031,964	24.0	1.6	20.8	27.1
เขต สคร.ที่ 11	3,041	738,925	24.0	2.9	18.4	29.7
เขต สคร.ที่ 12	3,297	895,130	27.4	2.2	23.1	31.7

ตารางที่ 6.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	328	786,833	18.1	2.1	14.0	22.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	268	148,623	16.7	2.8	11.3	22.2
นนทบุรี	335	157,414	19.0	3.8	11.4	26.5
ปทุมธานี	337	132,287	18.1	4.1	10.0	26.2
พระนครศรีอยุธยา	289	107,320	18.2	3.2	12.0	24.5
อ่างทอง	275	37,646	17.2	2.6	12.1	22.3
ลพบุรี	366	141,717	24.8	5.7	13.7	36.0
สิงห์บุรี	367	28,783	17.3	3.7	10.0	24.5
ชัยนาท	252	33,781	13.0	3.9	5.3	20.7
สระบุรี	580	169,612	36.9	6.3	24.6	49.2
ชลบุรี	512	275,421	28.6	3.8	21.3	36.0
ระยอง	288	90,662	20.0	7.2	5.9	34.1
จันทบุรี	271	62,472	16.1	1.9	12.3	19.9
ตราด	223	14,720	9.1	2.7	3.8	14.5
ฉะเชิงเทรา	354	107,142	21.2	5.6	10.3	32.2
ปราจีนบุรี	276	68,901	19.9	5.6	8.9	30.9
นครนายก	333	38,247	19.9	5.4	9.3	30.5
สระแก้ว	361	72,686	18.1	4.6	9.1	27.1
ราชบุรี	483	180,940	28.8	6.4	16.3	41.3
กาญจนบุรี	401	135,871	23.4	4.8	14.0	32.7
สุพรรณบุรี	432	132,337	20.4	3.4	13.7	27.2
นครปฐม	316	95,925	14.7	4.3	6.2	23.2
สมุทรสาคร	347	67,099	18.4	4.6	9.5	27.4
สมุทรสงคราม	494	44,520	29.7	5.7	18.6	40.9
เพชรบุรี	286	52,373	14.9	2.8	9.5	20.3
ประจวบคีรีขันธ์	325	61,482	16.3	2.9	10.7	21.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	344	319,844	16.4	2.7	11.1	21.7
บุรีรัมย์	555	349,546	30.4	5.8	19.0	41.8
สุรินทร์	267	154,486	15.2	3.1	9.2	21.2
ศรีสะเกษ	191	101,196	9.3	2.8	3.9	14.8
อุบลราชธานี	316	248,601	18.6	2.2	14.4	22.9
ยโสธร	476	97,703	23.4	6.1	11.4	35.3
ชัยภูมิ	458	290,503	33.8	7.2	19.7	48.0
อำนาจเจริญ	322	55,410	19.7	2.9	13.9	25.4
หนองบัวลำภู	771	162,281	42.7	5.7	31.5	53.9
ขอนแก่น	435	424,373	31.1	10.4	10.8	51.4
อุดรธานี	360	230,965	19.8	5.2	9.7	29.9
เลย	389	106,956	22.6	3.6	15.7	29.6
หนองคาย	347	129,008	19.0	3.5	12.2	25.9

ตารางที่ 6.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่บริโภคผักและผลไม้รวมกันตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	398	183,481	25.1	9.0	7.5	42.7	
ร้อยเอ็ด	447	229,504	22.7	6.9	9.1	36.2	
กาฬสินธุ์	405	169,698	22.4	2.2	18.0	26.7	
สกลนคร	216	96,982	11.4	3.0	5.7	17.2	
นครพนม	254	61,715	11.7	1.9	7.9	15.5	
มุกดาหาร	344	45,694	18.0	3.9	10.4	25.6	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	401	260,612	21.6	3.4	15.0	28.2	
ลำพูน	409	92,546	28.7	7.4	14.2	43.2	
ลำปาง	384	145,497	23.9	3.1	17.8	30.0	
อุตรดิตถ์	353	65,465	18.2	3.2	11.9	24.5	
แพร่	458	89,542	24.0	4.6	15.1	33.0	
น่าน	463	79,019	21.3	3.7	14.1	28.5	
พะเยา	430	99,588	25.6	5.1	15.5	35.6	
เชียงราย	450	233,385	26.5	4.0	18.7	34.3	
แม่ฮ่องสอน	395	31,775	20.4	5.1	10.5	30.4	
นครสวรรค์	261	86,305	10.6	3.2	4.4	16.8	
อุทัยธานี	287	31,422	12.6	4.0	4.8	20.4	
กำแพงเพชร	262	96,817	17.7	5.6	6.7	28.6	
ตาก	359	79,129	23.0	7.3	8.8	37.2	
สุโขทัย	550	132,916	28.4	4.1	20.3	36.5	
พิษณุโลก	610	287,720	44.1	8.4	27.5	60.6	
พิจิตร	337	81,704	19.3	2.2	14.9	23.6	
เพชรบูรณ์	351	154,303	20.5	6.9	6.9	34.0	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	306	224,405	20.0	6.7	6.9	33.0	
กระบี่	611	108,282	35.5	6.9	22.0	48.9	
พังงา	546	52,090	28.0	4.9	18.3	37.7	
ภูเก็ต	342	58,168	23.7	5.0	13.9	33.6	
สุราษฎร์ธานี	402	178,357	24.5	5.2	14.3	34.7	
ระนอง	457	34,135	28.0	5.8	16.6	39.4	
ชุมพร	377	83,488	23.0	5.2	12.8	33.3	
สงขลา	574	289,177	29.7	5.1	19.8	39.6	
สตูล	493	65,868	31.5	6.1	19.4	43.5	
ตรัง	444	105,540	23.2	5.0	13.4	32.9	
พัทลุง	529	137,523	36.1	6.2	23.9	48.3	
ปัตตานี	450	98,508	22.8	5.6	11.8	33.7	
ยะลา	376	65,151	20.0	4.6	11.0	29.1	
นราธิวาส	431	133,363	27.0	4.5	18.2	35.9	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 6.2.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	8,192	1.8	0.0	1.7	1.8
25 - 34	8,176	1.7	0.0	1.7	1.8
35 - 44	9,055	1.7	0.0	1.6	1.8
45 - 54	6,851	1.8	0.1	1.6	2.0
55 - 64	11,431	1.8	0.1	1.7	1.9
65 - 74	5,099	1.7	0.1	1.6	1.8
รวม	48,804	1.7	0.0	1.7	1.8
<b>หญิง</b>					
15 - 24	7,974	2.0	0.1	1.9	2.2
25 - 34	8,165	2.1	0.1	2.0	2.2
35 - 44	9,942	2.1	0.1	2.0	2.2
45 - 54	7,869	2.0	0.1	1.8	2.1
55 - 64	11,427	1.9	0.0	1.8	1.9
65 - 74	5,427	1.8	0.1	1.6	2.0
รวม	50,804	2.0	0.0	1.9	2.1
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	16,166	1.9	0.0	1.8	2.0
25 - 34	16,341	1.9	0.0	1.8	2.0
35 - 44	18,997	1.9	0.0	1.8	2.0
45 - 54	14,720	1.9	0.1	1.7	2.0
55 - 64	22,858	1.8	0.0	1.7	1.9
65 - 74	10,526	1.8	0.1	1.6	1.9
รวมทั้งประเทศ	99,608	1.9	0.0	1.8	2.0

ตารางที่ 6.2.2 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	49,536	2.0	0.1	1.9	2.1
นอกเขตเทศบาล	50,072	1.8	0.1	1.7	1.9
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,126	1.8	0.1	1.6	2.1
ภาคกลาง	32,341	1.9	0.1	1.8	2.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,161	1.8	0.1	1.6	2.0
ภาคเหนือ	21,181	1.8	0.1	1.7	1.9
ภาคใต้	18,799	2.1	0.1	1.9	2.3
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	3,541	1.9	0.2	1.7	2.2
เขต สคร. ที่ 2	7,206	1.8	0.1	1.6	2.0
เขต สคร. ที่ 3	11,784	1.9	0.1	1.7	2.1
เขต สคร. ที่ 4	9,810	2.0	0.1	1.8	2.3
เขต สคร. ที่ 5	5,678	1.7	0.1	1.5	1.9
เขต สคร. ที่ 6	11,311	2.1	0.2	1.7	2.5
เขต สคร. ที่ 7	9,172	1.5	0.1	1.4	1.6
เขต สคร. ที่ 8	4,442	1.7	0.1	1.4	2.0
เขต สคร. ที่ 9	6,375	1.8	0.2	1.6	2.1
เขต สคร. ที่ 10	10,364	1.9	0.1	1.7	2.0
เขต สคร. ที่ 11	9,232	1.9	0.1	1.7	2.1
เขต สคร. ที่ 12	9,567	2.4	0.2	2.1	2.7

ตารางที่ 6.2.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,126	1.8	0.1	1.6	2.1
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,166	1.7	0.2	1.3	2.1
นนทบุรี	1,307	2.1	0.2	1.6	2.5
ปทุมธานี	1,013	2.0	0.4	1.3	2.7
พระนครศรีอยุธยา	1,221	1.7	0.1	1.5	2.0
อ่างทอง	1,647	1.5	0.1	1.3	1.7
ลพบุรี	1,317	1.8	0.1	1.5	2.1
สิงห์บุรี	1,297	2.0	0.2	1.6	2.3
ชัยนาท	1,204	1.4	0.2	1.1	1.7
สระบุรี	1,741	1.9	0.2	1.5	2.4
ชลบุรี	1,284	2.6	0.3	2.1	3.2
ระยอง	1,076	2.1	0.3	1.5	2.7
จันทบุรี	1,359	1.6	0.1	1.4	1.8
ตราด	1,149	1.4	0.1	1.1	1.7
ฉะเชิงเทรา	1,515	2.0	0.3	1.3	2.6
ปราจีนบุรี	1,637	1.5	0.3	1.0	2.0
นครนายก	1,364	1.4	0.2	1.0	1.8
สระแก้ว	1,234	1.7	0.3	1.2	2.2
ราชบุรี	1,327	2.0	0.3	1.6	2.5
กาญจนบุรี	1,090	2.0	0.2	1.6	2.4
สุพรรณบุรี	1,371	1.8	0.2	1.5	2.1
นครปฐม	1,091	2.0	0.5	1.0	3.1
สมุทรสาคร	1,170	2.2	0.3	1.7	2.7
สมุทรสงคราม	1,544	2.4	0.4	1.6	3.1
เพชรบุรี	1,271	1.6	0.2	1.3	1.9
ประจวบคีรีขันธ์	946	2.5	0.3	1.8	3.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,286	1.6	0.1	1.3	1.9
บุรีรัมย์	1,623	1.8	0.3	1.3	2.3
สุรินทร์	1,404	1.4	0.2	1.0	1.8
ศรีสะเกษ	1,059	1.3	0.2	0.9	1.6
อุบลราชธานี	1,366	1.6	0.1	1.4	1.8
ยโสธร	1,582	1.6	0.3	1.1	2.1
ชัยภูมิ	1,365	2.2	0.2	1.7	2.6
อำนาจเจริญ	1,398	1.8	0.1	1.6	2.0
หนองบัวลำภู	1,689	2.5	0.2	2.1	3.0
ขอนแก่น	1,377	2.7	0.8	1.2	4.2
อุดรธานี	1,367	1.8	0.2	1.3	2.2
เลย	1,367	1.7	0.1	1.4	1.9
หนองคาย	1,252	1.8	0.2	1.4	2.3

ตารางที่ 6.2.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)				
มหาสารคาม	1,591	2.0	0.5	1.0 2.9
ร้อยเอ็ด	1,508	1.7	0.3	1.2 2.2
กาฬสินธุ์	1,160	2.1	0.1	1.9 2.4
สกลนคร	1,171	1.3	0.2	0.9 1.7
นครพนม	1,256	1.4	0.2	1.1 1.7
มุกดาหาร	1,340	1.8	0.2	1.4 2.1
ภาคเหนือ				
เชียงใหม่	1,084	2.1	0.2	1.7 2.5
ลำพูน	1,281	1.8	0.3	1.3 2.3
ลำปาง	1,409	1.6	0.1	1.4 1.9
อุตรดิตถ์	938	1.9	0.2	1.6 2.2
แพร่	1,437	2.2	0.3	1.6 2.8
น่าน	1,479	1.4	0.2	1.0 1.9
พะเยา	1,330	2.0	0.3	1.5 2.5
เชียงราย	1,427	1.7	0.1	1.5 1.9
แม่ฮ่องสอน	917	2.3	0.2	1.8 2.8
นครสวรรค์	1,043	1.4	0.1	1.1 1.6
อุทัยธานี	1,013	2.0	0.3	1.3 2.6
กำแพงเพชร	1,167	1.9	0.4	1.2 2.7
ตาก	1,334	1.6	0.2	1.2 1.9
สุโขทัย	1,522	1.6	0.2	1.3 1.9
พิษณุโลก	1,329	2.4	0.3	1.8 3.0
พิจิตร	1,219	1.6	0.2	1.3 2.0
เพชรบูรณ์	1,252	1.7	0.4	0.9 2.4
ภาคใต้				
นครศรีธรรมราช	1,296	1.5	0.1	1.2 1.8
กระบี่	1,404	2.1	0.3	1.6 2.6
พังงา	1,351	2.1	0.2	1.7 2.5
ภูเก็ต	1,332	2.2	0.4	1.5 2.9
สุราษฎร์ธานี	1,363	2.0	0.3	1.4 2.7
ระนอง	1,302	2.3	0.3	1.7 2.9
ชุมพร	1,184	2.1	0.2	1.6 2.6
สงขลา	1,299	2.6	0.4	1.8 3.4
สตูล	1,135	3.0	0.4	2.3 3.7
ตรัง	1,461	2.1	0.4	1.3 2.8
พัทลุง	1,592	2.4	0.3	1.8 3.1
ปัตตานี	1,339	2.2	0.4	1.4 3.0
ยะลา	1,343	2.0	0.3	1.5 2.5
นราธิวาส	1,398	2.3	0.2	1.9 2.8



ตารางที่ 6.3.1 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	8,384	2.1	0.1	2.0	2.2
25 - 34	8,453	2.3	0.1	2.2	2.4
35 - 44	9,393	2.4	0.1	2.3	2.5
45 - 54	7,141	2.5	0.1	2.4	2.7
55 - 64	11,856	2.6	0.1	2.5	2.7
65 - 74	5,321	2.4	0.1	2.3	2.5
รวม	50,548	2.4	0.0	2.3	2.5
<b>หญิง</b>					
15 - 24	8,000	2.1	0.1	2.0	2.3
25 - 34	8,353	2.5	0.1	2.3	2.6
35 - 44	10,271	2.6	0.1	2.5	2.7
45 - 54	8,177	2.6	0.1	2.5	2.8
55 - 64	11,854	2.6	0.1	2.5	2.7
65 - 74	5,648	2.4	0.1	2.3	2.6
รวม	52,303	2.5	0.0	2.4	2.6
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	16,384	2.1	0.1	2.0	2.2
25 - 34	16,806	2.4	0.0	2.3	2.5
35 - 44	19,664	2.5	0.1	2.4	2.6
45 - 54	15,318	2.6	0.1	2.5	2.7
55 - 64	23,710	2.6	0.1	2.5	2.7
65 - 74	10,969	2.4	0.1	2.3	2.5
รวมทั้งประเทศ	102,851	2.4	0.0	2.3	2.5

ตารางที่ 6.3.2 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	50,700	2.4	0.1	2.3	2.5
นอกเขตเทศบาล	52,151	2.4	0.1	2.3	2.6
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	1,161	2.2	0.1	1.9	2.4
ภาคกลาง	33,404	2.4	0.1	2.3	2.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,737	2.3	0.1	2.1	2.5
ภาคเหนือ	22,679	2.7	0.1	2.5	2.8
ภาคใต้	18,870	2.5	0.1	2.3	2.7
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	3,599	2.2	0.2	1.9	2.5
เขต สคร. ที่ 2	7,365	2.5	0.1	2.2	2.8
เขต สคร. ที่ 3	12,337	2.4	0.1	2.2	2.6
เขต สคร. ที่ 4	10,103	2.5	0.2	2.2	2.8
เขต สคร. ที่ 5	5,867	2.4	0.1	2.2	2.7
เขต สคร. ที่ 6	11,489	2.5	0.2	2.1	2.9
เขต สคร. ที่ 7	9,381	2.0	0.1	1.8	2.1
เขต สคร. ที่ 8	4,920	2.3	0.1	2.1	2.5
เขต สคร. ที่ 9	6,907	2.9	0.2	2.5	3.3
เขต สคร. ที่ 10	10,852	2.7	0.1	2.5	2.9
เขต สคร. ที่ 11	9,377	2.4	0.2	2.0	2.8
เขต สคร. ที่ 12	9,493	2.6	0.2	2.3	2.9

ตารางที่ 6.3.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	1,161	2.2	0.1	1.9	2.4
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	1,191	2.1	0.3	1.6	2.6
นนทบุรี	1,323	2.1	0.3	1.6	2.6
ปทุมธานี	1,034	2.4	0.4	1.7	3.2
พระนครศรีอยุธยา	1,242	2.2	0.2	1.9	2.6
อ่างทอง	1,657	1.9	0.1	1.6	2.1
ลพบุรี	1,375	2.8	0.4	2.1	3.5
สิงห์บุรี	1,260	1.9	0.2	1.5	2.4
ชัยนาท	1,328	2.1	0.3	1.5	2.6
สระบุรี	1,745	2.8	0.2	2.4	3.2
ชลบุรี	1,303	3.0	0.2	2.5	3.4
ระยอง	1,180	2.5	0.3	1.8	3.1
จันทบุรี	1,439	1.9	0.1	1.7	2.2
ตราด	1,307	2.0	0.2	1.5	2.4
ฉะเชิงเทรา	1,513	2.4	0.3	1.7	3.0
ปราจีนบุรี	1,665	2.1	0.2	1.7	2.5
นครนายก	1,382	2.2	0.3	1.7	2.7
สระแก้ว	1,357	2.5	0.4	1.8	3.2
ราชบุรี	1,364	2.6	0.4	1.9	3.4
กาญจนบุรี	1,137	2.7	0.5	1.8	3.7
สุพรรณบุรี	1,439	2.5	0.2	2.0	3.0
นครปฐม	1,152	2.4	0.6	1.3	3.6
สมุทรสาคร	1,170	2.6	0.3	2.1	3.2
สมุทรสงคราม	1,565	2.5	0.2	2.0	2.9
เพชรบุรี	1,311	1.8	0.2	1.5	2.2
ประจวบคีรีขันธ์	965	2.8	0.3	2.3	3.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	1,325	2.1	0.2	1.8	2.5
บุรีรัมย์	1,664	2.6	0.2	2.3	2.9
สุรินทร์	1,465	2.3	0.3	1.7	2.8
ศรีสะเกษ	1,077	1.6	0.2	1.3	1.9
อุบลราชธานี	1,385	2.2	0.1	2.1	2.4
ยโสธร	1,640	2.2	0.4	1.5	3.0
ชัยภูมิ	1,413	3.2	0.6	1.9	4.4
อำนาจเจริญ	1,462	2.2	0.1	1.9	2.4
หนองบัวลำภู	1,708	3.3	0.2	2.8	3.7
ขอนแก่น	1,393	2.9	0.7	1.4	4.3
อุดรธานี	1,386	2.4	0.3	1.8	3.1
เลย	1,394	2.2	0.2	1.9	2.6
หนองคาย	1,328	2.2	0.2	1.8	2.5

ตารางที่ 6.3.3 ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่วยมาตรฐานต่อวันของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)				
มหาสารคาม	1,603	2.5	0.5	1.5 3.5
ร้อยเอ็ด	1,511	2.0	0.3	1.3 2.6
กาฬสินธุ์	1,166	2.4	0.2	2.2 2.7
สกลนคร	1,157	1.8	0.2	1.3 2.2
นครพนม	1,241	1.9	0.2	1.5 2.3
มุกดาหาร	1,419	1.9	0.2	1.5 2.3
ภาคเหนือ				
เชียงใหม่	1,158	3.0	0.3	2.5 3.6
ลำพูน	1,327	3.1	0.6	2.0 4.3
ลำปาง	1,563	2.5	0.2	2.2 2.9
อุตรดิตถ์	1,286	2.7	0.2	2.4 3.1
แพร่	1,479	2.6	0.3	2.0 3.1
น่าน	1,509	2.3	0.2	1.9 2.7
พะเยา	1,365	2.6	0.3	2.1 3.1
เชียงราย	1,467	2.6	0.3	1.9 3.2
แม่ฮ่องสอน	984	3.2	0.3	2.7 3.7
นครสวรรค์	1,353	2.1	0.1	1.9 2.4
อุทัยธานี	1,068	2.7	0.4	1.9 3.5
กำแพงเพชร	1,203	2.4	0.3	1.9 2.9
ตาก	1,434	2.9	0.6	1.8 4.0
สุโขทัย	1,539	2.7	0.3	2.2 3.2
พิษณุโลก	1,352	3.9	0.4	3.2 4.6
พิจิตร	1,296	2.2	0.1	1.9 2.5
เพชรบูรณ์	1,296	2.2	0.4	1.4 3.1
ภาคใต้				
นครศรีธรรมราช	1,303	2.2	0.4	1.4 3.1
กระบี่	1,485	3.3	0.4	2.4 4.1
พังงา	1,350	2.7	0.2	2.3 3.2
ภูเก็ต	1,335	2.4	0.3	1.7 3.0
สุราษฎร์ธานี	1,370	2.1	0.3	1.6 2.6
ระนอง	1,295	2.8	0.4	1.9 3.7
ชุมพร	1,239	2.4	0.3	1.9 2.9
สงขลา	1,315	2.9	0.4	2.1 3.7
สตูล	1,066	3.1	0.4	2.4 3.9
ตรัง	1,447	2.4	0.2	2.0 2.8
พัทลุง	1,596	2.8	0.3	2.2 3.4
ปัตตานี	1,347	2.4	0.5	1.4 3.3
ยะลา	1,358	2.1	0.2	1.6 2.5
นราธิวาส	1,364	2.3	0.4	1.6 3.0

**ส่วนที่ 7**

**การบริโภคยาสูบ**



ตารางที่ 7.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,841	1,417,677	28.9	1.2	26.5	31.4
25 - 34	4,004	1,775,109	39.0	0.9	37.2	40.8
35 - 44	4,565	2,054,282	40.1	0.9	38.4	41.8
45 - 54	3,338	1,593,099	40.2	1.2	37.8	42.5
55 - 64	4,988	927,336	37.0	0.7	35.7	38.4
65 - 74	1,867	348,974	31.0	1.1	28.9	33.0
รวม	21,603	8,116,477	36.6	0.5	35.6	37.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	72	34,091	0.7	0.1	0.4	1.0
25 - 34	112	77,135	1.7	0.3	1.2	2.1
35 - 44	236	116,981	2.0	0.2	1.6	2.5
45 - 54	256	135,717	3.0	0.3	2.4	3.6
55 - 64	608	111,988	3.9	0.3	3.3	4.4
65 - 74	295	49,859	3.6	0.3	2.9	4.3
รวม	1,579	525,770	2.2	0.1	1.9	2.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	2,913	1,451,768	15.1	0.7	13.7	16.5
25 - 34	4,116	1,852,244	20.1	0.5	19.1	21.0
35 - 44	4,801	2,171,263	20.0	0.4	19.1	20.8
45 - 54	3,594	1,728,815	20.4	0.7	19.0	21.7
55 - 64	5,596	1,039,324	19.2	0.4	18.5	20.0
65 - 74	2,162	398,833	15.9	0.6	14.8	17.0
รวมทั้งประเทศ	23,182	8,642,247	18.7	0.3	18.2	19.3

ตารางที่ 7.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	10,687	2,596,220	16.8	0.4	16.0	17.5
นอกเขตเทศบาล	12,495	6,046,027	19.7	0.4	19.0	20.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	328	842,481	19.7	1.2	17.5	22.0
ภาคกลาง	6,500	1,643,658	14.3	0.4	13.5	15.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,193	3,090,102	19.7	0.5	18.7	20.8
ภาคเหนือ	5,152	1,630,136	19.1	0.7	17.6	20.5
ภาคใต้	5,009	1,435,871	23.4	0.7	22.0	24.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	634	231,924	11.3	1.1	9.1	13.5
เขต สคร.ที่ 2	1,409	287,260	17.4	1.0	15.4	19.4
เขต สคร.ที่ 3	2,377	601,635	14.4	0.7	13.0	15.8
เขต สคร.ที่ 4	2,080	522,839	14.4	0.7	13.0	15.8
เขต สคร.ที่ 5	1,163	840,339	17.6	0.9	15.8	19.5
เขต สคร.ที่ 6	2,713	1,274,435	20.2	1.0	18.2	22.2
เขต สคร.ที่ 7	2,317	975,328	21.2	0.7	19.9	22.5
เขต สคร.ที่ 8	1,200	407,379	21.8	2.0	18.0	25.7
เขต สคร.ที่ 9	1,634	491,271	19.7	1.1	17.6	21.8
เขต สคร.ที่ 10	2,318	731,485	17.5	0.9	15.7	19.3
เขต สคร.ที่ 11	2,299	695,640	23.6	1.2	21.3	25.9
เขต สคร.ที่ 12	2,710	740,230	23.3	0.8	21.7	24.9



ตารางที่ 7.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	328	842,481	19.7	1.2	17.5	22.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	156	88,299	10.2	1.3	7.6	12.8
นนทบุรี	143	54,914	6.8	1.0	4.8	8.8
ปทุมธานี	183	89,554	13.1	2.3	8.6	17.6
พระนครศรีอยุธยา	308	87,456	15.6	1.7	12.1	19.0
อ่างทอง	305	32,816	15.1	2.4	10.3	19.9
ลพบุรี	343	124,252	22.2	1.7	18.8	25.5
สิงห์บุรี	234	26,226	16.4	1.9	12.6	20.1
ชัยนาท	278	35,644	13.9	1.5	10.9	16.8
สระบุรี	249	68,322	15.0	2.2	10.6	19.3
ชลบุรี	240	112,209	12.2	2.1	8.1	16.3
ระยอง	162	40,099	9.2	1.2	6.9	11.5
จันทบุรี	339	70,974	18.9	1.4	16.2	21.5
ตราด	299	29,364	18.4	1.6	15.2	21.7
ฉะเชิงเทรา	297	94,874	19.3	1.8	15.8	22.7
ปราจีนบุรี	293	56,700	16.4	2.9	10.7	22.1
นครนายก	277	35,798	18.8	1.7	15.3	22.2
สระแก้ว	314	73,317	18.7	2.1	14.6	22.9
ราชบุรี	287	97,848	15.9	2.0	12.0	19.8
กาญจนบุรี	291	98,101	17.3	2.9	11.6	23.0
สุพรรณบุรี	253	82,895	12.9	1.4	10.2	15.6
นครปฐม	223	81,547	12.9	1.6	9.7	16.0
สมุทรสาคร	217	38,396	11.5	1.2	9.0	13.9
สมุทรสงคราม	306	21,808	14.9	1.9	11.1	18.6
เพชรบุรี	288	56,817	16.8	1.8	13.3	20.2
ประจวบคีรีขันธ์	215	45,427	13.0	1.3	10.5	15.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	282	341,471	17.9	1.6	14.9	21.0
บุรีรัมย์	192	117,724	11.6	1.8	8.2	15.1
สุรินทร์	339	205,474	20.4	1.9	16.6	24.2
ศรีสะเกษ	333	220,051	20.6	1.3	18.1	23.1
อุบลราชธานี	396	325,735	25.3	1.4	22.6	28.1
ยโสธร	292	80,405	19.5	2.5	14.5	24.4
ชัยภูมิ	350	175,671	20.9	1.9	17.0	24.7
อำนาจเจริญ	361	60,938	22.6	2.0	18.6	26.5
หนองบัวลำภู	486	110,339	29.1	0.9	27.3	30.9
ขอนแก่น	308	217,764	16.5	2.0	12.5	20.5
อุดรธานี	375	247,188	22.1	1.9	18.4	25.7
เลย	314	87,316	20.2	2.0	16.3	24.2
หนองคาย	285	106,531	16.5	2.2	12.2	20.8

ตารางที่ 7.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	340	158,717	22.1	2.7	16.8 - 27.4
ร้อยเอ็ด	322	224,835	22.8	3.5	15.9 - 29.6
กาฬสินธุ์	283	121,744	17.3	2.4	12.6 - 22.0
สกลนคร	255	141,132	17.5	1.8	13.9 - 21.0
นครพนม	311	94,174	18.6	1.9	14.9 - 22.4
มุกดาหาร	369	52,893	21.7	2.2	17.5 - 25.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	330	225,904	19.4	2.7	14.0 - 24.7
ลำพูน	284	51,541	16.4	2.0	12.4 - 20.4
ลำปาง	255	90,446	15.1	1.4	12.3 - 18.0
อุตรดิตถ์	268	54,283	16.1	1.9	12.4 - 19.8
แพร่	276	58,685	16.0	1.2	13.6 - 18.4
น่าน	214	48,652	13.2	2.6	8.1 - 18.4
พะเยา	312	69,981	18.2	1.8	14.7 - 21.8
เชียงราย	297	152,629	18.0	1.3	15.5 - 20.6
แม่ฮ่องสอน	350	33,647	23.1	3.3	16.5 - 29.6
นครสวรรค์	258	169,666	23.9	4.1	15.8 - 32.1
อุทัยธานี	277	43,028	18.6	3.1	12.4 - 24.7
กำแพงเพชร	360	118,017	22.8	1.7	19.5 - 26.1
ตาก	418	86,745	26.2	3.8	18.8 - 33.6
สุโขทัย	354	108,805	23.3	1.6	20.1 - 26.5
พิษณุโลก	295	122,840	19.6	2.2	15.2 - 23.9
พิจิตร	305	76,669	18.7	2.1	14.5 - 22.9
เพชรบูรณ์	299	118,599	16.2	2.1	12.2 - 20.3
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	368	263,773	24.5	2.5	19.6 - 29.3
กระบี่	312	63,015	21.1	1.6	17.9 - 24.3
พังงา	361	47,261	26.2	2.1	22.0 - 30.3
ภูเก็ต	209	31,400	13.1	1.5	10.1 - 16.1
สุราษฎร์ธานี	370	172,653	25.1	2.6	20.1 - 30.1
ระนอง	336	25,319	21.2	2.2	16.8 - 25.6
ชุมพร	343	92,221	26.6	2.9	20.9 - 32.3
สงขลา	375	201,645	21.6	1.9	17.9 - 25.3
สตูล	352	45,355	22.8	2.4	18.1 - 27.5
ตรัง	401	108,712	24.6	2.3	20.1 - 29.0
พัทลุง	432	103,791	27.4	1.4	24.6 - 30.2
ปัตตานี	419	105,517	25.3	1.9	21.6 - 29.1
ยะลา	398	73,935	23.0	1.7	19.7 - 26.4
นราธิวาส	333	101,275	20.9	1.8	17.3 - 24.5

ตารางที่ 7.2.1 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่หรือจมน้ำเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	2,950	15.9	0.1	15.8	16.1
25 - 34	4,232	17.4	0.1	17.3	17.6
35 - 44	5,130	18.1	0.1	17.9	18.3
45 - 54	4,092	18.3	0.1	18.0	18.5
55 - 64	6,736	18.4	0.1	18.2	18.6
65 - 74	3,003	18.2	0.1	18.0	18.5
<b>รวม</b>	<b>26,143</b>	<b>17.7</b>	<b>0.1</b>	<b>17.6</b>	<b>17.8</b>
<b>หญิง</b>					
15 - 24	88	17.1	0.6	15.9	18.2
25 - 34	146	19.0	0.8	17.4	20.6
35 - 44	269	21.5	0.8	19.9	23.1
45 - 54	283	20.6	0.7	19.3	21.9
55 - 64	669	20.9	0.4	20.1	21.7
65 - 74	397	19.4	0.5	18.5	20.3
<b>รวม</b>	<b>1,852</b>	<b>20.2</b>	<b>0.4</b>	<b>19.6</b>	<b>20.9</b>
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	3,038	16.0	0.1	15.8	16.1
25 - 34	4,378	17.5	0.1	17.3	17.6
35 - 44	5,399	18.3	0.1	18.0	18.5
45 - 54	4,375	18.4	0.1	18.2	18.7
55 - 64	7,405	18.6	0.1	18.4	18.8
65 - 74	3,400	18.4	0.1	18.1	18.6
<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>27,995</b>	<b>17.8</b>	<b>0.1</b>	<b>17.7</b>	<b>18.0</b>

ตารางที่ 7.2.2 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	13,338	17.9	0.1	17.6	18.1
นอกเขตเทศบาล	14,657	17.8	0.1	17.7	18.0
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	280	17.9	0.4	17.1	18.8
ภาคกลาง	7,923	18.1	0.1	17.9	18.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,434	17.8	0.1	17.6	18.1
ภาคเหนือ	6,768	17.5	0.1	17.3	17.7
ภาคใต้	5,590	17.9	0.1	17.7	18.2
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	772	17.3	0.4	16.5	18.2
เขต สคร. ที่ 2	1,645	17.9	0.2	17.5	18.4
เขต สคร. ที่ 3	3,038	18.5	0.2	18.1	18.8
เขต สคร. ที่ 4	2,468	18.1	0.2	17.8	18.5
เขต สคร. ที่ 5	1,492	18.0	0.2	17.5	18.4
เขต สคร. ที่ 6	3,196	17.8	0.2	17.4	18.3
เขต สคร. ที่ 7	2,746	17.6	0.1	17.3	17.9
เขต สคร. ที่ 8	1,498	17.7	0.2	17.3	18.1
เขต สคร. ที่ 9	2,022	17.5	0.2	17.1	17.8
เขต สคร. ที่ 10	3,248	17.5	0.2	17.2	17.8
เขต สคร. ที่ 11	2,651	18.0	0.2	17.7	18.3
เขต สคร. ที่ 12	2,939	17.9	0.1	17.6	18.2

ตารางที่ 7.2.3 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	280	17.9	0.4	17.1	18.8
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	242	19.4	0.7	18.1	20.7
นนทบุรี	211	18.0	0.3	17.4	18.5
ปทุมธานี	206	16.9	1.1	14.9	19.0
พระนครศรีอยุธยา	355	17.2	0.4	16.4	18.0
อ่างทอง	382	17.2	0.2	16.7	17.7
ลพบุรี	416	18.3	0.5	17.4	19.2
สิงห์บุรี	256	17.6	0.3	16.9	18.2
ชัยนาท	288	18.3	0.4	17.5	19.0
สระบุรี	303	17.7	0.3	17.0	18.3
ชลบุรี	298	18.3	0.3	17.7	18.9
ระยอง	267	18.4	0.3	17.8	18.9
จันทบุรี	430	17.8	0.4	17.0	18.5
ตราด	398	18.5	0.4	17.7	19.3
ฉะเชิงเทรา	362	18.2	0.3	17.7	18.8
ปราจีนบุรี	403	18.4	0.5	17.4	19.5
นครนายก	282	18.5	0.4	17.8	19.2
สระแก้ว	356	18.4	0.5	17.5	19.3
ราชบุรี	345	18.5	0.6	17.3	19.7
กาญจนบุรี	338	18.2	0.5	17.3	19.2
สุพรรณบุรี	281	17.8	0.4	17.1	18.6
นครปฐม	258	17.4	0.4	16.6	18.1
สมุทรสาคร	249	19.1	0.3	18.5	19.6
สมุทรสงคราม	414	18.4	0.3	17.9	18.9
เพชรบุรี	341	17.6	0.2	17.2	18.0
ประจวบคีรีขันธ์	242	18.7	0.4	17.9	19.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	342	17.7	0.5	16.7	18.7
บุรีรัมย์	375	18.0	0.3	17.3	18.7
สุรินทร์	361	18.6	0.5	17.6	19.5
ศรีสะเกษ	366	18.2	0.3	17.6	18.9
อุบลราชธานี	442	17.8	0.3	17.3	18.4
ยโสธร	445	17.8	0.3	17.3	18.4
ชัยภูมิ	414	17.9	0.2	17.5	18.3
อำนาจเจริญ	466	17.3	0.2	17.0	17.7
หนองบัวลำภู	582	17.4	0.1	17.1	17.6
ขอนแก่น	396	17.3	0.2	16.9	17.6
อุดรธานี	398	18.2	0.6	17.0	19.3
เลย	374	17.1	0.2	16.6	17.5
หนองคาย	343	17.6	0.4	16.9	18.3

ตารางที่ 7.2.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของ ค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	428	17.5	0.4	16.7	18.3
ร้อยเอ็ด	341	19.4	0.6	18.2	20.6
กาฬสินธุ์	334	17.6	0.3	17.1	18.2
สกลนคร	268	17.0	0.4	16.3	17.7
นครพนม	349	16.6	0.3	16.1	17.1
มุกดาหาร	410	16.8	0.5	15.9	17.8
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	386	18.0	0.4	17.1	18.9
ลำพูน	358	17.6	0.5	16.7	18.5
ลำปาง	468	16.8	0.3	16.3	17.3
อุตรดิตถ์	263	17.8	0.4	17.0	18.6
แพร่	399	16.8	0.3	16.2	17.5
น่าน	422	17.5	0.2	17.1	17.9
พะเยา	358	17.3	0.6	16.1	18.5
เชียงราย	486	17.8	0.3	17.2	18.5
แม่ฮ่องสอน	371	16.6	0.2	16.2	17.0
นครสวรรค์	330	17.3	0.3	16.8	17.9
อุทัยธานี	310	17.3	0.4	16.5	18.1
กำแพงเพชร	423	18.2	0.4	17.4	18.9
ตาก	507	17.4	0.3	16.8	18.1
สุโขทัย	471	17.1	0.3	16.4	17.7
พิษณุโลก	422	17.5	0.4	16.7	18.3
พิจิตร	435	18.0	0.3	17.4	18.5
เพชรบูรณ์	359	17.7	0.4	16.9	18.5
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	445	17.7	0.2	17.3	18.2
กระบี่	411	18.4	0.7	17.0	19.9
พังงา	392	18.6	0.5	17.6	19.5
ภูเก็ต	211	18.2	0.3	17.6	18.8
สุราษฎร์ธานี	460	18.2	0.3	17.6	18.8
ระนอง	377	17.9	0.3	17.3	18.6
ชุมพร	355	17.6	0.6	16.4	18.9
สงขลา	375	17.6	0.3	17.0	18.1
สตูล	361	17.1	0.2	16.7	17.6
ตรัง	483	17.9	0.4	17.2	18.6
พัทลุง	498	17.9	0.3	17.3	18.5
ปัตตานี	466	18.1	0.4	17.3	18.8
ยะลา	384	19.0	0.5	18.1	20.0
นราธิวาส	372	18.0	0.4	17.3	18.7

ตารางที่ 7.3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่จากโรงงาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,021	981,747	72.2	2.3	67.8	76.7
25 - 34	2,435	1,024,695	60.2	1.6	57.1	63.2
35 - 44	2,222	946,539	47.9	1.6	44.8	51.0
45 - 54	1,420	670,421	43.9	2.6	38.7	49.1
55 - 64	1,435	263,208	28.9	1.5	26.0	31.7
65 - 74	387	75,230	21.5	1.6	18.2	24.7
รวม	9,920	3,961,840	50.6	1.1	48.5	52.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	50	24,660	62.7	7.2	48.5	76.9
25 - 34	64	44,695	57.1	7.1	43.1	71.0
35 - 44	115	68,722	57.1	5.5	46.4	67.9
45 - 54	79	49,536	35.3	5.4	24.7	45.8
55 - 64	128	26,690	22.9	3.2	16.7	29.1
65 - 74	37	4,321	8.4	1.8	4.9	11.9
รวม	473	218,624	40.0	3.0	34.1	46.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	2,071	1,006,407	72.0	2.2	67.6	76.3
25 - 34	2,499	1,069,389	60.0	1.6	56.9	63.1
35 - 44	2,337	1,015,261	48.4	1.5	45.4	51.5
45 - 54	1,499	719,957	43.2	2.6	38.2	48.2
55 - 64	1,563	289,898	28.2	1.4	25.5	30.9
65 - 74	424	79,551	19.8	1.5	16.8	22.7
รวมทั้งประเทศ	10,393	4,180,463	49.9	1.1	47.8	52.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	5,909	1,774,855	69.5	1.3	66.9	72.1
นอกเขตเทศบาล	4,484	2,405,608	41.3	1.5	38.4	44.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	284	727,151	88.1	2.6	83.1	93.1
ภาคกลาง	3,710	1,019,748	62.0	1.5	59.2	64.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,274	1,241,435	44.1	2.6	39.0	49.2
ภาคเหนือ	2,042	650,775	39.4	1.6	36.3	42.5
ภาคใต้	2,083	541,354	37.6	1.6	34.4	40.8
<b>เขตสคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	458	185,825	82.9	2.0	79.0	86.8
เขต สคร.ที่ 2	737	151,766	53.4	2.5	48.4	58.3
เขต สคร.ที่ 3	1,369	386,639	63.5	2.4	58.7	68.3
เขต สคร.ที่ 4	1,146	295,518	56.1	2.3	51.6	60.6
เขต สคร.ที่ 5	499	369,554	42.3	3.6	35.1	49.4
เขต สคร.ที่ 6	902	550,229	50.8	5.2	40.6	61.1
เขต สคร.ที่ 7	873	321,652	37.5	2.6	32.4	42.6
เขต สคร.ที่ 8	442	156,924	38.6	2.7	33.3	43.8
เขต สคร.ที่ 9	593	161,402	31.3	2.4	26.7	36.0
เขต สคร.ที่ 10	1,007	332,449	45.6	2.9	39.9	51.2
เขต สคร.ที่ 11	1,016	238,194	33.3	2.5	28.3	38.3
เขต สคร.ที่ 12	1,067	303,160	41.9	2.0	38.0	45.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 7.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	284	727,151	88.1	2.6	83.1	93.1
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	133	80,680	90.8	3.7	83.6	98.0
นนทบุรี	106	43,409	81.0	4.6	72.0	90.1
ปทุมธานี	138	75,590	86.5	1.7	83.1	89.9
พระนครศรีอยุธยา	214	66,825	80.3	3.1	74.2	86.4
อ่างทอง	171	18,323	55.8	4.3	47.3	64.3
ลพบุรี	150	54,191	44.9	4.0	37.1	52.7
สิงห์บุรี	140	17,228	63.7	4.9	54.0	73.4
ชัยนาท	120	18,966	53.3	6.4	40.7	65.9
สระบุรี	156	43,058	63.2	5.2	53.0	73.4
ชลบุรี	165	84,121	72.5	4.8	63.1	81.9
ระยอง	127	34,761	84.3	2.4	79.6	89.0
จันทบุรี	162	40,538	57.0	5.1	47.0	67.0
ตราด	163	15,069	51.3	5.6	40.3	62.2
ฉะเชิงเทรา	174	53,706	56.1	6.2	43.9	68.3
ปราจีนบุรี	166	28,435	49.7	7.5	35.1	64.4
นครนายก	131	17,184	47.9	8.0	32.2	63.6
สระแก้ว	148	32,145	43.9	7.4	29.3	58.5
ราชบุรี	138	52,178	53.5	6.0	41.7	65.3
กาญจนบุรี	116	36,639	37.3	5.0	27.5	47.1
สุพรรณบุรี	132	44,780	53.8	3.9	46.2	61.5
นครปฐม	180	69,309	84.1	3.1	78.0	90.2
สมุทรสาคร	166	31,454	86.3	3.5	79.5	93.0
สมุทรสงคราม	203	14,507	61.4	3.7	54.1	68.8
เพชรบุรี	126	27,513	45.1	4.1	37.1	53.1
ประจวบคีรีขันธ์	85	19,138	43.4	4.8	33.9	52.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	148	187,157	53.1	6.7	39.9	66.3
บุรีรัมย์	77	49,347	30.0	5.2	19.9	40.1
สุรินทร์	156	82,473	40.1	6.1	28.3	52.0
ศรีสะเกษ	122	74,671	34.5	6.6	21.6	47.3
อุบลราชธานี	160	126,136	46.6	4.2	38.4	54.8
ยโสธร	139	32,986	41.5	6.8	28.0	54.9
ชัยภูมิ	118	50,577	33.2	6.5	20.5	46.0
อำนาจเจริญ	138	21,832	38.5	4.5	29.6	47.3
หนองบัวลำภู	101	22,885	25.2	2.7	20.0	30.4
ขอนแก่น	127	101,769	54.4	8.3	38.1	70.7
อุดรธานี	151	108,272	54.7	8.6	37.9	71.5
เลย	80	26,691	33.3	4.9	23.6	42.9
หนองคาย	92	29,891	36.0	4.4	27.3	44.7

ตารางที่ 7.3.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	162	75,873	58.8	5.9	47.3	70.3
ร้อยเอ็ด	114	149,542	73.3	14.5	44.8	100.0
กาฬสินธุ์	75	35,307	32.1	4.1	24.0	40.1
สกลนคร	77	31,685	27.3	7.3	13.0	41.7
นครพนม	117	17,293	26.5	3.6	19.5	33.5
มุกดาหาร	120	17,050	32.7	7.9	17.3	48.1
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	112	88,961	39.8	7.1	25.9	53.6
ลำพูน	123	24,662	46.7	5.0	36.9	56.6
ลำปาง	136	50,171	54.8	5.8	43.5	66.1
อุตรดิตถ์	126	27,759	47.2	7.1	33.3	61.0
แพร่	182	39,841	64.5	6.1	52.6	76.5
น่าน	89	16,314	33.7	9.4	15.3	52.2
พะเยา	129	31,299	43.9	4.5	35.1	52.6
เชียงราย	138	74,221	48.7	5.5	37.9	59.4
แม่ฮ่องสอน	98	6,980	25.7	6.7	12.6	38.8
นครสวรรค์	119	82,462	44.2	2.4	39.5	48.9
อุทัยธานี	106	14,294	30.5	7.2	16.4	44.6
กำแพงเพชร	98	27,639	28.9	5.3	18.5	39.2
ตาก	141	30,658	34.3	4.8	24.9	43.8
สุโขทัย	122	32,119	29.3	5.2	19.0	39.6
พิษณุโลก	117	38,787	30.8	6.3	18.4	43.2
พิจิตร	119	32,529	41.8	4.9	32.3	51.4
เพชรบูรณ์	87	32,079	24.4	3.1	18.2	30.5
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	138	77,033	27.8	4.5	18.9	36.6
กระบี่	133	20,909	33.2	6.1	21.2	45.3
พังงา	183	22,022	46.6	7.0	32.9	60.3
ภูเก็ต	164	24,587	77.7	3.7	70.3	85.0
สุราษฎร์ธานี	105	43,262	23.9	3.6	16.9	30.9
ระนอง	175	14,198	64.5	6.5	51.7	77.2
ชุมพร	118	36,183	39.1	6.8	25.7	52.5
สงขลา	142	84,560	41.6	3.7	34.3	48.9
สตูล	162	22,548	49.5	5.7	38.3	60.8
ตรัง	161	42,214	39.1	4.0	31.2	47.0
พัทลุง	138	31,849	30.7	4.7	21.4	39.9
ปัตตานี	156	42,535	40.7	6.0	29.0	52.4
ยะลา	153	33,529	61.9	4.5	53.0	70.8
นราธิวาส	155	45,925	43.8	6.3	31.3	56.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	367	189,775	14.0	1.0	12.0	15.9
25 - 34	919	437,412	25.7	1.3	23.2	28.1
35 - 44	1,671	802,925	40.6	1.5	37.7	43.6
45 - 54	1,519	714,148	46.8	2.4	42.1	51.4
55 - 64	3,109	585,184	64.2	1.5	61.2	67.2
65 - 74	1,349	255,707	72.9	1.7	69.5	76.3
รวม	8,934	2,985,151	38.1	1.0	36.2	40.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	24	11,061	28.1	6.7	15.0	41.3
25 - 34	53	26,450	33.8	6.6	20.8	46.8
35 - 44	106	41,205	34.3	4.8	24.9	43.6
45 - 54	160	75,114	53.5	4.9	43.8	63.2
55 - 64	447	81,142	69.7	3.3	63.2	76.3
65 - 74	251	45,255	88.1	2.2	83.8	92.4
รวม	1,041	280,227	51.3	2.8	45.8	56.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	391	200,836	14.4	1.0	12.4	16.3
25 - 34	972	463,862	26.0	1.2	23.6	28.5
35 - 44	1,777	844,130	40.3	1.5	37.4	43.2
45 - 54	1,679	789,262	47.3	2.3	42.8	51.9
55 - 64	3,556	666,326	64.8	1.4	62.0	67.7
65 - 74	1,600	300,962	74.9	1.6	71.7	78.0
รวมทั้งประเทศ	9,975	3,265,378	39.0	1.0	37.0	41.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	3,599	568,418	22.3	1.0	20.2	24.3
นอกเขตเทศบาล	6,376	2,696,961	46.3	1.5	43.4	49.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	25	55,695	6.7	1.4	4.0	9.5
ภาคกลาง	2,215	470,063	28.6	1.2	26.2	31.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,147	1,411,253	50.2	2.5	45.2	55.1
ภาคเหนือ	2,652	790,369	47.9	2.6	42.7	53.0
ภาคใต้	1,936	537,998	37.4	1.8	33.9	40.8
<b>เขตสคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	139	33,397	14.9	1.6	11.8	18.0
เขต สคร.ที่ 2	538	101,515	35.7	2.4	31.0	40.4
เขต สคร.ที่ 3	836	168,020	27.6	2.1	23.5	31.7
เขต สคร.ที่ 4	702	167,132	31.7	2.0	27.8	35.7
เขต สคร.ที่ 5	611	410,495	46.9	3.7	39.7	54.2
เขต สคร.ที่ 6	1,420	525,221	48.5	5.2	38.2	58.8
เขต สคร.ที่ 7	1,116	475,537	55.5	2.8	50.0	61.0
เขต สคร.ที่ 8	620	177,351	43.6	7.8	28.2	58.9
เขต สคร.ที่ 9	931	289,862	56.2	2.5	51.4	61.1
เขต สคร.ที่ 10	1,101	323,155	44.3	2.9	38.6	50.0
เขต สคร.ที่ 11	901	278,721	39.0	3.1	33.0	45.0
เขต สคร.ที่ 12	1,035	259,277	35.8	1.8	32.3	39.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	25	55,695	6.7	1.4	4.0	9.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	18	5,300	6.0	2.5	1.0	10.9
นนทบุรี	27	6,611	12.3	3.0	6.4	18.3
ปทุมธานี	39	11,213	12.8	1.6	9.7	16.0
พระนครศรีอยุธยา	73	15,574	18.7	3.0	12.8	24.6
อ่างทอง	111	11,959	36.4	4.2	28.1	44.7
ลพบุรี	155	51,234	42.5	3.9	34.7	50.2
สิงห์บุรี	80	7,827	28.9	4.5	20.1	37.8
ชัยนาท	125	12,500	35.1	5.4	24.6	45.7
สระบุรี	67	17,995	26.4	5.0	16.7	36.1
ชลบุรี	66	23,609	20.4	3.8	12.9	27.8
ระยอง	42	5,741	13.9	2.1	9.9	18.0
จันทบุรี	142	21,386	30.1	5.1	20.1	40.0
ตราด	123	11,132	37.9	3.5	30.9	44.8
ฉะเชิงเทรา	106	35,397	37.0	6.4	24.4	49.5
ปราจีนบุรี	86	17,718	31.0	4.8	21.6	40.4
นครนายก	120	15,406	43.0	6.5	30.2	55.7
สระแก้ว	133	32,331	44.2	6.7	31.1	57.3
ราชบุรี	109	32,902	33.7	6.4	21.2	46.3
กาญจนบุรี	127	38,956	39.6	6.1	27.7	51.6
สุพรรณบุรี	104	33,270	40.0	3.7	32.7	47.3
นครปฐม	30	9,037	11.0	2.7	5.6	16.3
สมุทรสาคร	42	5,013	13.7	3.5	7.0	20.5
สมุทรสงคราม	75	5,939	25.1	2.8	19.6	30.6
เพชรบุรี	119	22,362	36.6	2.7	31.3	41.9
ประจวบคีรีขันธ์	96	19,654	44.6	4.6	35.5	53.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	103	107,741	30.6	5.6	19.6	41.5
บุรีรัมย์	160	92,902	56.5	6.1	44.6	68.4
สุรินทร์	159	109,295	53.2	5.4	42.7	63.7
ศรีสะเกษ	163	102,502	47.3	7.5	32.6	62.0
อุบลราชธานี	173	140,996	52.1	4.3	43.7	60.5
ยโสธร	130	39,217	49.3	5.4	38.7	59.9
ชัยภูมิ	189	100,557	66.1	6.7	52.8	79.3
อำนาจเจริญ	189	33,728	59.4	4.1	51.4	67.4
หนองบัวลำภู	317	68,083	74.8	2.7	69.6	80.0
ขอนแก่น	131	80,579	43.1	9.5	24.4	61.8
อุดรธานี	170	89,267	45.1	8.6	28.3	61.9
เลย	210	53,508	66.7	4.9	57.1	76.4
หนองคาย	138	52,601	63.4	4.5	54.5	72.2

ตารางที่ 7.3.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	122	52,936	41.0	5.9	29.4 - 52.6
ร้อยเอ็ด	150	54,540	26.7	14.5	0.0 - 55.2
กาฬสินธุ์	182	73,707	67.0	4.6	57.9 - 76.0
สกลนคร	144	84,244	72.7	7.3	58.3 - 87.0
นครพนม	141	47,856	73.3	3.6	66.3 - 80.4
มุกดาหาร	176	26,993	51.8	6.1	39.8 - 63.8
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	184	115,414	51.6	7.4	37.1 - 66.0
ลำพูน	139	21,893	41.5	4.7	32.2 - 50.8
ลำปาง	107	36,403	39.8	5.2	29.7 - 49.9
อุตรดิตถ์	138	25,560	43.4	7.0	29.7 - 57.1
แพร่	85	17,492	28.3	5.3	17.9 - 38.8
น่าน	101	24,653	51.0	7.8	35.6 - 66.3
พะเยา	153	31,102	43.6	4.4	35.0 - 52.2
เชียงราย	131	56,819	37.3	5.0	27.4 - 47.1
แม่ฮ่องสอน	201	19,380	71.2	6.7	58.2 - 84.3
นครสวรรค์	100	45,838	24.6	7.3	10.3 - 38.8
อุทัยธานี	146	25,605	54.6	7.6	39.7 - 69.5
กำแพงเพชร	211	67,147	70.1	5.2	59.9 - 80.3
ตาก	240	47,570	53.3	5.3	42.8 - 63.7
สุโขทัย	213	65,563	59.8	6.1	47.8 - 71.8
พิษณุโลก	156	73,628	58.5	6.4	45.9 - 71.0
พิจิตร	163	38,762	49.8	4.6	40.9 - 58.8
เพชรบูรณ์	184	77,542	58.9	3.2	52.7 - 65.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	156	106,240	38.3	5.3	27.9 - 48.7
กระบี่	122	29,778	47.3	7.2	33.1 - 61.5
พังงา	123	16,142	34.1	6.6	21.2 - 47.1
ภูเก็ต	28	3,498	11.0	2.1	7.0 - 15.1
สุราษฎร์ธานี	189	77,030	42.5	7.2	28.4 - 56.6
ระนอง	114	7,793	35.4	6.4	22.8 - 48.0
ชุมพร	169	38,241	41.3	9.2	23.3 - 59.4
สงขลา	153	73,450	36.1	4.4	27.5 - 44.7
สตูล	103	10,051	22.1	3.7	14.8 - 29.3
ตรัง	170	47,173	43.7	3.4	37.1 - 50.3
พัทลุง	182	43,462	41.9	3.9	34.1 - 49.6
ปัตตานี	158	33,454	32.0	4.2	23.7 - 40.3
ยะลา	157	20,333	37.5	4.5	28.6 - 46.4
นราธิวาส	112	31,353	29.9	4.7	20.7 - 39.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งชนิดที่ผลิตจากโรงงานและชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	317	181,326	13.3	2.0	9.5	17.2
25 - 34	478	226,704	13.3	1.3	10.7	15.9
35 - 44	488	207,192	10.5	0.8	8.9	12.0
45 - 54	286	134,270	8.8	1.0	6.8	10.8
55 - 64	358	58,084	6.4	0.5	5.3	7.4
65 - 74	104	17,734	5.1	0.6	3.8	6.3
รวม	2,031	825,311	10.5	0.7	9.1	12.0
<b>หญิง</b>						
15 - 24	3	920	2.3	1.7	0.0	5.6
25 - 34	5	1,600	2.0	1.0	0.0	4.0
35 - 44	12	5,136	4.3	1.5	1.4	7.2
45 - 54	12	6,466	4.6	1.7	1.3	8.0
55 - 64	28	3,038	2.6	0.6	1.4	3.8
65 - 74	8	944	1.8	0.9	0.1	3.6
รวม	68	18,105	3.3	0.6	2.2	4.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	320	182,246	13.0	1.9	9.2	16.9
25 - 34	483	228,304	12.8	1.3	10.3	15.3
35 - 44	500	212,329	10.1	0.8	8.6	11.6
45 - 54	298	140,737	8.4	1.0	6.6	10.3
55 - 64	386	61,122	5.9	0.5	5.0	6.9
65 - 74	112	18,678	4.6	0.6	3.5	5.8
รวมทั้งประเทศ	2,099	843,416	10.1	0.7	8.7	11.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.3.8. ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งชนิดที่ผลิตจากโรงงานและชนิดมวนเอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	888	171,447	6.7	0.8	5.2	8.2
นอกเขตเทศบาล	1,211	671,968	11.5	0.9	9.8	13.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	10	31,206	3.8	1.9	0.0	7.6
ภาคกลาง	551	137,297	8.4	0.7	7.0	9.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	228	142,543	5.1	1.0	3.0	7.1
ภาคเหนือ	430	184,957	11.2	1.9	7.5	14.9
ภาคใต้	880	347,413	24.1	1.8	20.6	27.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	-	-	-	-	-	-
เขต สคร.ที่ 2	129	29,168	10.3	1.5	7.3	13.2
เขต สคร.ที่ 3	179	44,375	7.3	1.0	5.4	9.2
เขต สคร.ที่ 4	236	60,833	11.6	1.5	8.6	14.5
เขต สคร.ที่ 5	89	86,633	9.9	2.8	4.5	15.4
เขต สคร.ที่ 6	-	-	-	-	-	-
เขต สคร.ที่ 7	139	55,910	6.5	1.6	3.4	9.7
เขต สคร.ที่ 8	103	66,396	16.3	6.1	4.3	28.3
เขต สคร.ที่ 9	162	59,276	11.5	1.4	8.8	14.2
เขต สคร.ที่ 10	165	59,286	8.1	1.0	6.2	10.1
เขต สคร.ที่ 11	384	194,004	27.1	3.1	21.0	33.2
เขต สคร.ที่ 12	496	153,409	21.2	1.5	18.2	24.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 7.4.1 ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่รวม (มวนต่อวันต่อคน) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี)/ เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	1,944	5.8	0.2	5.4	6.3
25 - 34	2,768	7.3	0.2	6.9	7.6
35 - 44	3,202	8.2	0.2	7.8	8.6
45 - 54	2,359	8.4	0.3	7.9	8.9
55 - 64	3,517	7.7	0.2	7.3	8.1
65 - 74	1,345	6.8	0.2	6.4	7.3
รวม	15,135	7.5	0.1	7.2	7.8
<b>หญิง</b>					
15 - 24	50	2.5	0.6	1.3	3.8
25 - 34	71	3.8	0.6	2.6	5.0
35 - 44	160	4.5	0.6	3.3	5.7
45 - 54	187	5.2	0.8	3.6	6.8
55 - 64	409	4.8	0.4	4.0	5.5
65 - 74	212	3.8	0.4	3.0	4.5
รวม	1,089	4.5	0.3	3.9	5.1
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	1,994	5.7	0.2	5.3	6.2
25 - 34	2,839	7.2	0.2	6.8	7.5
35 - 44	3,362	8.0	0.2	7.6	8.4
45 - 54	2,546	8.1	0.3	7.6	8.6
55 - 64	3,926	7.4	0.2	7.1	7.8
65 - 74	1,557	6.4	0.2	6.0	6.8
รวมทั้งประเทศ	16,224	7.3	0.1	7.1	7.6

ตารางที่ 7.4.2 ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่รวม (มวนต่อวันต่อคน) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	7,212	7.3	0.2	7.0	7.7
นอกเขตเทศบาล	9,012	7.3	0.2	7.0	7.6
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	110	7.1	0.6	6.0	8.3
ภาคกลาง	4,602	7.7	0.2	7.3	8.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,288	7.3	0.2	6.8	7.7
ภาคเหนือ	3,512	5.8	0.3	5.3	6.3
ภาคใต้	3,712	8.6	0.3	8.0	9.2
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร. ที่ 1	371	7.7	0.5	6.7	8.6
เขต สคร. ที่ 2	1,070	8.3	0.3	7.7	8.9
เขต สคร. ที่ 3	1,807	7.3	0.4	6.5	8.2
เขต สคร. ที่ 4	1,354	7.8	0.3	7.2	8.4
เขต สคร. ที่ 5	836	7.2	0.5	6.1	8.2
เขต สคร. ที่ 6	1,997	7.0	0.3	6.5	7.5
เขต สคร. ที่ 7	1,455	7.8	0.3	7.1	8.4
เขต สคร. ที่ 8	702	6.7	0.6	5.5	8.0
เขต สคร. ที่ 9	1,160	7.4	0.4	6.6	8.2
เขต สคร. ที่ 10	1,650	4.3	0.3	3.7	4.9
เขต สคร. ที่ 11	1,678	9.1	0.4	8.2	10.0
เขต สคร. ที่ 12	2,034	8.1	0.4	7.3	8.9

ตารางที่ 7.4.3 ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่รวม (มวนต่อวันต่อคน) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	110	7.1	0.6	6.0	8.3
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	90	4.5	1.4	1.7	7.3
นนทบุรี	87	6.9	0.8	5.3	8.5
ปทุมธานี	93	7.9	0.8	6.3	9.5
พระนครศรีอยุธยา	191	7.9	0.9	6.1	9.6
อ่างทอง	273	7.4	0.7	6.1	8.8
ลพบุรี	236	9.5	0.5	8.4	10.5
สิงห์บุรี	179	7.6	0.8	6.1	9.2
ชัยนาท	143	8.2	0.7	6.8	9.6
สระบุรี	239	7.4	0.5	6.4	8.3
ชลบุรี	143	6.5	0.6	5.3	7.6
ระยอง	61	3.6	1.3	1.2	6.1
จันทบุรี	259	8.7	0.7	7.4	10.0
ตราด	253	8.7	0.7	7.4	10.0
ฉะเชิงเทรา	237	9.1	1.3	6.4	11.7
ปราจีนบุรี	266	7.5	1.0	5.4	9.5
นครนายก	236	7.5	0.9	5.7	9.3
สระแก้ว	262	7.8	1.1	5.6	10.0
ราชบุรี	189	7.9	0.8	6.4	9.5
กาญจนบุรี	139	7.0	0.5	6.1	7.9
สุพรรณบุรี	196	7.8	0.8	6.3	9.4
นครปฐม	132	8.7	0.8	7.2	10.2
สมุทรสาคร	166	7.9	0.9	6.0	9.7
สมุทรสงคราม	268	8.0	0.7	6.6	9.4
เพชรบุรี	177	7.7	0.7	6.4	9.1
ประจวบคีรีขันธ์	87	6.8	0.8	5.2	8.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	172	6.8	1.2	4.5	9.2
บุรีรัมย์	139	8.2	0.7	6.8	9.6
สุรินทร์	252	6.8	1.0	4.8	8.8
ศรีสะเกษ	220	7.8	0.7	6.5	9.0
อุบลราชธานี	249	8.2	0.5	7.1	9.3
ยโสธร	263	7.7	0.9	6.0	9.5
ชัยภูมิ	273	7.4	0.6	6.2	8.6
อำนาจเจริญ	170	7.5	0.6	6.4	8.7
หนองบัวลำภู	464	8.3	0.6	7.2	9.4
ขอนแก่น	234	5.2	0.6	4.1	6.4
อุดรธานี	250	7.7	0.4	6.9	8.5
เลย	266	8.5	0.8	7.0	10.0
หนองคาย	167	7.8	1.0	5.9	9.7

ตารางที่ 7.4.3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่รวม (มวนต่อวันต่อคน) ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	292	7.4	0.9	5.6	9.2
ร้อยเอ็ด	230	5.1	0.4	4.3	6.0
กาฬสินธุ์	94	6.9	0.9	5.2	8.6
สกลนคร	135	7.7	1.0	5.8	9.7
นครพนม	153	6.4	1.7	3.0	9.8
มุกดาหาร	265	7.2	0.8	5.6	8.8
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	185	1.9	0.3	1.4	2.4
ลำพูน	226	3.0	0.3	2.4	3.6
ลำปาง	230	5.9	0.5	4.9	6.9
อุตรดิตถ์	166	7.1	0.5	6.0	8.1
แพร่	165	5.9	1.0	4.0	7.9
น่าน	181	5.8	1.2	3.4	8.3
พะเยา	228	5.6	0.5	4.6	6.7
เชียงราย	234	5.2	0.7	3.8	6.5
แม่ฮ่องสอน	201	3.7	1.1	1.6	5.8
นครสวรรค์	193	5.5	1.0	3.6	7.4
อุทัยธานี	171	6.4	0.6	5.2	7.7
กำแพงเพชร	223	7.8	0.6	6.7	8.9
ตาก	342	5.1	0.4	4.4	5.8
สุโขทัย	283	8.2	0.6	6.9	9.5
พิษณุโลก	157	7.0	0.8	5.4	8.6
พิจิตร	115	8.9	0.6	7.8	10.1
เพชรบูรณ์	212	8.9	1.1	6.7	11.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	265	9.8	0.8	8.2	11.4
กระบี่	241	8.5	0.9	6.7	10.4
พังงา	280	6.9	0.9	5.1	8.7
ภูเก็ต	145	5.9	0.9	4.1	7.7
สุราษฎร์ธานี	295	9.0	0.6	7.8	10.2
ระนอง	232	7.2	0.6	5.9	8.4
ชุมพร	220	10.5	1.7	7.2	13.9
สงขลา	223	9.6	1.0	7.6	11.5
สตูล	229	8.1	1.0	6.1	10.1
ตรัง	352	7.5	0.7	6.1	8.9
พัทลุง	396	8.7	1.2	6.4	11.1
ปัตตานี	295	8.2	0.8	6.6	9.8
ยะลา	292	7.3	1.1	5.1	9.5
นราธิวาส	247	6.0	0.5	5.0	7.0

ตารางที่ 7.5.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณ สัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณ สัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,420	719,889	52.8	1.9	49.0	56.6
25 - 34	1,945	864,505	50.7	1.5	47.8	53.7
35 - 44	2,171	951,397	48.1	1.5	45.1	51.0
45 - 54	1,537	701,540	46.0	1.8	42.5	49.5
55 - 64	2,301	429,269	48.3	1.4	45.5	51.1
65 - 74	822	148,680	44.3	1.9	40.6	48.1
รวม	10,196	3,815,280	48.9	1.0	47.0	50.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	48	26,831	51.2	7.4	36.7	65.8
25 - 34	67	39,438	51.1	6.5	38.4	63.8
35 - 44	136	65,194	49.7	4.4	41.0	58.4
45 - 54	116	52,849	38.9	5.2	28.7	49.2
55 - 64	292	50,858	47.3	3.1	41.2	53.5
65 - 74	140	23,625	45.0	4.2	36.8	53.1
รวม	799	258,795	46.5	2.4	41.8	51.2
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,468	746,720	52.7	1.9	49.0	56.5
25 - 34	2,012	903,943	50.7	1.5	47.9	53.6
35 - 44	2,307	1,016,591	48.2	1.5	45.3	51.0
45 - 54	1,653	754,389	45.4	1.8	42.0	48.8
55 - 64	2,593	480,127	48.2	1.3	45.5	50.8
65 - 74	962	172,305	44.4	1.8	40.9	47.9
รวมทั้งประเทศ	10,995	4,074,075	48.8	1.0	46.9	50.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.5.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	4,976	1,040,691	42.3	1.4	39.5 - 45.1
นอกเขตเทศบาล	6,019	3,033,383	51.4	1.2	49.0 - 53.8
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	86	215,562	28.4	3.7	21.1 - 35.7
ภาคกลาง	3,030	766,827	48.3	1.4	45.5 - 51.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,104	1,572,281	51.9	1.8	48.3 - 55.5
ภาคเหนือ	2,562	878,572	54.3	1.9	50.6 - 58.0
ภาคใต้	2,213	640,831	47.1	2.1	42.9 - 51.3
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร.ที่ 1	297	101,986	47.1	4.3	38.6 - 55.6
เขต สคร.ที่ 2	645	116,367	42.7	3.1	36.7 - 48.7
เขต สคร.ที่ 3	1,093	276,955	47.6	2.2	43.3 - 51.9
เขต สคร.ที่ 4	995	271,519	52.6	2.6	47.6 - 57.7
เขต สคร.ที่ 5	643	491,119	54.8	3.8	47.4 - 62.2
เขต สคร.ที่ 6	1,312	597,424	50.1	3.1	44.1 - 56.1
เขต สคร.ที่ 7	1,149	483,738	51.3	2.5	46.4 - 56.2
เขต สคร.ที่ 8	607	223,392	57.1	4.3	48.7 - 65.6
เขต สคร.ที่ 9	881	287,248	57.4	2.5	52.6 - 62.3
เขต สคร.ที่ 10	1,074	367,932	50.6	2.9	44.9 - 56.4
เขต สคร.ที่ 11	1,040	324,905	46.7	3.6	39.6 - 53.7
เขต สคร.ที่ 12	1,173	315,926	47.6	2.2	43.2 - 51.9

ตารางที่ 7.5.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ใน 12 เดือน ที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	86	215,562	28.4	3.7	21.1	35.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	76	45,161	50.8	3.5	43.9	57.7
นนทบุรี	63	26,909	56.0	4.8	46.6	65.4
ปทุมธานี	86	35,500	41.3	6.8	28.1	54.6
พระนครศรีอยุธยา	148	39,577	47.8	6.1	35.9	59.8
อ่างทอง	171	19,132	59.3	3.3	52.9	65.7
ลพบุรี	123	38,475	33.1	4.6	24.0	42.1
สิงห์บุรี	105	11,925	48.0	5.5	37.2	58.9
ชัยนาท	126	15,613	47.6	4.7	38.3	56.8
สระบุรี	120	31,222	47.2	7.4	32.7	61.6
ชลบุรี	104	52,068	46.2	3.8	38.9	53.6
ระยอง	93	25,519	57.8	7.0	44.2	71.5
จันทบุรี	172	35,442	51.7	4.4	43.1	60.2
ตราด	155	17,174	61.5	9.0	43.9	79.2
ฉะเชิงเทรา	129	36,188	41.0	8.1	25.0	56.9
ปราจีนบุรี	127	24,551	44.1	5.8	32.8	55.4
นครนายก	120	15,231	45.2	10.8	24.0	66.4
สระแก้ว	117	25,620	41.4	7.3	27.1	55.7
ราชบุรี	140	48,824	51.2	6.1	39.1	63.2
กาญจนบุรี	127	52,384	54.6	7.0	40.8	68.4
สุพรรณบุรี	155	50,923	62.4	4.9	52.7	72.0
นครปฐม	90	39,603	48.9	9.2	30.8	67.0
สมุทรสาคร	100	17,649	52.9	6.2	40.8	65.1
สมุทรสงคราม	123	9,210	42.8	4.7	33.6	52.0
เพชรบุรี	156	31,020	51.8	6.4	39.2	64.3
ประจวบคีรีขันธ์	104	21,906	46.5	6.1	34.6	58.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	149	198,979	58.6	5.8	47.2	70.1
บุรีรัมย์	172	127,517	64.9	4.8	55.5	74.2
สุรินทร์	169	94,777	48.3	11.1	26.5	70.2
ศรีสะเกษ	157	108,934	55.6	6.5	42.9	68.3
อุบลราชธานี	205	170,709	52.2	4.1	44.1	60.2
ยโสธร	136	35,861	47.1	4.0	39.2	55.0
ชัยภูมิ	153	69,845	42.7	5.0	32.8	52.6
อำนาจเจริญ	239	39,001	66.4	3.9	58.8	74.0
หนองบัวลำภู	244	55,165	51.8	6.3	39.6	64.1
ขอนแก่น	131	99,029	47.4	8.1	31.5	63.3
อุดรธานี	186	123,842	56.1	5.9	44.5	67.7
เลย	194	58,146	65.3	4.5	56.4	74.2
หนองคาย	140	49,793	48.1	2.9	42.4	53.8

ตารางที่ 7.5.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	174	92,522	58.3	7.3	44.0	72.6
ร้อยเอ็ด	126	69,602	35.9	8.1	20.0	51.8
กาฬสินธุ์	117	49,326	44.5	4.0	36.6	52.3
สกลนคร	98	58,202	42.2	9.0	24.6	59.8
นครพนม	154	44,799	46.7	3.7	39.4	54.0
มุกดาหาร	160	26,233	51.8	7.8	36.5	67.1
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	143	104,916	46.5	6.7	33.3	59.7
ลำพูน	116	22,549	46.5	7.6	31.5	61.5
ลำปาง	132	50,788	52.7	3.7	45.5	59.9
อุตรดิตถ์	134	29,025	51.1	3.8	43.6	58.5
แพร่	106	23,159	40.0	4.2	31.6	48.3
น่าน	126	29,649	62.2	5.3	51.8	72.7
พะเยา	144	32,219	47.0	5.5	36.1	57.9
เชียงราย	180	91,893	59.0	8.7	42.0	76.0
แม่ฮ่องสอน	127	12,760	48.2	7.3	33.8	62.6
นครสวรรค์	150	111,805	65.8	5.4	55.2	76.4
อุทัยธานี	124	19,941	42.4	5.5	31.6	53.1
กำแพงเพชร	171	47,361	47.5	6.6	34.6	60.3
ตาก	236	46,912	55.3	6.0	43.6	67.0
สุโขทัย	178	57,272	53.4	6.7	40.2	66.5
พิษณุโลก	176	79,849	63.8	3.6	56.8	70.8
พิจิตร	162	44,286	59.7	3.4	53.0	66.4
เพชรบูรณ์	157	74,190	58.9	5.5	48.2	69.6
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	169	118,616	44.0	8.1	28.1	60.0
กระบี่	143	33,153	54.0	7.2	39.9	68.1
พังงา	163	17,703	38.7	7.5	24.0	53.5
ภูเก็ต	75	11,178	40.2	5.3	29.7	50.6
สุราษฎร์ธานี	183	82,133	46.0	3.9	38.4	53.6
ระนอง	149	10,585	50.0	5.5	39.3	60.7
ชุมพร	158	51,538	55.9	5.9	44.4	67.5
สงขลา	145	73,786	38.3	4.7	29.1	47.5
สตูล	143	19,274	52.7	7.8	37.3	68.1
ตรัง	100	28,464	39.1	7.7	23.9	54.3
พัทลุง	246	60,352	57.0	3.6	49.9	64.1
ปัตตานี	198	49,045	52.0	4.4	43.4	60.5
ยะลา	188	32,365	49.7	5.8	38.2	61.2
นราธิวาส	153	52,640	54.4	6.0	42.6	66.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20



ตารางที่ 7.5.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	268	107,813	59.0	4.4	50.4	67.7
25 - 34	543	234,904	78.5	2.4	73.8	83.2
35 - 44	1,050	422,768	84.3	1.7	80.9	87.7
45 - 54	1,116	412,486	88.4	1.2	86.0	90.7
55 - 64	2,453	405,901	92.1	0.9	90.2	93.9
65 - 74	1,486	239,943	94.8	0.8	93.3	96.4
รวม	6,916	1,823,815	85.1	0.9	83.4	86.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	46	22,339	66.9	8.1	51.0	82.9
25 - 34	76	29,319	81.2	4.5	72.4	90.0
35 - 44	100	33,214	66.0	5.4	55.3	76.7
45 - 54	100	52,731	74.2	7.5	59.5	88.9
55 - 64	289	51,575	82.6	3.3	76.1	89.1
65 - 74	198	33,431	83.7	3.2	77.3	90.0
รวม	809	222,609	75.9	2.8	70.4	81.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	314	130,152	60.3	3.7	52.9	67.6
25 - 34	619	264,223	78.8	2.2	74.5	83.0
35 - 44	1,150	455,982	82.6	1.7	79.2	86.0
45 - 54	1,216	465,217	86.5	1.6	83.4	89.6
55 - 64	2,742	457,476	90.9	1.0	89.0	92.8
65 - 74	1,684	273,374	93.3	0.8	91.7	94.9
รวมทั้งประเทศ	7,725	2,046,425	84.0	0.9	82.2	85.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.5.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	4,111	651,616	86.2	1.0	84.4	88.1
นอกเขตเทศบาล	3,614	1,394,809	82.9	1.2	80.6	85.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	37	70,178	86.4	4.8	76.9	95.9
ภาคกลาง	2,276	464,413	87.2	1.2	85.0	89.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,860	697,266	80.4	1.9	76.7	84.1
ภาคเหนือ	2,333	549,187	85.6	1.4	82.8	88.4
ภาคใต้	1,219	265,381	84.1	2.0	80.2	88.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	241	80,668	90.7	2.4	86.0	95.3
เขต สคร.ที่ 2	412	57,748	81.4	2.9	75.6	87.2
เขต สคร.ที่ 3	976	203,857	86.5	1.9	82.8	90.1
เขต สคร.ที่ 4	647	122,140	89.4	2.1	85.2	93.5
เขต สคร.ที่ 5	373	182,212	86.7	3.5	79.8	93.5
เขต สคร.ที่ 6	761	319,227	83.9	2.3	79.5	88.3
เขต สคร.ที่ 7	726	195,827	70.9	3.9	63.3	78.6
เขต สคร.ที่ 8	423	91,252	76.5	5.0	66.8	86.3
เขต สคร.ที่ 9	648	152,197	80.5	1.9	76.7	84.2
เขต สคร.ที่ 10	1,262	305,738	91.7	1.5	88.8	94.6
เขต สคร.ที่ 11	597	139,047	89.8	3.0	83.9	95.6
เขต สคร.ที่ 12	622	126,334	78.7	2.7	73.4	84.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.5.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	37	70,178	86.4	4.8	76.9	95.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	110	44,608	90.6	4.9	81.1	100.0
นนทบุรี	90	38,738	87.0	3.8	79.5	94.5
ปทุมธานี	73	23,517	98.8	0.9	97.0	100.0
พระนครศรีอยุธยา	78	18,413	89.3	4.8	79.9	98.6
อ่างทอง	107	11,214	96.4	2.2	92.1	100.0
ลพบุรี	78	16,673	80.9	3.8	73.5	88.4
สิงห์บุรี	76	6,787	95.8	1.7	92.4	99.2
ชัยนาท	81	10,945	89.6	4.2	81.5	97.8
สระบุรี	70	12,128	62.5	7.8	47.1	77.9
ชลบุรี	103	38,801	81.3	3.9	73.6	88.9
ระยอง	127	24,184	84.5	3.4	77.9	91.1
จันทบุรี	128	22,123	90.0	2.8	84.6	95.5
ตราด	147	8,481	77.6	5.3	67.2	87.9
ฉะเชิงเทรา	85	20,222	89.4	4.8	79.9	98.9
ปราจีนบุรี	124	19,418	82.7	6.5	70.0	95.4
นครนายก	71	10,418	85.7	3.8	78.3	93.1
สระแก้ว	81	15,601	95.4	3.0	89.4	100.0
ราชบุรี	101	25,855	94.9	2.1	90.8	99.0
กาญจนบุรี	63	13,319	88.3	5.4	77.6	99.0
สุพรรณบุรี	75	26,095	94.9	2.5	90.0	99.7
นครปฐม	81	19,220	76.6	8.4	60.2	93.1
สมุทรสาคร	69	10,199	95.1	2.7	89.9	100.0
สมุทรสงคราม	124	6,618	92.5	2.5	87.5	97.4
เพชรบุรี	74	11,193	96.7	1.8	93.1	100.0
ประจวบคีรีขันธ์	60	9,641	78.5	6.4	66.0	91.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	101	73,142	84.0	7.2	69.7	98.2
บุรีรัมย์	67	37,724	95.5	2.7	90.3	100.0
สุรินทร์	73	19,626	70.5	6.4	57.9	83.2
ศรีสะเกษ	89	25,010	76.1	6.7	63.0	89.2
อุบลราชธานี	91	54,138	53.0	6.8	39.7	66.3
ยโสธร	145	29,324	93.1	2.5	88.2	98.1
ชัยภูมิ	132	51,721	92.7	2.6	87.6	97.8
อำนาจเจริญ	134	18,648	66.0	5.0	56.3	75.7
หนองบัวลำภู	93	16,028	87.4	4.3	78.9	96.0
ขอนแก่น	137	106,006	81.5	4.3	73.0	90.0
อุดรธานี	76	39,921	74.2	5.1	64.1	84.2
เลย	84	22,870	81.4	9.8	62.3	100.0
หนองคาย	114	38,776	94.8	2.5	90.0	99.6

ตารางที่ 7.5.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	95	34,533	88.2	4.7	79.0	97.4	
ร้อยเอ็ด	85	39,720	94.7	3.3	88.2	100.0	
กาฬสินธุ์	77	21,374	75.8	6.8	62.4	89.1	
สกลนคร	87	33,722	87.4	6.0	75.6	99.2	
นครพนม	94	26,671	83.9	4.4	75.2	92.6	
มุกดาหาร	86	8,315	76.3	11.1	54.5	98.0	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	99	60,636	86.8	5.5	76.0	97.6	
ลำพูน	124	19,567	98.2	1.1	96.0	100.0	
ลำปาง	228	61,531	95.1	2.1	90.9	99.2	
อุตรดิตถ์	95	14,633	82.9	3.7	75.7	90.1	
แพร่	139	24,711	89.7	3.7	82.5	96.9	
น่าน	234	31,137	92.1	2.8	86.5	97.6	
พะเยา	105	19,669	87.2	4.0	79.3	95.1	
เชียงราย	211	79,787	95.0	2.2	90.7	99.2	
แม่ฮ่องสอน	122	8,699	80.2	10.5	59.6	100.0	
นครสวรรค์	94	22,855	73.1	17.3	39.1	100.0	
อุทัยธานี	92	11,270	54.2	3.0	48.3	60.0	
กำแพงเพชร	106	27,977	91.3	3.2	85.0	97.7	
ตาก	187	28,582	63.9	4.1	55.9	71.9	
สุโขทัย	150	32,975	86.9	3.5	80.0	93.9	
พิษณุโลก	142	45,846	91.8	2.5	86.9	96.6	
พิจิตร	131	29,151	79.9	3.5	72.9	86.8	
เพชรบูรณ์	74	30,161	77.5	5.4	66.9	88.2	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	112	61,479	92.0	5.8	80.6	100.0	
กระบี่	121	12,266	87.8	7.2	73.7	100.0	
พังงา	68	4,883	95.3	2.5	90.3	100.0	
ภูเก็ต	57	6,402	92.9	3.5	86.1	99.7	
สุราษฎร์ธานี	84	31,459	83.1	5.5	72.3	93.9	
ระนอง	85	6,275	90.6	2.6	85.5	95.6	
ชุมพร	70	16,281	93.9	4.5	85.1	100.0	
สงขลา	112	47,451	94.0	2.3	89.4	98.6	
สตูล	66	4,444	82.0	5.7	70.9	93.1	
ตรัง	85	11,280	92.2	3.9	84.6	99.8	
พัทลุง	116	20,663	54.4	4.3	45.9	62.9	
ปัตตานี	85	12,599	90.9	3.6	83.8	98.1	
ยะลา	53	6,651	94.6	2.4	89.8	99.4	
นราธิวาส	105	23,247	69.4	8.6	52.6	86.2	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.6.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	664	365,326	25.8	2.1	21.7	29.9
25 - 34	835	363,229	20.8	1.1	18.6	23.0
35 - 44	836	345,300	17.2	1.0	15.3	19.0
45 - 54	507	240,518	15.5	1.2	13.2	17.8
55 - 64	697	138,656	15.2	1.1	13.1	17.2
65 - 74	258	46,892	13.7	1.3	11.1	16.2
รวม	3,797	1,499,922	18.8	0.8	17.3	20.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	18	8,630	14.5	3.9	6.7	22.2
25 - 34	16	10,461	11.6	5.1	1.6	21.5
35 - 44	36	22,322	15.8	3.8	8.4	23.3
45 - 54	36	24,257	17.3	4.0	9.4	25.1
55 - 64	61	11,318	9.8	1.7	6.3	13.2
65 - 74	28	5,208	9.9	2.4	5.2	14.6
รวม	195	82,195	13.7	1.7	10.3	17.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	682	373,956	25.4	2.0	21.3	29.4
25 - 34	851	373,690	20.4	1.1	18.2	22.5
35 - 44	872	367,622	17.1	1.0	15.2	18.9
45 - 54	543	264,775	15.6	1.2	13.2	18.0
55 - 64	758	149,974	14.6	1.0	12.6	16.5
65 - 74	286	52,100	13.2	1.2	10.8	15.5
รวมทั้งประเทศ	3,992	1,582,117	18.4	0.8	16.9	19.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.6.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,918	420,192	16.4	1.0	14.3	18.4
นอกเขตเทศบาล	2,074	1,161,925	19.3	1.0	17.4	21.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	25	72,885	9.2	2.6	4.2	14.2
ภาคกลาง	1,080	295,125	18.1	1.1	16.0	20.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,124	577,591	18.6	1.3	16.0	21.2
ภาคเหนือ	828	343,121	20.4	2.0	16.6	24.3
ภาคใต้	935	293,395	21.2	1.9	17.5	24.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	108	46,515	21.0	2.7	15.8	26.3
เขต สคร.ที่ 2	218	41,663	15.0	2.0	11.1	18.9
เขต สคร.ที่ 3	395	104,523	17.4	1.8	13.8	21.0
เขต สคร.ที่ 4	359	102,424	19.2	2.1	15.2	23.3
เขต สคร.ที่ 5	216	160,114	17.2	2.2	12.8	21.6
เขต สคร.ที่ 6	465	240,366	19.8	2.4	15.0	24.5
เขต สคร.ที่ 7	443	177,110	18.6	2.1	14.5	22.7
เขต สคร.ที่ 8	183	95,439	22.8	5.6	11.9	33.7
เขต สคร.ที่ 9	292	95,001	18.6	2.3	14.0	23.2
เขต สคร.ที่ 10	353	152,681	20.4	2.5	15.6	25.3
เขต สคร.ที่ 11	429	133,561	18.9	2.5	13.9	23.9
เขต สคร.ที่ 12	506	159,834	23.5	2.7	18.1	28.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.6.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
กรุงเทพมหานคร	25	72,885	9.2	2.6	4.2	14.2	
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	32	17,788	20.8	7.0	6.9	34.6	
นนทบุรี	21	11,420	21.6	5.0	11.8	31.3	
ปทุมธานี	30	16,809	20.1	3.0	14.2	26.1	
พระนครศรีอยุธยา	57	18,286	21.6	5.5	10.8	32.3	
อ่างทอง	25	2,657	8.1	2.1	4.0	12.2	
ลพบุรี	58	15,368	13.1	3.5	6.2	19.9	
สิงห์บุรี	44	4,814	18.9	8.8	1.6	36.2	
ชัยนาท	37	5,132	14.9	3.7	7.6	22.2	
สระบุรี	54	13,693	20.4	3.0	14.4	26.3	
ชลบุรี	39	20,557	16.5	4.3	8.0	25.0	
ระยอง	54	13,172	29.2	5.9	17.6	40.8	
จันทบุรี	53	12,142	17.3	4.3	8.9	25.8	
ตราด	32	3,228	11.1	2.9	5.3	16.9	
ฉะเชิงเทรา	33	8,123	8.9	3.5	2.0	15.7	
ปราจีนบุรี	54	9,093	16.0	2.8	10.6	21.4	
นครนายก	35	3,809	10.8	2.2	6.4	15.1	
สระแก้ว	63	16,612	27.3	7.3	13.0	41.6	
ราชบุรี	38	14,791	13.6	2.9	7.9	19.3	
กาญจนบุรี	54	19,368	20.1	5.4	9.6	30.6	
สุพรรณบุรี	33	15,946	19.9	5.2	9.6	30.1	
นครปฐม	58	25,074	30.9	8.8	13.6	48.2	
สมุทรสาคร	57	7,640	22.4	4.7	13.2	31.5	
สมุทรสงคราม	44	2,699	12.6	2.0	8.8	16.5	
เพชรบุรี	39	9,173	14.8	3.0	8.8	20.7	
ประจวบคีรีขันธ์	36	7,733	15.9	4.9	6.2	25.6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	48	66,369	19.1	4.6	10.1	28.0	
บุรีรัมย์	62	42,411	20.5	5.1	10.5	30.4	
สุรินทร์	53	24,074	11.6	2.9	6.0	17.2	
ศรีสะเกษ	67	47,276	23.0	6.3	10.5	35.4	
อุบลราชธานี	73	52,641	16.0	3.9	8.4	23.5	
ยโสธร	50	12,631	16.1	4.5	7.2	25.0	
ชัยภูมิ	53	27,260	16.3	3.1	10.3	22.4	
อำนาจเจริญ	65	13,042	21.0	4.2	12.8	29.3	
หนองบัวลำภู	72	18,604	17.3	2.1	13.2	21.5	
ขอนแก่น	53	50,380	24.1	5.5	13.3	34.8	
อุดรธานี	92	60,016	26.0	5.4	15.4	36.6	
เลย	40	8,345	9.4	1.9	5.7	13.1	
หนองคาย	36	13,966	13.4	3.0	7.5	19.3	

ตารางที่ 7.6.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	95	53,574	32.7	9.2	14.5 50.8
ร้อยเอ็ด	48	20,934	10.5	5.3	0.0 20.9
กาฬสินธุ์	29	14,549	13.1	2.4	8.4 17.7
สกลนคร	35	20,274	15.9	2.5	11.0 20.9
นครพนม	61	20,143	20.5	5.1	10.6 30.5
มุกดาหาร	92	11,103	21.8	5.4	11.3 32.4
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	69	54,247	23.4	5.1	13.4 33.4
ลำพูน	41	8,273	16.3	4.3	7.7 24.8
ลำปาง	43	17,789	18.4	4.7	9.2 27.6
อุตรดิตถ์	51	10,903	18.4	4.1	10.4 26.4
แพร่	39	11,314	18.7	5.0	8.9 28.6
น่าน	19	4,695	9.8	4.8	0.3 19.2
<b>ภาคเหนือ</b>					
พะเยา	41	10,073	14.0	3.4	7.3 20.7
เชียงราย	61	42,220	26.7	7.3	12.4 41.0
แม่ฮ่องสอน	40	4,069	13.8	4.8	4.5 23.2
นครสวรรค์	47	55,916	30.7	8.8	13.5 47.9
อุทัยธานี	43	9,231	17.4	6.1	5.3 29.5
กำแพงเพชร	64	23,186	21.5	6.1	9.5 33.5
ตาก	57	11,316	12.6	2.1	8.5 16.7
สุโขทัย	57	16,091	14.8	4.0	6.9 22.7
พิษณุโลก	51	25,489	19.3	5.7	8.1 30.5
พิจิตร	29	7,107	9.4	2.8	3.8 15.0
เพชรบูรณ์	76	31,202	25.7	5.9	14.1 37.2
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	62	48,774	18.1	3.7	10.8 25.4
กระบี่	53	8,366	13.7	2.5	8.9 18.6
พังงา	60	6,814	14.9	3.8	7.6 22.3
ภูเก็ต	30	4,640	17.0	3.3	10.5 23.5
สุราษฎร์ธานี	54	27,838	15.0	1.9	11.3 18.8
ระนอง	94	5,598	23.6	4.2	15.4 31.8
ชุมพร	76	31,531	33.5	12.9	8.2 58.8
สงขลา	96	55,760	28.5	7.4	14.0 43.0
สตูล	31	3,045	8.0	2.4	3.3 12.8
ตรัง	27	7,905	10.1	2.1	6.0 14.1
พัทลุง	69	19,664	18.8	3.8	11.2 26.3
ปัตตานี	97	26,858	29.1	5.5	18.3 40.0
ยะลา	82	16,591	23.2	6.7	10.1 36.4
นราธิวาส	104	30,012	30.2	7.2	16.1 44.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 7.6.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	6,536	3,010,215	61.9	1.3	59.3	64.5
25 - 34	6,186	2,629,260	58.2	1.2	55.8	60.6
35 - 44	6,560	2,894,703	57.2	1.1	54.9	59.4
45 - 54	4,933	2,142,497	55.4	1.6	52.2	58.6
55 - 64	7,646	1,312,260	53.6	1.0	51.6	55.7
65 - 74	3,351	579,140	53.6	1.4	50.8	56.3
รวม	35,212	12,568,075	57.5	1.0	55.6	59.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	5,729	2,663,463	59.5	1.2	57.2	61.8
25 - 34	5,511	2,479,440	56.1	1.2	53.8	58.5
35 - 44	6,496	2,996,107	55.1	1.2	52.8	57.4
45 - 54	4,881	2,156,271	51.2	1.3	48.6	53.8
55 - 64	6,561	1,292,374	47.7	1.1	45.5	50.0
65 - 74	2,890	545,474	43.3	1.4	40.6	46.0
รวม	32,068	12,133,129	53.9	1.0	52.0	55.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	12,265	5,673,678	60.7	1.1	58.6	62.9
25 - 34	11,697	5,108,700	57.2	1.0	55.1	59.2
35 - 44	13,056	5,890,810	56.1	1.0	54.1	58.1
45 - 54	9,814	4,298,768	53.2	1.2	50.7	55.6
55 - 64	14,207	2,604,634	50.5	1.0	48.6	52.4
65 - 74	6,241	1,124,614	48.0	1.2	45.8	50.3
รวมทั้งประเทศ	67,280	24,701,204	55.7	0.9	53.9	57.5

ตารางที่ 7.6.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	35,037	7,977,587	55.7	1.6	52.6	58.8
นอกเขตเทศบาล	32,243	16,723,617	55.7	1.1	53.5	57.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	608	1,592,535	46.2	5.6	35.2	57.2
ภาคกลาง	22,066	6,344,425	56.9	1.3	54.3	59.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16,648	8,433,454	54.9	1.8	51.4	58.3
ภาคเหนือ	14,604	4,717,370	56.5	1.6	53.4	59.6
ภาคใต้	13,354	3,613,420	59.8	2.0	55.9	63.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	2,649	1,174,498	58.0	3.5	51.1	64.9
เขต สคร.ที่ 2	4,027	801,628	50.1	2.6	45.0	55.3
เขต สคร.ที่ 3	8,052	2,312,422	57.7	2.2	53.4	62.0
เขต สคร.ที่ 4	7,338	2,055,877	58.4	2.3	53.9	63.0
เขต สคร.ที่ 5	3,565	2,660,355	55.9	3.1	49.8	61.9
เขต สคร.ที่ 6	6,954	3,389,656	55.1	3.2	48.7	61.4
เขต สคร.ที่ 7	6,129	2,383,443	53.7	2.4	48.9	58.5
เขต สคร.ที่ 8	3,259	1,041,180	56.7	3.7	49.4	64.1
เขต สคร.ที่ 9	4,466	1,384,285	56.6	2.8	51.1	62.0
เขต สคร.ที่ 10	6,879	2,291,904	56.3	2.3	51.9	60.8
เขต สคร.ที่ 11	6,562	1,760,118	59.9	3.5	52.9	66.8
เขต สคร.ที่ 12	6,792	1,853,302	59.7	1.8	56.1	63.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 7.6.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	608	1,592,535	46.2	5.6	35.2	57.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	832	447,954	56.8	6.0	45.1	68.5
นนทบุรี	841	439,590	55.8	5.3	45.4	66.3
ปทุมธานี	979	464,059	67.9	3.4	61.2	74.6
พระนครศรีอยุธยา	829	270,850	48.8	7.1	34.8	62.8
อ่างทอง	748	90,061	41.8	3.9	34.2	49.4
ลพบุรี	931	280,864	51.3	4.3	42.9	59.7
สิงห์บุรี	677	58,791	39.3	6.0	27.5	51.1
ชัยนาท	687	108,338	47.0	4.6	37.9	56.1
สระบุรี	984	263,574	57.9	6.8	44.6	71.1
ชลบุรี	920	538,579	59.4	5.7	48.2	70.5
ระยอง	780	214,716	54.0	5.0	44.1	63.9
จันทบุรี	1,005	246,971	67.4	4.6	58.4	76.5
ตราด	778	65,094	42.8	5.4	32.2	53.5
ฉะเชิงเทรา	839	222,919	46.4	6.7	33.2	59.6
ปราจีนบุรี	1,084	212,359	62.8	4.6	53.9	71.8
นครนายก	934	98,857	53.4	5.4	42.9	64.0
สระแก้ว	880	264,972	67.8	5.6	56.8	78.9
ราชบุรี	699	292,910	49.1	3.7	41.8	56.4
กาญจนบุรี	923	329,578	61.1	6.8	47.6	74.5
สุพรรณบุรี	779	333,316	54.9	6.2	42.7	67.1
นครปฐม	1,126	439,095	69.3	5.9	57.7	80.9
สมุทรสาคร	988	177,151	53.6	9.1	35.8	71.4
สมุทรสงคราม	1,001	84,292	57.7	5.7	46.5	68.8
เพชรบุรี	977	209,078	63.5	3.8	56.0	71.0
ประจวบคีรีขันธ์	845	190,458	56.9	5.4	46.4	67.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	839	1,071,550	58.2	5.0	48.3	68.0
บุรีรัมย์	941	623,958	55.2	7.6	40.3	70.0
สุรินทร์	980	559,182	57.9	6.7	44.8	70.9
ศรีสะเกษ	981	596,998	58.3	7.0	44.5	72.1
อุบลราชธานี	853	692,697	56.7	3.2	50.4	63.0
ยโสธร	862	206,091	50.4	8.0	34.7	66.1
ชัยภูมิ	805	405,665	49.2	4.8	39.8	58.7
อำนาจเจริญ	939	168,780	66.2	3.2	59.9	72.5
หนองบัวลำภู	853	192,162	51.8	2.4	47.2	56.5
ขอนแก่น	1,027	858,302	66.8	5.9	55.2	78.4
อุดรธานี	891	637,835	59.9	6.0	48.2	71.6
เลย	776	226,919	51.3	3.8	43.8	58.8
หนองคาย	855	361,286	57.0	3.8	49.6	64.5

ตารางที่ 7.6.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น สถานที่ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	953	389,326	55.8	9.2	37.7 - 73.9
ร้อยเอ็ด	909	396,871	41.4	11.3	19.1 - 63.6
กาฬสินธุ์	690	326,955	46.6	5.4	36.0 - 57.2
สกลนคร	733	343,350	42.6	6.3	30.2 - 55.0
นครพนม	939	243,589	50.0	6.5	37.2 - 62.7
มุกดาหาร	822	131,938	55.1	7.8	39.8 - 70.4
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	1,006	735,781	65.2	4.8	55.8 - 74.7
ลำพูน	744	135,590	45.1	7.5	30.3 - 59.9
ลำปาง	846	295,980	50.2	4.9	40.7 - 59.7
อุตรดิตถ์	825	174,273	51.6	5.9	40.2 - 63.1
แพร่	802	162,193	47.5	7.3	33.1 - 61.9
น่าน	1,032	219,428	60.5	6.5	47.8 - 73.2
พะเยา	751	164,429	43.8	4.6	34.8 - 52.8
เชียงราย	954	509,803	61.4	5.7	50.3 - 72.5
แม่ฮ่องสอน	744	68,701	49.4	6.9	35.8 - 62.9
นครสวรรค์	778	423,987	58.7	6.6	45.8 - 71.6
อุทัยธานี	801	139,394	59.6	7.1	45.7 - 73.4
กำแพงเพชร	886	284,675	56.5	7.8	41.1 - 71.8
ตาก	932	176,667	53.8	3.9	46.1 - 61.5
สุโขทัย	780	202,777	44.4	6.1	32.5 - 56.4
พิษณุโลก	879	333,311	54.1	6.9	40.5 - 67.7
พิจิตร	794	193,124	51.5	4.4	42.9 - 60.1
เพชรบูรณ์	1,050	497,257	70.2	4.5	61.3 - 79.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	855	576,056	53.3	8.4	36.8 - 69.9
กระบี่	997	199,491	67.1	5.1	57.0 - 77.1
พังงา	962	99,560	56.0	4.1	48.0 - 64.0
ภูเก็ต	736	120,838	51.6	5.6	40.6 - 62.5
สุราษฎร์ธานี	968	427,394	61.6	4.5	52.8 - 70.5
ระนอง	1,006	83,383	72.8	6.8	59.5 - 86.1
ชุมพร	1,038	253,396	73.8	4.2	65.5 - 82.0
สงขลา	913	550,636	59.8	3.7	52.6 - 67.0
สตูล	809	99,497	52.1	5.5	41.3 - 62.8
ตรัง	887	206,501	48.7	3.8	41.2 - 56.2
พัทลุง	1,045	248,858	67.7	4.3	59.2 - 76.2
ปัตตานี	963	237,707	57.5	4.5	48.7 - 66.3
ยะลา	1,039	191,523	60.6	5.3	50.2 - 71.0
นราธิวาส	1,136	318,579	67.4	5.5	56.7 - 78.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีนี้ที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

**ส่วนที่ 8**  
**การดื่มเครื่องดื่ม**  
**ดื่มที่มีแอลกอฮอล์**



ตารางที่ 8.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	4,083	1,999,461	41.0	1.1	38.8	43.1
25 - 34	5,586	2,458,020	53.1	1.0	51.1	55.0
35 - 44	6,231	2,807,920	54.0	1.0	52.0	56.0
45 - 54	4,433	2,029,566	50.9	1.1	48.8	53.0
55 - 64	5,483	998,256	39.5	0.8	38.0	41.1
65 - 74	1,704	318,973	27.8	1.0	25.8	29.7
รวม	27,520	10,612,197	47.4	0.6	46.2	48.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	803	383,494	8.3	0.5	7.2	9.3
25 - 34	1,310	602,196	13.1	0.6	11.9	14.3
35 - 44	1,938	907,257	16.0	0.6	14.8	17.2
45 - 54	1,430	670,870	15.0	0.7	13.7	16.4
55 - 64	1,329	288,438	10.0	0.5	9.1	10.9
65 - 74	397	79,617	5.8	0.5	4.8	6.8
รวม	7,207	2,931,873	12.4	0.4	11.7	13.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	4,886	2,382,955	25.1	0.7	23.7	26.5
25 - 34	6,896	3,060,216	33.2	0.6	31.9	34.4
35 - 44	8,169	3,715,177	34.2	0.6	32.9	35.4
45 - 54	5,863	2,700,436	32.0	0.7	30.5	33.4
55 - 64	6,812	1,286,694	23.8	0.5	22.8	24.8
65 - 74	2,101	398,590	15.8	0.6	14.7	16.9
รวมทั้งประเทศ	34,727	13,544,069	29.5	0.4	28.6	30.3

ตารางที่ 8.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
<i>ในเขตเทศบาล</i>	17,443	4,208,881	27.4	0.6	26.2	28.6
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	17,284	9,335,188	30.5	0.6	29.4	31.6
<b>ภาค</b>						
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	380	1,022,846	24.0	1.7	20.6	27.4
<i>ภาคกลาง</i>	10,070	2,764,293	24.3	0.6	23.1	25.6
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	10,163	5,324,014	34.0	0.9	32.2	35.7
<i>ภาคเหนือ</i>	9,976	3,242,951	37.8	0.9	36.1	39.6
<i>ภาคใต้</i>	4,138	1,189,965	19.5	0.8	17.9	21.0
<b>เขต สคร.</b>						
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	1,037	465,470	22.8	2.0	19.0	26.7
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	2,061	442,314	27.0	1.1	24.8	29.2
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	4,149	1,118,920	27.2	1.1	25.0	29.4
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	2,823	737,589	20.6	1.0	18.7	22.5
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	2,127	1,596,207	33.1	1.9	29.3	36.9
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	4,130	2,101,911	33.4	1.2	31.1	35.8
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	3,906	1,625,896	35.7	1.5	32.7	38.7
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	1,919	648,281	34.3	1.5	31.3	37.3
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	2,750	856,261	34.2	1.6	31.0	37.3
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	5,307	1,738,409	41.7	1.4	38.9	44.4
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	2,375	709,175	24.1	1.2	21.7	26.6
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	1,763	480,790	15.1	0.9	13.4	16.9



ตารางที่ 8.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	380	1,022,846	24.0	1.7	20.5	27.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	362	210,372	24.6	2.5	19.7	29.6
นนทบุรี	256	128,374	16.1	2.6	11.0	21.2
ปทุมธานี	346	182,926	26.9	3.5	19.9	33.8
พระนครศรีอยุธยา	435	154,170	27.4	1.7	24.1	30.7
อ่างทอง	440	54,350	25.0	2.2	20.7	29.3
ลพบุรี	501	175,824	31.6	2.3	27.2	36.1
สิงห์บุรี	302	32,656	20.5	1.6	17.4	23.7
ชัยนาท	430	66,774	26.6	2.0	22.7	30.5
สระบุรี	388	112,711	24.8	2.3	20.3	29.3
ชลบุรี	374	191,587	21.1	2.8	15.6	26.7
ระยอง	386	103,159	24.5	2.1	20.3	28.7
จันทบุรี	616	138,382	37.1	2.5	32.1	42.1
ตราด	514	47,697	30.1	3.7	22.9	37.3
ฉะเชิงเทรา	405	107,436	22.1	1.9	18.3	26.0
ปราจีนบุรี	542	113,461	32.9	3.9	25.3	40.6
นครนายก	340	43,058	22.8	2.9	17.1	28.5
สระแก้ว	610	163,766	42.8	3.7	35.5	50.1
ราชบุรี	407	141,022	23.1	2.9	17.5	28.8
กาญจนบุรี	413	136,987	24.6	4.1	16.6	32.6
สุพรรณบุรี	341	112,620	17.7	2.1	13.7	21.8
นครปฐม	305	120,585	19.3	1.9	15.5	23.0
สมุทรสาคร	296	64,091	20.1	1.7	16.8	23.4
สมุทรสงคราม	400	28,932	20.0	2.2	15.6	24.4
เพชรบุรี	384	72,887	21.3	2.5	16.5	26.1
ประจวบคีรีขันธ์	277	60,463	17.5	1.9	13.7	21.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	524	610,491	32.7	3.6	25.5	39.8
บุรีรัมย์	542	399,793	35.3	4.6	26.3	44.4
สุรินทร์	531	327,325	32.9	3.3	26.4	39.4
ศรีสะเกษ	579	355,767	34.3	3.0	28.3	40.3
อุบลราชธานี	582	500,309	38.6	2.7	33.4	43.9
ยโสธร	600	141,487	34.4	4.5	25.4	43.3
ชัยภูมิ	530	258,599	31.1	2.2	26.7	35.5
อำนาจเจริญ	617	109,998	40.8	2.5	35.9	45.8
หนองบัวลำภู	652	164,873	43.4	2.2	39.1	47.7
ขอนแก่น	485	431,701	33.0	2.1	28.9	37.0
อุดรธานี	576	389,466	34.9	3.6	27.9	41.9
เลย	404	125,547	27.5	3.6	20.4	34.6
หนองคาย	550	223,493	35.4	4.5	26.5	44.3

ตารางที่ 8.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	534	233,154	32.7	4.5	23.9 - 41.5
ร้อยเอ็ด	519	315,591	32.1	2.3	27.7 - 36.5
กาฬสินธุ์	410	218,085	31.1	3.8	23.7 - 38.5
สกลนคร	497	279,206	35.0	5.2	24.8 - 45.2
นครพนม	496	158,367	31.9	3.8	24.5 - 39.3
มุกดาหาร	535	80,764	33.3	2.3	28.7 - 37.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	557	397,165	34.4	3.1	28.2 - 40.5
ลำพูน	665	128,586	42.1	3.4	35.3 - 48.8
ลำปาง	641	231,782	38.5	2.9	32.8 - 44.2
อุตรดิตถ์	568	121,297	35.7	3.2	29.4 - 42.1
แพร่	725	169,866	46.8	2.2	42.5 - 51.0
น่าน	664	132,045	35.8	5.9	24.2 - 47.4
พะเยา	680	165,319	43.8	3.8	36.4 - 51.2
เชียงราย	808	449,815	52.9	3.6	45.9 - 59.9
แม่ฮ่องสอน	567	63,832	43.2	3.8	35.6 - 50.8
นครสวรรค์	470	259,469	35.2	2.4	30.5 - 39.9
อุทัยธานี	387	64,804	28.4	3.7	21.0 - 35.7
กำแพงเพชร	594	194,306	37.9	3.6	30.8 - 45.0
ตาก	559	127,616	38.3	3.1	32.2 - 44.4
สุโขทัย	585	181,325	38.8	2.0	35.0 - 42.7
พิษณุโลก	542	217,174	34.0	3.5	27.1 - 40.8
พิจิตร	468	129,702	31.4	2.1	27.3 - 35.5
เพชรบูรณ์	496	208,849	28.7	3.8	21.3 - 36.1
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	353	277,865	26.0	2.3	21.5 - 30.5
กระบี่	233	26,418	8.9	1.8	5.4 - 12.4
พังงา	328	33,486	18.9	4.0	11.0 - 26.7
ภูเก็ต	271	40,698	17.1	2.2	12.7 - 21.4
สุราษฎร์ธานี	441	204,890	29.4	2.8	23.9 - 35.0
ระนอง	360	29,122	25.0	2.5	20.1 - 30.0
ชุมพร	389	96,695	27.9	2.7	22.6 - 33.2
สงขลา	340	199,631	21.4	1.8	17.8 - 24.9
สตูล	173	18,996	9.6	2.0	5.6 - 13.5
ตรัง	400	98,140	22.3	1.8	18.8 - 25.7
พัทลุง	467	97,868	26.0	3.8	18.4 - 33.5
ปัตตานี	121	19,552	4.6	1.7	1.2 - 8.1
ยะลา	151	19,491	6.1	1.5	3.0 - 9.1
นราธิวาส	111	27,113	5.6	2.1	1.5 - 9.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 8.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน) ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	604	309,886	6.4	0.4	5.5	7.2
25 - 34	1,008	423,024	9.1	0.6	8.0	10.3
35 - 44	1,066	438,897	8.4	0.4	7.6	9.3
45 - 54	717	312,603	7.8	0.6	6.7	9.0
55 - 64	700	120,621	4.8	0.3	4.2	5.3
65 - 74	180	31,234	2.7	0.3	2.1	3.4
รวม	4,275	1,636,265	7.3	0.3	6.8	7.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	73	43,821	0.9	0.2	0.6	1.3
25 - 34	134	63,441	1.4	0.2	0.9	1.9
35 - 44	220	106,697	1.9	0.2	1.5	2.3
45 - 54	183	93,317	2.1	0.3	1.5	2.7
55 - 64	130	27,275	0.9	0.1	0.7	1.2
65 - 74	24	6,391	0.5	0.2	0.1	0.9
รวม	764	340,941	1.4	0.1	1.2	1.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	677	353,706	3.7	0.3	3.2	4.2
25 - 34	1,142	486,464	5.3	0.3	4.6	5.9
35 - 44	1,286	545,594	5.0	0.2	4.5	5.5
45 - 54	900	405,920	4.8	0.4	4.1	5.5
55 - 64	830	147,896	2.7	0.2	2.4	3.1
65 - 74	204	37,625	1.5	0.2	1.1	1.9
รวมทั้งประเทศ	5,039	1,977,206	4.3	0.2	4.0	4.6

ตารางที่ 8.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน) ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,649	696,230	4.5	0.3	3.9	5.2
นอกเขตเทศบาล	2,390	1,280,976	4.2	0.2	3.8	4.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	70	199,554	4.7	1.1	2.6	6.8
ภาคกลาง	1,458	398,861	3.5	0.2	3.1	3.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,161	618,540	3.9	0.3	3.4	4.5
ภาคเหนือ	1,748	583,351	6.8	0.4	6.1	7.6
ภาคใต้	602	176,900	2.9	0.3	2.3	3.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	135	67,646	3.3	0.7	2.0	4.7
เขต สคร. ที่ 2	300	68,330	4.2	0.5	3.2	5.1
เขต สคร. ที่ 3	609	164,075	4.0	0.3	3.4	4.6
เขต สคร. ที่ 4	414	98,810	2.8	0.2	2.3	3.2
เขต สคร. ที่ 5	292	219,633	4.5	0.6	3.4	5.7
เขต สคร. ที่ 6	447	211,169	3.4	0.4	2.6	4.1
เขต สคร. ที่ 7	422	187,737	4.1	0.4	3.3	4.9
เขต สคร. ที่ 8	248	96,714	5.1	0.7	3.8	6.4
เขต สคร. ที่ 9	582	176,108	7.0	0.8	5.4	8.6
เขต สคร. ที่ 10	918	310,529	7.4	0.6	6.3	8.6
เขต สคร. ที่ 11	298	91,534	3.1	0.5	2.2	4.0
เขต สคร. ที่ 12	304	85,367	2.7	0.4	2.0	3.4

ตารางที่ 8.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน) ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	70	199,554	4.7	1.1	2.6	6.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	34	20,606	2.4	0.8	0.8	4.0
นนทบุรี	25	12,462	1.6	0.4	0.7	2.4
ปทุมธานี	48	33,500	4.9	1.4	2.2	7.7
พระนครศรีอยุธยา	62	21,684	3.9	0.9	2.1	5.7
อ่างทอง	41	5,107	2.3	0.8	0.9	3.8
ลพบุรี	102	35,351	6.4	1.1	4.2	8.5
สิงห์บุรี	36	3,580	2.3	0.5	1.3	3.2
ชัยนาท	52	7,216	2.9	0.8	1.2	4.5
สระบุรี	69	17,076	3.8	0.7	2.3	5.2
ชลบุรี	64	30,491	3.4	0.7	2.1	4.7
ระยอง	35	10,149	2.4	0.6	1.3	3.5
จันทบุรี	118	25,797	6.9	0.9	5.1	8.7
ตราด	78	6,877	4.3	0.8	2.8	5.9
ฉะเชิงเทรา	62	18,888	3.9	1.1	1.7	6.1
ปราจีนบุรี	87	19,120	5.6	1.2	3.2	7.9
นครนายก	47	6,064	3.2	0.6	2.1	4.3
สระแก้ว	84	26,082	6.8	0.9	5.1	8.5
ราชบุรี	63	20,034	3.3	0.5	2.3	4.3
กาญจนบุรี	43	12,973	2.3	0.6	1.1	3.5
สุพรรณบุรี	67	19,220	3.0	0.8	1.5	4.5
นครปฐม	46	16,246	2.6	0.7	1.2	4.0
สมุทรสาคร	37	6,995	2.2	0.5	1.2	3.2
สมุทรสงคราม	60	3,384	2.3	0.6	1.1	3.6
เพชรบุรี	68	14,096	4.1	0.7	2.8	5.4
ประจวบคีรีขันธ์	30	5,861	1.7	0.5	0.8	2.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	64	82,278	4.4	1.1	2.2	6.6
บุรีรัมย์	80	56,239	5.0	1.1	2.9	7.0
สุรินทร์	79	44,531	4.5	1.1	2.4	6.6
ศรีสะเกษ	77	36,518	3.5	0.9	1.7	5.3
อุบลราชธานี	80	80,376	6.2	0.5	5.3	7.2
ยโสธร	52	8,056	2.0	0.6	0.8	3.1
ชัยภูมิ	69	36,584	4.4	1.2	2.0	6.8
อำนาจเจริญ	48	6,905	2.6	0.6	1.5	3.7
หนองบัวลำภู	52	13,357	3.5	0.5	2.5	4.5
ขอนแก่น	66	49,367	3.8	0.7	2.4	5.1
อุดรธานี	55	33,682	3.0	0.9	1.3	4.8
เลย	30	11,596	2.5	0.9	0.8	4.3
หนองคาย	71	22,549	3.6	0.7	2.1	5.0

ตารางที่ 8.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน) ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	105	43,622	6.1	2.3	1.6 10.6
ร้อยเอ็ด	47	26,904	2.7	1.0	0.8 4.6
กาฬสินธุ์	21	10,092	1.4	0.4	0.6 2.2
สกลนคร	58	32,476	4.1	1.5	1.0 7.1
นครพนม	61	16,526	3.3	0.9	1.5 5.1
มุกดาหาร	46	6,881	2.8	0.7	1.5 4.2
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	91	67,118	5.8	1.0	3.8 7.8
ลำพูน	104	20,496	6.7	1.4	4.0 9.4
ลำปาง	128	45,409	7.5	1.3	5.0 10.1
อุตรดิตถ์	115	27,251	8.0	1.7	4.7 11.4
แพร่	157	39,120	10.8	2.1	6.6 14.9
น่าน	100	21,130	5.7	1.5	2.8 8.6
พะเยา	145	35,487	9.4	1.6	6.3 12.5
เชียงราย	145	76,098	8.9	1.9	5.2 12.7
แม่ฮ่องสอน	48	5,672	3.8	0.9	2.0 5.7
นครสวรรค์	61	46,553	6.3	1.1	4.1 8.5
อุทัยธานี	42	6,485	2.8	0.8	1.2 4.4
กำแพงเพชร	81	26,463	5.2	0.8	3.6 6.7
ตาก	100	18,757	5.6	1.3	3.1 8.2
สุโขทัย	175	49,474	10.6	1.3	8.0 13.2
พิษณุโลก	116	47,253	7.4	2.4	2.7 12.1
พิจิตร	64	17,213	4.2	1.0	2.3 6.1
เพชรบูรณ์	76	33,374	4.6	1.2	2.1 7.0
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	28	19,532	1.8	0.5	0.8 2.8
กระบี่	30	4,829	1.6	0.5	0.6 2.7
พังงา	37	3,830	2.2	0.7	0.7 3.6
ภูเก็ต	42	6,817	2.9	1.4	0.1 5.6
สุราษฎร์ธานี	74	34,029	4.9	1.2	2.6 7.2
ระนอง	31	2,200	1.9	0.7	0.6 3.2
ชุมพร	56	20,296	5.9	2.0	2.0 9.7
สงขลา	57	35,500	3.8	0.9	1.9 5.7
สตูล	19	2,797	1.4	0.5	0.4 2.4
ตรัง	75	18,872	4.3	1.0	2.4 6.2
พัทลุง	83	17,324	4.6	1.2	2.2 7.0
ปัตตานี	37	6,512	1.5	0.8	0.0 3.1
ยะลา	19	1,986	0.6	0.2	0.2 1.0
นราธิวาส	14	2,376	0.5	0.2	0.1 0.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 8.3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,247	604,619	15.0	0.7	13.7	16.3
25 - 34	1,891	800,063	21.6	0.8	20.0	23.2
35 - 44	2,079	905,633	21.5	0.8	19.9	23.1
45 - 54	1,300	594,590	18.4	0.9	16.6	20.2
55 - 64	1,356	244,793	11.3	0.5	10.3	12.3
65 - 74	349	73,395	7.2	0.6	6.0	8.3
รวม	8,222	3,223,094	17.6	0.5	16.6	18.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	152	71,225	1.6	0.2	1.2	2.0
25 - 34	238	98,925	2.3	0.2	1.9	2.8
35 - 44	357	169,310	3.2	0.3	2.7	3.8
45 - 54	255	108,396	2.6	0.3	2.1	3.1
55 - 64	205	49,852	1.8	0.2	1.4	2.2
65 - 74	58	12,122	0.9	0.2	0.5	1.3
รวม	1,265	509,831	2.3	0.1	2.0	2.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,399	675,844	8.0	0.4	7.3	8.7
25 - 34	2,129	898,988	11.3	0.4	10.5	12.1
35 - 44	2,436	1,074,943	11.4	0.4	10.6	12.2
45 - 54	1,555	702,986	9.5	0.5	8.6	10.4
55 - 64	1,561	294,645	6.0	0.3	5.5	6.5
65 - 74	407	85,517	3.6	0.3	3.0	4.2
รวมทั้งประเทศ	9,487	3,732,925	9.2	0.2	8.7	9.7

ตารางที่ 8.3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	4,752	1,051,763	7.9	0.3	7.3	8.6
นอกเขตเทศบาล	4,735	2,681,161	9.8	0.3	9.2	10.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	56	157,710	4.5	0.9	2.8	6.2
ภาคกลาง	2,556	726,805	7.1	0.4	6.4	7.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,738	1,485,654	10.9	0.5	9.9	11.8
ภาคเหนือ	2,961	983,748	13.3	0.7	12.0	14.7
ภาคใต้	1,176	379,008	6.6	0.5	5.6	7.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	243	118,457	4.5	0.9	2.8	6.2
เขต สคร. ที่ 2	494	114,054	6.5	1.1	4.2	8.8
เขต สคร. ที่ 3	1,113	313,485	7.7	0.7	6.3	9.1
เขต สคร. ที่ 4	706	180,808	8.5	0.6	7.3	9.7
เขต สคร. ที่ 5	590	439,758	5.5	0.5	4.5	6.6
เขต สคร. ที่ 6	1,095	606,069	10.3	0.9	8.6	12.1
เขต สคร. ที่ 7	1,053	439,827	10.8	0.8	9.2	12.4
เขต สคร. ที่ 8	502	182,709	11.5	0.7	10.1	13.0
เขต สคร. ที่ 9	883	277,532	11.5	1.3	8.9	14.1
เขต สคร. ที่ 10	1,576	523,507	12.5	1.2	10.2	14.7
เขต สคร. ที่ 11	604	208,446	7.7	0.9	5.9	9.6
เขต สคร. ที่ 12	572	170,562	5.6	0.6	4.5	6.8



ตารางที่ 8.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	56	157,710	4.5	0.9	2.7	6.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	87	52,323	7.0	1.5	4.1	9.9
นนทบุรี	48	23,902	3.3	0.8	1.8	4.7
ปทุมธานี	76	45,299	7.6	1.8	4.0	11.1
พระนครศรีอยุธยา	119	49,256	10.0	2.9	4.3	15.8
อ่างทอง	73	8,899	4.3	0.8	2.7	5.8
ลพบุรี	145	47,639	9.5	1.3	6.9	12.1
สิงห์บุรี	73	6,924	4.8	0.6	3.7	6.0
ชัยนาท	84	13,373	6.1	1.3	3.6	8.7
สระบุรี	119	37,219	9.0	1.7	5.6	12.3
ชลบุรี	107	53,314	6.5	1.3	4.0	9.0
ระยอง	100	30,386	7.8	1.3	5.4	10.3
จันทบุรี	151	36,103	11.2	1.6	8.0	14.3
ตราด	126	10,155	7.4	1.5	4.4	10.3
ฉะเชิงเทรา	121	36,758	8.2	1.6	5.0	11.4
ปราจีนบุรี	113	28,336	8.6	1.8	5.1	12.2
นครนายก	108	15,177	8.4	1.8	4.8	12.0
สระแก้ว	200	50,933	16.1	3.4	9.4	22.9
ราชบุรี	118	43,008	7.8	1.8	4.3	11.3
กาญจนบุรี	101	34,314	6.9	1.7	3.6	10.2
สุพรรณบุรี	110	30,032	5.0	1.2	2.6	7.4
นครปฐม	50	19,873	3.5	1.1	1.4	5.6
สมุทรสาคร	57	11,939	4.3	0.8	2.8	5.8
สมุทรสงคราม	97	6,029	4.5	0.9	2.7	6.4
เพชรบุรี	107	21,915	7.0	1.2	4.7	9.3
ประจวบคีรีขันธ์	66	13,699	4.3	1.2	2.0	6.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	119	149,883	9.3	1.5	6.3	12.3
บุรีรัมย์	147	94,550	9.3	1.6	6.1	12.5
สุรินทร์	168	108,827	12.4	2.0	8.4	16.3
ศรีสะเกษ	180	110,687	12.4	2.0	8.5	16.2
อุบลราชธานี	169	160,360	14.9	1.3	12.4	17.3
ยโสธร	139	24,988	6.9	1.7	3.6	10.3
ชัยภูมิ	156	86,498	11.6	2.0	7.7	15.6
อำนาจเจริญ	157	28,969	13.3	1.4	10.6	16.0
หนองบัวลำภู	95	26,940	8.0	0.9	6.3	9.8
ขอนแก่น	122	102,906	8.7	1.1	6.7	10.8
อุดรธานี	130	96,353	10.2	1.6	7.1	13.4
เลย	89	31,455	7.6	1.8	4.1	11.2
หนองคาย	193	75,254	13.5	2.2	9.2	17.9

ตารางที่ 8.3.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	221	116,053	17.6	5.0	7.8 27.3
ร้อยเอ็ด	133	99,306	11.0	1.6	7.8 14.2
กาฬสินธุ์	112	57,801	9.5	1.8	6.1 13.0
สกลนคร	109	57,216	8.7	2.2	4.4 13.0
นครพนม	137	34,791	8.5	1.7	5.2 11.8
มุกดาหาร	162	22,817	11.5	1.8	7.9 15.1
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	130	110,004	11.1	2.1	6.9 15.3
ลำพูน	202	41,029	15.6	2.8	10.2 21.1
ลำปาง	209	77,436	14.1	1.5	11.0 17.1
อุตรดิตถ์	167	38,518	13.1	2.6	8.0 18.2
แพร่	262	59,829	19.3	2.4	14.5 24.0
น่าน	218	46,926	14.3	4.3	5.8 22.8
พะเยา	193	48,261	16.0	2.3	11.4 20.6
เชียงราย	262	131,313	18.5	3.1	12.3 24.6
แม่ฮ่องสอน	100	8,710	8.5	1.2	6.1 10.9
นครสวรรค์	135	81,964	13.4	2.3	8.9 17.8
อุทัยธานี	98	18,740	9.6	4.3	1.2 18.0
กำแพงเพชร	161	50,210	12.1	2.5	7.1 17.0
ตาก	143	34,035	11.8	1.4	9.0 14.5
สุโขทัย	237	61,514	14.4	2.4	9.7 19.2
พิษณุโลก	190	81,535	14.7	3.2	8.3 21.1
พิจิตร	108	31,794	8.8	1.3	6.3 11.3
เพชรบูรณ์	146	61,930	9.3	2.1	5.2 13.4
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	78	73,606	7.5	1.1	5.3 9.7
กระบี่	65	7,362	2.5	0.5	1.5 3.6
พังงา	93	10,481	6.2	1.8	2.6 9.9
ภูเก็ต	57	9,112	4.2	1.3	1.6 6.7
สุราษฎร์ธานี	132	62,567	10.1	1.9	6.3 13.9
ระนอง	71	5,641	5.4	0.9	3.6 7.2
ชุมพร	108	39,677	12.6	5.3	2.3 22.9
สงขลา	113	67,777	7.9	1.4	5.1 10.6
สตูล	34	4,218	2.2	0.6	1.1 3.4
ตรัง	140	38,194	9.3	1.4	6.5 12.1
พัทลุง	159	36,615	10.3	1.9	6.6 13.9
ปัตตานี	53	9,925	2.4	1.0	0.4 4.4
ยะลา	36	3,582	1.1	0.4	0.3 1.9
นราธิวาส	37	10,252	2.2	1.1	0.0 4.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

# ส่วนที่ 13

## โรคเรื้อรัง



ตารางที่ 13.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคโลหิตจาง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	4,043	1,583,203	3.5	0.2	3.2	3.8
เพศ						
ชาย	1,360	519,714	2.3	0.2	2.0	2.7
หญิง	2,683	1,063,489	4.6	0.2	4.1	5.0
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	2,061	464,599	3.1	0.3	2.6	3.6
นอกเขตเทศบาล	1,982	1,118,604	3.7	0.2	3.3	4.1
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	28	86,341	2.4	0.9	0.4	4.3
ภาคกลาง	1,118	321,981	2.8	0.2	2.4	3.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,430	720,577	4.6	0.3	4.0	5.3
ภาคเหนือ	865	290,230	3.3	0.4	2.6	4.1
ภาคใต้	602	164,075	2.7	0.2	2.3	3.1
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	127	66,816	3.2	0.8	1.6	4.7
เขต สคร.ที่ 2	204	37,916	2.3	0.3	1.8	2.8
เขต สคร.ที่ 3	447	125,059	3.0	0.3	2.3	3.7
เขต สคร.ที่ 4	340	92,189	2.5	0.3	2.0	3.0
เขต สคร.ที่ 5	276	221,975	5.0	0.7	3.6	6.3
เขต สคร.ที่ 6	523	224,413	3.5	0.4	2.6	4.3
เขต สคร.ที่ 7	631	274,189	6.0	0.6	4.8	7.2
เขต สคร.ที่ 8	237	89,044	4.5	1.3	2.0	7.0
เขต สคร.ที่ 9	292	86,605	3.4	0.4	2.6	4.3
เขต สคร.ที่ 10	336	114,581	2.7	0.3	2.2	3.2
เขต สคร.ที่ 11	309	85,250	2.9	0.3	2.2	3.5
เขต สคร.ที่ 12	293	78,825	2.5	0.2	2.0	3.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรือรูมาตอยด์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	4,666	1,323,128	2.9	0.1	2.6	3.2
<b>เพศ</b>						
ชาย	1,900	548,000	2.5	0.2	2.1	2.8
หญิง	2,766	775,128	3.3	0.2	3.0	3.7
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,483	459,428	3.1	0.3	2.5	3.6
นอกเขตเทศบาล	2,183	863,700	2.8	0.2	2.5	3.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	45	104,049	2.9	1.0	0.8	5.0
ภาคกลาง	1,520	320,442	2.8	0.2	2.4	3.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,136	427,439	2.8	0.2	2.3	3.2
ภาคเหนือ	1,235	318,064	3.7	0.3	3.0	4.3
ภาคใต้	730	153,136	2.5	0.2	2.1	2.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	219	78,319	3.7	0.6	2.5	5.0
เขต สคร.ที่ 2	337	50,870	3.1	0.4	2.4	3.9
เขต สคร.ที่ 3	504	99,753	2.4	0.2	2.0	2.9
เขต สคร.ที่ 4	460	91,499	2.5	0.3	2.0	3.0
เขต สคร.ที่ 5	222	114,857	2.6	0.4	1.9	3.3
เขต สคร.ที่ 6	460	187,265	2.9	0.5	2.0	3.8
เขต สคร.ที่ 7	454	125,317	2.7	0.4	1.9	3.5
เขต สคร.ที่ 8	302	83,284	4.2	0.9	2.6	5.9
เขต สคร.ที่ 9	404	92,138	3.7	0.4	2.8	4.5
เขต สคร.ที่ 10	529	142,641	3.4	0.5	2.4	4.4
เขต สคร.ที่ 11	381	83,932	2.8	0.3	2.2	3.4
เขต สคร.ที่ 12	349	69,204	2.2	0.3	1.6	2.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	2,269	736,590	1.6	0.1	1.4	1.8
เพศ						
ชาย	1,320	414,625	1.8	0.1	1.6	2.1
หญิง	949	321,965	1.4	0.1	1.1	1.6
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	1,302	280,342	1.9	0.2	1.4	2.3
นอกเขตเทศบาล	967	456,248	1.5	0.1	1.3	1.7
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	27	79,577	2.2	0.8	0.5	3.8
ภาคกลาง	715	167,323	1.4	0.1	1.1	1.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	557	258,839	1.7	0.2	1.3	2.0
ภาคเหนือ	558	153,001	1.7	0.2	1.4	2.1
ภาคใต้	412	77,851	1.3	0.1	1.0	1.5
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	82	33,395	1.6	0.5	0.6	2.5
เขต สคร.ที่ 2	151	24,681	1.5	0.2	1.1	1.9
เขต สคร.ที่ 3	244	58,040	1.4	0.2	0.9	1.8
เขต สคร.ที่ 4	238	51,207	1.4	0.3	0.9	1.9
เขต สคร.ที่ 5	110	67,384	1.5	0.3	1.0	2.0
เขต สคร.ที่ 6	257	128,128	2.0	0.3	1.3	2.7
เขต สคร.ที่ 7	190	63,327	1.4	0.3	0.7	2.0
เขต สคร.ที่ 8	153	43,269	2.2	0.4	1.4	2.9
เขต สคร.ที่ 9	185	40,328	1.6	0.2	1.2	2.0
เขต สคร.ที่ 10	220	69,404	1.6	0.3	1.1	2.2
เขต สคร.ที่ 11	229	41,191	1.4	0.2	1.0	1.7
เขต สคร.ที่ 12	183	36,659	1.2	0.2	0.9	1.5

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	2,388	734,693	1.6	0.1	1.4	1.8
<b>เพศ</b>						
ชาย	1,203	362,538	1.6	0.1	1.4	1.9
หญิง	1,185	372,155	1.6	0.1	1.4	1.8
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,357	283,995	1.9	0.2	1.4	2.3
นอกเขตเทศบาล	1,031	450,698	1.5	0.1	1.3	1.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	30	72,410	2.0	0.8	0.4	3.5
ภาคกลาง	736	173,792	1.5	0.1	1.2	1.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	587	262,880	1.7	0.2	1.3	2.1
ภาคเหนือ	594	150,835	1.7	0.2	1.4	2.0
ภาคใต้	441	74,775	1.2	0.1	1.0	1.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	89	36,756	1.7	0.5	0.8	2.7
เขต สคร.ที่ 2	163	25,935	1.6	0.2	1.2	2.0
เขต สคร.ที่ 3	242	58,428	1.4	0.2	0.9	1.9
เขต สคร.ที่ 4	242	52,674	1.4	0.3	0.9	1.9
เขต สคร.ที่ 5	127	77,722	1.7	0.3	1.2	2.3
เขต สคร.ที่ 6	258	117,763	1.8	0.3	1.2	2.5
เขต สคร.ที่ 7	202	67,395	1.5	0.3	0.8	2.1
เขต สคร.ที่ 8	144	42,204	2.1	0.4	1.4	2.9
เขต สคร.ที่ 9	214	45,794	1.8	0.2	1.4	2.2
เขต สคร.ที่ 10	236	62,837	1.5	0.2	1.0	1.9
เขต สคร.ที่ 11	250	40,943	1.4	0.2	1.0	1.7
เขต สคร.ที่ 12	191	33,832	1.1	0.2	0.8	1.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 13.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคกระดูกพรุน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	2,283	707,399	1.6	0.1	1.3	1.8
เพศ						
ชาย	912	320,973	1.4	0.1	1.2	1.7
หญิง	1,371	386,426	1.7	0.1	1.4	1.9
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	1,347	274,045	1.8	0.2	1.4	2.3
นอกเขตเทศบาล	936	433,354	1.4	0.1	1.2	1.6
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	26	67,477	1.9	0.9	0.0	3.7
ภาคกลาง	689	164,692	1.4	0.1	1.2	1.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	597	251,486	1.6	0.2	1.2	2.0
ภาคเหนือ	588	143,613	1.7	0.2	1.4	1.9
ภาคใต้	383	80,133	1.3	0.1	1.0	1.6
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	86	34,506	1.6	0.5	0.7	2.6
เขต สคร.ที่ 2	127	20,795	1.3	0.2	0.8	1.7
เขต สคร.ที่ 3	246	53,955	1.3	0.2	1.0	1.6
เขต สคร.ที่ 4	230	55,435	1.5	0.2	1.0	2.0
เขต สคร.ที่ 5	132	73,202	1.6	0.4	0.9	2.4
เขต สคร.ที่ 6	252	110,122	1.7	0.4	1.0	2.4
เขต สคร.ที่ 7	213	68,162	1.5	0.3	0.8	2.1
เขต สคร.ที่ 8	157	39,491	2.0	0.3	1.4	2.6
เขต สคร.ที่ 9	180	38,854	1.5	0.2	1.1	2.0
เขต สคร.ที่ 10	251	65,267	1.5	0.2	1.1	2.0
เขต สคร.ที่ 11	211	42,637	1.4	0.2	1.0	1.8
เขต สคร.ที่ 12	172	37,496	1.2	0.2	0.8	1.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้า ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,913	671,499	1.5	0.1	1.3	1.7
<b>เพศ</b>						
ชาย	889	321,318	1.4	0.1	1.2	1.7
หญิง	1,024	350,180	1.5	0.1	1.3	1.7
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,058	244,282	1.6	0.2	1.2	2.1
นอกเขตเทศบาล	855	427,217	1.4	0.1	1.2	1.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	19	62,512	1.7	0.9	0.0	3.5
ภาคกลาง	505	135,267	1.2	0.1	0.9	1.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	519	247,492	1.6	0.2	1.2	2.0
ภาคเหนือ	486	134,283	1.5	0.2	1.2	1.8
ภาคใต้	384	91,945	1.5	0.2	1.1	1.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	44	21,485	1.0	0.3	0.4	1.7
เขต สคร.ที่ 2	107	18,129	1.1	0.2	0.8	1.5
เขต สคร.ที่ 3	189	51,117	1.2	0.2	0.7	1.7
เขต สคร.ที่ 4	165	44,537	1.2	0.2	0.8	1.6
เขต สคร.ที่ 5	107	61,183	1.4	0.3	0.9	1.9
เขต สคร.ที่ 6	208	103,391	1.6	0.3	0.9	2.3
เขต สคร.ที่ 7	204	82,917	1.8	0.3	1.1	2.5
เขต สคร.ที่ 8	147	38,700	2.0	0.3	1.3	2.6
เขต สคร.ที่ 9	149	36,943	1.5	0.2	1.1	1.9
เขต สคร.ที่ 10	190	58,640	1.4	0.2	0.9	1.9
เขต สคร.ที่ 11	207	52,261	1.7	0.3	1.1	2.4
เขต สคร.ที่ 12	177	39,684	1.3	0.2	0.9	1.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,750	599,050	1.3	0.1	1.1	1.5
<b>เพศ</b>						
ชาย	1,039	347,736	1.6	0.1	1.3	1.8
หญิง	711	251,314	1.1	0.1	0.9	1.3
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	933	216,257	1.4	0.2	1.0	1.9
นอกเขตเทศบาล	817	382,793	1.2	0.1	1.0	1.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	18	59,460	1.6	0.8	0.0	3.3
ภาคกลาง	514	131,040	1.1	0.1	0.9	1.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	430	201,305	1.3	0.2	0.9	1.7
ภาคเหนือ	487	132,323	1.5	0.1	1.2	1.8
ภาคใต้	301	74,922	1.2	0.1	1.0	1.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	71	29,609	1.4	0.4	0.5	2.3
เขต สคร.ที่ 2	111	18,438	1.1	0.2	0.7	1.6
เขต สคร.ที่ 3	175	44,683	1.1	0.2	0.7	1.5
เขต สคร.ที่ 4	157	38,311	1.0	0.2	0.6	1.5
เขต สคร.ที่ 5	88	52,810	1.2	0.3	0.7	1.7
เขต สคร.ที่ 6	209	101,173	1.6	0.4	0.9	2.3
เขต สคร.ที่ 7	133	47,322	1.0	0.3	0.4	1.7
เขต สคร.ที่ 8	121	36,220	1.8	0.4	1.1	2.6
เขต สคร.ที่ 9	148	36,819	1.5	0.2	1.1	1.8
เขต สคร.ที่ 10	218	59,284	1.4	0.2	1.0	1.8
เขต สคร.ที่ 11	170	39,763	1.3	0.2	0.9	1.7
เขต สคร.ที่ 12	131	35,158	1.1	0.2	0.8	1.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,569	576,342	1.3	0.1	1.0	1.5
<b>เพศ</b>						
ชาย	708	277,534	1.2	0.1	1.0	1.5
หญิง	861	298,808	1.3	0.1	1.0	1.5
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	898	229,596	1.5	0.3	1.0	2.0
นอกเขตเทศบาล	671	346,745	1.1	0.1	0.9	1.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	20	67,176	1.8	0.9	0.0	3.7
ภาคกลาง	511	139,768	1.2	0.1	0.9	1.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	392	201,224	1.3	0.2	0.9	1.7
ภาคเหนือ	407	114,884	1.3	0.2	1.0	1.6
ภาคใต้	239	53,290	0.9	0.1	0.7	1.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	67	30,238	1.4	0.5	0.5	2.4
เขต สคร.ที่ 2	86	16,291	1.0	0.2	0.6	1.4
เขต สคร.ที่ 3	192	54,058	1.3	0.3	0.8	1.8
เขต สคร.ที่ 4	166	39,181	1.1	0.2	0.7	1.5
เขต สคร.ที่ 5	82	62,672	1.4	0.3	0.8	2.0
เขต สคร.ที่ 6	177	91,514	1.4	0.3	0.8	2.1
เขต สคร.ที่ 7	133	47,038	1.0	0.3	0.4	1.7
เขต สคร.ที่ 8	113	35,221	1.8	0.4	1.1	2.5
เขต สคร.ที่ 9	118	28,964	1.1	0.2	0.8	1.5
เขต สคร.ที่ 10	176	50,699	1.2	0.2	0.8	1.6
เขต สคร.ที่ 11	138	29,369	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 12	101	23,921	0.8	0.1	0.5	1.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหอบหืดในปัจจุบัน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,816	570,183	1.2	0.1	1.1	1.3
เพศ						
ชาย	827	220,145	1.0	0.1	0.8	1.1
หญิง	989	350,038	1.5	0.1	1.3	1.7
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	943	204,162	1.3	0.1	1.1	1.6
นอกเขตเทศบาล	873	366,021	1.2	0.1	1.0	1.3
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	22	60,637	1.5	0.4	0.7	2.4
ภาคกลาง	507	120,287	1.0	0.1	0.9	1.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	426	173,504	1.1	0.1	0.9	1.3
ภาคเหนือ	382	111,969	1.3	0.1	1.1	1.5
ภาคใต้	479	103,785	1.7	0.1	1.4	2.0
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	85	33,620	1.6	0.3	1.0	2.2
เขต สคร.ที่ 2	91	13,703	0.8	0.1	0.6	1.0
เขต สคร.ที่ 3	161	35,985	0.9	0.1	0.6	1.1
เขต สคร.ที่ 4	170	36,979	1.0	0.1	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 5	94	53,193	1.1	0.2	0.7	1.5
เขต สคร.ที่ 6	140	52,621	0.8	0.1	0.5	1.1
เขต สคร.ที่ 7	192	67,691	1.4	0.2	1.1	1.8
เขต สคร.ที่ 8	84	20,764	1.1	0.2	0.6	1.5
เขต สคร.ที่ 9	132	32,371	1.3	0.2	1.0	1.6
เขต สคร.ที่ 10	166	58,834	1.4	0.2	1.1	1.7
เขต สคร.ที่ 11	230	58,259	1.9	0.3	1.4	2.4
เขต สคร.ที่ 12	249	45,526	1.4	0.1	1.1	1.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณ สัดสวน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณ สัดสวน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,492	546,844	1.2	0.1	1.0	1.4
เพศ						
ชาย	768	280,578	1.3	0.1	1.0	1.5
หญิง	724	266,266	1.1	0.1	0.9	1.4
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	845	209,855	1.4	0.2	0.9	1.8
นอกเขตเทศบาล	647	336,989	1.1	0.1	0.9	1.3
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	22	65,129	1.8	0.9	0.0	3.6
ภาคกลาง	426	116,364	1.0	0.1	0.8	1.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	446	216,371	1.4	0.2	1.0	1.8
ภาคเหนือ	365	99,494	1.1	0.1	0.9	1.4
ภาคใต้	233	49,486	0.8	0.1	0.6	1.0
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	44	22,006	1.0	0.4	0.2	1.9
เขต สคร.ที่ 2	80	15,523	1.0	0.2	0.6	1.3
เขต สคร.ที่ 3	161	41,280	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 4	141	37,555	1.0	0.2	0.6	1.5
เขต สคร.ที่ 5	77	55,246	1.2	0.3	0.7	1.7
เขต สคร.ที่ 6	217	101,619	1.6	0.4	0.9	2.3
เขต สคร.ที่ 7	152	59,505	1.3	0.4	0.6	2.0
เขต สคร.ที่ 8	100	31,300	1.6	0.4	0.8	2.4
เขต สคร.ที่ 9	117	25,590	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 10	148	42,603	1.0	0.2	0.6	1.4
เขต สคร.ที่ 11	141	30,028	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 12	92	19,458	0.6	0.1	0.4	0.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคตับแข็ง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,314	507,096	1.1	0.1	0.9	1.3
เพศ						
ชาย	761	299,881	1.3	0.1	1.1	1.6
หญิง	553	207,215	0.9	0.1	0.7	1.1
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	747	193,801	1.3	0.2	0.8	1.7
นอกเขตเทศบาล	567	313,295	1.0	0.1	0.8	1.2
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	17	58,473	1.6	0.9	0.0	3.4
ภาคกลาง	747	193,801	1.3	0.2	0.8	1.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	567	313,295	1.0	0.1	0.8	1.2
ภาคเหนือ	747	193,801	1.3	0.2	0.8	1.7
ภาคใต้	567	313,295	1.0	0.1	0.8	1.2
เขต สคร.						
เขต สคร.ที่ 1	40	20,974	1.0	0.5	0.1	1.9
เขต สคร.ที่ 2	75	15,040	0.9	0.2	0.6	1.3
เขต สคร.ที่ 3	140	39,076	0.9	0.2	0.6	1.2
เขต สคร.ที่ 4	118	30,848	0.8	0.2	0.4	1.3
เขต สคร.ที่ 5	96	66,735	1.5	0.3	0.9	2.1
เขต สคร.ที่ 6	152	80,795	1.2	0.3	0.6	1.9
เขต สคร.ที่ 7	109	45,458	1.0	0.3	0.4	1.6
เขต สคร.ที่ 8	101	31,914	1.6	0.4	0.9	2.4
เขต สคร.ที่ 9	112	24,752	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 10	147	44,650	1.1	0.2	0.6	1.5
เขต สคร.ที่ 11	122	25,931	0.9	0.1	0.6	1.2
เขต สคร.ที่ 12	85	22,448	0.7	0.1	0.5	0.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 13.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณ สัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณ สัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,346	503,995	1.1	0.1	0.9	1.3
<b>เพศ</b>						
ชาย	791	296,129	1.3	0.1	1.1	1.6
หญิง	555	207,866	0.9	0.1	0.7	1.1
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	773	197,986	1.3	0.2	0.8	1.8
นอกเขตเทศบาล	573	306,009	1.0	0.1	0.8	1.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	16	55,772	1.5	0.9	0.0	3.4
ภาคกลาง	386	108,554	0.9	0.1	0.7	1.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	372	186,054	1.2	0.2	0.8	1.6
ภาคเหนือ	356	100,339	1.1	0.1	0.9	1.4
ภาคใต้	216	53,277	0.9	0.1	0.7	1.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	40	18,588	0.9	0.3	0.3	1.5
เขต สคร.ที่ 2	81	15,773	1.0	0.2	0.6	1.3
เขต สคร.ที่ 3	135	39,603	0.9	0.2	0.6	1.3
เขต สคร.ที่ 4	130	34,589	0.9	0.2	0.5	1.4
เขต สคร.ที่ 5	83	52,669	1.2	0.3	0.6	1.7
เขต สคร.ที่ 6	171	89,517	1.4	0.3	0.7	2.1
เขต สคร.ที่ 7	118	43,868	1.0	0.3	0.3	1.6
เขต สคร.ที่ 8	99	32,952	1.7	0.4	0.9	2.4
เขต สคร.ที่ 9	115	26,064	1.0	0.2	0.7	1.4
เขต สคร.ที่ 10	142	41,322	1.0	0.2	0.6	1.4
เขต สคร.ที่ 11	134	32,284	1.1	0.2	0.7	1.4
เขต สคร.ที่ 12	82	20,993	0.7	0.1	0.4	0.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 13.13 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	1,178	455,412	1.0	0.1	0.8	1.2
<b>เพศ</b>						
ชาย	616	240,279	1.1	0.1	0.8	1.3
หญิง	562	215,133	0.9	0.1	0.7	1.1
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	681	180,786	1.2	0.2	0.7	1.7
นอกเขตเทศบาล	497	274,626	0.9	0.1	0.7	1.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	17	57,218	1.6	0.9	0.0	3.4
ภาคกลาง	334	99,321	0.9	0.1	0.6	1.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	317	168,314	1.1	0.2	0.7	1.4
ภาคเหนือ	300	83,313	1.0	0.1	0.7	1.2
ภาคใต้	210	47,246	0.8	0.1	0.6	1.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	32	18,613	0.9	0.4	0.1	1.7
เขต สคร.ที่ 2	67	13,675	0.8	0.2	0.5	1.2
เขต สคร.ที่ 3	106	32,296	0.8	0.2	0.5	1.1
เขต สคร.ที่ 4	129	34,737	0.9	0.2	0.5	1.4
เขต สคร.ที่ 5	60	44,463	1.0	0.2	0.5	1.5
เขต สคร.ที่ 6	161	87,123	1.3	0.3	0.7	2.0
เขต สคร.ที่ 7	96	36,728	0.8	0.3	0.2	1.4
เขต สคร.ที่ 8	84	28,941	1.5	0.4	0.7	2.3
เขต สคร.ที่ 9	92	20,026	0.8	0.1	0.5	1.1
เขต สคร.ที่ 10	124	34,346	0.8	0.2	0.5	1.2
เขต สคร.ที่ 11	127	30,102	1.0	0.2	0.7	1.3
เขต สคร.ที่ 12	83	17,144	0.5	0.1	0.4	0.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

## ส่วนที่ 9

การคัดกรองและเสริมทักษะการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
ลดโรคไม่ติดต่อ



ตารางที่ 9.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาซักถามหรือวัดความดันโลหิต และ/หรือเจาะเลือด เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	3,330	1,595,677	31.7	0.9	29.9	33.6
25 - 34	5,011	2,131,741	45.4	1.1	43.3	47.6
35 - 44	7,290	3,164,057	60.0	1.0	58.1	62.0
45 - 54	6,211	2,718,425	67.1	1.1	65.0	69.2
55 - 64	10,932	1,855,530	72.8	0.8	71.2	74.5
65 - 74	5,144	861,801	74.5	1.1	72.2	76.7
รวม	37,918	12,327,231	54.2	0.7	52.9	55.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	3,680	1,711,005	36.5	1.0	34.6	38.5
25 - 34	5,811	2,623,861	56.8	1.0	54.9	58.7
35 - 44	8,998	3,989,012	69.7	0.9	67.8	71.5
45 - 54	7,610	3,294,526	73.2	1.1	71.0	75.4
55 - 64	11,823	2,342,248	80.6	0.8	79.1	82.1
65 - 74	5,686	1,107,855	80.7	1.0	78.7	82.7
รวม	43,608	15,068,507	63.3	0.6	62.0	64.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	7,010	3,306,682	34.0	0.8	32.4	35.7
25 - 34	10,822	4,755,602	51.1	0.8	49.4	52.7
35 - 44	16,288	7,153,068	65.0	0.8	63.4	66.6
45 - 54	13,821	6,012,951	70.3	0.9	68.5	72.1
55 - 64	22,755	4,197,778	77.0	0.7	75.7	78.3
65 - 74	10,830	1,969,656	77.9	0.9	76.2	79.6
รวมทั้งประเทศ	81,526	27,395,738	58.8	0.6	57.7	60.0

ตารางที่ 9.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาซักถามหรือวัดความดันโลหิต และ/หรือเจาะเลือด เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	38,447	7,425,643	47.8	1.0	45.8	49.8
นอกเขตเทศบาล	43,079	19,970,095	64.4	0.8	62.9	65.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	473	1,097,968	26.1	2.8	20.5	31.6
ภาคกลาง	25,596	6,407,621	55.6	1.1	53.5	57.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,400	10,650,547	67.0	1.1	64.9	69.2
ภาคเหนือ	18,865	5,509,979	63.5	1.2	61.0	65.9
ภาคใต้	15,192	3,729,622	59.9	1.1	57.7	62.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	2,738	993,397	48.4	2.9	42.7	54.0
เขต สคร. ที่ 2	6,017	1,107,674	66.9	2.1	62.7	71.0
เขต สคร. ที่ 3	9,189	2,413,792	57.5	1.7	54.2	60.8
เขต สคร. ที่ 4	7,652	1,892,758	52.2	1.8	48.8	55.7
เขต สคร. ที่ 5	4,686	3,297,124	67.7	2.4	63.1	72.4
เขต สคร. ที่ 6	8,882	4,289,602	67.2	1.7	63.8	70.5
เขต สคร. ที่ 7	7,832	3,063,822	66.0	1.6	62.9	69.2
เขต สคร. ที่ 8	4,266	1,203,177	61.4	3.2	55.2	67.7
เขต สคร. ที่ 9	5,396	1,616,913	64.3	2.0	60.4	68.3
เขต สคร. ที่ 10	9,203	2,689,889	63.9	1.6	60.7	67.1
เขต สคร. ที่ 11	7,599	1,876,935	62.2	1.7	59.0	65.5
เขต สคร. ที่ 12	7,593	1,852,687	57.6	1.4	54.9	60.4

ตารางที่ 9.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาซักถามหรือวัด ความดันโลหิต และ/หรือเจาะเลือด เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	473	1,097,968	26.1	2.8	20.5	31.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,023	469,907	54.4	4.2	46.2	62.5
นนทบุรี	791	296,849	37.2	5.3	26.8	47.6
ปทุมธานี	796	314,529	45.8	3.3	39.3	52.3
พระนครศรีอยุธยา	1,151	382,019	67.1	3.1	60.9	73.3
อ่างทอง	1,301	166,080	76.3	3.8	68.8	83.8
ลพบุรี	1,127	374,200	66.6	3.9	59.0	74.2
สิงห์บุรี	1,194	113,628	69.7	4.0	61.7	77.6
ชัยนาท	1,232	167,482	65.4	4.5	56.5	74.3
สระบุรี	1,163	286,286	62.6	4.8	53.1	72.0
ชลบุรี	1,008	559,171	59.1	4.6	50.0	68.2
ระยอง	948	221,730	50.8	4.6	41.8	59.8
จันทบุรี	962	205,167	54.0	3.1	47.9	60.1
ตราด	1,021	90,795	57.4	2.6	52.2	62.6
ฉะเชิงเทรา	1,079	315,809	64.0	4.2	55.7	72.3
ปราจีนบุรี	1,070	207,468	60.3	5.5	49.4	71.1
นครนายก	1,062	125,138	66.5	3.1	60.3	72.6
สระแก้ว	1,016	218,607	56.2	5.1	46.3	66.2
ราชบุรี	1,032	346,505	57.0	2.7	51.7	62.4
กาญจนบุรี	882	261,689	45.6	4.4	37.0	54.2
สุพรรณบุรี	1,009	349,134	54.9	4.9	45.2	64.5
นครปฐม	841	292,653	46.9	6.6	34.1	59.8
สมุทรสาคร	863	148,477	43.8	2.7	38.5	49.2
สมุทรสงคราม	968	70,562	48.0	4.0	40.1	55.8
เพชรบุรี	1,040	195,840	57.2	2.6	52.2	62.3
ประจวบคีรีขันธ์	1,017	227,898	64.1	3.4	57.4	70.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,198	1,302,283	68.5	4.1	60.4	76.5
บุรีรัมย์	1,277	825,896	72.3	3.9	64.7	79.9
สุรินทร์	1,164	667,276	67.3	6.9	53.8	80.9
ศรีสะเกษ	1,129	730,359	68.8	2.8	63.3	74.3
อุบลราชธานี	1,165	932,019	71.0	2.8	65.6	76.5
ยโสธร	1,261	306,304	73.4	4.9	63.7	83.1
ชัยภูมิ	1,047	501,669	60.3	3.3	53.8	66.7
อำนาจเจริญ	1,164	190,192	69.5	3.2	63.2	75.7
หนองบัวลำภู	1,033	216,838	57.2	2.7	51.8	62.5
ขอนแก่น	1,053	813,786	61.1	5.0	51.2	70.9
อุดรธานี	1,314	880,135	78.1	3.0	72.3	83.9
เลย	993	279,623	61.7	3.7	54.4	69.0
หนองคาย	1,066	423,933	65.7	3.4	59.1	72.4

ตารางที่ 9.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาซักถามหรือวัดความดันโลหิต และ/หรือเจาะเลือด เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปีในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,201	557,412	77.1	3.6	69.9	84.3
ร้อยเอ็ด	1,183	656,171	65.4	3.9	57.7	73.2
กาฬสินธุ์	1,039	461,704	63.8	4.0	56.0	71.6
สกลนคร	1,035	462,196	56.9	5.6	46.0	67.8
นครพนม	1,269	342,773	66.7	3.1	60.6	72.7
มุกดาหาร	809	99,979	40.4	6.4	27.9	52.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	989	666,244	56.9	4.1	48.9	64.9
ลำพูน	1,062	191,630	62.2	5.2	52.0	72.4
ลำปาง	1,127	384,227	63.6	3.0	57.7	69.4
อุตรดิตถ์	985	204,539	58.9	3.7	51.7	66.1
แพร่	1,307	281,263	76.4	3.3	69.9	83.0
น่าน	1,244	252,782	68.9	3.1	62.9	74.9
พะเยา	1,244	279,814	73.0	3.6	65.9	80.1
เชียงราย	1,111	535,752	61.8	3.9	54.1	69.6
แม่ฮ่องสอน	1,119	98,176	68.6	3.9	60.9	76.2
นครสวรรค์	1,021	412,290	53.1	5.0	43.2	63.0
อุทัยธานี	1,046	160,821	66.5	4.2	58.2	74.8
กำแพงเพชร	1,129	354,778	67.5	2.8	62.0	73.0
ตาก	1,080	209,941	63.5	3.3	57.1	70.0
สุโขทัย	1,253	336,609	72.3	2.5	67.4	77.2
พิษณุโลก	1,093	431,850	67.7	3.3	61.2	74.2
พิจิตร	1,070	275,288	66.4	3.0	60.4	72.4
เพชรบูรณ์	985	433,973	59.2	5.5	48.5	70.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	994	714,671	64.5	3.3	58.0	70.9
กระบี่	1,038	165,339	55.4	4.2	47.0	63.7
พังงา	1,151	129,602	70.8	5.5	60.1	81.6
ภูเก็ต	843	98,608	41.2	4.2	33.0	49.5
สุราษฎร์ธานี	1,165	468,339	65.8	2.8	60.3	71.4
ระนอง	1,256	77,659	65.7	6.0	53.9	77.6
ชุมพร	1,152	222,718	62.3	4.6	53.2	71.3
สงขลา	849	445,437	46.6	2.6	41.4	51.8
สตูล	1,191	145,769	71.8	3.7	64.6	79.1
ตรัง	1,194	293,771	65.8	3.3	59.3	72.4
พัทลุง	1,252	268,804	70.8	2.7	65.4	76.1
ปัตตานี	1,079	244,001	58.0	3.3	51.5	64.5
ยะลา	949	154,489	48.0	4.4	39.4	56.7
นราธิวาส	1,079	300,417	61.5	4.0	53.8	69.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.1.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	116	44,166	0.9	0.1	0.6	1.2
25 - 34	362	139,170	3.0	0.3	2.4	3.6
35 - 44	907	313,070	6.0	0.3	5.4	6.7
45 - 54	1,155	447,223	11.3	0.8	9.6	13.0
55 - 64	2,821	443,602	17.8	0.5	16.7	18.8
65 - 74	1,664	265,953	23.6	0.9	21.8	25.4
รวม	7,025	1,653,183	7.4	0.2	6.9	7.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	96	31,945	0.7	0.1	0.5	0.9
25 - 34	298	119,626	2.6	0.3	2.1	3.2
35 - 44	994	412,869	7.3	0.4	6.6	8.1
45 - 54	1,451	585,936	13.3	0.6	12.2	14.4
55 - 64	3,473	663,845	23.4	0.6	22.3	24.5
65 - 74	2,004	377,526	28.1	0.9	26.3	30.0
รวม	8,316	2,191,747	9.4	0.2	8.9	9.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	212	76,111	0.8	0.1	0.6	1.0
25 - 34	660	258,796	2.8	0.2	2.4	3.2
35 - 44	1,901	725,939	6.7	0.3	6.2	7.3
45 - 54	2,606	1,033,158	12.4	0.5	11.4	13.3
55 - 64	6,294	1,107,446	20.8	0.4	19.9	21.7
65 - 74	3,668	643,479	26.0	0.7	24.6	27.5
รวมทั้งประเทศ	15,341	3,844,930	8.4	0.2	8.0	8.8



ตารางที่ 9.1.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	8,092	1,302,362	8.5	0.3	8.0	9.0
นอกเขตเทศบาล	7,249	2,542,568	8.3	0.3	7.8	8.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	137	237,664	5.8	0.6	4.5	7.0
ภาคกลาง	5,518	1,086,742	9.6	0.3	8.9	10.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,892	1,112,170	7.1	0.4	6.4	7.8
ภาคเหนือ	3,463	808,073	9.5	0.4	8.7	10.4
ภาคใต้	3,331	600,281	9.8	0.4	8.9	10.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	647	177,111	8.8	0.7	7.4	10.1
เขต สคร. ที่ 2	1,370	193,417	11.9	0.8	10.3	13.4
เขต สคร. ที่ 3	1,969	417,828	10.1	0.6	9.0	11.2
เขต สคร. ที่ 4	1,532	298,385	8.4	0.7	7.0	9.7
เขต สคร. ที่ 5	730	370,146	7.7	0.8	6.2	9.3
เขต สคร. ที่ 6	1,084	446,708	7.1	0.6	6.0	8.2
เขต สคร. ที่ 7	1,078	295,316	6.4	0.5	5.4	7.5
เขต สคร. ที่ 8	733	150,376	8.0	1.0	5.9	10.0
เขต สคร. ที่ 9	991	220,965	9.1	0.6	7.8	10.3
เขต สคร. ที่ 10	1,739	436,732	10.5	0.6	9.3	11.7
เขต สคร. ที่ 11	1,744	282,649	9.5	0.6	8.4	10.6
เขต สคร. ที่ 12	1,587	317,632	10.0	0.7	8.7	11.4

ตารางที่ 9.1.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	137	237,664	5.8	0.6	4.5	7.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	245	93,283	10.9	1.2	8.7	13.2
นนทบุรี	192	58,515	7.4	1.0	5.4	9.4
ปทุมธานี	140	42,336	6.2	0.8	4.7	7.7
พระนครศรีอยุธยา	315	76,260	13.7	1.5	10.7	16.8
อ่างทอง	488	55,456	25.7	3.0	19.9	31.6
ลพบุรี	184	49,632	9.1	1.1	7.0	11.1
สิงห์บุรี	247	21,312	13.2	1.4	10.5	16.0
ชัยนาท	243	32,706	13.2	2.5	8.3	18.0
สระบุรี	208	34,312	7.5	1.0	5.6	9.4
ชลบุรี	236	92,570	9.9	1.2	7.5	12.3
ระยอง	218	38,623	8.9	1.2	6.5	11.4
จันทบุรี	198	32,589	8.8	1.0	6.8	10.8
ตราด	215	12,915	8.4	1.3	5.8	10.9
ฉะเชิงเทรา	236	56,107	11.5	2.2	7.1	15.8
ปราจีนบุรี	132	15,509	4.6	0.9	2.9	6.3
นครนายก	279	29,362	15.6	1.2	13.2	18.0
สระแก้ว	210	46,869	12.2	3.1	6.0	18.3
ราชบุรี	182	46,207	7.7	0.8	6.2	9.2
กาญจนบุรี	157	36,792	6.5	1.8	3.0	10.1
สุพรรณบุรี	196	52,575	8.5	1.3	5.8	11.1
นครปฐม	177	61,656	10.0	2.8	4.4	15.6
สมุทรสาคร	188	25,865	7.8	0.9	6.1	9.5
สมุทรสงคราม	234	13,951	9.6	1.1	7.5	11.7
เพชรบุรี	216	31,347	9.3	0.7	7.9	10.6
ประจวบคีรีขันธ์	182	29,994	8.6	1.0	6.5	10.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	197	150,550	8.0	0.9	6.2	9.9
บุรีรัมย์	181	76,800	6.8	1.0	4.9	8.7
สุรินทร์	201	85,293	8.7	3.0	2.7	14.7
ศรีสะเกษ	153	52,719	5.0	0.9	3.2	6.8
อุบลราชธานี	164	100,156	7.7	1.1	5.5	9.9
ยโสธร	162	34,875	8.4	1.8	4.8	12.0
ชัยภูมิ	151	57,503	7.0	1.3	4.5	9.5
อำนาจเจริญ	112	13,105	4.9	0.7	3.4	6.3
หนองบัวลำภู	120	18,639	5.1	0.8	3.6	6.6
ขอนแก่น	131	103,300	7.9	1.3	5.3	10.5
อุดรธานี	145	73,093	6.6	1.0	4.6	8.6
เลย	110	26,292	5.9	1.0	3.8	7.9
หนองคาย	133	37,729	6.0	0.9	4.3	7.7

ตารางที่ 9.1.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	166	74,237	10.4	2.7	5.1	15.7
ร้อยเอ็ด	142	73,144	7.4	1.6	4.2	10.6
กาฬสินธุ์	137	40,273	5.7	1.1	3.5	7.9
สกลนคร	143	43,527	5.5	1.4	2.8	8.2
นครพนม	219	39,508	7.8	2.0	3.9	11.7
มุกดาหาร	125	11,426	4.6	0.7	3.3	5.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	213	127,297	11.1	1.6	7.9	14.2
ลำพูน	199	30,411	10.0	1.3	7.4	12.6
ลำปาง	222	61,951	10.3	1.0	8.3	12.2
อุตรดิตถ์	133	25,117	7.4	1.4	4.6	10.1
แพร่	251	47,374	13.0	1.9	9.3	16.6
น่าน	210	21,985	6.0	1.4	3.3	8.7
พะเยา	266	52,844	14.0	2.3	9.5	18.4
เชียงราย	188	84,161	9.9	1.1	7.8	12.0
แม่ฮ่องสอน	190	10,710	7.7	1.6	4.5	10.8
นครสวรรค์	191	48,210	6.5	2.0	2.5	10.5
อุทัยธานี	149	14,881	6.3	1.0	4.3	8.4
กำแพงเพชร	192	49,164	9.6	1.2	7.2	12.1
ตาก	242	39,996	12.5	2.5	7.6	17.5
สุโขทัย	215	35,880	7.9	1.3	5.3	10.4
พิษณุโลก	228	61,014	9.9	1.1	7.7	12.2
พิจิตร	201	38,121	9.5	0.8	8.0	11.0
เพชรบูรณ์	173	58,958	8.3	1.2	6.0	10.7
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	188	93,051	8.4	0.9	6.6	10.3
กระบี่	241	20,066	6.7	0.9	5.0	8.5
พังงา	266	24,846	13.7	2.0	9.8	17.6
ภูเก็ต	214	19,982	8.4	1.6	5.3	11.6
สุราษฎร์ธานี	204	57,884	8.5	0.9	6.7	10.2
ระนอง	337	15,945	13.7	1.8	10.1	17.2
ชุมพร	294	50,875	14.4	2.2	10.1	18.7
สงขลา	183	90,641	9.6	1.7	6.2	13.0
สตูล	167	14,455	7.4	0.8	5.8	8.9
ตรัง	260	47,650	10.9	2.4	6.2	15.5
พัทลุง	229	35,531	9.5	0.9	7.7	11.3
ปัตตานี	241	38,508	9.4	1.1	7.1	11.6
ยะลา	233	29,571	9.3	1.3	6.8	11.8
นราธิวาส	274	61,275	12.7	1.4	9.9	15.5

ตารางที่ 9.1.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	83	34,507	0.7	0.1	0.5	0.9
25 - 34	232	81,187	1.8	0.2	1.3	2.2
35 - 44	520	188,710	3.6	0.3	3.1	4.2
45 - 54	692	296,922	7.5	0.6	6.4	8.6
55 - 64	1,630	254,368	10.2	0.4	9.4	11.1
65 - 74	887	142,702	12.7	0.8	11.1	14.3
รวม	4,044	998,396	4.5	0.2	4.1	4.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	95	43,204	0.9	0.1	0.7	1.2
25 - 34	264	108,803	2.4	0.3	1.9	2.9
35 - 44	796	317,929	5.6	0.3	5.0	6.3
45 - 54	993	410,882	9.3	0.5	8.4	10.3
55 - 64	2,424	472,422	16.7	0.5	15.6	17.8
65 - 74	1,242	238,204	17.9	0.8	16.4	19.5
รวม	5,814	1,591,445	6.8	0.2	6.4	7.2
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	178	77,711	0.8	0.1	0.6	1.0
25 - 34	496	189,990	2.1	0.2	1.7	2.4
35 - 44	1,316	506,638	4.7	0.2	4.3	5.1
45 - 54	1,685	707,804	8.5	0.4	7.7	9.3
55 - 64	4,054	726,790	13.7	0.4	12.9	14.4
65 - 74	2,129	380,906	15.5	0.6	14.3	16.8
รวมทั้งประเทศ	9,858	2,589,841	5.7	0.2	5.3	6.0

ตารางที่ 9.1.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	5,158	840,352	5.5	0.2	5.1	5.9
นอกเขตเทศบาล	4,700	1,749,488	5.7	0.2	5.3	6.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	79	146,903	3.6	0.5	2.5	4.6
ภาคกลาง	3,420	690,733	6.1	0.3	5.5	6.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,441	960,754	6.1	0.4	5.4	6.8
ภาคเหนือ	2,087	473,057	5.6	0.3	5.0	6.2
ภาคใต้	1,831	318,393	5.2	0.3	4.6	5.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	401	111,203	5.5	0.5	4.5	6.6
เขต สคร. ที่ 2	896	132,872	8.2	0.8	6.6	9.7
เขต สคร. ที่ 3	1,202	260,450	6.3	0.5	5.4	7.2
เขต สคร. ที่ 4	921	186,208	5.2	0.7	3.9	6.5
เขต สคร. ที่ 5	529	296,575	6.2	0.9	4.4	8.0
เขต สคร. ที่ 6	1,015	412,814	6.6	0.4	5.7	7.4
เขต สคร. ที่ 7	897	251,365	5.5	0.5	4.6	6.4
เขต สคร. ที่ 8	443	87,617	4.7	0.7	3.4	6.0
เขต สคร. ที่ 9	605	137,669	5.6	0.5	4.8	6.5
เขต สคร. ที่ 10	1,039	247,771	6.0	0.5	5.0	7.0
เขต สคร. ที่ 11	1,009	148,978	5.0	0.5	4.1	6.0
เขต สคร. ที่ 12	822	169,415	5.4	0.4	4.5	6.2

ตารางที่ 9.1.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	79	146,903	3.6	0.5	2.5	4.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	140	52,666	6.2	0.9	4.4	8.0
นนทบุรี	118	36,171	4.6	0.9	2.8	6.4
ปทุมธานี	91	28,760	4.3	0.7	2.9	5.6
พระนครศรีอยุธยา	192	46,272	8.4	1.2	6.0	10.7
อ่างทอง	342	39,601	18.4	3.2	12.1	24.6
ลพบุรี	116	34,912	6.4	1.4	3.6	9.2
สิงห์บุรี	157	12,740	7.9	1.1	5.7	10.1
ชัยนาท	157	21,342	8.6	2.0	4.6	12.6
สระบุรี	124	24,277	5.3	0.9	3.5	7.1
ชลบุรี	152	61,352	6.6	1.1	4.3	8.8
ระยอง	109	16,717	3.9	0.6	2.7	5.1
จันทบุรี	127	21,839	5.9	0.7	4.4	7.4
ตราด	122	7,532	4.9	0.7	3.4	6.3
ฉะเชิงเทรา	144	36,008	7.4	2.0	3.4	11.4
ปราจีนบุรี	122	18,377	5.4	1.1	3.3	7.5
นครนายก	138	15,197	8.1	1.2	5.8	10.4
สระแก้ว	148	30,762	8.0	2.4	3.3	12.8
ราชบุรี	119	28,817	4.8	0.5	3.8	5.8
กาญจนบุรี	87	19,008	3.4	0.6	2.3	4.5
สุพรรณบุรี	121	36,509	5.9	1.0	3.9	7.9
นครปฐม	116	45,192	7.4	3.3	0.8	13.9
สมุทรสาคร	107	14,045	4.2	0.8	2.7	5.7
สมุทรสงคราม	170	10,917	7.5	0.9	5.8	9.2
เพชรบุรี	120	18,704	5.5	0.6	4.3	6.8
ประจวบคีรีขันธ์	81	13,016	3.7	0.8	2.1	5.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	141	122,817	6.6	1.8	2.9	10.2
บุรีรัมย์	121	52,937	4.7	0.8	3.1	6.3
สุรินทร์	147	83,728	8.5	2.5	3.5	13.5
ศรีสะเกษ	92	31,273	3.0	0.5	1.9	4.0
อุบลราชธานี	130	72,929	5.6	0.7	4.3	7.0
ยโสธร	159	32,531	7.8	2.2	3.5	12.2
ชัยภูมิ	120	37,093	4.5	0.6	3.3	5.7
อำนาจเจริญ	101	13,224	4.9	0.6	3.7	6.1
หนองบัวลำภู	108	17,459	4.8	0.8	3.2	6.5
ขอนแก่น	129	100,853	7.7	1.2	5.4	10.0
อุดรธานี	136	64,270	5.8	1.0	3.8	7.8
เลย	93	24,431	5.4	1.0	3.4	7.5
หนองคาย	103	31,341	4.9	0.8	3.4	6.5

ตารางที่ 9.1.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	170	69,767	9.7	1.7	6.4 - 13.1
ร้อยเอ็ด	128	62,032	6.2	0.7	4.8 - 7.7
กาฬสินธุ์	148	42,661	6.0	1.2	3.6 - 8.5
สกลนคร	133	46,723	5.9	1.3	3.3 - 8.5
นครพนม	195	46,208	9.1	2.3	4.6 - 13.6
มุกดาหาร	87	8,477	3.4	0.7	2.0 - 4.9
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	101	64,701	5.7	1.2	3.4 - 8.0
ลำพูน	143	22,280	7.3	1.6	4.2 - 10.5
ลำปาง	140	43,950	7.3	1.0	5.3 - 9.3
อุตรดิตถ์	97	18,146	5.3	0.8	3.8 - 6.9
แพร่	160	27,377	7.5	1.2	5.1 - 9.9
น่าน	136	13,596	3.7	0.8	2.2 - 5.3
พะเยา	163	31,046	8.2	1.0	6.3 - 10.2
เชียงราย	108	40,110	4.7	1.2	2.3 - 7.2
แม่ฮ่องสอน	88	4,712	3.4	1.1	1.1 - 5.6
นครสวรรค์	121	29,722	4.0	1.3	1.4 - 6.6
อุทัยธานี	102	9,446	4.0	0.7	2.7 - 5.3
กำแพงเพชร	104	24,044	4.7	0.9	3.0 - 6.5
ตาก	119	19,406	6.1	1.2	3.7 - 8.5
สุโขทัย	151	24,211	5.3	0.8	3.7 - 6.8
พิษณุโลก	135	39,287	6.4	0.9	4.6 - 8.3
พิจิตร	116	24,405	6.1	0.7	4.7 - 7.5
เพชรบูรณ์	103	36,619	5.2	1.0	3.1 - 7.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	96	39,418	3.6	0.7	2.2 - 4.9
กระบี่	181	11,521	3.9	0.7	2.6 - 5.2
พังงา	168	15,148	8.4	1.4	5.7 - 11.0
ภูเก็ต	140	11,115	4.7	1.0	2.7 - 6.6
สุราษฎร์ธานี	109	31,397	4.6	0.8	3.0 - 6.2
ระนอง	177	9,488	8.1	0.5	7.1 - 9.2
ชุมพร	138	30,891	8.8	2.3	4.3 - 13.4
สงขลา	101	50,735	5.4	1.0	3.4 - 7.4
สตูล	82	7,674	3.9	0.6	2.8 - 5.0
ตรัง	134	26,331	6.0	0.7	4.6 - 7.4
พัทลุง	123	20,364	5.4	0.6	4.2 - 6.7
ปัตตานี	131	19,495	4.7	1.2	2.3 - 7.2
ยะลา	125	16,596	5.2	1.2	2.9 - 7.6
นราธิวาส	126	28,218	5.8	1.0	3.9 - 7.7

ตารางที่ 9.1.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และ/หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	67	27,988	0.6	0.1	0.4	0.8
25 - 34	202	74,888	1.6	0.2	1.2	2.1
35 - 44	469	160,255	3.1	0.3	2.6	3.6
45 - 54	600	257,786	6.5	0.9	4.8	8.2
55 - 64	1,472	226,232	9.1	0.4	8.3	10.0
65 - 74	887	125,975	11.3	0.7	9.9	12.7
รวม	3,697	873,124	3.9	0.2	3.5	4.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	58	23,205	0.5	0.1	0.3	0.7
25 - 34	144	58,690	1.3	0.2	1.0	1.6
35 - 44	416	156,297	2.8	0.2	2.3	3.3
45 - 54	665	247,181	5.7	0.4	4.9	6.4
55 - 64	1,666	290,001	10.4	0.5	9.5	11.2
65 - 74	1,025	183,405	13.9	0.7	12.5	15.3
รวม	3,974	958,778	4.1	0.2	3.8	4.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	125	51,193	0.5	0.1	0.4	0.7
25 - 34	346	133,578	1.5	0.2	1.2	1.8
35 - 44	885	316,552	2.9	0.2	2.6	3.3
45 - 54	1,265	504,967	6.1	0.5	5.1	7.1
55 - 64	3,138	516,232	9.8	0.4	9.1	10.5
65 - 74	1,912	309,380	12.7	0.6	11.6	13.8
รวมทั้งประเทศ	7,671	1,831,902	4.0	0.2	3.7	4.3



ตารางที่ 9.1.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และ/หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	4,069	546,603	3.6	0.2	3.3	3.9
นอกเขตเทศบาล	3,602	1,285,299	4.2	0.2	3.8	4.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	27	45,895	1.1	0.2	0.7	1.5
ภาคกลาง	2,801	543,365	4.8	0.3	4.3	5.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,557	607,529	3.9	0.4	3.2	4.6
ภาคเหนือ	1,673	373,591	4.4	0.3	3.9	5.0
ภาคใต้	1,613	261,522	4.3	0.3	3.7	4.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	341	96,469	4.8	0.5	3.8	5.8
เขต สคร. ที่ 2	676	95,669	5.9	0.7	4.5	7.3
เขต สคร. ที่ 3	987	205,117	5.0	0.5	4.1	5.9
เขต สคร. ที่ 4	797	146,110	4.1	0.6	3.0	5.2
เขต สคร. ที่ 5	381	182,073	3.8	0.8	2.3	5.3
เขต สคร. ที่ 6	615	292,343	4.7	0.6	3.4	5.9
เขต สคร. ที่ 7	561	133,113	2.9	0.4	2.2	3.6
เขต สคร. ที่ 8	352	71,826	3.8	0.5	2.8	4.9
เขต สคร. ที่ 9	464	105,893	4.4	0.5	3.4	5.3
เขต สคร. ที่ 10	857	195,872	4.7	0.4	3.9	5.6
เขต สคร. ที่ 11	977	141,201	4.8	0.4	3.9	5.6
เขต สคร. ที่ 12	636	120,321	3.8	0.5	2.9	4.7

ตารางที่ 9.1.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และ/หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	27	45,895	1.1	0.2	0.7	1.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	81	28,672	3.4	0.7	2.0	4.8
นนทบุรี	109	32,894	4.2	0.8	2.6	5.8
ปทุมธานี	76	25,476	3.8	0.6	2.6	4.9
พระนครศรีอยุธยา	156	38,099	6.9	1.3	4.4	9.4
อ่างทอง	189	21,083	9.8	3.3	3.3	16.3
ลพบุรี	101	27,727	5.1	1.0	3.2	7.0
สิงห์บุรี	134	9,463	5.9	1.5	3.0	8.8
ชัยนาท	138	17,536	7.1	2.5	2.2	12.0
สระบุรี	114	19,859	4.4	0.8	2.8	5.9
ชลบุรี	139	56,943	6.1	1.1	4.0	8.3
ระยอง	96	17,427	4.1	0.7	2.6	5.5
จันทบุรี	96	14,198	3.8	0.7	2.5	5.1
ตราด	75	3,782	2.4	0.4	1.7	3.2
ฉะเชิงเทรา	121	24,168	5.0	1.6	1.9	8.1
ปราจีนบุรี	151	18,202	5.4	0.8	3.7	7.0
นครนายก	104	11,831	6.3	1.2	4.1	8.6
สระแก้ว	124	29,894	7.8	2.9	2.1	13.5
ราชบุรี	107	26,292	4.4	0.4	3.5	5.2
กาญจนบุรี	67	18,802	3.3	1.3	0.9	5.8
สุพรรณบุรี	96	20,850	3.4	0.6	2.2	4.6
นครปฐม	87	36,080	5.9	2.8	0.3	11.5
สมุทรสาคร	89	11,267	3.4	0.7	2.0	4.8
สมุทรสงคราม	182	8,702	6.0	0.9	4.1	7.8
เพชรบุรี	103	13,600	4.0	0.7	2.7	5.4
ประจวบคีรีขันธ์	66	10,518	3.0	0.6	1.9	4.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	74	52,645	2.8	0.5	1.9	3.8
บุรีรัมย์	97	33,560	3.0	0.7	1.6	4.4
สุรินทร์	128	69,510	7.1	3.4	0.3	13.9
ศรีสะเกษ	63	14,854	1.4	0.3	0.8	2.0
อุบลราชธานี	65	36,899	2.8	0.7	1.6	4.1
ยโสธร	159	27,286	6.6	2.2	2.3	10.9
ชัยภูมิ	82	26,358	3.2	0.6	2.1	4.3
อำนาจเจริญ	60	8,092	3.0	0.6	1.9	4.1
หนองบัวลำภู	60	9,506	2.6	0.6	1.4	3.8
ขอนแก่น	82	66,651	5.1	1.3	2.5	7.6
อุดรธานี	90	42,065	3.8	0.9	2.0	5.7
เลย	40	8,499	1.9	0.5	0.9	2.9
หนองคาย	62	16,761	2.7	0.4	1.9	3.5

ตารางที่ 9.1.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และ/หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	128	67,238	9.4	2.6	4.3 - 14.5
ร้อยเอ็ด	62	54,859	5.5	2.4	0.9 - 10.2
กาฬสินธุ์	91	26,765	3.8	1.1	1.6 - 6.0
สกลนคร	56	17,954	2.3	0.7	1.0 - 3.6
นครพนม	122	25,096	5.0	1.7	1.7 - 8.2
มุกดาหาร	36	2,931	1.2	0.4	0.3 - 2.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	74	43,144	3.8	0.9	2.0 - 5.6
ลำพูน	102	14,658	4.9	1.1	2.8 - 6.9
ลำปาง	133	40,378	6.7	1.1	4.6 - 8.8
อุตรดิตถ์	63	12,568	3.7	1.0	1.7 - 5.6
แพร่	159	28,079	7.7	1.2	5.5 - 10.0
น่าน	105	10,740	3.0	0.8	1.3 - 4.6
พะเยา	139	28,134	7.6	2.1	3.5 - 11.6
เชียงราย	66	26,083	3.1	0.9	1.3 - 4.9
แม่ฮ่องสอน	79	4,657	3.3	1.4	0.7 - 6.0
นครสวรรค์	114	29,039	3.9	1.1	1.8 - 6.1
อุทัยธานี	75	6,197	2.6	0.5	1.7 - 3.6
กำแพงเพชร	79	21,000	4.1	1.1	2.0 - 6.3
ตาก	97	15,365	4.8	1.6	1.6 - 8.1
สุโขทัย	122	19,617	4.3	1.2	1.9 - 6.7
พิษณุโลก	109	30,397	5.0	0.9	3.3 - 6.7
พิจิตร	84	15,590	4.0	0.7	2.7 - 5.2
เพชรบูรณ์	73	27,946	4.0	0.8	2.5 - 5.5
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	86	43,410	3.9	0.7	2.6 - 5.3
กระบี่	146	8,354	2.8	0.8	1.3 - 4.3
พังงา	160	15,743	8.7	1.6	5.4 - 11.9
ภูเก็ต	121	8,953	3.8	0.9	2.1 - 5.5
สุราษฎร์ธานี	98	25,387	3.7	0.6	2.5 - 5.0
ระนอง	204	10,015	8.6	1.6	5.4 - 11.8
ชุมพร	162	29,340	8.4	2.2	4.1 - 12.8
สงขลา	77	40,472	4.3	1.2	2.0 - 6.6
สตูล	71	6,650	3.4	0.6	2.2 - 4.6
ตรัง	84	11,874	2.7	0.5	1.6 - 3.8
พัทลุง	97	13,409	3.6	0.6	2.4 - 4.8
ปัตตานี	110	15,814	3.9	1.2	1.6 - 6.2
ยะลา	103	14,553	4.6	1.2	2.2 - 7.0
นราธิวาส	94	17,548	3.6	1.0	1.8 - 5.5

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินอาหารทอด แกงกะทิ และอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้มีระดับไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10,106	4,604,002	96.9	0.4	96.2	97.6
25 - 34	10,181	4,444,232	98.3	0.2	97.8	98.7
35 - 44	10,991	4,948,331	98.0	0.2	97.6	98.3
45 - 54	8,325	3,787,397	97.5	0.3	97.0	98.0
55 - 64	13,357	2,327,718	97.1	0.2	96.7	97.5
65 - 74	5,958	1,031,364	96.6	0.4	95.9	97.3
รวม	58,918	21,143,045	97.6	0.1	97.3	97.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,680	4,432,067	97.2	0.3	96.6	97.8
25 - 34	9,960	4,430,437	98.1	0.2	97.7	98.5
35 - 44	11,803	5,426,710	98.0	0.2	97.6	98.4
45 - 54	9,348	4,233,643	97.5	0.3	97.0	98.1
55 - 64	13,311	2,674,600	96.7	0.3	96.1	97.2
65 - 74	6,229	1,209,986	96.6	0.3	95.9	97.3
รวม	60,331	22,407,444	97.5	0.1	97.2	97.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	19,786	9,036,070	97.1	0.3	96.6	97.6
25 - 34	20,141	8,874,669	98.2	0.2	97.9	98.5
35 - 44	22,794	10,375,042	98.0	0.2	97.7	98.3
45 - 54	17,673	8,021,040	97.5	0.2	97.1	97.9
55 - 64	26,668	5,002,318	96.9	0.2	96.5	97.2
65 - 74	12,187	2,241,350	96.6	0.3	96.0	97.1
รวมทั้งประเทศ	119,249	43,550,488	97.6	0.1	97.3	97.8

ตารางที่ 9.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินอาหารทอด แกงกะทิ และอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้มีระดับไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15 -74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	60,731	14,587,633	97.8	0.2	97.5	98.2
นอกเขตเทศบาล	58,518	28,962,855	97.4	0.2	97.1	97.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,537	3,842,153	99.1	0.4	98.3	99.9
ภาคกลาง	39,500	10,931,006	98.0	0.2	97.6	98.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29,357	14,833,806	97.1	0.3	96.6	97.6
ภาคเหนือ	26,493	8,083,460	97.3	0.2	96.8	97.8
ภาคใต้	22,362	5,860,063	97.3	0.3	96.7	98.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,788	1,986,164	98.0	0.5	97.0	99.1
เขต สคร. ที่ 2	7,776	1,500,635	97.8	0.4	97.1	98.6
เขต สคร. ที่ 3	14,274	3,996,145	97.9	0.3	97.4	98.5
เขต สคร. ที่ 4	12,662	3,448,063	98.0	0.3	97.4	98.5
เขต สคร. ที่ 5	6,262	4,567,841	97.6	0.4	96.9	98.3
เขต สคร. ที่ 6	12,419	6,034,680	97.1	0.4	96.3	97.9
เขต สคร. ที่ 7	10,676	4,231,284	96.4	0.6	95.3	97.6
เขต สคร. ที่ 8	6,190	1,820,198	96.7	0.5	95.7	97.7
เขต สคร. ที่ 9	7,802	2,339,230	96.7	0.5	95.8	97.6
เขต สคร. ที่ 10	12,501	3,924,032	97.9	0.3	97.4	98.5
เขต สคร. ที่ 11	11,283	2,873,337	97.9	0.4	97.2	98.7
เขต สคร. ที่ 12	11,079	2,986,726	96.8	0.5	95.7	97.8

ตารางที่ 9.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินอาหารทอด แกงกะทิ และ อาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้มีระดับไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,537	3,842,153	99.1	0.4	98.3	99.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,640	856,719	98.7	0.5	97.6	99.7
นนทบุรี	1,625	789,399	98.6	0.5	97.7	99.5
ปทุมธานี	1,572	655,183	96.5	1.5	93.6	99.4
พระนครศรีอยุธยา	1,591	541,582	99.2	0.3	98.6	99.7
อ่างทอง	1,607	206,276	98.0	0.7	96.5	99.4
ลพบุรี	1,470	503,154	97.5	0.7	96.1	98.8
สิงห์บุรี	1,603	153,793	98.3	0.5	97.3	99.2
ชัยนาท	1,504	227,057	98.8	0.3	98.1	99.4
สระบุรี	1,592	410,355	97.5	1.0	95.5	99.5
ชลบุรี	1,575	891,614	97.3	0.9	95.5	99.1
ระยอง	1,584	422,398	99.5	0.2	99.1	99.8
จันทบุรี	1,510	341,328	96.0	0.6	94.9	97.2
ตราด	1,606	149,501	98.6	0.5	97.7	99.5
ฉะเชิงเทรา	1,641	477,591	99.0	0.4	98.1	99.8
ปราจีนบุรี	1,595	320,750	96.5	1.0	94.6	98.4
นครนายก	1,566	172,394	98.9	0.5	98.0	99.8
สระแก้ว	1,557	363,850	97.2	1.0	95.3	99.1
ราชบุรี	1,585	579,609	97.6	1.2	95.2	100.0
กาญจนบุรี	1,535	522,142	97.5	0.6	96.4	98.6
สุพรรณบุรี	1,599	602,166	98.4	0.5	97.5	99.3
นครปฐม	1,615	620,487	98.3	0.7	97.0	99.5
สมุทรสาคร	1,596	333,520	98.4	0.4	97.5	99.3
สมุทรสงคราม	1,606	135,845	97.8	0.9	96.0	99.6
เพชรบุรี	1,519	305,055	96.6	0.9	94.8	98.3
ประจวบคีรีขันธ์	1,607	349,240	98.9	0.6	97.8	100.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,567	1,785,884	98.2	0.4	97.5	99.0
บุรีรัมย์	1,551	1,047,641	97.2	0.8	95.6	98.8
สุรินทร์	1,615	949,310	97.2	1.2	94.8	99.5
ศรีสะเกษ	1,457	928,397	95.4	1.9	91.6	99.3
อุบลราชธานี	1,582	1,241,476	98.9	0.4	98.1	99.7
ยโสธร	1,601	384,616	95.0	1.4	92.3	97.8
ชัยภูมิ	1,529	785,007	97.3	0.6	96.1	98.5
อำนาจเจริญ	1,464	248,468	96.7	0.6	95.5	97.9
หนองบัวลำภู	1,499	332,211	94.0	0.7	92.6	95.4
ขอนแก่น	1,577	1,260,124	98.2	0.6	97.0	99.4
อุดรธานี	1,540	1,072,081	97.3	0.6	96.2	98.4
เลย	1,542	433,178	96.3	0.7	94.9	97.6
หนองคาย	1,569	624,278	97.4	0.7	96.1	98.7

ตารางที่ 9.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินอาหารทอด แกงกะทิ และอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้มีระดับไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,592	685,511	98.2	0.6	97.1	99.3
ร้อยเอ็ด	1,590	958,702	97.9	0.6	96.7	99.0
กาฬสินธุ์	1,510	668,595	94.2	2.7	88.8	99.5
สกลนคร	1,569	769,752	96.1	1.2	93.8	98.4
นครพนม	1,534	448,867	95.3	1.6	92.1	98.6
มุกดาหาร	1,469	209,708	92.9	2.9	87.2	98.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,529	1,083,638	98.3	0.5	97.2	99.4
ลำพูน	1,560	299,030	99.1	0.3	98.5	99.8
ลำปาง	1,602	571,894	98.1	0.6	96.9	99.3
อุตรดิตถ์	1,568	326,938	97.4	0.6	96.2	98.5
แพร่	1,613	348,564	98.1	0.6	97.0	99.2
น่าน	1,555	323,826	96.2	1.8	92.7	99.7
พะเยา	1,611	367,678	98.4	0.6	97.3	99.5
เชียงราย	1,545	799,229	97.5	0.8	96.0	99.0
แม่ฮ่องสอน	1,486	130,173	96.6	1.1	94.5	98.7
นครสวรรค์	1,549	712,056	96.2	1.0	94.2	98.2
อุทัยธานี	1,587	233,706	97.7	0.8	96.1	99.3
กำแพงเพชร	1,548	502,071	97.2	0.7	95.8	98.5
ตาก	1,497	293,980	96.5	1.0	94.4	98.5
สุโขทัย	1,575	426,083	95.5	1.7	92.2	98.8
พิษณุโลก	1,608	611,494	97.9	0.5	96.9	98.9
พิจิตร	1,506	372,364	96.3	0.9	94.6	98.1
เพชรบูรณ์	1,554	680,736	96.2	1.1	94.1	98.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,544	1,040,055	97.8	0.8	96.3	99.3
กระบี่	1,641	291,915	96.7	1.7	93.4	100.0
พังงา	1,640	175,705	99.4	0.3	98.8	100.0
ภูเก็ต	1,587	225,850	98.6	0.5	97.6	99.5
สุราษฎร์ธานี	1,607	685,528	98.1	0.6	97.0	99.2
ระนอง	1,639	115,884	98.3	0.6	97.2	99.4
ชุมพร	1,625	338,399	97.7	1.1	95.5	100.0
สงขลา	1,561	894,135	94.8	1.7	91.6	98.1
สตูล	1,541	187,292	98.2	0.6	97.0	99.3
ตรัง	1,683	442,414	99.3	0.2	98.9	99.8
พัทลุง	1,597	347,749	97.1	0.7	95.7	98.4
ปัตตานี	1,522	376,639	96.2	0.7	94.8	97.5
ยะลา	1,626	302,985	97.8	0.6	96.6	99.0
นราธิวาส	1,549	435,513	97.2	0.9	95.6	98.9

ตารางที่ 9.2.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินผักและผลไม้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,908	4,077,460	93.1	0.5	92.1	94.0
25 - 34	9,022	3,965,675	94.4	0.4	93.5	95.2
35 - 44	9,738	4,367,760	94.3	0.4	93.5	95.1
45 - 54	7,474	3,418,224	94.4	0.5	93.4	95.3
55 - 64	12,198	2,140,585	94.6	0.4	93.9	95.3
65 - 74	5,479	943,007	95.1	0.4	94.3	96.0
รวม	52,819	18,912,712	94.1	0.3	93.6	94.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,482	3,899,139	93.7	0.6	92.6	94.8
25 - 34	8,655	3,857,443	93.9	0.4	93.0	94.7
35 - 44	10,422	4,791,149	94.4	0.4	93.7	95.1
45 - 54	8,350	3,793,489	94.8	0.4	94.0	95.7
55 - 64	12,114	2,438,472	95.3	0.3	94.7	95.9
65 - 74	5,684	1,115,635	94.9	0.4	94.0	95.7
รวม	53,707	19,895,326	94.4	0.3	93.9	94.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	17,390	7,976,598	93.4	0.4	92.5	94.2
25 - 34	17,677	7,823,118	94.1	0.3	93.4	94.8
35 - 44	20,160	9,158,910	94.4	0.3	93.7	95.0
45 - 54	15,824	7,211,713	94.6	0.3	93.9	95.3
55 - 64	24,312	4,579,058	95.0	0.3	94.4	95.5
65 - 74	11,163	2,058,642	95.0	0.3	94.3	95.7
รวมทั้งประเทศ	106,526	38,808,038	94.3	0.2	93.8	94.7



ตารางที่ 9.2.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินผักและผลไม้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	54,216	12,950,734	95.0	0.3	94.5	95.6
นอกเขตเทศบาล	52,310	25,857,303	93.9	0.3	93.3	94.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,337	3,343,764	97.2	0.8	95.7	98.8
ภาคกลาง	34,771	9,663,318	94.0	0.4	93.1	94.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,869	13,491,154	94.0	0.5	93.1	94.9
ภาคเหนือ	23,400	7,069,821	93.4	0.5	92.4	94.4
ภาคใต้	20,149	5,239,982	94.8	0.4	93.9	95.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,208	1,764,058	93.8	1.0	91.7	95.8
เขต สคร. ที่ 2	6,918	1,332,309	95.3	0.7	93.9	96.8
เขต สคร. ที่ 3	12,529	3,517,289	93.6	0.7	92.2	95.0
เขต สคร. ที่ 4	11,116	3,049,662	93.9	0.8	92.2	95.5
เขต สคร. ที่ 5	5,662	4,042,375	92.2	1.1	90.1	94.4
เขต สคร. ที่ 6	11,637	5,629,621	95.1	0.5	94.0	96.2
เขต สคร. ที่ 7	9,570	3,819,159	94.3	0.7	92.8	95.7
เขต สคร. ที่ 8	5,603	1,632,150	94.2	0.8	92.5	95.9
เขต สคร. ที่ 9	6,910	2,069,491	93.1	0.8	91.6	94.7
เขต สคร. ที่ 10	10,887	3,368,180	93.2	0.8	91.5	94.9
เขต สคร. ที่ 11	10,260	2,585,339	95.7	0.6	94.5	96.9
เขต สคร. ที่ 12	9,889	2,654,643	93.9	0.6	92.7	95.1

ตารางที่ 9.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการกินผักและผลไม้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,337	3,343,764	97.2	0.8	95.7	98.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,457	755,978	94.5	2.1	90.3	98.7
นนทบุรี	1,508	741,101	95.4	1.0	93.5	97.3
ปทุมธานี	1,300	542,989	91.1	2.0	87.1	95.0
พระนครศรีอยุธยา	1,400	479,968	94.5	1.7	91.2	97.7
อ่างทอง	1,344	174,781	91.1	4.0	83.1	99.0
ลพบุรี	1,345	455,190	95.9	0.9	94.2	97.6
สิงห์บุรี	1,433	139,209	95.4	1.1	93.2	97.5
ชัยนาท	1,338	181,654	96.4	1.1	94.3	98.5
สระบุรี	1,458	381,475	96.1	1.2	93.7	98.6
ชลบุรี	1,405	797,938	94.6	1.7	91.2	98.1
ระยอง	1,357	367,279	93.5	1.5	90.6	96.5
จันทบุรี	1,304	288,247	87.2	2.4	82.4	91.9
ตราด	1,442	131,840	94.7	2.4	90.0	99.5
ฉะเชิงเทรา	1,428	427,675	95.9	1.0	93.9	97.9
ปราจีนบุรี	1,415	289,103	93.2	1.6	90.1	96.3
นครนายก	1,346	147,125	94.3	1.3	91.7	96.8
สระแก้ว	1,375	312,105	92.2	1.6	89.0	95.3
ราชบุรี	1,429	512,633	95.1	2.0	91.1	99.1
กาญจนบุรี	1,287	444,282	91.9	2.1	87.6	96.1
สุพรรณบุรี	1,381	538,509	92.9	3.1	86.9	99.0
นครปฐม	1,495	571,743	95.0	1.8	91.5	98.5
สมุทรสาคร	1,446	296,944	95.0	1.4	92.3	97.7
สมุทรสงคราม	1,359	117,477	93.4	1.5	90.3	96.4
เพชรบุรี	1,334	266,869	92.8	1.8	89.2	96.4
ประจวบคีรีขันธ์	1,385	301,205	94.3	1.4	91.6	97.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,382	1,516,634	91.9	1.7	88.5	95.2
บุรีรัมย์	1,505	1,018,696	94.7	1.6	91.5	97.9
สุรินทร์	1,447	864,395	92.3	2.0	88.4	96.1
ศรีสะเกษ	1,270	849,325	94.0	1.3	91.5	96.6
อุบลราชธานี	1,461	1,168,685	99.1	0.3	98.5	99.6
ยโสธร	1,453	352,797	90.5	4.3	82.1	98.9
ชัยภูมิ	1,328	642,649	89.4	3.7	82.1	96.6
อำนาจเจริญ	1,377	225,501	95.2	0.7	93.9	96.6
หนองบัวลำภู	1,451	309,088	92.6	1.7	89.3	95.8
ขอนแก่น	1,494	1,168,195	97.5	0.7	96.1	98.8
อุดรธานี	1,464	996,370	95.8	0.8	94.2	97.4
เลย	1,421	403,006	92.9	2.1	88.7	97.1
หนองคาย	1,405	568,675	93.9	1.3	91.2	96.5

ตารางที่ 9.2.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการกินผักและผลไม้ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,446	628,036	95.0	1.6	91.9	98.1
ร้อยเอ็ด	1,502	920,892	96.4	1.4	93.6	99.3
กาฬสินธุ์	1,454	635,359	91.9	2.1	87.8	96.1
สกลนคร	1,344	642,055	93.9	1.4	91.2	96.7
นครพนม	1,448	411,148	91.4	1.9	87.7	95.1
มุกดาหาร	1,217	169,648	81.7	6.8	68.2	95.1
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,240	882,429	91.9	1.8	88.4	95.4
ลำพูน	1,456	283,747	97.3	0.8	95.7	98.9
ลำปาง	1,446	513,710	94.9	1.4	92.2	97.6
อุตรดิตถ์	1,409	293,618	94.5	1.3	91.9	97.2
แพร่	1,394	303,859	96.7	0.8	95.1	98.4
น่าน	1,317	283,081	94.4	1.8	91.0	97.9
พะเยา	1,385	313,550	90.1	2.8	84.6	95.7
เชียงราย	1,363	679,026	91.4	2.8	85.9	96.8
แม่ฮ่องสอน	1,286	108,779	94.0	1.8	90.4	97.5
นครสวรรค์	1,373	628,296	94.0	1.7	90.7	97.4
อุทัยธานี	1,484	218,269	94.7	2.0	90.8	98.7
กำแพงเพชร	1,344	434,785	93.2	1.4	90.5	95.9
ตาก	1,332	256,086	91.0	1.5	88.1	93.9
สุโขทัย	1,425	391,337	92.4	1.3	89.8	94.9
พิษณุโลก	1,382	527,238	95.3	1.6	92.1	98.5
พิจิตร	1,402	350,800	95.4	1.0	93.4	97.5
เพชรบูรณ์	1,362	601,211	92.1	2.1	88.0	96.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,390	907,809	97.0	0.9	95.3	98.8
กระบี่	1,509	264,820	95.5	1.2	93.1	97.9
พังงา	1,488	163,917	97.6	0.8	96.0	99.3
ภูเก็ต	1,467	207,962	95.6	1.0	93.7	97.6
สุราษฎร์ธานี	1,480	622,775	93.3	1.9	89.6	96.9
ระนอง	1,474	102,953	94.3	1.3	91.7	97.0
ชุมพร	1,452	315,102	96.5	1.2	94.2	98.9
สงขลา	1,454	815,725	94.0	1.3	91.5	96.4
สตูล	1,350	160,559	93.9	1.5	90.9	96.9
ตรัง	1,512	393,237	93.6	2.0	89.8	97.5
พัทลุง	1,451	312,230	95.2	1.0	93.3	97.1
ปัตตานี	1,389	356,768	95.7	1.0	93.7	97.7
ยะลา	1,414	262,272	93.8	2.0	89.9	97.8
นราธิวาส	1,319	353,852	91.3	2.0	87.5	95.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.2.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินปลา (ไม่รวมปลาเค็มและปลาที่เกิดจากการหมักดอง) ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,081	3,707,251	89.1	0.7	87.7	90.5
25 - 34	8,410	3,731,598	93.0	0.5	92.1	93.9
35 - 44	9,148	4,106,751	92.0	0.5	91.0	92.9
45 - 54	7,168	3,282,685	93.6	0.5	92.6	94.5
55 - 64	11,765	2,046,798	93.2	0.4	92.3	94.1
65 - 74	5,316	910,029	94.2	0.5	93.2	95.2
รวม	49,888	17,785,112	92.1	0.3	91.4	92.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,852	3,618,671	91.8	0.6	90.7	92.9
25 - 34	8,228	3,676,422	93.5	0.4	92.6	94.3
35 - 44	9,990	4,563,529	92.9	0.5	91.9	94.0
45 - 54	8,131	3,633,861	93.6	0.5	92.6	94.6
55 - 64	11,897	2,370,799	94.7	0.4	94.0	95.4
65 - 74	5,555	1,080,728	94.4	0.5	93.4	95.4
รวม	51,653	18,944,011	93.2	0.3	92.6	93.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	15,933	7,325,922	90.4	0.5	89.4	91.4
25 - 34	16,638	7,408,020	93.2	0.4	92.5	93.9
35 - 44	19,138	8,670,280	92.5	0.4	91.7	93.2
45 - 54	15,299	6,916,546	93.6	0.4	92.8	94.4
55 - 64	23,662	4,417,597	94.0	0.3	93.4	94.6
65 - 74	10,871	1,990,757	94.3	0.4	93.5	95.1
รวมทั้งประเทศ	101,541	36,729,123	92.7	0.3	92.1	93.2

ตารางที่ 9.2.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินปลา (ไม่รวมปลาเค็มและปลาที่เกิดจากการหมักดอง) ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	51,844	12,213,721	93.7	0.4	93.0	94.5
นอกเขตเทศบาล	49,697	24,515,401	92.2	0.4	91.4	92.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,246	3,089,579	96.0	1.1	93.9	98.2
ภาคกลาง	33,195	9,148,801	92.6	0.6	91.6	93.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25,902	12,905,344	92.4	0.5	91.3	93.4
ภาคเหนือ	22,020	6,660,288	91.9	0.5	90.8	92.9
ภาคใต้	19,178	4,925,110	92.7	0.6	91.5	93.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,120	1,696,359	93.1	1.5	90.1	96.1
เขต สคร. ที่ 2	6,616	1,259,597	93.6	1.1	91.4	95.7
เขต สคร. ที่ 3	11,943	3,352,157	92.5	0.9	90.7	94.4
เขต สคร. ที่ 4	10,516	2,840,689	92.1	1.0	90.2	94.0
เขต สคร. ที่ 5	5,451	3,868,408	90.9	1.1	88.8	93.1
เขต สคร. ที่ 6	11,202	5,425,967	93.7	0.6	92.4	94.9
เขต สคร. ที่ 7	9,249	3,610,969	92.0	1.1	89.8	94.1
เขต สคร. ที่ 8	5,236	1,528,984	92.1	1.3	89.5	94.7
เขต สคร. ที่ 9	6,420	1,914,874	90.7	0.9	88.9	92.6
เขต สคร. ที่ 10	10,364	3,216,431	92.5	0.8	91.0	94.0
เขต สคร. ที่ 11	9,817	2,436,003	93.6	0.9	91.9	95.4
เขต สคร. ที่ 12	9,361	2,489,107	91.7	0.8	90.2	93.3

ตารางที่ 9.2.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การกินปลา (ไม่รวมปลาเค็มและปลาที่เกิดจากการหมักดอง) ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,246	3,089,579	96.0	1.1	93.9	98.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,397	718,562	91.7	3.4	85.1	98.3
นนทบุรี	1,471	713,889	95.2	0.8	93.6	96.8
ปทุมธานี	1,284	515,989	88.3	3.4	81.6	95.0
พระนครศรีอยุธยา	1,365	466,481	95.6	1.2	93.2	97.9
อ่างทอง	1,316	172,197	91.9	4.3	83.5	100.0
ลพบุรี	1,263	425,967	93.6	1.8	90.1	97.2
สิงห์บุรี	1,395	136,755	94.4	1.0	92.4	96.4
ชัยนาท	1,256	166,198	94.5	1.3	92.0	97.1
สระบุรี	1,386	358,479	93.6	2.3	89.1	98.1
ชลบุรี	1,353	771,372	94.9	1.6	91.8	98.0
ระยอง	1,291	350,254	92.1	1.5	89.2	95.1
จันทบุรี	1,220	275,457	87.5	2.6	82.3	92.6
ตราด	1,368	126,452	94.2	2.5	89.3	99.1
ฉะเชิงเทรา	1,378	411,906	95.6	1.0	93.6	97.6
ปราจีนบุรี	1,360	285,307	93.6	1.0	91.7	95.4
นครนายก	1,281	135,325	93.1	1.4	90.3	95.8
สระแก้ว	1,295	277,522	88.2	2.2	83.9	92.5
ราชบุรี	1,333	480,746	94.2	1.8	90.6	97.8
กาญจนบุรี	1,218	421,742	90.8	2.6	85.7	95.9
สุพรรณบุรี	1,284	501,833	90.8	3.4	84.1	97.6
นครปฐม	1,420	532,882	92.5	2.5	87.6	97.4
สมุทรสาคร	1,367	263,082	92.1	1.7	88.8	95.5
สมุทรสงคราม	1,333	115,002	93.2	2.1	89.0	97.4
เพชรบุรี	1,211	237,966	88.6	2.9	82.9	94.3
ประจวบคีรีขันธ์	1,350	287,435	94.6	1.6	91.4	97.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,280	1,391,538	89.1	1.9	85.3	92.9
บุรีรัมย์	1,464	994,657	94.2	1.4	91.5	96.8
สุรินทร์	1,416	845,888	91.5	2.0	87.6	95.5
ศรีสะเกษ	1,227	812,088	92.7	1.6	89.7	95.8
อุบลราชธานี	1,382	1,108,009	97.9	0.6	96.8	99.1
ยโสธร	1,456	355,398	91.3	2.8	85.7	96.9
ชัยภูมิ	1,291	636,326	89.5	3.7	82.3	96.7
อำนาจเจริญ	1,265	205,387	92.2	1.5	89.2	95.2
หนองบัวลำภู	1,404	299,113	90.2	1.2	87.8	92.5
ขอนแก่น	1,419	1,126,421	95.1	1.2	92.7	97.4
อุดรธานี	1,409	964,679	94.7	1.0	92.8	96.7
เลย	1,330	371,268	89.6	2.4	84.8	94.4
หนองคาย	1,339	538,440	91.3	1.9	87.7	95.0

ตารางที่ 9.2.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการกินปลา (ไม่รวมปลาเค็มและปลาที่เกิดจากการหมักดอง) ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเสี้ยวส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณเสี้ยวส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,402	598,211	93.7	2.3	89.1	98.3
ร้อยเอ็ด	1,496	913,974	96.3	1.2	93.9	98.6
กาฬสินธุ์	1,403	613,862	92.4	2.3	87.8	97.0
สกลนคร	1,316	575,811	87.3	4.6	78.2	96.4
นครพนม	1,392	388,677	87.7	2.6	82.7	92.7
มุกดาหาร	1,211	165,598	81.5	7.3	67.1	95.8
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,192	849,338	92.3	1.8	88.8	95.9
ลำพูน	1,400	275,206	97.1	0.9	95.3	98.9
ลำปาง	1,328	475,708	92.5	1.4	89.7	95.2
อุตรดิตถ์	1,321	274,586	92.5	1.0	90.5	94.6
แพร่	1,375	302,017	96.4	1.0	94.5	98.3
น่าน	1,257	253,605	89.7	2.4	84.9	94.4
พะเยา	1,314	296,371	88.9	3.3	82.5	95.4
เชียงราย	1,309	665,521	92.1	1.8	88.6	95.6
แม่ฮ่องสอน	1,189	98,665	91.6	2.4	86.9	96.3
นครสวรรค์	1,300	592,548	90.8	2.6	85.7	95.9
อุทัยธานี	1,370	205,573	93.2	2.5	88.2	98.1
กำแพงเพชร	1,233	403,125	92.4	1.3	89.9	94.9
ตาก	1,229	235,908	88.8	2.7	83.5	94.1
สุโขทัย	1,289	347,914	87.3	2.6	82.3	92.3
พิษณุโลก	1,311	502,205	93.8	2.0	89.8	97.7
พิจิตร	1,333	327,738	93.4	1.6	90.3	96.4
เพชรบูรณ์	1,270	554,260	90.3	1.7	86.9	93.7
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,354	856,605	94.7	1.9	91.1	98.4
กระบี่	1,476	255,808	93.4	1.6	90.2	96.5
พังงา	1,415	150,663	95.9	1.2	93.5	98.4
ภูเก็ต	1,427	200,743	95.2	1.2	92.9	97.5
สุราษฎร์ธานี	1,363	569,364	90.0	2.3	85.6	94.5
ระนอง	1,373	95,341	92.0	1.8	88.4	95.5
ชุมพร	1,409	307,478	96.3	1.3	93.7	98.8
สงขลา	1,389	787,350	91.9	1.5	88.9	95.0
สตูล	1,275	147,978	90.9	2.2	86.5	95.3
ตรัง	1,472	373,720	92.3	2.5	87.4	97.3
พัทลุง	1,293	273,307	89.5	1.5	86.5	92.5
ปัตตานี	1,300	334,477	95.3	0.8	93.7	96.9
ยะลา	1,388	256,374	94.2	1.4	91.5	97.0
นราธิวาส	1,244	315,901	87.6	3.1	81.5	93.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.2.10 ความซุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การชอบกินอาหารเค็มจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่กินอาหารจืด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,407	4,243,946	93.6	0.7	92.2	95.0
25 - 34	9,564	4,148,348	96.2	0.3	95.6	96.8
35 - 44	10,585	4,725,819	96.4	0.3	95.8	96.9
45 - 54	8,090	3,697,442	96.4	0.3	95.7	97.1
55 - 64	13,309	2,301,053	96.4	0.3	95.8	97.1
65 - 74	6,040	1,034,520	96.7	0.4	95.9	97.5
รวม	56,995	20,151,127	95.8	0.3	95.3	96.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,054	4,143,200	95.3	0.5	94.4	96.2
25 - 34	9,480	4,199,651	96.6	0.4	95.9	97.3
35 - 44	11,501	5,284,664	97.1	0.3	96.5	97.6
45 - 54	9,226	4,154,914	97.1	0.4	96.4	97.9
55 - 64	13,344	2,658,379	96.9	0.3	96.4	97.4
65 - 74	6,306	1,223,292	96.5	0.4	95.8	97.3
รวม	58,911	21,664,100	96.6	0.2	96.1	97.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	18,461	8,387,146	94.4	0.5	93.5	95.4
25 - 34	19,044	8,347,998	96.4	0.3	95.9	96.9
35 - 44	22,086	10,010,483	96.7	0.2	96.3	97.2
45 - 54	17,316	7,852,357	96.8	0.3	96.2	97.4
55 - 64	26,653	4,959,432	96.7	0.2	96.2	97.1
65 - 74	12,346	2,257,811	96.6	0.3	96.0	97.2
รวมทั้งประเทศ	115,906	41,815,226	96.2	0.2	95.8	96.6



ตารางที่ 9.2.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การชอบกินอาหารเค็มจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่า ผู้ที่กินอาหารจืด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	58,435	13,649,337	95.6	0.5	94.7	96.5
นอกเขตเทศบาล	57,471	28,165,890	96.5	0.2	96.0	96.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,385	3,459,301	96.0	1.5	93.1	99.0
ภาคกลาง	38,034	10,409,327	96.2	0.3	95.5	96.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29,137	14,593,086	96.7	0.3	96.2	97.3
ภาคเหนือ	25,279	7,585,866	95.0	0.6	93.9	96.1
ภาคใต้	22,071	5,767,647	96.5	0.5	95.6	97.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,547	1,849,285	94.5	1.2	92.1	96.9
เขต สคร. ที่ 2	7,587	1,445,517	97.2	0.5	96.2	98.3
เขต สคร. ที่ 3	13,688	3,803,846	96.7	0.5	95.7	97.7
เขต สคร. ที่ 4	12,212	3,310,680	96.1	0.5	95.1	97.1
เขต สคร. ที่ 5	6,111	4,413,890	96.2	0.6	94.9	97.5
เขต สคร. ที่ 6	12,517	6,044,985	97.3	0.4	96.6	98.0
เขต สคร. ที่ 7	10,509	4,134,210	96.6	0.4	95.7	97.4
เขต สคร. ที่ 8	6,066	1,743,248	95.6	1.5	92.7	98.4
เขต สคร. ที่ 9	7,433	2,205,284	94.9	0.7	93.5	96.3
เขต สคร. ที่ 10	11,780	3,637,334	94.8	0.9	93.1	96.5
เขต สคร. ที่ 11	11,068	2,817,584	96.7	0.6	95.6	97.9
เขต สคร. ที่ 12	11,003	2,950,063	96.3	0.8	94.8	97.8

ตารางที่ 9.2.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การชอบกินอาหารเค็มจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่า ผู้ที่กินอาหารจืด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,385	3,459,301	96.0	1.5	93.1	99.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,600	826,897	98.8	0.4	98.1	99.4
นนทบุรี	1,472	702,441	92.4	2.6	87.2	97.6
ปทุมธานี	1,512	615,257	93.9	1.8	90.3	97.5
พระนครศรีอยุธยา	1,563	531,587	98.1	0.5	97.2	99.1
อ่างทอง	1,531	198,541	98.0	0.9	96.2	99.8
ลพบุรี	1,457	492,529	97.3	0.7	95.8	98.7
สิงห์บุรี	1,600	153,909	97.9	0.7	96.6	99.2
ชัยนาท	1,452	210,444	97.9	0.5	97.0	98.9
สระบุรี	1,547	390,093	96.2	1.5	93.2	99.1
ชลบุรี	1,485	819,905	93.7	2.1	89.5	97.9
ระยอง	1,531	407,287	97.3	1.2	94.9	99.8
จันทบุรี	1,486	335,717	95.0	0.8	93.4	96.6
ตราด	1,574	144,721	97.8	0.9	96.0	99.7
ฉะเชิงเทรา	1,533	449,054	98.1	0.5	97.1	99.1
ปราจีนบุรี	1,525	313,730	97.4	0.5	96.4	98.4
นครนายก	1,472	161,423	96.8	1.0	94.8	98.8
สระแก้ว	1,482	345,112	96.9	1.1	94.8	99.1
ราชบุรี	1,536	559,262	96.6	1.2	94.3	98.8
กาญจนบุรี	1,442	496,050	95.4	1.6	92.3	98.5
สุพรรณบุรี	1,548	583,202	96.6	1.5	93.6	99.6
นครปฐม	1,548	590,414	96.1	1.4	93.3	98.8
สมุทรสาคร	1,572	324,441	95.9	0.9	94.1	97.7
สมุทรสงคราม	1,525	126,198	95.8	1.5	92.7	98.8
เพชรบุรี	1,468	294,459	94.5	1.2	92.2	96.9
ประจวบคีรีขันธ์	1,573	336,653	97.6	0.8	96.1	99.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,497	1,686,522	96.1	0.8	94.6	97.7
บุรีรัมย์	1,580	1,060,959	96.9	0.9	95.2	98.6
สุรินทร์	1,550	897,416	94.8	2.5	90.0	99.7
ศรีสะเกษ	1,442	919,109	95.8	1.1	93.6	97.9
อุบลราชธานี	1,478	1,181,086	98.8	0.5	97.8	99.7
ยโสธร	1,590	383,262	95.5	1.3	92.9	98.1
ชัยภูมิ	1,484	768,993	97.1	0.7	95.7	98.4
อำนาจเจริญ	1,523	252,222	97.7	0.4	97.0	98.5
หนองบัวลำภู	1,527	338,086	95.5	0.7	94.1	96.9
ขอนแก่น	1,578	1,238,123	96.9	1.1	94.8	99.0
อุดรธานี	1,562	1,075,964	97.2	0.7	95.8	98.6
เลย	1,566	434,519	97.4	0.5	96.5	98.3
หนองคาย	1,559	623,209	97.3	0.6	96.2	98.5

ตารางที่ 9.2.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การชอบกินอาหารเค็มจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง มากกว่าผู้ที่กินอาหารจืด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,552	670,200	97.1	0.9	95.4	98.9
ร้อยเอ็ด	1,607	968,572	98.6	0.6	97.4	99.8
กาฬสินธุ์	1,566	696,313	97.1	1.5	94.2	100.0
สกลนคร	1,528	732,352	96.2	1.1	94.0	98.3
นครพนม	1,524	456,345	94.5	1.5	91.6	97.4
มุกดาหาร	1,424	209,834	94.7	1.5	91.8	97.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,341	938,801	92.5	2.7	87.1	97.9
ลำพูน	1,515	290,415	97.1	0.9	95.4	98.8
ลำปาง	1,529	544,469	95.8	0.8	94.3	97.3
อุตรดิตถ์	1,495	306,812	95.5	0.8	94.0	97.0
แพร่	1,580	343,524	98.7	0.4	97.8	99.5
น่าน	1,490	304,117	95.2	1.5	92.2	98.2
พะเยา	1,435	326,320	93.1	2.7	87.8	98.5
เชียงราย	1,468	765,400	94.7	1.5	91.6	97.7
แม่ฮ่องสอน	1,422	124,288	96.8	0.8	95.2	98.5
นครสวรรค์	1,507	658,427	92.9	2.8	87.4	98.5
อุทัยธานี	1,584	230,793	98.2	0.9	96.5	100.0
กำแพงเพชร	1,525	496,145	97.9	0.5	97.1	98.8
ตาก	1,447	279,632	94.3	1.7	90.9	97.6
สุโขทัย	1,515	407,472	92.8	2.5	87.8	97.7
พิษณุโลก	1,531	578,573	97.0	1.0	95.0	98.9
พิจิตร	1,450	357,883	95.6	1.4	92.9	98.4
เพชรบูรณ์	1,445	632,795	94.5	1.4	91.8	97.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,562	1,038,242	96.7	1.2	94.3	99.2
กระบี่	1,635	292,752	98.4	0.6	97.2	99.6
พังงา	1,602	171,462	98.0	0.8	96.5	99.5
ภูเก็ต	1,527	214,055	97.6	0.7	96.2	99.0
สุราษฎร์ธานี	1,544	659,493	95.1	1.4	92.4	97.8
ระนอง	1,608	108,598	95.8	1.9	92.2	99.5
ชุมพร	1,590	332,982	97.9	0.9	96.0	99.8
สงขลา	1,458	844,994	92.6	2.6	87.5	97.7
สตูล	1,575	189,847	98.9	0.4	98.2	99.6
ตรัง	1,631	431,064	98.6	0.4	97.8	99.4
พัทลุง	1,549	337,903	96.8	0.5	95.9	97.7
ปัตตานี	1,555	386,611	96.8	1.2	94.4	99.2
ยะลา	1,626	304,717	97.9	0.5	96.9	98.9
นราธิวาส	1,609	454,927	98.3	0.4	97.4	99.2

ตารางที่ 9.2.13 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,505	4,351,166	93.7	0.6	92.6	94.9
25 - 34	9,719	4,218,798	95.9	0.3	95.3	96.5
35 - 44	10,551	4,705,343	95.3	0.3	94.6	95.9
45 - 54	8,048	3,669,827	95.9	0.4	95.2	96.6
55 - 64	13,082	2,272,790	96.1	0.3	95.5	96.6
65 - 74	5,947	1,022,370	96.2	0.4	95.4	97.0
รวม	56,852	20,240,293	95.3	0.2	94.9	95.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,969	4,152,761	94.9	0.4	94.2	95.6
25 - 34	9,258	4,144,668	95.6	0.3	94.9	96.3
35 - 44	11,142	5,140,058	96.1	0.3	95.5	96.7
45 - 54	8,903	4,025,396	95.7	0.4	94.9	96.5
55 - 64	12,749	2,554,027	96.0	0.3	95.5	96.6
65 - 74	6,019	1,171,774	95.6	0.4	94.8	96.4
รวม	57,040	21,188,684	95.7	0.2	95.3	96.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	18,474	8,503,927	94.3	0.4	93.6	95.1
25 - 34	18,977	8,363,466	95.8	0.3	95.2	96.3
35 - 44	21,693	9,845,401	95.7	0.2	95.2	96.2
45 - 54	16,951	7,695,223	95.8	0.3	95.2	96.4
55 - 64	25,831	4,826,816	96.1	0.2	95.6	96.5
65 - 74	11,966	2,194,143	95.9	0.3	95.3	96.5
รวมทั้งประเทศ	113,892	41,428,977	95.5	0.2	95.1	95.9

ตารางที่ 9.2.14 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	57,778	13,763,792	96.0	0.2	95.6	96.5
นอกเขตเทศบาล	56,114	27,665,185	95.2	0.3	94.7	95.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,420	3,562,700	98.0	0.6	96.9	99.1
ภาคกลาง	37,770	10,434,679	95.9	0.3	95.3	96.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	28,212	14,210,187	95.1	0.3	94.4	95.8
ภาคเหนือ	24,826	7,520,343	93.8	0.5	92.8	94.8
ภาคใต้	21,664	5,701,069	96.5	0.3	95.8	97.2
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,598	1,898,651	96.4	0.4	95.6	97.2
เขต สคร. ที่ 2	7,495	1,443,648	95.6	0.8	94.0	97.2
เขต สคร. ที่ 3	13,654	3,819,864	96.0	0.5	95.0	97.0
เขต สคร. ที่ 4	12,023	3,272,516	95.7	0.6	94.5	97.0
เขต สคร. ที่ 5	6,020	4,350,018	94.8	0.7	93.6	96.1
เขต สคร. ที่ 6	12,131	5,874,722	96.0	0.4	95.1	96.8
เขต สคร. ที่ 7	10,061	3,985,446	94.0	0.8	92.5	95.5
เขต สคร. ที่ 8	5,918	1,733,807	94.2	1.4	91.4	96.9
เขต สคร. ที่ 9	7,207	2,138,016	93.3	0.7	91.9	94.7
เขต สคร. ที่ 10	11,701	3,648,519	94.0	0.7	92.6	95.3
เขต สคร. ที่ 11	11,003	2,821,865	97.2	0.5	96.3	98.1
เขต สคร. ที่ 12	10,661	2,879,205	95.8	0.5	94.8	96.7

ตารางที่ 9.2.15 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,420	3,562,700	98.0	0.6	96.9	99.1
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,549	812,813	97.5	1.0	95.4	99.5
นนทบุรี	1,535	744,003	95.2	0.9	93.5	96.9
ปทุมธานี	1,524	634,395	96.5	0.5	95.6	97.5
พระนครศรีอยุธยา	1,539	520,253	97.9	0.7	96.6	99.3
อ่างทอง	1,520	193,337	93.3	4.2	85.0	100.0
ลพบุรี	1,476	493,435	95.6	1.0	93.5	97.6
สิงห์บุรี	1,559	150,125	97.1	0.8	95.6	98.6
ชัยนาท	1,449	225,416	97.9	0.6	96.7	99.1
สระบุรี	1,491	381,335	95.1	1.5	92.1	98.1
ชลบุรี	1,555	871,084	95.3	1.5	92.3	98.3
ระยอง	1,465	391,632	95.5	1.6	92.4	98.6
จันทบุรี	1,479	331,800	94.5	1.0	92.6	96.3
ตราด	1,578	144,605	97.3	1.0	95.4	99.3
ฉะเชิงเทรา	1,562	451,811	97.1	1.2	94.7	99.4
ปราจีนบุรี	1,539	318,687	96.9	0.8	95.3	98.4
นครนายก	1,444	160,492	95.0	1.1	92.8	97.1
สระแก้ว	1,483	336,939	94.2	2.0	90.4	98.1
ราชบุรี	1,524	551,177	96.3	1.4	93.7	99.0
กาญจนบุรี	1,424	500,339	96.6	0.9	94.8	98.3
สุพรรณบุรี	1,494	562,405	94.9	2.5	89.9	99.9
นครปฐม	1,547	592,904	95.9	1.6	92.7	99.1
สมุทรสาคร	1,569	322,825	96.2	1.2	93.9	98.5
สมุทรสงคราม	1,504	126,849	94.2	1.2	91.8	96.5
เพชรบุรี	1,429	283,867	92.8	1.9	89.0	96.6
ประจวบคีรีขันธ์	1,532	332,150	97.3	0.9	95.6	99.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,494	1,695,313	95.2	0.9	93.4	96.9
บุรีรัมย์	1,548	1,047,389	95.6	1.1	93.4	97.8
สุรินทร์	1,545	908,759	94.4	1.7	91.0	97.8
ศรีสะเกษ	1,382	891,529	93.1	1.8	89.7	96.6
อุบลราชธานี	1,467	1,180,471	98.2	0.5	97.1	99.2
ยโสธร	1,485	355,541	89.2	5.0	79.3	99.1
ชัยภูมิ	1,433	698,557	93.4	1.9	89.6	97.3
อำนาจเจริญ	1,505	248,379	96.1	0.5	95.2	97.1
หนองบัวลำภู	1,472	326,973	91.8	1.4	89.1	94.5
ขอนแก่น	1,550	1,233,603	97.4	0.9	95.6	99.2
อุดรธานี	1,493	1,022,898	95.5	1.1	93.3	97.7
เลย	1,532	425,995	95.9	0.9	94.2	97.6
หนองคาย	1,528	605,976	94.7	1.2	92.3	97.1

ตารางที่ 9.2.15 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,516	646,240	94.9	1.4	92.1	97.6
ร้อยเอ็ด	1,561	945,053	97.7	0.9	95.9	99.6
กาฬสินธุ์	1,479	667,983	96.2	0.8	94.6	97.8
สกลนคร	1,420	686,830	93.0	1.7	89.6	96.4
นครพนม	1,480	433,488	91.7	2.0	87.8	95.5
มุกดาหาร	1,322	189,207	90.1	2.3	85.5	94.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,395	981,274	92.6	2.0	88.8	96.5
ลำพูน	1,457	277,980	95.5	1.2	93.2	97.9
ลำปาง	1,488	530,683	93.9	1.3	91.3	96.5
อุตรดิตถ์	1,440	305,373	95.9	1.0	93.8	97.9
แพร่	1,560	336,562	96.8	0.9	95.0	98.6
น่าน	1,493	311,086	95.7	1.3	93.2	98.2
พะเยา	1,412	320,762	91.3	2.5	86.5	96.1
เชียงราย	1,494	768,745	94.1	1.3	91.6	96.6
แม่ฮ่องสอน	1,402	121,427	96.2	1.2	93.9	98.5
นครสวรรค์	1,491	670,989	92.5	2.9	86.9	98.2
อุทัยธานี	1,544	227,630	97.0	0.8	95.3	98.6
กำแพงเพชร	1,459	478,107	95.9	0.5	94.9	97.0
ตาก	1,392	264,435	91.1	1.8	87.6	94.6
สุโขทัย	1,465	403,070	92.0	1.3	89.5	94.5
พิษณุโลก	1,487	558,264	95.1	1.3	92.6	97.6
พิจิตร	1,424	357,081	93.4	1.8	89.9	96.8
เพชรบูรณ์	1,423	606,874	92.3	1.7	88.9	95.7
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,538	1,021,455	97.6	0.9	95.8	99.3
กระบี่	1,627	290,544	97.6	1.2	95.3	99.8
พังงา	1,592	174,028	98.7	0.6	97.6	99.8
ภูเก็ต	1,526	213,910	96.9	0.7	95.5	98.4
สุราษฎร์ธานี	1,582	678,093	96.4	1.2	94.1	98.6
ระนอง	1,563	110,920	96.2	0.9	94.5	97.9
ชุมพร	1,575	332,915	97.4	0.8	95.8	98.9
สงขลา	1,500	854,305	93.4	1.3	90.7	96.0
สตูล	1,495	181,561	97.1	0.5	96.2	98.1
ตรัง	1,602	420,583	96.7	0.9	94.8	98.5
พัทลุง	1,572	342,351	95.2	0.9	93.5	96.9
ปัตตานี	1,488	382,205	97.9	0.7	96.5	99.2
ยะลา	1,545	287,810	97.2	1.1	95.0	99.3
นราธิวาส	1,459	410,389	96.8	0.8	95.2	98.3

ตารางที่ 9.2.16 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,580	4,436,812	94.6	0.4	93.8	95.5
25 - 34	9,467	4,131,653	94.1	0.5	93.2	95.1
35 - 44	10,276	4,630,816	93.8	0.4	93.0	94.7
45 - 54	7,840	3,590,192	93.8	0.5	92.8	94.8
55 - 64	12,748	2,229,981	94.1	0.4	93.3	95.0
65 - 74	5,706	974,522	93.6	0.7	92.3	95.0
รวม	55,617	19,993,976	94.1	0.3	93.5	94.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,942	4,115,135	93.4	0.5	92.4	94.4
25 - 34	8,983	4,020,445	92.9	0.5	91.9	93.9
35 - 44	10,963	5,028,500	93.3	0.5	92.4	94.3
45 - 54	8,688	3,920,091	93.5	0.5	92.5	94.4
55 - 64	12,428	2,492,296	93.4	0.5	92.5	94.4
65 - 74	5,866	1,143,660	94.0	0.6	92.8	95.1
รวม	55,870	20,720,126	93.3	0.3	92.7	94.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	18,522	8,551,946	94.0	0.4	93.3	94.8
25 - 34	18,450	8,152,098	93.5	0.4	92.7	94.3
35 - 44	21,239	9,659,316	93.6	0.4	92.8	94.3
45 - 54	16,528	7,510,283	93.6	0.4	92.8	94.5
55 - 64	25,176	4,722,277	93.7	0.4	93.0	94.5
65 - 74	11,572	2,118,182	93.8	0.5	92.8	94.8
รวมทั้งประเทศ	111,487	40,714,101	93.7	0.3	93.1	94.3



ตารางที่ 9.2.17 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	56,210	13,359,943	93.1	0.5	92.2	94.0
นอกเขตเทศบาล	55,277	27,354,158	94.0	0.4	93.3	94.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,367	3,417,131	93.0	1.5	90.0	96.0
ภาคกลาง	36,339	10,081,180	93.1	0.5	92.2	94.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	28,487	14,380,721	94.9	0.4	94.0	95.8
ภาคเหนือ	24,340	7,372,951	92.3	0.6	91.1	93.5
ภาคใต้	20,954	5,462,117	94.0	0.9	92.3	95.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,340	1,798,761	92.1	1.2	89.8	94.4
เขต สคร. ที่ 2	7,251	1,414,866	94.6	0.8	93.0	96.1
เขต สคร. ที่ 3	13,109	3,662,074	92.8	0.8	91.1	94.4
เขต สคร. ที่ 4	11,639	3,205,480	93.5	0.8	92.0	95.1
เขต สคร. ที่ 5	6,066	4,393,564	93.7	1.1	91.5	95.9
เขต สคร. ที่ 6	12,124	5,837,087	95.4	0.5	94.4	96.5
เขต สคร. ที่ 7	10,297	4,150,070	95.4	0.6	94.2	96.6
เขต สคร. ที่ 8	5,764	1,682,127	91.5	1.5	88.5	94.5
เขต สคร. ที่ 9	7,143	2,138,349	92.3	0.8	90.7	93.9
เขต สคร. ที่ 10	11,433	3,552,475	92.7	0.9	90.9	94.4
เขต สคร. ที่ 11	10,615	2,672,402	93.9	1.5	90.9	96.9
เขต สคร. ที่ 12	10,339	2,789,716	94.2	0.9	92.4	95.9

ตารางที่ 9.2.18 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,367	3,417,131	93.0	1.5	90.0	96.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,513	796,155	94.2	1.6	91.1	97.3
นนทบุรี	1,391	676,631	89.0	2.4	84.3	93.8
ปทุมธานี	1,454	611,690	92.9	1.7	89.6	96.1
พระนครศรีอยุธยา	1,495	510,440	95.5	2.0	91.6	99.3
อ่างทอง	1,483	193,040	94.9	1.0	92.9	97.0
ลพบุรี	1,500	505,165	95.6	1.3	93.1	98.0
สิงห์บุรี	1,402	136,968	90.6	4.1	82.5	98.8
ชัยนาท	1,393	193,683	93.7	2.2	89.3	98.1
สระบุรี	1,473	386,008	95.0	1.3	92.5	97.6
ชลบุรี	1,491	821,683	91.3	2.2	86.9	95.7
ระยอง	1,344	361,531	90.7	2.7	85.4	96.1
จันทบุรี	1,513	336,497	93.2	1.3	90.7	95.7
ตราด	1,482	139,884	94.8	1.8	91.3	98.3
ฉะเชิงเทรา	1,484	433,890	95.8	0.9	94.0	97.7
ปราจีนบุรี	1,454	297,622	90.9	3.8	83.4	98.3
นครนายก	1,418	156,060	94.6	1.5	91.7	97.5
สระแก้ว	1,410	318,751	91.0	3.3	84.5	97.5
ราชบุรี	1,548	560,881	95.1	1.6	92.0	98.3
กาญจนบุรี	1,507	517,923	95.2	1.2	93.0	97.5
สุพรรณบุรี	1,430	545,720	92.4	2.6	87.2	97.5
นครปฐม	1,434	547,806	91.1	2.8	85.6	96.6
สมุทรสาคร	1,504	313,932	95.8	1.1	93.7	97.8
สมุทรสงคราม	1,354	116,142	88.5	3.8	81.1	95.9
เพชรบุรี	1,373	282,533	91.0	2.0	87.0	95.1
ประจวบคีรีขันธ์	1,489	320,541	96.5	0.9	94.7	98.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,515	1,704,538	93.5	1.6	90.3	96.7
บุรีรัมย์	1,590	1,089,570	97.7	0.6	96.5	99.0
สุรินทร์	1,527	890,158	93.3	2.2	88.9	97.7
ศรีสะเกษ	1,437	934,909	96.4	1.3	93.9	98.8
อุบลราชธานี	1,481	1,204,594	97.7	0.6	96.5	98.9
ยโสธร	1,534	368,106	92.5	2.3	88.1	97.0
ชัยภูมิ	1,434	709,298	89.0	4.6	79.9	98.1
อำนาจเจริญ	1,515	254,258	96.5	0.8	95.0	98.0
หนองบัวลำภู	1,537	343,098	93.7	0.9	91.9	95.5
ขอนแก่น	1,528	1,190,385	96.2	1.6	93.0	99.4
อุดรธานี	1,478	1,011,728	94.9	1.1	92.7	97.2
เลย	1,459	419,471	94.4	0.8	92.9	95.9
หนองคาย	1,507	597,072	94.1	1.3	91.5	96.6

ตารางที่ 9.2.18 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,522	655,394	95.8	1.2	93.5	98.1
ร้อยเอ็ด	1,551	932,208	96.2	1.6	93.0	99.4
กาฬสินธุ์	1,542	687,731	96.2	1.0	94.2	98.2
สกลนคร	1,501	756,293	96.0	1.2	93.5	98.4
นครพนม	1,473	441,157	91.7	2.8	86.3	97.2
มุกดาหาร	1,356	190,752	88.2	3.8	80.6	95.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,353	920,170	90.2	2.9	84.6	95.9
ลำพูน	1,443	279,439	94.1	2.3	89.7	98.6
ลำปาง	1,496	532,243	93.1	1.0	91.2	95.0
อุตรดิตถ์	1,463	304,643	93.9	1.3	91.4	96.4
แพร่	1,428	312,468	94.2	1.5	91.3	97.1
น่าน	1,461	311,930	94.3	1.7	91.0	97.5
พะเยา	1,465	330,209	93.2	1.4	90.4	96.0
เชียงราย	1,429	746,884	93.3	1.3	90.8	95.9
แม่ฮ่องสอน	1,358	119,133	93.0	1.9	89.2	96.7
นครสวรรค์	1,408	654,629	91.3	1.4	88.6	94.0
อุทัยธานี	1,428	199,681	85.6	9.1	67.6	100.0
กำแพงเพชร	1,469	463,457	93.0	2.8	87.4	98.5
ตาก	1,366	272,948	91.2	1.4	88.5	93.9
สุโขทัย	1,487	415,077	93.0	1.4	90.3	95.8
พิษณุโลก	1,425	551,028	93.5	1.2	91.1	95.9
พิจิตร	1,459	364,359	93.6	1.1	91.5	95.7
เพชรบูรณ์	1,402	594,653	90.3	2.4	85.7	95.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,491	927,649	91.7	4.0	83.8	99.7
กระบี่	1,561	275,733	95.3	1.5	92.4	98.3
พังงา	1,524	163,067	96.2	1.5	93.2	99.2
ภูเก็ต	1,477	210,213	94.7	1.3	92.1	97.2
สุราษฎร์ธานี	1,568	670,005	95.8	0.7	94.4	97.1
ระนอง	1,483	102,562	91.9	2.8	86.5	97.4
ชุมพร	1,511	323,173	94.3	1.6	91.1	97.4
สงขลา	1,440	816,566	89.8	2.4	85.1	94.4
สตูล	1,433	172,440	95.6	0.9	93.7	97.4
ตรัง	1,574	410,850	96.8	0.8	95.2	98.4
พัทลุง	1,533	334,084	94.7	0.8	93.1	96.3
ปัตตานี	1,404	364,758	97.1	1.1	95.0	99.2
ยะลา	1,492	284,198	97.6	0.6	96.5	98.7
นราธิวาส	1,463	406,820	95.0	1.4	92.4	97.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.2.19 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10,676	4,850,186	98.5	0.2	98.1	99.0
25 - 34	10,532	4,557,147	98.8	0.2	98.5	99.1
35 - 44	11,400	5,058,531	98.7	0.2	98.3	99.1
45 - 54	8,664	3,924,978	98.7	0.3	98.2	99.2
55 - 64	13,972	2,430,621	98.6	0.2	98.2	98.9
65 - 74	6,341	1,093,187	98.7	0.3	98.2	99.3
รวม	61,585	21,914,650	98.7	0.1	98.5	98.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,974	4,550,176	99.1	0.2	98.7	99.4
25 - 34	10,073	4,492,568	98.7	0.2	98.3	99.1
35 - 44	12,091	5,532,959	98.9	0.2	98.4	99.3
45 - 54	9,623	4,318,189	99.1	0.2	98.8	99.5
55 - 64	13,783	2,774,473	98.8	0.2	98.5	99.2
65 - 74	6,521	1,269,950	98.5	0.2	98.0	99.0
รวม	62,065	22,938,315	98.9	0.1	98.7	99.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	20,650	9,400,362	98.8	0.1	98.5	99.1
25 - 34	20,605	9,049,715	98.7	0.1	98.5	99.0
35 - 44	23,491	10,591,490	98.8	0.2	98.5	99.1
45 - 54	18,287	8,243,166	98.9	0.2	98.6	99.3
55 - 64	27,755	5,205,093	98.7	0.1	98.4	99.0
65 - 74	12,862	2,363,137	98.6	0.2	98.3	99.0
รวมทั้งประเทศ	123,650	44,852,965	98.8	0.1	98.6	99.0

ตารางที่ 9.2.20 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	62,763	14,806,345	98.6	0.2	98.3	99.0
นอกเขตเทศบาล	60,887	30,046,620	98.9	0.1	98.7	99.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,479	3,697,336	98.2	0.6	97.0	99.4
ภาคกลาง	40,736	11,221,692	98.7	0.2	98.4	99.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,874	15,506,765	98.7	0.1	98.4	99.0
ภาคเหนือ	27,487	8,369,470	99.0	0.1	98.7	99.2
ภาคใต้	23,074	6,057,702	99.2	0.1	99.0	99.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,825	2,009,734	98.3	0.3	97.7	99.0
เขต สคร. ที่ 2	8,148	1,573,848	99.1	0.4	98.3	99.9
เขต สคร. ที่ 3	14,707	4,084,933	98.8	0.3	98.2	99.4
เขต สคร. ที่ 4	13,056	3,553,178	98.8	0.3	98.1	99.4
เขต สคร. ที่ 5	6,612	4,801,399	99.0	0.2	98.6	99.4
เขต สคร. ที่ 6	13,031	6,235,050	98.7	0.2	98.2	99.2
เขต สคร. ที่ 7	11,231	4,470,316	98.4	0.3	97.9	99.0
เขต สคร. ที่ 8	6,495	1,907,376	98.9	0.2	98.5	99.4
เขต สคร. ที่ 9	8,086	2,394,569	98.5	0.4	97.7	99.2
เขต สคร. ที่ 10	12,906	4,067,525	99.3	0.1	99.0	99.5
เขต สคร. ที่ 11	11,616	2,971,814	99.4	0.2	99.1	99.7
เขต สคร. ที่ 12	11,458	3,085,888	99.0	0.2	98.7	99.3

ตารางที่ 9.2.21 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,479	3,697,336	98.2	0.6	97.0	99.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,646	852,206	99.0	0.4	98.2	99.8
นนทบุรี	1,646	786,868	98.4	0.3	97.8	99.0
ปทุมธานี	1,568	674,677	97.6	1.0	95.6	99.6
พระนครศรีอยุธยา	1,611	548,189	99.1	0.3	98.5	99.8
อ่างทอง	1,674	210,301	98.7	0.6	97.5	99.9
ลพบุรี	1,617	538,627	99.7	0.2	99.4	100.0
สิงห์บุรี	1,668	159,974	99.3	0.3	98.7	99.9
ชัยนาท	1,559	238,115	99.3	0.4	98.6	100.0
สระบุรี	1,630	426,831	98.2	1.4	95.4	100.0
ชลบุรี	1,640	916,851	98.5	0.7	97.1	99.9
ระยอง	1,587	419,005	97.7	1.1	95.5	99.9
จันทบุรี	1,659	372,140	99.7	0.1	99.5	100.0
ตราด	1,659	155,686	99.8	0.1	99.6	100.0
ฉะเชิงเทรา	1,646	485,184	99.3	0.4	98.6	100.0
ปราจีนบุรี	1,680	339,149	99.7	0.2	99.3	100.0
นครนายก	1,604	181,947	99.8	0.1	99.7	99.9
สระแก้ว	1,586	362,765	97.0	2.4	92.2	100.0
ราชบุรี	1,641	597,534	98.9	1.1	96.8	100.0
กาญจนบุรี	1,586	549,384	98.8	0.7	97.4	100.0
สุพรรณบุรี	1,645	615,665	98.2	1.3	95.7	100.0
นครปฐม	1,662	633,980	99.1	0.5	98.1	100.0
สมุทรสาคร	1,628	331,875	97.6	1.0	95.7	99.5
สมุทรสงคราม	1,645	142,043	98.7	0.6	97.5	99.8
เพชรบุรี	1,631	330,128	99.5	0.2	99.1	99.9
ประจวบคีรีขันธ์	1,618	352,569	99.6	0.2	99.2	100.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,628	1,856,219	98.7	0.4	97.8	99.5
บุรีรัมย์	1,660	1,114,046	98.9	0.4	98.1	99.7
สุรินทร์	1,678	994,828	99.3	0.4	98.6	100.0
ศรีสะเกษ	1,594	1,029,073	99.0	0.3	98.4	99.6
อุบลราชธานี	1,601	1,269,133	99.7	0.2	99.2	100.0
ยโสธร	1,632	392,565	95.9	1.6	92.8	99.0
ชัยภูมิ	1,646	836,306	99.5	0.3	98.8	100.0
อำนาจเจริญ	1,640	269,906	98.8	0.3	98.1	99.5
หนองบัวลำภู	1,636	361,281	98.1	0.6	97.0	99.2
ขอนแก่น	1,654	1,301,871	99.7	0.2	99.3	100.0
อุดรธานี	1,605	1,103,767	98.9	0.4	98.1	99.6
เลย	1,652	458,179	99.0	0.3	98.4	99.6
หนองคาย	1,605	643,809	99.0	0.2	98.6	99.4

ตารางที่ 9.2.21 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,624	676,511	97.4	1.2	95.1	99.7
ร้อยเอ็ด	1,677	986,238	99.4	0.3	98.8	100.0
กาฬสินธุ์	1,578	703,395	96.7	1.4	94.0	99.5
สกลนคร	1,628	808,860	98.1	0.9	96.3	99.9
นครพนม	1,618	483,521	97.6	1.0	95.5	99.6
มุกดาหาร	1,518	217,258	95.8	2.0	91.9	99.7
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,579	1,119,176	99.4	0.2	99.0	99.8
ลำพูน	1,650	314,430	99.7	0.1	99.4	100.0
ลำปาง	1,641	583,505	99.1	0.3	98.5	99.8
อุตรดิตถ์	1,642	342,115	99.1	0.3	98.6	99.7
แพร่	1,670	363,106	99.6	0.2	99.1	100.0
น่าน	1,636	340,462	99.2	0.6	98.0	100.0
พะเยา	1,619	367,333	98.8	0.4	98.1	99.5
เชียงราย	1,650	851,937	99.4	0.3	98.8	100.0
แม่ฮ่องสอน	1,461	127,576	97.2	1.3	94.8	99.7
นครสวรรค์	1,590	736,343	98.3	0.4	97.5	99.2
อุทัยธานี	1,648	239,255	98.9	0.5	97.9	99.9
กำแพงเพชร	1,637	527,142	99.6	0.2	99.2	100.0
ตาก	1,579	309,741	98.8	0.4	97.9	99.7
สุโขทัย	1,659	451,756	98.4	0.8	96.8	100.0
พิษณุโลก	1,649	625,063	99.2	0.3	98.6	99.9
พิจิตร	1,620	404,635	99.2	0.2	98.8	99.7
เพชรบูรณ์	1,557	665,895	97.3	1.3	94.7	99.8
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,636	1,075,809	99.3	0.3	98.7	100.0
กระบี่	1,682	298,773	98.8	0.5	97.8	99.8
พังงา	1,642	178,158	99.7	0.1	99.5	100.0
ภูเก็ต	1,613	229,244	98.8	0.5	97.9	99.7
สุราษฎร์ธานี	1,677	718,298	99.8	0.1	99.6	100.0
ระนอง	1,687	118,290	99.1	0.3	98.5	99.8
ชุมพร	1,679	353,242	99.6	0.3	99.0	100.0
สงขลา	1,642	932,706	98.7	0.3	98.1	99.3
สตูล	1,635	199,634	99.1	0.4	98.3	99.9
ตรัง	1,680	438,446	99.4	0.4	98.6	100.0
พัทลุง	1,695	372,536	99.4	0.2	99.0	99.8
ปัตตานี	1,618	404,667	99.2	0.3	98.7	99.8
ยะลา	1,609	297,172	98.1	0.9	96.4	99.9
นราธิวาส	1,579	440,726	99.4	0.2	99.0	99.7

ตารางที่ 9.2.22 ความซุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับหนักจะทำให้ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,927	4,508,433	97.0	0.5	96.2	97.9
25 - 34	9,906	4,299,707	97.7	0.2	97.3	98.2
35 - 44	10,778	4,805,078	97.3	0.2	96.8	97.8
45 - 54	8,248	3,743,915	97.4	0.3	96.8	98.0
55 - 64	13,300	2,312,963	97.1	0.3	96.6	97.6
65 - 74	5,975	1,028,901	97.0	0.3	96.4	97.6
รวม	58,134	20,698,997	97.3	0.2	97.0	97.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,339	4,295,344	97.7	0.3	97.2	98.2
25 - 34	9,459	4,209,574	97.1	0.3	96.5	97.7
35 - 44	11,397	5,268,156	97.5	0.2	97.1	97.9
45 - 54	9,104	4,093,515	97.1	0.3	96.5	97.7
55 - 64	12,918	2,593,048	96.7	0.3	96.3	97.2
65 - 74	6,007	1,169,371	95.6	0.4	94.9	96.4
รวม	58,224	21,629,008	97.2	0.2	96.9	97.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	19,266	8,803,778	97.4	0.3	96.8	97.9
25 - 34	19,365	8,509,281	97.4	0.2	97.0	97.8
35 - 44	22,175	10,073,234	97.4	0.2	97.1	97.8
45 - 54	17,352	7,837,430	97.2	0.2	96.8	97.7
55 - 64	26,218	4,906,011	96.9	0.2	96.5	97.3
65 - 74	11,982	2,198,272	96.3	0.3	95.8	96.8
รวมทั้งประเทศ	116,358	42,328,004	97.3	0.1	97.0	97.5



ตารางที่ 9.2.23 ความซุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับหนึ่งจะทำให้ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	59,227	14,124,351	97.7	0.2	97.4	98.1
นอกเขตเทศบาล	57,131	28,203,653	97.0	0.2	96.7	97.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,461	3,677,187	99.1	0.3	98.5	99.7
ภาคกลาง	38,678	10,672,248	97.7	0.2	97.3	98.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	28,981	14,519,885	96.7	0.3	96.1	97.3
ภาคเหนือ	25,901	7,850,228	96.8	0.3	96.3	97.4
ภาคใต้	21,337	5,608,455	97.3	0.3	96.8	97.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,568	1,900,308	97.7	0.3	97.2	98.3
เขต สคร. ที่ 2	7,765	1,495,804	97.4	0.7	96.1	98.7
เขต สคร. ที่ 3	13,911	3,899,526	97.8	0.3	97.2	98.4
เขต สคร. ที่ 4	12,434	3,376,610	97.6	0.4	96.9	98.4
เขต สคร. ที่ 5	6,187	4,468,462	96.7	0.5	95.7	97.7
เขต สคร. ที่ 6	12,224	5,892,867	96.6	0.5	95.6	97.5
เขต สคร. ที่ 7	10,570	4,158,556	96.8	0.6	95.7	97.9
เขต สคร. ที่ 8	6,199	1,795,708	96.9	1.0	95.0	98.8
เขต สคร. ที่ 9	7,569	2,249,095	96.2	0.5	95.3	97.1
เขต สคร. ที่ 10	12,133	3,805,425	97.2	0.3	96.6	97.8
เขต สคร. ที่ 11	10,973	2,781,920	97.5	0.4	96.8	98.3
เขต สคร. ที่ 12	10,364	2,826,536	97.1	0.4	96.4	97.8

ตารางที่ 9.2.24 ความซุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับหนักจะทำให้ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,461	3,677,187	99.1	0.3	98.5	99.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,601	829,395	98.6	0.4	97.8	99.4
นนทบุรี	1,522	736,325	96.9	0.5	95.9	97.9
ปทุมธานี	1,525	657,417	98.1	0.3	97.5	98.8
พระนครศรีอยุธยา	1,521	506,567	98.4	0.5	97.3	99.4
อ่างทอง	1,554	197,314	95.4	3.5	88.5	100.0
ลพบุรี	1,528	509,669	97.6	0.7	96.2	98.9
สิงห์บุรี	1,625	156,376	99.0	0.3	98.3	99.7
ชัยนาท	1,501	226,271	98.8	0.4	98.0	99.6
สระบุรี	1,557	406,174	96.8	1.4	94.1	99.5
ชลบุรี	1,590	890,000	97.7	1.1	95.6	99.9
ระยอง	1,528	408,641	98.7	0.3	98.2	99.3
จันทบุรี	1,526	343,781	96.3	0.7	95.0	97.6
ตราด	1,579	145,227	97.8	1.1	95.7	99.9
ฉะเชิงเทรา	1,554	456,943	98.6	0.5	97.7	99.5
ปราจีนบุรี	1,585	322,104	97.0	0.9	95.3	98.7
นครนายก	1,451	159,339	96.6	0.9	94.8	98.4
สระแก้ว	1,497	344,095	96.4	1.1	94.2	98.5
ราชบุรี	1,559	562,804	97.7	1.4	95.0	100.0
กาญจนบุรี	1,558	539,250	98.2	0.7	96.8	99.6
สุพรรณบุรี	1,573	583,257	97.6	0.9	95.9	99.4
นครปฐม	1,573	606,331	97.8	0.7	96.3	99.2
สมุทรสาคร	1,569	320,662	97.3	1.1	95.3	99.4
สมุทรสงคราม	1,552	130,825	97.4	1.0	95.5	99.2
เพชรบุรี	1,504	301,510	96.8	1.1	94.7	98.9
ประจวบคีรีขันธ์	1,546	331,972	97.6	0.7	96.2	98.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,498	1,680,565	96.3	0.9	94.5	98.1
บุรีรัมย์	1,570	1,072,938	96.8	0.8	95.3	98.3
สุรินทร์	1,583	935,505	96.4	1.5	93.4	99.4
ศรีสะเกษ	1,459	932,765	96.7	0.9	95.0	98.5
อุบลราชธานี	1,528	1,211,333	99.0	0.4	98.2	99.7
ยโสธร	1,532	362,359	91.2	4.8	81.6	100.0
ชัยภูมิ	1,536	779,455	98.0	0.5	97.0	99.1
อำนาจเจริญ	1,548	255,246	98.1	0.4	97.3	98.9
หนองบัวลำภู	1,530	343,066	94.8	1.1	92.7	96.9
ขอนแก่น	1,547	1,229,986	98.1	0.4	97.3	99.0
อุดรธานี	1,506	1,026,958	95.8	1.6	92.6	98.9
เลย	1,548	430,750	97.3	0.6	96.2	98.4
หนองคาย	1,547	620,139	98.0	0.4	97.1	98.8

ตารางที่ 9.2.24 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับหนัก จะทำให้ ความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,490	631,238	94.4	1.8	91.0	97.9
ร้อยเอ็ด	1,580	942,241	96.5	1.8	93.0	100.0
กาฬสินธุ์	1,476	668,489	96.3	1.3	93.7	98.8
สกลนคร	1,517	729,201	97.1	0.9	95.3	98.9
นครพนม	1,547	460,842	96.0	1.3	93.5	98.6
มุกดาหาร	1,439	206,811	95.1	1.9	91.4	98.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,470	1,046,681	98.1	0.5	97.1	99.1
ลำพูน	1,540	296,660	98.8	0.4	98.0	99.6
ลำปาง	1,517	539,115	97.1	0.6	95.9	98.4
อุตรดิตถ์	1,568	328,781	97.9	0.5	96.9	99.0
แพร่	1,573	338,784	97.5	0.7	96.2	98.8
น่าน	1,545	318,968	96.3	1.3	93.7	98.9
พะเยา	1,501	340,608	94.8	2.0	90.8	98.8
เชียงราย	1,555	800,460	96.7	0.6	95.6	97.8
แม่ฮ่องสอน	1,432	124,149	96.8	1.3	94.3	99.4
นครสวรรค์	1,537	681,225	95.3	1.9	91.5	99.0
อุทัยธานี	1,597	234,854	98.9	0.3	98.3	99.4
กำแพงเพชร	1,514	491,767	97.7	0.5	96.7	98.6
ตาก	1,446	271,252	96.3	0.8	94.8	97.8
สุโขทัย	1,551	425,317	95.8	0.9	94.1	97.5
พิษณุโลก	1,543	586,934	96.9	0.9	95.2	98.6
พิจิตร	1,551	387,861	97.7	0.7	96.3	99.2
เพชรบูรณ์	1,461	636,812	95.0	1.3	92.3	97.6
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,526	999,627	97.6	0.7	96.3	98.9
กระบี่	1,617	290,519	99.0	0.3	98.3	99.7
พังงา	1,521	158,308	96.9	1.4	94.1	99.6
ภูเก็ต	1,490	210,180	97.0	0.8	95.5	98.6
สุราษฎร์ธานี	1,562	667,506	96.5	1.0	94.5	98.5
ระนอง	1,627	113,683	97.5	1.1	95.3	99.7
ชุมพร	1,630	342,096	98.8	0.5	97.9	99.8
สงขลา	1,537	876,007	97.0	0.8	95.4	98.5
สตูล	1,488	177,500	97.5	1.2	95.2	99.8
ตรัง	1,588	421,291	97.4	1.2	95.1	99.8
พัทลุง	1,539	336,140	96.5	0.7	95.2	97.8
ปัตตานี	1,372	355,720	97.0	1.2	94.6	99.4
ยะลา	1,461	270,603	97.8	0.7	96.5	99.2
นราธิวาส	1,379	389,274	97.0	0.9	95.3	98.6

ตารางที่ 9.2.25 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	6,229	2,895,057	57.1	1.2	54.6	59.5
25 - 34	6,605	2,934,612	61.8	1.0	59.8	63.7
35 - 44	7,085	3,197,465	60.3	1.0	58.4	62.3
45 - 54	5,599	2,580,946	63.2	1.3	60.7	65.8
55 - 64	9,029	1,582,691	62.2	0.9	60.4	63.9
65 - 74	4,026	699,076	60.7	1.3	58.2	63.2
รวม	38,573	13,889,847	60.6	0.8	59.0	62.2
<b>หญิง</b>						
15 - 24	6,088	2,833,296	59.8	1.1	57.7	62.0
25 - 34	6,466	2,894,005	62.1	1.0	60.1	64.1
35 - 44	7,821	3,642,161	63.3	0.9	61.6	65.1
45 - 54	6,345	2,830,765	62.8	1.1	60.6	64.9
55 - 64	9,001	1,799,291	62.0	1.0	60.1	63.9
65 - 74	4,117	808,134	60.1	1.2	57.8	62.3
รวม	39,838	14,807,651	62.0	0.7	60.5	63.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	12,317	5,728,353	58.4	1.0	56.4	60.4
25 - 34	13,071	5,828,617	62.0	0.8	60.3	63.6
35 - 44	14,906	6,839,626	61.9	0.8	60.3	63.4
45 - 54	11,944	5,411,711	63.0	1.0	61.1	64.9
55 - 64	18,030	3,381,982	62.1	0.8	60.5	63.7
65 - 74	8,143	1,507,209	60.4	0.9	58.5	62.2
รวมทั้งประเทศ	78,411	28,697,498	61.3	0.7	59.9	62.7

ตารางที่ 9.2.26 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	40,008	9,636,527	62.0	1.0	59.9	64.0
นอกเขตเทศบาล	38,403	19,060,971	61.0	0.9	59.2	62.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,067	2,648,677	66.4	3.1	60.1	72.7
ภาคกลาง	25,557	7,072,987	60.4	1.2	58.1	62.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19,892	10,192,066	63.4	1.4	60.7	66.0
ภาคเหนือ	16,681	4,918,492	56.2	1.4	53.4	59.0
ภาคใต้	15,214	3,865,275	61.6	1.5	58.7	64.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,129	1,253,556	59.2	2.9	53.4	64.9
เขต สคร. ที่ 2	5,146	1,002,758	61.5	2.6	56.4	66.7
เขต สคร. ที่ 3	9,202	2,605,900	61.2	1.9	57.5	65.0
เขต สคร. ที่ 4	8,080	2,210,773	59.7	2.3	55.2	64.2
เขต สคร. ที่ 5	4,230	2,998,995	60.9	2.2	56.5	65.3
เขต สคร. ที่ 6	8,690	4,366,545	67.3	2.0	63.3	71.3
เขต สคร. ที่ 7	6,972	2,826,526	60.5	2.7	55.3	65.7
เขต สคร. ที่ 8	4,072	1,144,710	57.4	2.9	51.6	63.2
เขต สคร. ที่ 9	4,770	1,429,690	56.5	3.0	50.7	62.3
เขต สคร. ที่ 10	7,839	2,344,092	55.5	1.9	51.7	59.2
เขต สคร. ที่ 11	8,091	1,969,115	64.8	2.5	59.8	69.7
เขต สคร. ที่ 12	7,123	1,896,160	58.7	1.7	55.3	62.0

ตารางที่ 9.2.27 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,067	2,648,677	66.4	3.1	60.1	72.7
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,145	592,295	67.0	4.7	57.7	76.2
นนทบุรี	1,046	514,006	62.5	4.0	54.7	70.3
ปทุมธานี	983	378,743	52.4	5.0	42.5	62.3
พระนครศรีอยุธยา	1,100	360,807	62.9	3.8	55.5	70.4
อ่างทอง	1,013	138,458	63.8	4.1	55.7	72.0
ลพบุรี	980	341,292	61.1	4.1	53.2	69.1
สิงห์บุรี	1,086	107,970	66.5	4.5	57.6	75.4
ชัยนาท	965	129,125	51.8	8.7	34.7	68.9
สระบุรี	1,102	285,913	64.5	5.6	53.6	75.4
ชลบุรี	1,063	592,265	62.2	4.9	52.6	71.8
ระยอง	978	275,639	61.4	4.7	52.1	70.6
จันทบุรี	900	205,061	53.9	2.6	48.8	59.0
ตราด	1,119	104,492	66.0	7.9	50.6	81.5
ฉะเชิงเทรา	1,066	322,322	64.4	5.8	53.0	75.9
ปราจีนบุรี	994	218,367	63.5	4.5	54.7	72.3
นครนายก	983	98,736	52.1	4.9	42.6	61.7
สระแก้ว	954	196,722	49.4	6.3	37.1	61.7
ราชบุรี	1,041	379,034	61.0	3.6	53.9	68.1
กาญจนบุรี	895	311,454	54.4	7.0	40.7	68.1
สุพรรณบุรี	1,018	402,369	62.5	6.1	50.5	74.5
นครปฐม	1,120	421,665	65.0	7.3	50.6	79.4
สมุทรสาคร	1,112	210,606	59.1	3.6	51.9	66.2
สมุทรสงคราม	880	71,916	48.4	5.9	36.8	59.9
เพชรบุรี	891	178,736	52.4	5.6	41.3	63.4
ประจวบคีรีขันธ์	1,123	234,990	63.3	6.7	50.1	76.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,026	1,071,404	56.0	2.9	50.3	61.6
บุรีรัมย์	1,165	821,143	72.0	4.3	63.4	80.5
สุรินทร์	1,116	654,987	64.7	4.5	55.8	73.6
ศรีสะเกษ	878	625,407	58.8	5.8	47.5	70.2
อุบลราชธานี	1,201	1,000,119	76.2	4.5	67.3	85.0
ยโสธร	1,139	265,526	64.0	7.3	49.6	78.4
ชัยภูมิ	923	451,462	52.9	6.6	39.8	65.9
อำนาจเจริญ	923	152,198	54.3	4.5	45.5	63.2
หนองบัวลำภู	969	210,828	55.6	2.6	50.5	60.8
ขอนแก่น	1,164	919,105	68.4	3.7	61.1	75.7
อุดรธานี	1,132	777,053	68.1	4.5	59.2	77.0
เลย	1,016	298,385	63.5	4.0	55.6	71.4
หนองคาย	998	409,882	60.9	4.3	52.5	69.4

ตารางที่ 9.2.27 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,066	467,363	64.2	5.9	52.6	75.7
ร้อยเอ็ด	1,189	779,320	77.4	6.5	64.6	90.3
กาฬสินธุ์	1,156	504,608	67.5	3.3	61.0	73.9
สกลนคร	921	396,316	47.0	8.0	31.2	62.8
นครพนม	1,069	276,403	53.9	6.3	41.6	66.2
มุกดาหาร	841	110,557	45.3	7.6	30.5	60.2
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	846	561,209	47.8	4.7	38.5	57.1
ลำพูน	1,093	213,793	66.9	4.5	58.0	75.7
ลำปาง	1,044	372,797	61.5	4.8	52.1	70.9
อุตรดิตถ์	1,070	221,271	62.6	4.2	54.4	70.9
แพร่	1,083	234,928	63.6	4.2	55.3	71.9
น่าน	926	194,592	54.0	7.3	39.6	68.5
พะเยา	1,006	225,114	58.8	4.0	50.9	66.8
เชียงราย	925	466,458	53.8	3.4	47.0	60.5
แม่ฮ่องสอน	916	75,201	52.0	5.6	41.0	63.0
นครสวรรค์	999	426,138	53.7	4.9	44.0	63.4
อุทัยธานี	1,076	150,303	60.8	7.6	45.9	75.7
กำแพงเพชร	936	310,033	57.4	3.8	50.0	64.9
ตาก	851	154,687	46.5	7.1	32.5	60.5
สุโขทัย	969	262,194	56.2	6.1	44.3	68.1
พิษณุโลก	976	384,880	59.5	6.2	47.2	71.7
พิจิตร	1,061	258,236	62.5	5.1	52.5	72.5
เพชรบูรณ์	904	406,657	55.6	6.5	42.8	68.4
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,079	655,348	59.1	5.7	47.9	70.2
กระบี่	1,270	215,381	70.6	5.1	60.6	80.6
พังงา	1,180	131,243	71.0	6.7	57.8	84.2
ภูเก็ต	1,145	160,416	67.9	4.3	59.4	76.3
สุราษฎร์ธานี	1,137	472,752	65.2	3.4	58.6	71.8
ระนอง	1,145	76,297	63.1	4.8	53.6	72.6
ชุมพร	1,135	257,678	71.8	6.1	59.9	83.7
สงขลา	1,008	581,061	60.0	3.5	53.1	67.0
สตูล	991	113,982	55.8	6.1	43.8	67.8
ตรัง	1,256	324,182	71.6	4.4	63.0	80.3
พัทลุง	929	190,851	50.2	3.0	44.2	56.2
ปัตตานี	925	255,476	61.0	3.7	53.7	68.3
ยะลา	1,075	201,732	62.6	4.6	53.4	71.7
นราธิวาส	939	228,876	47.2	5.7	36.0	58.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหรือรู้สึกอึดอัดแบบจุก หรือถูกบีบเค้น หรือถูกของทับ ที่หน้าอก และมีอาการปวดร้าวไปที่กราม คอ หรือหลัง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,748	3,924,054	89.0	1.0	87.1	90.9
25 - 34	8,851	3,810,549	90.7	0.8	89.2	92.2
35 - 44	9,660	4,320,276	91.7	0.6	90.6	92.8
45 - 54	7,420	3,345,231	91.1	0.7	89.6	92.5
55 - 64	12,184	2,115,254	92.4	0.5	91.3	93.4
65 - 74	5,428	926,111	92.1	0.7	90.6	93.5
รวม	52,291	18,441,476	90.9	0.5	89.9	91.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,342	3,798,428	90.7	0.7	89.3	92.1
25 - 34	8,721	3,851,748	92.6	0.6	91.4	93.8
35 - 44	10,450	4,792,695	92.5	0.5	91.5	93.6
45 - 54	8,384	3,801,167	93.1	0.6	92.0	94.3
55 - 64	12,003	2,401,117	92.5	0.6	91.4	93.7
65 - 74	5,585	1,098,647	92.9	0.7	91.6	94.3
รวม	53,485	19,743,802	92.3	0.4	91.5	93.1
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	17,090	7,722,482	89.8	0.7	88.4	91.2
25 - 34	17,572	7,662,297	91.6	0.6	90.5	92.8
35 - 44	20,110	9,112,971	92.1	0.5	91.2	93.0
45 - 54	15,804	7,146,398	92.2	0.6	91.0	93.3
55 - 64	24,187	4,516,371	92.4	0.4	91.6	93.3
65 - 74	11,013	2,024,758	92.5	0.5	91.5	93.6
รวมทั้งประเทศ	105,776	38,185,279	91.6	0.4	90.8	92.4



ตารางที่ 9.3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหรือรู้สึกอึดอัดแบบจุก หรือถูกบีบเค้น หรือถูกของทับ ที่หน้าอก และมีอาการปวดร้าวไปที่กราม คอ หรือหลัง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	53,666	12,616,716	91.9	0.6	90.6	93.1
นอกเขตเทศบาล	52,110	25,568,562	91.5	0.5	90.4	92.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,251	3,129,058	92.0	2.0	87.8	96.1
ภาคกลาง	34,701	9,509,481	92.6	0.6	91.5	93.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,468	13,092,477	90.3	0.9	88.5	92.0
ภาคเหนือ	23,344	7,128,412	91.6	0.8	90.0	93.1
ภาคใต้	20,012	5,325,851	93.2	0.7	91.8	94.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,119	1,686,925	92.3	1.3	89.9	94.8
เขต สคร. ที่ 2	6,773	1,290,158	92.3	1.5	89.4	95.1
เขต สคร. ที่ 3	12,441	3,463,396	91.5	1.1	89.3	93.6
เขต สคร. ที่ 4	11,368	3,069,002	94.1	0.7	92.9	95.4
เขต สคร. ที่ 5	5,482	3,854,114	87.8	2.3	83.2	92.4
เขต สคร. ที่ 6	11,223	5,351,904	90.6	1.1	88.4	92.8
เขต สคร. ที่ 7	9,763	3,886,459	92.3	1.0	90.3	94.4
เขต สคร. ที่ 8	5,433	1,596,929	89.4	2.1	85.3	93.6
เขต สคร. ที่ 9	6,874	2,079,136	91.8	0.9	90.0	93.7
เขต สคร. ที่ 10	11,037	3,452,347	92.5	1.1	90.4	94.5
เขต สคร. ที่ 11	10,190	2,656,314	94.3	0.9	92.5	96.0
เขต สคร. ที่ 12	9,822	2,669,536	92.2	1.0	90.1	94.2

ตารางที่ 9.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหรือรู้สึกอึดอัดแบบจุก หรือถูกบีบเค้น หรือถูกของทับ ที่หน้าอก และมีอาการปวดร้าวไปที่กราม คอ หรือหลัง เป็นอาการจุกเจ็บ/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,251	3,129,058	92.0	2.0	87.8	96.1
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,326	680,075	86.9	3.3	80.5	93.4
นนทบุรี	1,355	673,620	91.4	2.4	86.6	96.2
ปทุมธานี	1,404	578,295	91.9	2.1	87.8	96.1
พระนครศรีอยุธยา	1,360	435,009	94.3	1.2	92.1	96.6
อ่างทอง	1,331	168,900	91.9	3.0	86.1	97.7
ลพบุรี	1,272	429,129	91.0	2.9	85.3	96.7
สิงห์บุรี	1,421	135,659	95.7	1.2	93.3	98.1
ชัยนาท	1,374	209,257	95.6	1.2	93.3	97.8
สระบุรี	1,375	347,213	90.9	3.5	84.0	97.9
ชลบุรี	1,404	801,546	91.9	2.6	86.8	97.0
ระยอง	1,372	369,418	93.1	2.4	88.5	97.8
จันทบุรี	1,410	308,432	91.9	1.7	88.5	95.3
ตราด	1,381	131,267	95.8	1.2	93.4	98.2
ฉะเชิงเทรา	1,475	425,997	95.9	1.8	92.3	99.4
ปราจีนบุรี	1,412	294,917	93.4	1.8	89.9	96.9
นครนายก	1,319	148,789	94.9	1.2	92.5	97.3
สระแก้ว	1,342	302,954	87.6	5.1	77.6	97.5
ราชบุรี	1,440	523,987	92.9	2.4	88.3	97.5
กาญจนบุรี	1,309	456,652	94.5	1.4	91.7	97.4
สุพรรณบุรี	1,396	493,103	95.0	0.9	93.1	96.8
นครปฐม	1,534	589,058	96.9	0.8	95.4	98.4
สมุทรสาคร	1,416	298,933	92.9	2.2	88.6	97.2
สมุทรสงคราม	1,469	121,601	94.8	1.2	92.5	97.1
เพชรบุรี	1,365	280,249	91.7	1.7	88.4	95.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,439	305,419	92.5	3.0	86.7	98.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,335	1,447,483	86.6	2.1	82.5	90.8
บุรีรัมย์	1,417	896,737	83.8	8.2	67.6	100.0
สุรินทร์	1,408	837,431	91.9	3.2	85.7	98.2
ศรีสะเกษ	1,309	870,665	91.3	3.4	84.7	97.9
อุบลราชธานี	1,509	1,196,853	96.8	0.9	95.0	98.6
ยโสธร	1,483	352,786	91.1	2.6	85.9	96.2
ชัยภูมิ	1,322	672,462	91.3	1.9	87.5	95.1
อำนาจเจริญ	1,339	210,077	84.8	4.0	76.9	92.8
หนองบัวลำภู	1,508	334,685	91.7	1.4	88.9	94.5
ขอนแก่น	1,406	1,110,247	91.0	2.1	86.8	95.1
อุดรธานี	1,356	871,470	87.0	3.3	80.6	93.4
เลย	1,353	380,429	89.9	1.4	87.2	92.6
หนองคาย	1,341	529,853	91.6	1.6	88.5	94.8

ตารางที่ 9.3.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการปวดหรือรู้สึกอึดอัดแบบจุก หรือถูกบีบเค้น หรือถูกของทับ ที่หน้าอก และมีอาการปวดร้าวไปที่กราม คอ หรือหลัง เป็นอาการจุกเงิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,378	597,348	89.9	5.0	80.1	99.7
ร้อยเอ็ด	1,490	910,689	94.5	2.6	89.4	99.6
กาฬสินธุ์	1,391	617,182	89.4	2.8	83.8	95.0
สกลนคร	1,361	647,302	92.5	1.9	88.8	96.2
นครพนม	1,406	418,119	88.7	3.4	82.1	95.3
มุกดาหาร	1,356	190,656	89.7	4.2	81.5	97.9
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,316	913,690	89.6	3.3	83.1	96.1
ลำพูน	1,501	289,182	95.8	0.9	94.0	97.6
ลำปาง	1,491	527,344	95.6	1.3	93.0	98.1
อุตรดิตถ์	1,325	283,120	92.2	1.3	89.6	94.8
แพร่	1,464	320,091	96.1	1.0	94.1	98.1
น่าน	1,357	287,980	95.6	1.0	93.7	97.5
พะเยา	1,312	296,305	85.2	4.0	77.2	93.1
เชียงราย	1,395	707,443	93.7	1.3	91.1	96.3
แม่ฮ่องสอน	1,201	110,313	89.6	2.6	84.4	94.8
นครสวรรค์	1,410	596,617	87.8	4.7	78.6	97.1
อุทัยธานี	1,348	207,402	90.8	2.6	85.7	95.9
กำแพงเพชร	1,388	453,879	92.0	1.7	88.6	95.4
ตาก	1,313	253,043	89.3	2.5	84.5	94.2
สุโขทัย	1,442	403,450	93.1	1.4	90.4	95.9
พิษณุโลก	1,390	532,810	91.1	2.5	86.2	95.9
พิจิตร	1,287	339,031	88.1	2.2	83.7	92.4
เพชรบูรณ์	1,404	606,713	92.6	1.8	89.0	96.1
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,444	991,917	94.4	2.0	90.4	98.3
กระบี่	1,559	281,499	96.7	0.8	95.1	98.2
พังงา	1,327	135,257	91.8	3.1	85.7	97.9
ภูเก็ต	1,374	193,290	91.5	2.8	86.1	97.0
สุราษฎร์ธานี	1,517	647,518	95.2	1.1	92.9	97.4
ระนอง	1,543	105,497	94.1	1.2	91.8	96.5
ชุมพร	1,426	301,336	92.9	2.7	87.5	98.3
สงขลา	1,395	800,423	89.5	2.7	84.3	94.8
สตูล	1,407	169,623	94.7	1.5	91.7	97.6
ตรัง	1,472	384,078	90.8	3.1	84.8	96.8
พัทลุง	1,433	317,961	92.7	1.8	89.1	96.4
ปัตตานี	1,355	344,026	95.5	1.3	92.9	98.1
ยะลา	1,396	262,357	95.0	1.4	92.3	97.7
นราธิวาส	1,364	391,067	92.8	1.8	89.4	96.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.3.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การรู้สึกหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลม และมือเท้าเย็น เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,344	3,757,297	85.6	0.9	84.0	87.3
25 - 34	8,618	3,736,746	88.7	0.8	87.1	90.2
35 - 44	9,426	4,207,036	89.4	0.6	88.2	90.7
45 - 54	7,257	3,312,723	89.3	0.8	87.9	90.8
55 - 64	11,963	2,085,705	90.5	0.6	89.4	91.6
65 - 74	5,372	919,337	90.2	0.8	88.6	91.7
รวม	50,980	18,018,845	88.6	0.5	87.5	89.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,053	3,756,326	88.8	0.7	87.4	90.1
25 - 34	8,469	3,769,665	90.5	0.7	89.2	91.8
35 - 44	10,218	4,694,154	90.8	0.6	89.7	91.9
45 - 54	8,217	3,712,158	91.5	0.6	90.2	92.8
55 - 64	11,894	2,391,286	91.9	0.6	90.8	93.0
65 - 74	5,567	1,094,904	91.6	0.6	90.5	92.8
รวม	52,418	19,418,494	90.6	0.5	89.7	91.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	16,397	7,513,624	87.2	0.6	85.9	88.4
25 - 34	17,087	7,506,411	89.6	0.6	88.4	90.8
35 - 44	19,644	8,901,190	90.2	0.5	89.1	91.2
45 - 54	15,474	7,024,882	90.5	0.6	89.3	91.6
55 - 64	23,857	4,476,992	91.2	0.5	90.3	92.2
65 - 74	10,939	2,014,241	91.0	0.5	89.9	92.0
รวมทั้งประเทศ	103,398	37,437,339	89.6	0.4	88.8	90.5

ตารางที่ 9.3.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การรู้สึกหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลม และมือเท้าเย็น เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	52,489	12,330,577	89.8	0.7	88.5	91.2
นอกเขตเทศบาล	50,909	25,106,761	89.6	0.6	88.4	90.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,223	3,062,840	90.3	2.3	85.6	95.0
ภาคกลาง	33,257	9,067,387	88.5	0.7	87.0	90.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,599	13,270,161	90.3	0.9	88.5	92.1
ภาคเหนือ	22,795	6,908,680	89.5	0.7	88.1	90.9
ภาคใต้	19,524	5,128,271	89.9	0.8	88.3	91.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,017	1,629,718	88.8	1.7	85.4	92.1
เขต สคร. ที่ 2	6,432	1,220,499	87.2	2.0	83.3	91.1
เขต สคร. ที่ 3	12,055	3,324,413	88.1	1.5	85.2	91.0
เขต สคร. ที่ 4	10,753	2,892,757	89.4	1.0	87.4	91.3
เขต สคร. ที่ 5	5,597	3,989,504	88.5	2.3	84.0	93.1
เขต สคร. ที่ 6	11,272	5,412,470	90.7	1.1	88.5	92.9
เขต สคร. ที่ 7	9,730	3,868,187	91.5	1.1	89.3	93.7
เขต สคร. ที่ 8	5,258	1,553,724	87.5	1.3	84.9	90.1
เขต สคร. ที่ 9	6,735	2,037,167	89.8	1.1	87.6	92.0
เขต สคร. ที่ 10	10,802	3,317,789	90.3	1.1	88.1	92.4
เขต สคร. ที่ 11	9,819	2,499,294	89.2	1.3	86.6	91.8
เขต สคร. ที่ 12	9,705	2,628,977	90.5	1.0	88.6	92.4

ตารางที่ 9.3.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การรู้สึกหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลม และมือเท้าเย็น เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,223	3,062,840	90.3	2.3	85.6	95.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,306	639,484	82.3	4.6	73.4	91.3
นนทบุรี	1,263	624,473	84.3	3.9	76.5	92.0
ปทุมธานี	1,386	558,915	90.6	2.2	86.4	94.9
พระนครศรีอยุธยา	1,368	446,331	93.4	1.6	90.3	96.6
อ่างทอง	1,350	174,622	91.5	1.6	88.4	94.6
ลพบุรี	1,249	417,217	87.9	2.6	82.9	92.9
สิงห์บุรี	1,225	116,853	85.1	3.8	77.7	92.6
ชัยนาท	1,298	177,727	82.6	8.8	65.4	99.9
สระบุรี	1,310	334,080	87.4	3.7	80.2	94.7
ชลบุรี	1,320	765,756	88.4	3.3	81.9	94.9
ระยอง	1,314	359,285	91.4	2.0	87.5	95.3
จันทบุรี	1,363	294,480	86.7	2.7	81.4	92.1
ตราด	1,340	127,830	93.6	2.0	89.6	97.5
ฉะเชิงเทรา	1,389	411,794	92.4	1.7	89.0	95.7
ปราจีนบุรี	1,400	282,964	89.7	1.8	86.2	93.3
นครนายก	1,332	149,867	93.7	1.3	91.0	96.3
สระแก้ว	1,291	292,953	85.9	6.0	74.2	97.7
ราชบุรี	1,372	500,846	89.1	2.6	84.0	94.3
กาญจนบุรี	1,223	432,402	90.0	2.5	85.1	95.0
สุพรรณบุรี	1,267	423,280	85.3	3.5	78.4	92.3
นครปฐม	1,489	566,463	91.7	2.1	87.6	95.8
สมุทรสาคร	1,363	290,683	91.1	2.4	86.3	95.9
สมุทรสงคราม	1,325	112,843	88.5	2.5	83.6	93.4
เพชรบุรี	1,273	261,646	87.1	2.4	82.4	91.9
ประจวบคีรีขันธ์	1,441	304,594	91.1	2.3	86.6	95.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,367	1,504,797	87.4	2.2	83.1	91.8
บุรีรัมย์	1,431	920,097	84.9	8.5	68.3	100.0
สุรินทร์	1,425	854,792	91.9	2.6	86.8	97.0
ศรีสะเกษ	1,313	860,378	90.6	3.5	83.6	97.5
อุบลราชธานี	1,491	1,197,134	96.2	1.0	94.2	98.2
ยโสธร	1,426	333,373	85.4	5.6	74.3	96.5
ชัยภูมิ	1,374	709,818	92.2	1.8	88.6	95.8
อำนาจเจริญ	1,390	219,398	86.6	3.9	79.0	94.1
หนองบัวลำภู	1,510	331,327	89.5	1.8	85.9	93.0
ขอนแก่น	1,399	1,116,415	91.4	2.4	86.7	96.0
อุดรธานี	1,382	924,238	89.9	2.4	85.2	94.5
เลย	1,356	382,602	90.2	1.7	86.9	93.5
หนองคาย	1,336	520,053	89.1	2.1	85.0	93.1

ตารางที่ 9.3.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การรู้สึกหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย หน้ามืด เป็นลมและมือเท้าเย็น เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,412	601,459	87.3	5.4	76.6	98.0
ร้อยเอ็ด	1,535	933,300	96.8	1.5	93.8	99.8
กาฬสินธุ์	1,342	603,075	88.3	3.4	81.5	95.0
สกลนคร	1,383	663,042	93.8	1.4	91.0	96.6
นครพนม	1,367	402,576	86.3	2.4	81.7	91.0
มุกดาหาร	1,360	192,288	89.3	4.2	81.2	97.5
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,259	845,225	86.7	3.2	80.5	93.0
ลำพูน	1,466	284,077	95.1	1.4	92.4	97.9
ลำปาง	1,413	502,311	92.6	1.6	89.5	95.6
อุตรดิตถ์	1,334	279,667	89.6	1.6	86.5	92.6
แพร่	1,410	300,979	91.8	1.5	88.9	94.8
น่าน	1,337	280,635	93.1	1.9	89.4	96.9
พะเยา	1,377	308,025	86.9	4.3	78.4	95.5
เชียงราย	1,331	688,331	91.4	1.7	88.0	94.8
แม่ฮ่องสอน	1,209	108,205	88.4	2.4	83.6	93.2
นครสวรรค์	1,356	583,961	86.3	2.6	81.2	91.4
อุทัยธานี	1,289	201,505	88.1	2.8	82.6	93.6
กำแพงเพชร	1,372	443,478	90.7	1.9	86.9	94.4
ตาก	1,259	232,915	83.0	5.6	72.0	94.0
สุโขทัย	1,380	389,526	89.0	2.2	84.7	93.4
พิษณุโลก	1,386	540,651	93.1	1.8	89.7	96.6
พิจิตร	1,241	324,780	85.3	2.0	81.3	89.3
เพชรบูรณ์	1,376	594,409	90.4	1.8	86.9	94.0
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,362	881,780	86.2	3.1	80.1	92.2
กระบี่	1,489	269,299	93.0	1.5	90.1	95.9
พังงา	1,243	122,483	86.7	4.5	77.8	95.6
ภูเก็ต	1,333	186,433	87.8	2.8	82.2	93.3
สุราษฎร์ธานี	1,491	629,351	92.0	1.6	88.9	95.1
ระนอง	1,442	100,008	88.8	1.7	85.5	92.1
ชุมพร	1,459	309,940	91.6	2.4	86.8	96.4
สงขลา	1,416	802,647	90.2	2.1	86.2	94.3
สตูล	1,414	172,103	93.3	1.6	90.1	96.5
ตรัง	1,451	372,850	88.1	3.7	80.8	95.4
พัทลุง	1,406	314,034	89.2	1.7	86.0	92.5
ปัตตานี	1,362	347,486	93.2	1.7	89.8	96.6
ยะลา	1,350	250,748	90.8	1.7	87.5	94.1
นราธิวาส	1,306	369,109	90.6	2.0	86.7	94.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.3.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการปวดหรือเจ็บตรงกลางยอดอก หรือลิ้นปี่ หรือเจ็บหน้าอกซีกซ้าย บริเวณตำแหน่งของหัวใจอย่างรุนแรง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,359	4,206,407	92.2	0.8	90.7	93.7
25 - 34	9,403	4,042,863	93.3	0.7	92.0	94.7
35 - 44	10,207	4,535,829	93.6	0.5	92.6	94.5
45 - 54	7,810	3,524,754	93.6	0.6	92.3	94.8
55 - 64	12,685	2,203,716	93.8	0.5	92.8	94.8
65 - 74	5,681	967,630	93.6	0.6	92.4	94.8
รวม	55,145	19,481,200	93.2	0.5	92.3	94.2
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,779	4,017,906	92.8	0.6	91.7	94.0
25 - 34	9,116	4,015,312	93.5	0.6	92.3	94.6
35 - 44	10,985	5,023,832	94.3	0.5	93.4	95.3
45 - 54	8,728	3,914,516	94.5	0.5	93.4	95.5
55 - 64	12,452	2,490,723	94.1	0.5	93.2	95.1
65 - 74	5,836	1,149,249	94.4	0.5	93.4	95.3
รวม	55,896	20,611,538	93.9	0.4	93.1	94.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	18,138	8,224,314	92.5	0.6	91.4	93.7
25 - 34	18,519	8,058,175	93.4	0.5	92.3	94.4
35 - 44	21,192	9,559,660	94.0	0.4	93.1	94.8
45 - 54	16,538	7,439,270	94.0	0.5	93.0	95.1
55 - 64	25,137	4,694,439	94.0	0.4	93.1	94.8
65 - 74	11,517	2,116,879	94.0	0.4	93.2	94.9
รวมทั้งประเทศ	111,041	40,092,737	93.6	0.4	92.8	94.3



ตารางที่ 9.3.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการปวดหรือเจ็บตรงกลางยอดอก หรือลิ้นปี่ หรือเจ็บหน้าอกซีกซ้าย บริเวณตำแหน่งของหัวใจอย่างรุนแรง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	56,310	13,108,834	93.3	0.6	92.1	94.5
นอกเขตเทศบาล	54,731	26,983,903	93.7	0.5	92.7	94.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,275	3,184,068	92.2	2.0	88.0	96.3
ภาคกลาง	36,596	10,036,184	94.4	0.5	93.4	95.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27,680	13,828,189	92.7	0.9	91.0	94.4
ภาคเหนือ	24,505	7,462,459	93.6	0.7	92.2	94.9
ภาคใต้	20,985	5,581,837	95.2	0.6	94.1	96.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,332	1,795,551	94.5	0.9	92.8	96.2
เขต สคร. ที่ 2	7,226	1,392,012	94.6	1.1	92.3	96.8
เขต สคร. ที่ 3	13,170	3,652,947	93.9	1.0	92.0	95.7
เขต สคร. ที่ 4	11,868	3,195,673	94.8	0.8	93.3	96.2
เขต สคร. ที่ 5	5,819	4,160,197	91.0	2.2	86.6	95.4
เขต สคร. ที่ 6	11,785	5,629,849	93.2	0.9	91.4	95.0
เขต สคร. ที่ 7	10,076	4,038,143	93.7	1.2	91.5	96.0
เขต สคร. ที่ 8	5,716	1,670,553	92.1	1.8	88.5	95.6
เขต สคร. ที่ 9	7,340	2,224,897	95.3	0.5	94.3	96.3
เขต สคร. ที่ 10	11,449	3,567,009	93.2	1.0	91.2	95.3
เขต สคร. ที่ 11	10,635	2,777,305	95.7	0.9	94.0	97.4
เขต สคร. ที่ 12	10,350	2,804,533	94.7	0.7	93.3	96.1

ตารางที่ 9.3.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการปวดหรือเจ็บตรงกลางยอดอก หรือลิ้นปี่ หรือเจ็บหน้าอกซีกซ้าย บริเวณตำแหน่งของหัวใจอย่างรุนแรง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,275	3,184,068	92.2	2.0	88.0	96.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,397	711,331	88.8	3.1	82.7	94.9
นนทบุรี	1,379	686,670	92.0	2.2	87.7	96.4
ปทุมธานี	1,491	625,207	95.4	0.8	93.8	97.0
พระนครศรีอยุธยา	1,462	483,675	97.1	0.7	95.7	98.5
อ่างทอง	1,479	188,183	94.6	2.7	89.3	99.9
ลพบุรี	1,384	466,863	93.5	2.8	87.9	99.0
สิงห์บุรี	1,483	140,117	95.4	1.3	92.9	97.9
ชัยนาท	1,442	224,985	96.9	0.9	95.1	98.6
สระบุรี	1,438	371,863	94.3	1.7	91.0	97.5
ชลบุรี	1,498	851,920	94.6	1.6	91.3	97.8
ระยอง	1,475	390,414	96.5	1.0	94.5	98.4
จันทบุรี	1,513	335,160	95.2	1.1	93.1	97.3
ตราด	1,476	139,105	98.4	0.5	97.3	99.4
ฉะเชิงเทรา	1,513	446,509	97.5	0.6	96.3	98.8
ปราจีนบุรี	1,524	306,501	95.4	1.3	92.8	98.0
นครนายก	1,388	155,708	96.5	0.8	94.8	98.1
สระแก้ว	1,386	316,298	90.0	5.9	78.4	100.0
ราชบุรี	1,450	534,551	93.6	2.4	88.8	98.4
กาญจนบุรี	1,419	493,938	96.3	1.0	94.4	98.2
สุพรรณบุรี	1,451	510,176	93.4	2.9	87.7	99.1
นครปฐม	1,604	609,172	97.3	0.8	95.7	98.9
สมุทรสาคร	1,468	307,860	94.5	1.9	90.8	98.2
สมุทรสงคราม	1,557	133,364	96.2	1.5	93.3	99.0
เพชรบุรี	1,438	293,902	92.6	1.6	89.4	95.8
ประจวบคีรีขันธ์	1,481	312,711	93.6	2.8	88.0	99.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,441	1,597,194	90.6	1.8	87.1	94.1
บุรีรัมย์	1,485	946,953	86.5	8.3	70.1	100.0
สุรินทร์	1,454	872,716	93.3	3.2	87.1	99.6
ศรีสะเกษ	1,376	923,881	93.4	3.9	85.7	100.0
อุบลราชธานี	1,499	1,207,149	97.1	0.8	95.5	98.8
ยโสธร	1,511	360,818	91.1	4.6	82.1	100.0
ชัยภูมิ	1,439	743,333	95.5	0.8	93.9	97.1
อำนาจเจริญ	1,387	216,202	86.5	4.1	78.4	94.6
หนองบัวลำภู	1,592	351,981	95.1	0.8	93.5	96.6
ขอนแก่น	1,481	1,155,930	92.9	2.2	88.5	97.2
อุดรธานี	1,449	972,382	92.2	2.3	87.7	96.6
เลย	1,407	393,221	91.8	1.5	88.9	94.7
หนองคาย	1,387	543,800	93.2	1.7	89.9	96.5

ตารางที่ 9.3.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการปวดหรือเจ็บตรงกลางยอดอก หรือลิ้นปี่ หรือเจ็บหน้าอก ซีกซ้าย บริเวณตำแหน่งของหัวใจอย่างรุนแรง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,479	626,843	90.3	4.9	80.6	100.0
ร้อยเอ็ด	1,604	956,380	97.9	0.9	96.1	99.7
กาฬสินธุ์	1,386	629,312	91.7	2.0	87.8	95.5
สกลนคร	1,447	699,554	94.7	1.5	91.8	97.7
นครพนม	1,460	433,440	90.6	2.6	85.5	95.6
มุกดาหาร	1,396	197,099	92.7	4.3	84.2	100.0
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,370	939,664	90.1	3.2	83.8	96.3
ลำพูน	1,473	288,345	95.8	1.9	92.1	99.6
ลำปาง	1,510	541,806	96.1	1.1	94.0	98.2
อุตรดิตถ์	1,394	292,908	92.2	1.7	88.9	95.5
แพร่	1,574	338,314	97.4	1.0	95.5	99.4
น่าน	1,390	288,725	94.5	1.7	91.2	97.9
พะเยา	1,431	325,255	89.9	3.8	82.3	97.4
เชียงราย	1,439	730,826	93.8	1.3	91.2	96.4
แม่ฮ่องสอน	1,262	114,075	92.1	1.9	88.3	95.9
นครสวรรค์	1,436	611,217	89.8	3.8	82.3	97.4
อุทัยธานี	1,439	219,596	95.2	1.5	92.3	98.0
กำแพงเพชร	1,485	485,300	96.0	1.2	93.6	98.4
ตาก	1,409	280,412	93.0	1.8	89.5	96.5
สุโขทัย	1,580	438,108	98.0	0.6	96.9	99.2
พิษณุโลก	1,481	572,014	95.8	0.7	94.4	97.2
พิจิตร	1,356	354,440	89.1	2.3	84.5	93.6
เพชรบูรณ์	1,476	641,455	95.5	1.2	93.1	97.9
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,479	1,025,108	96.2	2.0	92.3	100.0
กระบี่	1,585	288,146	97.3	0.8	95.8	98.8
พังงา	1,499	158,813	96.6	0.9	94.9	98.4
ภูเก็ต	1,413	198,368	91.8	2.8	86.2	97.3
สุราษฎร์ธานี	1,584	678,343	97.0	0.7	95.7	98.3
ระนอง	1,545	108,665	94.0	1.3	91.4	96.6
ชุมพร	1,530	319,862	92.7	3.4	86.1	99.4
สงขลา	1,520	858,205	95.4	1.1	93.2	97.7
สตูล	1,519	187,759	97.5	1.1	95.3	99.8
ตรัง	1,517	389,637	91.1	3.5	84.1	98.0
พัทลุง	1,530	342,336	95.3	1.4	92.5	98.0
ปัตตานี	1,435	363,487	95.7	0.8	94.1	97.2
ยะลา	1,432	266,485	94.9	1.6	91.7	98.1
นราธิวาส	1,397	396,624	94.2	1.5	91.3	97.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.3.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ทั้ง 3 หัวข้อ ที่ควรรีบส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	7,542	3,388,103	71.8	1.3	69.2	74.4
25 - 34	7,804	3,409,515	76.5	1.0	74.6	78.4
35 - 44	8,531	3,835,335	76.8	0.8	75.1	78.4
45 - 54	6,601	3,007,078	77.5	1.0	75.5	79.5
55 - 64	10,871	1,905,622	78.9	0.8	77.4	80.4
65 - 74	4,849	833,205	78.0	1.0	76.0	80.0
รวม	46,198	16,378,858	76.1	0.7	74.7	77.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,278	3,374,726	75.4	1.0	73.5	77.4
25 - 34	7,742	3,442,775	78.1	0.9	76.3	79.8
35 - 44	9,341	4,314,297	78.9	0.8	77.4	80.5
45 - 54	7,519	3,425,086	80.2	0.8	78.6	81.8
55 - 64	10,778	2,172,923	79.5	0.9	77.8	81.2
65 - 74	5,012	987,969	78.4	1.1	76.3	80.4
รวม	47,670	17,717,777	78.3	0.7	77.1	79.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	14,820	6,762,828	73.6	1.0	71.6	75.5
25 - 34	15,546	6,852,290	77.3	0.8	75.7	78.8
35 - 44	17,872	8,149,632	77.9	0.7	76.6	79.2
45 - 54	14,120	6,432,163	78.9	0.8	77.4	80.4
55 - 64	21,649	4,078,546	79.2	0.7	77.9	80.6
65 - 74	9,861	1,821,175	78.2	0.9	76.5	79.9
รวมทั้งประเทศ	93,868	34,096,634	77.2	0.6	76.0	78.5

ตารางที่ 9.3.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ทั้ง 3 หัวข้อ ที่ควรรักษาส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	47,725	11,377,509	78.7	0.8	77.0	80.3
นอกเขตเทศบาล	46,143	22,719,125	76.5	0.8	74.9	78.2
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,187	2,971,716	84.9	2.5	79.7	90.2
ภาคกลาง	30,186	8,213,369	74.7	1.1	72.6	76.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	24,072	11,979,966	78.0	1.3	75.5	80.5
ภาคเหนือ	20,585	6,245,407	75.6	1.1	73.3	77.8
ภาคใต้	17,838	4,686,176	77.7	1.3	75.2	80.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,706	1,467,659	74.8	3.1	68.8	80.9
เขต สคร. ที่ 2	5,771	1,102,409	72.7	2.7	67.5	77.9
เขต สคร. ที่ 3	10,885	3,017,325	74.9	1.9	71.3	78.6
เขต สคร. ที่ 4	9,824	2,625,976	75.2	1.6	72.1	78.4
เขต สคร. ที่ 5	5,025	3,532,803	75.2	2.8	69.8	80.7
เขต สคร. ที่ 6	10,200	4,884,843	78.4	1.9	74.6	82.2
เขต สคร. ที่ 7	8,847	3,562,320	80.3	1.7	77.1	83.6
เขต สคร. ที่ 8	4,793	1,397,709	74.0	2.9	68.4	79.6
เขต สคร. ที่ 9	6,059	1,839,437	76.7	2.0	72.6	80.7
เขต สคร. ที่ 10	9,733	3,008,261	75.7	1.4	72.9	78.5
เขต สคร. ที่ 11	9,133	2,339,868	79.3	2.0	75.3	83.3
เขต สคร. ที่ 12	8,705	2,346,308	76.2	1.5	73.2	79.1

ตารางที่ 9.3.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ทั้ง 3 หัวข้อ ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,187	2,971,716	84.9	2.5	79.7	90.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,179	575,200	68.9	5.4	58.4	79.5
นนทบุรี	1,150	570,867	73.0	5.2	62.8	83.1
ปทุมธานี	1,285	493,172	74.1	5.6	63.1	85.2
พระนครศรีอยุธยา	1,271	403,620	78.6	4.7	69.3	87.9
อ่างทอง	1,158	148,268	71.6	4.6	62.6	80.7
ลพบุรี	1,109	375,489	73.3	4.2	65.0	81.5
สิงห์บุรี	1,150	110,112	73.1	5.0	63.2	83.0
ชัยนาท	1,166	161,310	67.9	9.6	49.1	86.6
สระบุรี	1,188	307,230	75.1	5.1	65.1	85.1
ชลบุรี	1,205	705,759	76.2	4.8	66.8	85.6
ระยอง	1,213	335,484	81.3	3.8	73.9	88.7
จันทบุรี	1,211	259,187	71.7	2.4	66.9	76.4
ตราด	1,230	118,303	80.7	3.9	73.1	88.3
ฉะเชิงเทรา	1,289	383,201	80.9	3.4	74.2	87.7
ปราจีนบุรี	1,240	254,729	77.4	2.6	72.3	82.4
นครนายก	1,169	129,329	74.6	3.5	67.7	81.5
สระแก้ว	1,149	256,133	69.4	5.8	58.1	80.7
ราชบุรี	1,226	452,716	75.9	3.8	68.4	83.3
กาญจนบุรี	1,108	392,396	74.4	5.0	64.6	84.2
สุพรรณบุรี	1,151	380,751	66.5	5.3	56.1	76.9
นครปฐม	1,375	518,457	80.9	2.7	75.6	86.1
สมุทรสาคร	1,275	269,318	80.4	4.9	70.7	90.0
สมุทรสงคราม	1,221	101,053	71.2	4.0	63.4	79.0
เพชรบุรี	1,157	238,256	73.0	4.4	64.4	81.6
ประจวบคีรีขันธ์	1,311	273,028	78.4	3.9	70.8	86.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,217	1,303,891	71.7	4.3	63.1	80.2
บุรีรัมย์	1,319	844,157	75.9	8.1	60.0	91.8
สุรินทร์	1,290	772,371	80.7	3.8	73.2	88.2
ศรีสะเกษ	1,149	792,967	78.3	4.3	70.0	86.7
อุบลราชธานี	1,422	1,141,370	90.0	2.5	85.0	95.0
ยโสธร	1,298	299,102	73.1	6.8	59.8	86.5
ชัยภูมิ	1,199	612,384	76.0	3.7	68.6	83.3
อำนาจเจริญ	1,213	187,753	70.7	4.7	61.4	80.0
หนองบัวลำภู	1,384	305,082	81.3	2.2	77.0	85.5
ขอนแก่น	1,278	1,011,441	77.9	3.8	70.5	85.3
อุดรธานี	1,238	800,625	74.0	4.8	64.5	83.5
เลย	1,236	347,021	78.6	3.0	72.7	84.5
หนองคาย	1,188	468,339	77.1	2.4	72.3	81.9

ตารางที่ 9.3.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคหัวใจวาย หรือหัวใจขาดเลือด ทั้ง 3 หัวข้อ ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,230	522,140	73.2	7.8	58.0	88.5
ร้อยเอ็ด	1,403	872,742	87.7	5.2	77.4	98.0
กาฬสินธุ์	1,243	557,452	77.9	4.0	69.9	85.8
สกลนคร	1,243	598,757	78.4	3.9	70.8	86.0
นครพนม	1,274	368,680	74.8	4.2	66.6	83.1
มุกดาหาร	1,248	173,691	77.9	6.5	65.1	90.7
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,147	775,086	71.4	3.4	64.6	78.1
ลำพูน	1,327	262,237	84.4	3.6	77.4	91.4
ลำปาง	1,299	461,587	78.8	3.9	71.2	86.4
อุตรดิตถ์	1,200	253,652	77.4	3.0	71.5	83.3
แพร่	1,323	285,873	81.1	2.3	76.6	85.6
น่าน	1,216	256,016	80.9	3.8	73.5	88.4
พะเยา	1,177	263,870	71.0	5.3	60.6	81.3
เชียงราย	1,200	607,812	74.3	2.5	69.5	79.2
แม่ฮ่องสอน	1,044	95,780	72.5	4.5	63.6	81.3
นครสวรรค์	1,244	500,736	69.0	5.3	58.6	79.5
อุทัยธานี	1,156	181,054	75.5	5.0	65.7	85.4
กำแพงเพชร	1,247	412,718	79.5	2.8	74.1	85.0
ตาก	1,122	203,327	64.7	8.7	47.6	81.8
สุโขทัย	1,244	347,877	76.0	3.2	69.7	82.2
พิษณุโลก	1,226	480,601	78.3	3.9	70.6	86.1
พิจิตร	1,146	303,200	74.9	2.6	69.7	80.0
เพชรบูรณ์	1,267	553,980	80.7	3.3	74.2	87.3
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,259	830,623	76.3	4.6	67.3	85.3
กระบี่	1,415	258,074	86.1	2.6	81.0	91.3
พังงา	1,137	112,117	66.3	8.7	49.1	83.5
ภูเก็ต	1,253	175,214	80.1	3.5	73.2	87.1
สุราษฎร์ธานี	1,401	592,991	83.6	2.5	78.7	88.4
ระนอง	1,354	93,440	80.0	2.3	75.4	84.5
ชุมพร	1,314	277,408	79.4	4.7	70.2	88.6
สงขลา	1,233	709,590	76.0	3.6	69.0	83.1
สตูล	1,273	151,656	76.8	3.8	69.2	84.4
ตรัง	1,373	351,423	81.2	3.6	74.1	88.3
พัทลุง	1,225	266,649	71.4	2.8	65.9	77.0
ปัตตานี	1,194	307,441	77.5	3.3	71.1	83.9
ยะลา	1,231	228,612	77.2	3.5	70.3	84.1
นราธิวาส	1,176	330,936	73.4	4.4	64.9	82.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การพุดจาสับสน หรือมีปัญหาการพุดอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการ  
 จุกเงิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที  
 ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	7,943	3,580,284	83.1	1.1	80.9	85.3
25 - 34	8,179	3,517,595	85.4	0.9	83.6	87.2
35 - 44	8,932	3,998,322	86.1	0.7	84.6	87.5
45 - 54	6,938	3,168,066	87.5	0.8	85.9	89.0
55 - 64	11,430	1,993,659	88.4	0.6	87.1	89.6
65 - 74	5,099	872,347	87.9	1.0	86.0	89.8
รวม	48,521	17,130,273	85.9	0.6	84.6	87.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,496	3,434,134	84.0	1.0	82.0	86.0
25 - 34	8,053	3,548,506	87.7	0.8	86.1	89.3
35 - 44	9,685	4,417,675	87.7	0.7	86.3	89.1
45 - 54	7,836	3,531,291	88.7	0.8	87.1	90.2
55 - 64	11,226	2,224,437	88.5	0.7	87.2	89.9
65 - 74	5,276	1,030,437	88.7	0.7	87.4	90.1
รวม	49,572	18,186,482	87.3	0.6	86.2	88.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	15,439	7,014,418	83.5	0.9	81.7	85.3
25 - 34	16,232	7,066,102	86.5	0.7	85.2	87.9
35 - 44	18,617	8,415,998	86.9	0.6	85.7	88.1
45 - 54	14,774	6,699,357	88.1	0.7	86.7	89.4
55 - 64	22,656	4,218,096	88.5	0.5	87.4	89.5
65 - 74	10,375	1,902,784	88.3	0.7	87.0	89.7
รวมทั้งประเทศ	98,093	35,316,755	86.6	0.5	85.6	87.7



ตารางที่ 9.4.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การพุดจาสับสน หรือมีปัญหาการพุดอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการ  
 จุกเงิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที  
 ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	49,674	11,637,665	86.8	0.8	85.2	88.4
นอกเขตเทศบาล	48,419	23,679,090	86.5	0.7	85.2	87.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,165	2,907,437	87.1	2.8	81.3	92.9
ภาคกลาง	32,094	8,731,139	86.7	0.8	85.1	88.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	24,901	12,345,291	86.9	1.0	85.0	88.8
ภาคเหนือ	21,513	6,526,223	86.3	1.1	84.1	88.4
ภาคใต้	18,420	4,806,665	86.0	1.4	83.2	88.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,887	1,545,143	85.5	2.7	80.2	90.9
เขต สคร. ที่ 2	6,291	1,167,398	84.7	2.2	80.4	89.0
เขต สคร. ที่ 3	11,462	3,204,828	86.9	1.4	84.2	89.6
เขต สคร. ที่ 4	10,454	2,813,770	88.0	1.0	86.0	90.1
เขต สคร. ที่ 5	5,136	3,620,139	84.2	2.3	79.6	88.7
เขต สคร. ที่ 6	10,725	5,087,660	87.8	1.4	85.1	90.5
เขต สคร. ที่ 7	9,040	3,637,492	88.5	1.2	86.1	90.9
เขต สคร. ที่ 8	5,104	1,486,836	83.6	3.1	77.6	89.6
เขต สคร. ที่ 9	6,348	1,921,189	87.5	1.2	85.2	89.8
เขต สคร. ที่ 10	10,061	3,118,198	86.8	1.4	84.0	89.7
เขต สคร. ที่ 11	9,351	2,351,636	85.4	2.5	80.5	90.3
เขต สคร. ที่ 12	9,069	2,455,029	86.5	1.4	83.8	89.3

ตารางที่ 9.4.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การพุดจาสับสน หรือมีปัญหาการพุดอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการ  
ฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรรักษาส่งโรงพยาบาลทันที  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,165	2,907,437	87.1	2.8	81.3	92.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,197	608,575	82.4	3.9	74.7	90.1
นนทบุรี	1,248	620,635	85.0	4.2	76.8	93.3
ปทุมธานี	1,297	493,630	81.4	5.1	71.5	91.4
พระนครศรีอยุธยา	1,342	430,878	91.5	2.0	87.7	95.4
อ่างทอง	1,277	166,579	88.9	1.8	85.5	92.4
ลพบุรี	1,113	371,509	81.8	4.4	73.2	90.3
สิงห์บุรี	1,346	131,409	88.0	3.3	81.4	94.5
ชัยนาท	1,283	177,088	81.1	7.3	66.8	95.4
สระบุรี	1,272	320,813	87.0	4.0	79.1	94.9
ชลบุรี	1,333	770,073	89.3	3.0	83.3	95.2
ระยอง	1,232	339,913	88.6	3.1	82.4	94.8
จันทบุรี	1,264	288,984	86.8	1.8	83.3	90.3
ตราด	1,330	126,352	90.6	3.0	84.6	96.6
ฉะเชิงเทรา	1,340	393,203	89.7	3.2	83.4	96.1
ปราจีนบุรี	1,338	281,157	90.3	1.6	87.1	93.4
นครนายก	1,242	131,650	88.0	2.9	82.4	93.7
สระแก้ว	1,186	264,920	80.2	6.1	68.2	92.1
ราชบุรี	1,311	475,020	86.2	3.1	80.1	92.3
กาญจนบุรี	1,141	396,868	85.4	3.1	79.3	91.5
สุพรรณบุรี	1,320	472,477	91.2	1.6	88.1	94.3
นครปฐม	1,431	541,301	90.7	2.8	85.3	96.2
สมุทรสาคร	1,330	280,278	88.6	2.9	82.8	94.4
สมุทรสงคราม	1,340	110,241	85.7	3.1	79.7	91.8
เพชรบุรี	1,200	247,720	83.8	2.9	78.1	89.5
ประจวบคีรีขันธ์	1,381	289,865	89.0	3.2	82.8	95.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,255	1,350,902	83.1	2.2	78.9	87.4
บุรีรัมย์	1,320	846,605	80.4	7.9	64.9	95.8
สุรินทร์	1,358	824,453	89.2	4.0	81.3	97.0
ศรีสะเกษ	1,192	802,203	87.5	3.5	80.6	94.4
อุบลราชธานี	1,404	1,122,480	94.8	1.2	92.3	97.2
ยโสธร	1,393	327,065	86.3	3.2	79.9	92.7
ชัยภูมิ	1,203	598,179	85.7	1.7	82.3	89.0
อำนาจเจริญ	1,229	195,752	82.3	1.8	78.8	85.9
หนองบัวลำภู	1,477	323,336	89.2	1.3	86.6	91.7
ขอนแก่น	1,307	1,030,394	86.9	2.8	81.3	92.4
อุดรธานี	1,257	794,806	83.7	4.0	75.9	91.6
เลย	1,278	353,538	84.9	2.2	80.6	89.3
หนองคาย	1,283	511,723	87.9	1.9	84.1	91.6

ตารางที่ 9.4.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การพุดจาสับสน หรือมีปัญหาการพุดอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่ง โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,311	574,569	86.7	5.5	75.8	97.5
ร้อยเอ็ด	1,439	893,049	93.8	3.1	87.7	100.0
กาฬสินธุ์	1,373	606,246	88.5	2.8	83.0	94.1
สกลนคร	1,298	646,917	89.0	3.0	83.1	95.0
นครพนม	1,291	375,914	81.6	4.1	73.5	89.6
มุกดาหาร	1,233	167,161	81.6	6.4	69.0	94.2
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,189	821,240	85.1	4.4	76.5	93.8
ลำพูน	1,302	252,683	85.8	4.5	76.9	94.7
ลำปาง	1,372	487,521	91.1	1.6	88.0	94.2
อุตรดิตถ์	1,203	261,391	85.5	2.4	80.7	90.3
แพร่	1,394	296,649	92.5	1.8	88.9	96.1
น่าน	1,276	260,637	88.3	2.6	83.2	93.4
พะเยา	1,226	279,121	83.3	4.3	74.8	91.8
เชียงราย	1,239	624,476	85.5	2.0	81.7	89.4
แม่ฮ่องสอน	1,063	95,871	83.5	4.9	73.8	93.3
นครสวรรค์	1,306	545,495	79.8	6.2	67.6	91.9
อุทัยธานี	1,252	189,037	84.7	4.4	76.0	93.3
กำแพงเพชร	1,320	429,447	87.9	2.5	83.0	92.8
ตาก	1,177	208,102	78.7	5.2	68.5	88.9
สุโขทัย	1,344	377,514	87.5	2.0	83.5	91.5
พิษณุโลก	1,267	479,505	88.8	2.5	84.0	93.7
พิจิตร	1,226	322,857	84.4	2.5	79.6	89.3
เพชรบูรณ์	1,357	594,677	90.8	1.6	87.6	94.0
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,283	835,388	81.8	6.2	69.7	93.9
กระบี่	1,472	267,692	93.0	1.8	89.4	96.6
พังงา	1,194	119,516	84.5	4.2	76.3	92.8
ภูเก็ต	1,287	175,640	85.8	2.2	81.4	90.2
สุราษฎร์ธานี	1,390	583,395	87.4	2.1	83.2	91.6
ระนอง	1,426	95,440	87.0	3.4	80.4	93.6
ชุมพร	1,299	274,566	85.4	5.2	75.3	95.6
สงขลา	1,323	768,966	86.6	3.2	80.3	92.9
สตูล	1,293	156,370	89.2	2.5	84.3	94.1
ตรัง	1,439	372,607	88.3	2.5	83.4	93.2
พัทลุง	1,281	275,247	82.9	3.0	77.0	88.7
ปัตตานี	1,231	326,388	88.4	1.6	85.2	91.7
ยะลา	1,285	234,263	89.6	2.1	85.4	93.8
นราธิวาส	1,217	321,187	82.3	5.5	71.5	93.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การมีปัญหาในการนับตัวเลข หรือใบหน้าเบี้ยว หรือแขน ขาอ่อนแรง เหนียวพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่ง โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,041	4,042,402	88.6	1.4	85.8	91.3
25 - 34	9,246	3,993,845	91.8	0.7	90.4	93.1
35 - 44	10,121	4,470,976	91.7	0.6	90.5	92.9
45 - 54	7,754	3,494,325	92.2	0.6	91.0	93.5
55 - 64	12,617	2,189,474	92.7	0.5	91.8	93.7
65 - 74	5,657	961,802	92.9	0.8	91.4	94.4
รวม	54,436	19,152,823	91.3	0.6	90.1	92.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,557	3,887,511	90.2	0.7	88.9	91.6
25 - 34	8,997	3,965,342	93.1	0.5	92.0	94.2
35 - 44	10,824	4,919,757	92.9	0.5	91.9	94.0
45 - 54	8,664	3,860,728	92.9	0.6	91.7	94.1
55 - 64	12,302	2,446,779	92.8	0.5	91.8	93.8
65 - 74	5,833	1,141,515	93.4	0.5	92.4	94.5
รวม	55,177	20,221,631	92.4	0.4	91.6	93.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	17,598	7,929,913	89.4	0.9	87.6	91.1
25 - 34	18,243	7,959,186	92.4	0.5	91.4	93.4
35 - 44	20,945	9,390,733	92.3	0.5	91.4	93.3
45 - 54	16,418	7,355,053	92.6	0.6	91.5	93.7
55 - 64	24,919	4,636,253	92.8	0.4	91.9	93.6
65 - 74	11,490	2,103,317	93.2	0.5	92.2	94.2
รวมทั้งประเทศ	109,613	39,374,454	91.9	0.4	91.0	92.8

ตารางที่ 9.4.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การมีปัญหาในการนับตัวเลข หรือใบหน้าเบี้ยว หรือแขน ขาอ่อนแรง เจ็บพหลัง เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่ง โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	55,712	12,910,776	91.9	0.7	90.6	93.1
นอกเขตเทศบาล	53,901	26,463,677	91.9	0.6	90.7	93.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,237	3,086,917	89.8	2.2	85.1	94.4
ภาคกลาง	36,287	9,927,528	92.6	0.5	91.6	93.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,925	13,414,101	91.0	0.9	89.3	92.8
ภาคเหนือ	24,355	7,432,698	92.1	1.2	89.8	94.4
ภาคใต้	20,809	5,513,210	93.6	0.8	92.1	95.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,288	1,767,935	93.2	1.1	91.0	95.4
เขต สคร. ที่ 2	7,166	1,363,546	92.4	1.6	89.2	95.6
เขต สคร. ที่ 3	13,076	3,642,552	92.3	1.0	90.3	94.3
เขต สคร. ที่ 4	11,757	3,153,495	92.8	0.8	91.2	94.4
เขต สคร. ที่ 5	5,715	4,111,276	90.3	2.2	85.9	94.6
เขต สคร. ที่ 6	11,516	5,481,811	91.5	1.1	89.4	93.6
เขต สคร. ที่ 7	9,694	3,821,014	91.2	1.2	88.8	93.5
เขต สคร. ที่ 8	5,676	1,654,278	87.6	3.8	80.2	95.1
เขต สคร. ที่ 9	7,305	2,216,016	94.0	0.7	92.6	95.4
เขต สคร. ที่ 10	11,374	3,562,404	93.1	1.1	91.1	95.2
เขต สคร. ที่ 11	10,468	2,729,814	94.4	1.0	92.5	96.4
เขต สคร. ที่ 12	10,341	2,783,396	92.8	1.1	90.6	95.1

ตารางที่ 9.4.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การมีปัญหาในการนับตัวเลข หรือใบหน้าเบี้ยว หรือแขน ขาอ่อนแรง เหนียวพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,237	3,086,917	89.8	2.2	85.1	94.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,386	709,885	87.8	3.1	81.7	93.9
นนทบุรี	1,396	696,734	91.6	2.3	87.1	96.1
ปทุมธานี	1,460	602,979	92.8	1.7	89.5	96.2
พระนครศรีอยุธยา	1,432	468,222	96.2	1.2	93.7	98.6
อ่างทอง	1,522	195,339	95.4	1.2	93.1	97.7
ลพบุรี	1,296	425,530	87.5	4.6	78.4	96.5
สิงห์บุรี	1,471	142,390	94.0	1.9	90.2	97.8
ชัยนาท	1,441	221,376	94.8	1.3	92.1	97.4
สระบุรี	1,436	378,911	95.0	1.9	91.3	98.7
ชลบุรี	1,483	846,421	93.2	2.0	89.4	97.1
ระยอง	1,430	384,847	94.6	1.4	91.8	97.3
จันทบุรี	1,471	328,853	93.2	1.7	89.8	96.5
ตราด	1,486	143,046	97.1	0.9	95.4	98.8
ฉะเชิงเทรา	1,511	450,662	95.6	1.2	93.4	97.9
ปราจีนบุรี	1,516	306,756	94.3	1.7	91.0	97.6
นครนายก	1,449	165,591	95.5	1.6	92.4	98.6
สระแก้ว	1,344	306,492	86.5	5.9	74.9	98.1
ราชบุรี	1,459	529,199	91.7	2.3	87.2	96.3
กาญจนบุรี	1,414	486,206	93.9	1.2	91.5	96.4
สุพรรณบุรี	1,446	508,995	91.3	2.8	85.7	96.8
นครปฐม	1,586	603,097	95.7	1.3	93.1	98.3
สมุทรสาคร	1,405	296,943	90.6	2.6	85.4	95.8
สมุทรสงคราม	1,534	125,821	93.0	2.6	87.8	98.2
เพชรบุรี	1,430	294,603	93.1	1.5	90.1	96.1
ประจวบคีรีขันธ์	1,483	308,631	91.9	3.1	85.8	98.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,427	1,592,617	91.4	1.8	88.0	94.9
บุรีรัมย์	1,446	922,590	84.8	8.3	68.5	100.0
สุรินทร์	1,470	888,321	92.3	2.8	86.7	97.9
ศรีสะเกษ	1,303	861,644	90.9	3.6	83.8	97.9
อุบลราชธานี	1,443	1,127,643	95.5	1.5	92.6	98.5
ยโสธร	1,447	342,048	86.8	4.5	77.9	95.6
ชัยภูมิ	1,372	707,749	92.9	1.0	90.9	94.9
อำนาจเจริญ	1,384	217,786	86.0	2.3	81.4	90.5
หนองบัวลำภู	1,586	350,041	95.3	1.0	93.3	97.3
ขอนแก่น	1,396	1,114,679	90.5	2.6	85.3	95.6
อุดรธานี	1,407	923,828	90.3	2.5	85.4	95.1
เลย	1,378	386,586	90.5	1.5	87.6	93.4
หนองคาย	1,357	538,308	90.8	2.3	86.4	95.3

ตารางที่ 9.4.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่าการมีปัญหาในการนับตัวเลข หรือใบหน้าเบี้ยว หรือแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเสถียรส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณเสถียรส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,432	608,486	89.0	5.2	78.8	99.2
ร้อยเอ็ด	1,531	934,822	96.5	1.5	93.5	99.4
กาฬสินธุ์	1,429	625,061	89.7	2.6	84.6	94.8
สกลนคร	1,401	689,462	93.4	2.0	89.5	97.4
นครพนม	1,415	406,685	86.6	3.5	79.6	93.6
มุกดาหาร	1,301	175,745	84.6	5.3	74.1	95.1
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,351	942,982	90.8	3.4	84.1	97.4
ลำพูน	1,507	290,784	95.5	1.1	93.3	97.7
ลำปาง	1,519	535,582	95.0	1.2	92.7	97.3
อุตรดิตถ์	1,410	297,880	93.0	1.6	89.8	96.2
แพร่	1,558	339,322	97.5	0.9	95.7	99.4
น่าน	1,402	286,542	93.4	1.6	90.3	96.4
พะเยา	1,388	317,682	90.2	3.3	83.7	96.6
เชียงราย	1,439	741,648	94.0	1.5	91.1	96.9
แม่ฮ่องสอน	1,210	107,862	88.8	3.1	82.8	94.8
นครสวรรค์	1,464	618,810	82.7	7.7	67.6	97.9
อุทัยธานี	1,367	203,038	89.2	3.0	83.4	95.0
กำแพงเพชร	1,494	479,379	93.9	1.7	90.5	97.3
ตาก	1,398	280,758	91.1	2.3	86.7	95.5
สุโขทัย	1,579	433,225	96.1	1.0	94.2	98.0
พิษณุโลก	1,477	566,765	94.4	1.1	92.2	96.7
พิจิตร	1,351	353,050	88.0	2.3	83.5	92.5
เพชรบูรณ์	1,441	637,389	94.0	1.6	90.8	97.3
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,468	1,024,222	95.3	2.1	91.3	99.4
กระบี่	1,584	284,246	95.9	0.8	94.2	97.5
พังงา	1,484	153,971	95.4	2.5	90.5	100.0
ภูเก็ต	1,382	192,527	90.5	2.1	86.3	94.7
สุราษฎร์ธานี	1,548	655,355	95.0	1.2	92.7	97.3
ระนอง	1,488	105,713	91.9	1.8	88.4	95.5
ชุมพร	1,514	313,780	92.0	4.2	83.8	100.0
สงขลา	1,486	844,059	92.7	2.6	87.6	97.8
สตูล	1,474	178,093	94.4	1.8	90.9	98.0
ตรัง	1,579	411,815	94.2	2.0	90.3	98.1
พัทลุง	1,529	338,130	94.1	1.4	91.3	96.9
ปัตตานี	1,448	364,170	93.9	1.2	91.6	96.2
ยะลา	1,481	278,499	95.2	1.3	92.7	97.7
นราธิวาส	1,344	368,629	87.3	5.1	77.4	97.2

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างมัว หรือเห็นภาพซ้อน หรือ มองไม่เห็นเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,115	3,684,257	84.0	1.4	81.2	86.8
25 - 34	8,378	3,638,699	87.5	0.8	85.9	89.0
35 - 44	9,120	4,107,989	88.0	0.7	86.7	89.3
45 - 54	7,024	3,224,593	89.2	0.8	87.7	90.7
55 - 64	11,591	2,041,212	90.0	0.6	88.9	91.1
65 - 74	5,177	888,104	89.8	0.8	88.3	91.3
รวม	49,405	17,584,853	87.5	0.6	86.3	88.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,687	3,545,804	86.0	0.8	84.4	87.6
25 - 34	8,131	3,608,741	88.9	0.7	87.6	90.2
35 - 44	9,746	4,479,244	88.9	0.7	87.5	90.2
45 - 54	7,973	3,611,494	90.6	0.7	89.2	92.0
55 - 64	11,437	2,275,115	90.1	0.6	89.0	91.3
65 - 74	5,385	1,050,587	90.9	0.7	89.6	92.2
รวม	50,359	18,570,986	88.9	0.5	88.0	89.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	15,802	7,230,061	84.9	0.9	83.1	86.8
25 - 34	16,509	7,247,440	88.2	0.6	87.0	89.4
35 - 44	18,866	8,587,233	88.5	0.6	87.3	89.6
45 - 54	14,997	6,836,087	90.0	0.6	88.7	91.2
55 - 64	23,028	4,316,327	90.1	0.5	89.1	91.0
65 - 74	10,562	1,938,692	90.4	0.6	89.3	91.5
รวมทั้งประเทศ	99,764	36,155,839	88.2	0.5	87.2	89.2



ตารางที่ 9.4.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างมัว หรือเห็นภาพซ้อน หรือ มองไม่เห็นเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรรักษาโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	50,507	11,996,732	88.8	0.7	87.4	90.3
นอกเขตเทศบาล	49,257	24,159,106	88.0	0.7	86.7	89.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,222	3,059,482	89.7	2.5	84.5	94.9
ภาคกลาง	32,524	8,900,130	88.3	0.7	86.9	89.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25,594	12,732,866	88.7	0.9	86.9	90.5
ภาคเหนือ	21,678	6,553,126	86.9	1.2	84.5	89.2
ภาคใต้	18,746	4,910,235	87.9	1.2	85.5	90.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,902	1,581,070	89.0	1.7	85.6	92.4
เขต สคร. ที่ 2	6,231	1,177,558	86.6	1.8	83.1	90.1
เขต สคร. ที่ 3	11,757	3,279,910	88.2	1.2	85.8	90.6
เขต สคร. ที่ 4	10,634	2,861,591	88.8	1.2	86.5	91.1
เขต สคร. ที่ 5	5,318	3,761,920	85.9	2.2	81.6	90.2
เขต สคร. ที่ 6	11,031	5,264,590	89.8	1.2	87.3	92.2
เขต สคร. ที่ 7	9,245	3,706,356	90.2	1.2	87.8	92.5
เขต สคร. ที่ 8	5,024	1,467,221	83.1	3.8	75.7	90.6
เขต สคร. ที่ 9	6,438	1,972,216	88.2	1.1	86.1	90.4
เขต สคร. ที่ 10	10,216	3,113,689	87.9	1.3	85.4	90.3
เขต สคร. ที่ 11	9,424	2,391,510	86.9	2.2	82.6	91.1
เขต สคร. ที่ 12	9,322	2,518,724	88.9	1.1	86.7	91.1

ตารางที่ 9.4.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างมัว หรือเห็นภาพซ้อน หรือ มองไม่เห็นเฉียบพลัน เป็นอาการจุกเงิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,222	3,059,482	89.7	2.5	84.5	94.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,256	629,990	83.7	3.0	77.7	89.6
นนทบุรี	1,244	630,733	86.8	3.0	80.9	92.8
ปทุมธานี	1,330	526,450	88.2	3.2	81.8	94.6
พระนครศรีอยุธยา	1,328	423,887	93.5	1.9	89.8	97.1
อ่างทอง	1,269	163,624	90.2	1.7	86.8	93.5
ลพบุรี	1,163	392,798	84.4	3.8	76.9	91.8
สิงห์บุรี	1,239	119,622	85.3	3.6	78.2	92.4
ชัยนาท	1,294	188,469	88.7	2.3	84.2	93.2
สระบุรี	1,266	313,045	87.0	4.2	78.8	95.2
ชลบุรี	1,355	779,425	91.0	2.4	86.2	95.8
ระยอง	1,193	330,202	87.3	2.5	82.4	92.3
จันทบุรี	1,341	297,738	87.4	2.0	83.5	91.4
ตราด	1,332	124,841	89.0	4.6	80.0	98.0
ฉะเชิงเทรา	1,366	404,930	90.6	4.0	82.6	98.5
ปราจีนบุรี	1,380	285,896	90.6	1.7	87.2	94.0
นครนายก	1,285	143,874	90.7	2.4	85.9	95.4
สระแก้ว	1,249	283,015	85.9	6.2	73.8	98.0
ราชบุรี	1,314	479,087	87.8	3.1	81.7	93.9
กาญจนบุรี	1,201	425,352	88.9	2.8	83.4	94.3
สุพรรณบุรี	1,244	423,076	83.3	4.6	74.3	92.3
นครปฐม	1,495	580,363	94.3	1.3	91.7	96.8
สมุทรสาคร	1,348	284,511	89.6	2.8	84.1	95.1
สมุทรสงคราม	1,376	115,599	88.8	2.8	83.3	94.3
เพชรบุรี	1,258	261,622	86.5	2.8	81.0	92.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,398	291,980	89.9	2.7	84.5	95.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,292	1,424,208	85.2	2.4	80.4	90.0
บุรีรัมย์	1,388	890,789	82.5	7.5	67.7	97.3
สุรินทร์	1,346	804,751	89.7	2.8	84.2	95.3
ศรีสะเกษ	1,227	829,666	89.8	3.7	82.6	97.0
อุบลราชธานี	1,407	1,113,923	94.7	1.5	91.7	97.8
ยโสธร	1,379	329,385	86.4	3.8	78.9	94.0
ชัยภูมิ	1,292	642,172	87.6	1.6	84.4	90.8
อำนาจเจริญ	1,309	209,212	86.9	2.1	82.8	91.0
หนองบัวลำภู	1,516	335,430	91.7	1.9	88.0	95.4
ขอนแก่น	1,347	1,088,516	89.3	2.7	83.9	94.6
อุดรธานี	1,363	879,556	89.4	3.0	83.5	95.2
เลย	1,302	360,515	87.7	2.5	82.9	92.5
หนองคาย	1,320	520,228	89.7	1.7	86.3	93.1

ตารางที่ 9.4.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างมัว หรือเห็นภาพซ้อน หรือ มองไม่เห็นเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,340	578,838	86.0	5.9	74.3	97.6
ร้อยเอ็ด	1,486	901,846	94.3	3.0	88.4	100.0
กาฬสินธุ์	1,357	599,662	89.0	2.7	83.6	94.4
สกลนคร	1,345	656,182	91.9	2.6	86.8	97.1
นครพนม	1,319	391,334	83.5	3.4	76.8	90.1
มุกดาหาร	1,259	176,653	85.5	4.3	77.1	93.9
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,184	775,437	84.2	3.9	76.6	91.9
ลำพูน	1,384	261,797	90.3	2.8	84.7	95.8
ลำปาง	1,355	477,596	91.3	1.5	88.3	94.3
อุตรดิตถ์	1,281	276,135	89.7	2.4	84.9	94.4
แพร่	1,411	304,669	93.1	1.5	90.1	96.1
น่าน	1,215	258,257	88.7	2.4	83.9	93.5
พะเยา	1,307	293,346	86.0	3.1	79.9	92.1
เชียงราย	1,238	641,952	87.4	2.3	83.0	91.9
แม่ฮ่องสอน	1,122	100,634	86.6	3.1	80.4	92.7
นครสวรรค์	1,231	513,484	76.2	7.2	62.0	90.4
อุทัยธานี	1,205	188,440	85.6	4.1	77.5	93.6
กำแพงเพชร	1,353	444,240	90.9	2.0	86.9	94.9
ตาก	1,169	215,050	81.0	3.7	73.7	88.2
สุโขทัย	1,319	371,895	85.5	2.7	80.2	90.8
พิษณุโลก	1,332	521,198	90.8	1.9	87.0	94.7
พิจิตร	1,235	321,057	84.2	2.0	80.3	88.0
เพชรบูรณ์	1,337	587,937	90.1	1.9	86.3	93.9
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,303	835,626	82.2	5.3	71.7	92.7
กระบี่	1,472	270,131	94.2	1.4	91.5	96.9
พังงา	1,193	115,459	85.1	4.6	76.2	94.1
ภูเก็ต	1,291	177,619	86.3	2.2	82.0	90.7
สุราษฎร์ธานี	1,450	610,009	90.7	1.9	87.1	94.4
ระนอง	1,380	93,774	86.1	3.7	78.7	93.4
ชุมพร	1,335	288,892	88.4	3.8	80.8	95.9
สงขลา	1,363	779,273	89.9	2.2	85.5	94.2
สตูล	1,365	166,934	92.5	2.0	88.6	96.4
ตรัง	1,446	375,672	89.3	3.2	83.1	95.5
พัทลุง	1,339	290,131	85.5	2.3	80.9	90.0
ปัตตานี	1,301	335,607	91.0	1.5	88.1	93.9
ยะลา	1,307	239,102	91.6	1.4	88.8	94.4
นราธิวาส	1,201	332,005	83.9	4.3	75.4	92.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูญเสียการทรงตัว การเดิน หรือวิ่งเวียนหัวอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำเสนอ โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	9,021	4,066,441	89.0	1.3	86.5	91.5
25 - 34	9,173	3,954,668	91.4	0.7	90.0	92.7
35 - 44	10,001	4,456,954	91.6	0.5	90.6	92.7
45 - 54	7,640	3,452,354	92.2	0.7	90.9	93.5
55 - 64	12,489	2,181,744	92.7	0.5	91.7	93.6
65 - 74	5,596	958,187	92.5	0.7	91.1	93.9
รวม	53,920	19,070,349	91.3	0.6	90.1	92.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	8,539	3,898,710	90.4	0.7	89.0	91.7
25 - 34	8,919	3,948,171	92.8	0.5	91.7	93.9
35 - 44	10,732	4,897,933	93.1	0.5	92.1	94.1
45 - 54	8,564	3,871,723	93.5	0.6	92.4	94.7
55 - 64	12,281	2,458,032	93.0	0.6	92.0	94.1
65 - 74	5,799	1,131,461	93.7	0.5	92.7	94.8
รวม	54,834	20,206,029	92.6	0.4	91.8	93.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	17,560	7,965,152	89.7	0.8	88.0	91.3
25 - 34	18,092	7,902,839	92.1	0.5	91.1	93.1
35 - 44	20,733	9,354,886	92.4	0.4	91.5	93.3
45 - 54	16,204	7,324,077	92.9	0.5	91.8	93.9
55 - 64	24,770	4,639,776	92.9	0.4	92.0	93.7
65 - 74	11,395	2,089,648	93.1	0.5	92.2	94.1
รวมทั้งประเทศ	108,754	39,276,378	91.9	0.4	91.1	92.8

ตารางที่ 9.4.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูญเสียการทรงตัว การเดิน หรือวิ่งเวียนหัวอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่ง โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	55,317	12,970,429	92.1	0.6	90.9	93.4
นอกเขตเทศบาล	53,437	26,305,949	91.9	0.6	90.7	93.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,291	3,218,212	92.1	2.2	87.6	96.6
ภาคกลาง	35,553	9,674,313	91.7	0.6	90.5	92.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27,493	13,679,375	91.8	0.9	90.1	93.5
ภาคเหนือ	24,005	7,283,660	91.7	1.1	89.6	93.7
ภาคใต้	20,412	5,420,818	93.1	0.7	91.8	94.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,131	1,696,316	90.8	1.3	88.2	93.5
เขต สคร. ที่ 2	6,993	1,317,285	91.3	1.5	88.4	94.2
เขต สคร. ที่ 3	12,814	3,545,756	91.2	1.1	89.0	93.4
เขต สคร. ที่ 4	11,615	3,114,956	92.9	0.8	91.2	94.5
เขต สคร. ที่ 5	5,743	4,101,796	89.8	2.3	85.4	94.2
เขต สคร. ที่ 6	11,777	5,595,913	92.8	0.9	90.9	94.6
เขต สคร. ที่ 7	9,973	3,981,666	92.5	1.1	90.4	94.6
เขต สคร. ที่ 8	5,572	1,608,826	87.6	3.3	81.1	94.2
เขต สคร. ที่ 9	7,122	2,140,314	92.7	0.7	91.3	94.1
เขต สคร. ที่ 10	11,311	3,534,520	93.0	1.1	90.9	95.1
เขต สคร. ที่ 11	10,211	2,663,826	93.1	1.1	90.9	95.2
เขต สคร. ที่ 12	10,201	2,756,992	93.2	0.8	91.6	94.8

ตารางที่ 9.4.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูญเสียการทรงตัว การเดิน หรือวิ่งเวียนหัวอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,291	3,218,212	92.1	2.2	87.6	96.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,363	689,957	86.2	3.1	80.2	92.3
นนทบุรี	1,325	666,537	88.9	2.6	83.8	94.0
ปทุมธานี	1,385	568,015	90.2	2.2	85.8	94.6
พระนครศรีอยุธยา	1,421	461,764	94.6	1.1	92.4	96.9
อ่างทอง	1,477	188,661	94.6	1.0	92.7	96.6
ลพบุรี	1,330	446,616	90.8	2.9	85.2	96.4
สิงห์บุรี	1,436	139,363	93.5	1.3	90.9	96.2
ชัยนาท	1,381	193,945	90.1	3.7	82.8	97.4
สระบุรี	1,369	348,700	90.1	3.5	83.2	97.0
ชลบุรี	1,462	834,602	92.6	2.3	88.1	97.1
ระยอง	1,400	374,940	94.4	0.9	92.7	96.2
จันทบุรี	1,388	304,383	89.7	2.9	84.0	95.5
ตราด	1,451	136,170	95.0	1.9	91.2	98.8
ฉะเชิงเทรา	1,463	424,022	93.9	2.4	89.1	98.7
ปราจีนบุรี	1,529	309,459	93.7	1.5	90.7	96.8
นครนายก	1,412	159,343	95.0	1.8	91.5	98.6
สระแก้ว	1,346	312,880	87.8	6.2	75.5	100.0
ราชบุรี	1,458	527,902	91.6	2.6	86.5	96.7
กาญจนบุรี	1,373	478,464	94.2	1.6	91.1	97.3
สุพรรณบุรี	1,410	476,978	89.6	3.1	83.6	95.6
นครปฐม	1,564	605,280	96.3	1.1	94.1	98.5
สมุทรสาคร	1,459	302,165	93.0	2.1	88.9	97.1
สมุทรสงคราม	1,514	132,437	94.8	1.2	92.5	97.2
เพชรบุรี	1,366	281,274	90.3	1.9	86.5	94.2
ประจวบคีรีขันธ์	1,471	310,454	93.3	3.1	87.3	99.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,410	1,580,624	89.8	1.8	86.2	93.3
บุรีรัมย์	1,455	931,159	85.1	8.3	68.7	100.0
สุรินทร์	1,463	858,149	92.8	2.8	87.3	98.4
ศรีสะเกษ	1,358	891,773	91.4	3.5	84.5	98.2
อุบลราชธานี	1,500	1,199,745	96.0	1.2	93.7	98.3
ยโสธร	1,466	350,233	89.2	3.7	82.0	96.4
ชัยภูมิ	1,415	731,864	92.8	1.8	89.2	96.5
อำนาจเจริญ	1,385	218,736	88.1	2.2	83.8	92.3
หนองบัวลำภู	1,594	352,860	95.4	0.9	93.6	97.2
ขอนแก่น	1,441	1,126,616	91.9	2.4	87.2	96.6
อุดรธานี	1,482	982,628	92.9	2.0	88.9	97.0
เลย	1,373	383,624	91.0	1.5	88.0	94.0
หนองคาย	1,403	556,831	92.1	1.9	88.3	95.9

ตารางที่ 9.4.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การสูญเสียการทรงตัว การเดิน หรือวิ่งเวียนหัว อย่างเฉียบพลัน เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,467	614,100	89.2	4.8	79.8	98.5
ร้อยเอ็ด	1,602	955,943	98.1	0.8	96.6	99.6
กาฬสินธุ์	1,415	623,310	90.4	2.5	85.6	95.3
สกลนคร	1,442	712,232	94.5	1.8	91.0	97.9
นครพนม	1,421	413,475	87.5	3.3	81.0	94.0
มุกดาหาร	1,401	195,472	92.4	3.4	85.8	99.0
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,357	928,667	90.9	3.4	84.2	97.6
ลำพูน	1,459	284,365	95.2	1.1	93.1	97.3
ลำปาง	1,471	524,430	94.9	1.0	92.9	96.9
อุตรดิตถ์	1,426	297,395	92.4	1.7	89.1	95.8
แพร่	1,539	334,683	96.8	0.9	95.1	98.5
น่าน	1,373	288,783	93.2	1.7	89.9	96.5
พะเยา	1,387	313,132	90.7	3.4	84.0	97.4
เชียงราย	1,462	747,190	93.2	1.8	89.7	96.7
แม่ฮ่องสอน	1,263	113,270	91.1	3.0	85.3	96.9
นครสวรรค์	1,375	580,931	82.0	6.5	69.1	94.8
อุทัยธานี	1,402	213,624	93.6	1.7	90.2	97.0
กำแพงเพชร	1,462	466,461	93.1	1.5	90.1	96.1
ตาก	1,338	255,508	89.1	2.0	85.2	93.1
สุโขทัย	1,503	417,401	93.3	1.5	90.3	96.2
พิษณุโลก	1,439	543,370	93.3	1.4	90.6	96.0
พิจิตร	1,333	347,810	87.3	2.2	83.1	91.6
เพชรบูรณ์	1,416	626,640	93.4	1.4	90.6	96.2
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,416	980,028	93.2	2.5	88.3	98.1
กระบี่	1,542	279,495	95.0	1.3	92.5	97.5
พังงา	1,368	141,454	92.0	3.3	85.6	98.5
ภูเก็ต	1,389	194,535	90.3	2.2	85.9	94.6
สุราษฎร์ธานี	1,536	653,362	94.4	1.0	92.3	96.4
ระนอง	1,472	102,413	90.6	1.8	87.0	94.2
ชุมพร	1,488	312,538	91.3	4.3	82.9	99.7
สงขลา	1,488	844,442	93.8	1.7	90.4	97.1
สตูล	1,457	176,776	93.7	1.9	90.0	97.4
ตรัง	1,531	398,750	92.2	2.5	87.3	97.2
พัทลุง	1,478	322,885	90.5	2.7	85.1	95.8
ปัตตานี	1,444	363,677	94.5	1.2	92.3	96.8
ยะลา	1,477	278,660	96.4	0.9	94.7	98.1
นราธิวาส	1,326	371,802	91.5	1.8	87.9	95.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.13 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหัวอย่างรุนแรง โดยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรรักษาส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	8,489	3,891,281	86.7	1.5	83.7	89.7
25 - 34	8,580	3,750,206	89.4	0.7	88.0	90.7
35 - 44	9,500	4,276,233	90.4	0.6	89.2	91.5
45 - 54	7,277	3,365,126	91.1	0.7	89.8	92.5
55 - 64	11,912	2,096,116	91.3	0.5	90.2	92.4
65 - 74	5,302	907,903	90.8	0.7	89.4	92.3
รวม	51,060	18,286,864	89.6	0.6	88.4	90.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	7,991	3,698,321	88.4	0.9	86.7	90.1
25 - 34	8,384	3,741,563	90.9	0.6	89.8	92.1
35 - 44	10,163	4,700,859	91.3	0.7	90.0	92.6
45 - 54	8,181	3,704,653	91.8	0.6	90.6	93.0
55 - 64	11,694	2,363,241	91.5	0.6	90.4	92.6
65 - 74	5,484	1,079,105	92.1	0.6	90.9	93.2
รวม	51,897	19,287,742	90.8	0.5	89.9	91.7
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	16,480	7,589,601	87.5	1.0	85.5	89.5
25 - 34	16,964	7,491,769	90.1	0.5	89.1	91.2
35 - 44	19,663	8,977,092	90.9	0.6	89.8	92.0
45 - 54	15,458	7,069,779	91.5	0.6	90.4	92.6
55 - 64	23,606	4,459,357	91.4	0.5	90.5	92.3
65 - 74	10,786	1,987,008	91.5	0.5	90.5	92.5
รวมทั้งประเทศ	102,957	37,574,605	90.2	0.5	89.2	91.2



ตารางที่ 9.4.14 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหัวอย่างรุนแรง โดยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	52,317	12,473,746	90.8	0.7	89.4	92.1
นอกเขตเทศบาล	50,640	25,100,859	90.0	0.7	88.6	91.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,302	3,251,006	92.6	2.3	87.8	97.5
ภาคกลาง	33,296	9,119,382	89.4	0.7	88.0	90.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26,669	13,292,220	90.8	0.9	89.0	92.5
ภาคเหนือ	22,533	6,820,614	88.8	1.4	86.0	91.5
ภาคใต้	19,157	5,091,382	90.9	0.8	89.3	92.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,007	1,648,575	89.8	1.9	86.0	93.5
เขต สคร. ที่ 2	6,509	1,226,122	87.4	2.0	83.5	91.2
เขต สคร. ที่ 3	12,034	3,332,974	89.1	1.3	86.6	91.7
เขต สคร. ที่ 4	10,746	2,911,711	90.4	0.9	88.5	92.2
เขต สคร. ที่ 5	5,483	3,910,197	88.0	2.3	83.5	92.4
เขต สคร. ที่ 6	11,457	5,476,651	91.7	1.1	89.6	93.8
เขต สคร. ที่ 7	9,729	3,905,372	92.4	1.1	90.2	94.6
เขต สคร. ที่ 8	5,295	1,516,997	83.9	4.7	74.7	93.0
เขต สคร. ที่ 9	6,681	2,007,540	89.2	1.5	86.4	92.1
เขต สคร. ที่ 10	10,557	3,296,077	90.9	1.1	88.8	93.0
เขต สคร. ที่ 11	9,757	2,537,974	91.1	1.4	88.4	93.8
เขต สคร. ที่ 12	9,400	2,553,409	90.7	0.9	89.0	92.5

ตารางที่ 9.4.15 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหัวอย่างรุนแรง โดยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,302	3,251,006	92.6	2.3	87.8	97.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,291	637,802	82.4	3.8	74.9	89.9
นนทบุรี	1,263	647,291	87.7	2.9	82.0	93.4
ปทุมธานี	1,344	541,678	87.8	3.9	80.2	95.4
พระนครศรีอยุธยา	1,400	459,607	95.4	1.2	93.1	97.8
อ่างทอง	1,328	166,654	88.9	4.0	80.9	96.8
ลพบุรี	1,247	416,268	85.4	4.2	77.1	93.7
สิงห์บุรี	1,287	126,116	88.8	3.2	82.5	95.1
ชัยนาท	1,354	190,405	92.2	1.3	89.6	94.8
สระบุรี	1,293	326,679	86.0	4.2	77.7	94.3
ชลบุรี	1,398	801,525	91.3	2.4	86.7	96.0
ระยอง	1,269	343,286	91.6	1.1	89.4	93.8
จันทบุรี	1,358	295,685	88.2	2.1	84.1	92.2
ตราด	1,355	122,325	90.1	4.0	82.3	97.9
ฉะเชิงเทรา	1,330	389,375	92.4	2.6	87.3	97.5
ปราจีนบุรี	1,446	302,518	93.7	1.4	90.9	96.5
นครนายก	1,312	144,908	91.7	2.5	86.8	96.6
สระแก้ว	1,275	295,549	87.1	6.6	74.0	100.0
ราชบุรี	1,362	506,801	89.2	2.7	83.9	94.5
กาญจนบุรี	1,151	415,863	88.8	2.5	83.9	93.8
สุพรรณบุรี	1,299	446,541	89.4	2.7	84.0	94.7
นครปฐม	1,498	577,967	93.8	1.8	90.2	97.3
สมุทรสาคร	1,367	286,255	90.3	2.6	85.3	95.3
สมุทรสงคราม	1,387	121,732	91.7	1.8	88.1	95.3
เพชรบุรี	1,269	261,978	88.2	2.5	83.3	93.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,413	294,572	91.3	3.3	84.9	97.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,328	1,461,388	86.7	2.6	81.6	91.8
บุรีรัมย์	1,437	924,806	85.3	7.7	70.1	100.0
สุรินทร์	1,369	822,716	90.4	3.0	84.6	96.3
ศรีสะเกษ	1,330	878,900	91.1	3.6	84.0	98.2
อุบลราชธานี	1,500	1,200,378	97.3	0.8	95.8	98.7
ยโสธร	1,424	337,171	88.4	3.8	80.9	96.0
ชัยภูมิ	1,349	701,286	91.5	2.4	86.8	96.1
อำนาจเจริญ	1,323	210,708	86.6	2.2	82.4	90.8
หนองบัวลำภู	1,610	356,401	96.1	1.2	93.8	98.4
ขอนแก่น	1,392	1,116,876	91.5	2.6	86.4	96.6
อุดรธานี	1,420	944,664	90.9	2.0	86.9	94.9
เลย	1,348	374,162	89.1	1.6	85.9	92.3
หนองคาย	1,362	547,497	91.2	2.1	87.2	95.3

ตารางที่ 9.4.15 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบว่า การปวดหัวอย่างรุนแรง โดยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เป็นอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ที่ควรนำส่ง โรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>						
มหาสารคาม	1,395	591,457	88.2	5.0	78.3	98.1
ร้อยเอ็ด	1,541	927,836	95.7	2.6	90.5	100.0
กาฬสินธุ์	1,389	617,759	90.7	2.0	86.8	94.7
สกลนคร	1,384	673,762	93.3	2.4	88.5	98.0
นครพนม	1,405	409,223	87.2	3.6	80.0	94.3
มุกดาหาร	1,363	195,228	92.0	3.3	85.6	98.4
<b>ภาคเหนือ</b>						
เชียงใหม่	1,278	852,484	88.9	3.3	82.4	95.4
ลำพูน	1,402	274,674	94.0	1.1	91.8	96.3
ลำปาง	1,394	500,725	93.7	1.3	91.1	96.3
อุตรดิตถ์	1,342	278,824	89.8	2.2	85.4	94.2
แพร่	1,456	316,924	94.9	1.3	92.3	97.4
น่าน	1,271	271,139	89.4	2.7	84.1	94.6
พะเยา	1,324	299,226	88.8	3.1	82.7	95.0
เชียงราย	1,295	677,068	90.5	2.1	86.3	94.8
แม่ฮ่องสอน	1,137	103,836	87.6	2.4	82.9	92.2
นครสวรรค์	1,331	537,793	76.4	9.1	58.4	94.4
อุทัยธานี	1,333	206,962	92.1	2.1	88.0	96.3
กำแพงเพชร	1,418	454,843	91.1	1.9	87.5	94.8
ตาก	1,241	224,269	79.0	8.4	62.5	95.5
สุโขทัย	1,405	392,615	89.1	3.3	82.7	95.6
พิษณุโลก	1,340	525,511	92.5	1.3	90.0	95.1
พิจิตร	1,213	317,398	83.3	2.2	79.0	87.5
เพชรบูรณ์	1,353	586,321	90.5	1.8	87.1	94.0
<b>ภาคใต้</b>						
นครศรีธรรมราช	1,376	941,400	91.0	3.3	84.5	97.5
กระบี่	1,452	260,314	91.2	2.5	86.2	96.1
พังงา	1,204	115,540	84.5	4.9	74.9	94.1
ภูเก็ต	1,354	187,460	88.5	2.7	83.2	93.9
สุราษฎร์ธานี	1,486	631,388	93.6	1.2	91.2	96.0
ระนอง	1,439	96,876	87.8	3.1	81.6	93.9
ชุมพร	1,446	304,995	91.5	2.9	85.8	97.2
สงขลา	1,369	780,996	90.8	2.0	86.9	94.6
สตูล	1,366	167,207	92.7	1.9	88.9	96.6
ตรัง	1,451	374,864	89.6	3.2	83.3	96.0
พัทลุง	1,299	287,844	87.0	2.1	82.8	91.2
ปัตตานี	1,351	339,655	92.2	1.5	89.3	95.1
ยะลา	1,311	244,862	93.1	1.2	90.6	95.5
นราธิวาส	1,253	357,981	91.0	1.7	87.6	94.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่งน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 9.4.16 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 5 หัวข้อ ที่ควรรักษาส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
<b>ชาย</b>							
15 - 24	6,549	2,994,876	61.8	1.5	58.8	64.7	
25 - 34	6,878	2,999,334	65.9	1.1	63.9	68.0	
35 - 44	7,529	3,413,027	66.6	1.0	64.6	68.6	
45 - 54	5,936	2,753,487	69.8	1.2	67.5	72.2	
55 - 64	9,710	1,718,523	69.7	0.9	67.9	71.5	
65 - 74	4,317	741,106	67.7	1.3	65.0	70.3	
รวม	40,919	14,620,353	66.4	0.9	64.7	68.1	
<b>หญิง</b>							
15 - 24	6,260	2,906,627	64.3	1.2	61.9	66.6	
25 - 34	6,846	3,038,361	67.8	1.1	65.7	69.9	
35 - 44	8,206	3,780,719	68.3	1.0	66.3	70.2	
45 - 54	6,703	3,017,856	69.0	1.1	66.9	71.1	
55 - 64	9,567	1,905,144	68.5	1.0	66.5	70.5	
65 - 74	4,469	866,386	67.7	1.2	65.3	70.0	
รวม	42,051	15,515,094	67.5	0.8	66.0	69.0	
<b>ชายและหญิง</b>							
15 - 24	12,809	5,901,504	63.0	1.2	60.7	65.3	
25 - 34	13,724	6,037,695	66.8	0.9	65.1	68.6	
35 - 44	15,735	7,193,745	67.5	0.9	65.8	69.1	
45 - 54	12,639	5,771,343	69.4	1.0	67.5	71.3	
55 - 64	19,277	3,623,668	69.1	0.8	67.5	70.7	
65 - 74	8,786	1,607,492	67.7	1.1	65.6	69.8	
รวมทั้งประเทศ	82,970	30,135,447	67.0	0.8	65.5	68.5	

ตารางที่ 9.4.17 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 5 หัวข้อ ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	42,122	10,048,771	67.7	1.1	65.7	69.8
นอกเขตเทศบาล	40,848	20,086,676	66.6	1.0	64.6	68.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,068	2,648,515	71.4	3.2	64.8	78.0
ภาคกลาง	26,768	7,286,766	64.9	1.3	62.3	67.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,501	10,724,959	69.0	1.5	66.1	71.9
ภาคเหนือ	17,949	5,400,438	64.1	1.5	61.1	67.1
ภาคใต้	15,684	4,074,769	66.8	1.8	63.4	70.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	3,371	1,325,086	66.9	3.6	59.8	74.0
เขต สคร. ที่ 2	5,098	960,716	61.9	2.7	56.5	67.3
เขต สคร. ที่ 3	9,539	2,663,800	64.5	2.1	60.4	68.6
เขต สคร. ที่ 4	8,760	2,337,165	65.6	2.4	60.8	70.4
เขต สคร. ที่ 5	4,387	3,043,604	63.7	3.1	57.7	69.7
เขต สคร. ที่ 6	9,345	4,488,227	71.4	2.4	66.8	76.0
เขต สคร. ที่ 7	7,769	3,193,129	71.3	2.2	67.0	75.6
เขต สคร. ที่ 8	4,315	1,245,848	63.9	3.9	56.3	71.5
เขต สคร. ที่ 9	5,211	1,595,302	65.5	2.5	60.6	70.4
เขต สคร. ที่ 10	8,423	2,559,288	63.4	2.0	59.4	67.4
เขต สคร. ที่ 11	8,146	2,045,461	68.9	2.9	63.2	74.5
เขต สคร. ที่ 12	7,538	2,029,308	64.9	2.1	60.7	69.0

ตารางที่ 9.4.18 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 5 หัวข้อ ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,068	2,648,515	71.4	3.2	64.8	78.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,025	506,085	59.1	5.1	49.1	69.1
นนทบุรี	1,045	533,644	67.7	5.4	57.0	78.4
ปทุมธานี	1,139	418,882	62.3	6.4	49.6	75.0
พระนครศรีอยุธยา	1,187	372,560	71.5	5.1	61.6	81.4
อ่างทอง	1,037	134,547	63.5	4.9	54.0	73.1
ลพบุรี	923	314,125	60.4	4.4	51.8	69.0
สิงห์บุรี	1,040	103,177	66.0	4.8	56.6	75.4
ชัยนาท	1,051	145,254	59.8	9.6	40.9	78.7
สระบุรี	1,047	263,613	62.6	5.6	51.6	73.7
ชลบุรี	1,123	656,788	70.0	5.4	59.4	80.7
ระยอง	1,022	286,868	67.9	4.0	60.0	75.8
จันทบุรี	990	216,951	58.2	3.4	51.5	65.0
ตราด	1,128	106,803	70.4	7.0	56.7	84.0
ฉะเชิงเทรา	1,099	323,004	66.2	6.7	53.0	79.3
ปราจีนบุรี	1,127	241,740	71.7	3.0	65.8	77.6
นครนายก	1,054	107,717	58.5	4.3	50.0	67.1
สระแก้ว	971	217,843	57.1	6.2	44.8	69.3
ราชบุรี	1,069	397,738	65.7	5.5	54.8	76.6
กาญจนบุรี	911	323,928	59.2	7.4	44.7	73.8
สุพรรณบุรี	1,003	332,726	55.7	7.5	40.9	70.5
นครปฐม	1,278	485,380	75.2	5.2	65.0	85.4
สมุทรสาคร	1,171	246,847	72.4	6.3	60.1	84.7
สมุทรสงคราม	1,098	89,074	61.2	6.8	47.8	74.6
เพชรบุรี	1,014	213,217	64.7	5.5	53.8	75.5
ประจวบคีรีขันธ์	1,216	248,254	70.6	5.7	59.3	81.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,063	1,119,565	60.6	4.7	51.4	69.9
บุรีรัมย์	1,171	755,245	67.5	7.7	52.4	82.7
สุรินทร์	1,141	673,846	68.7	6.2	56.5	80.9
ศรีสะเกษ	997	699,271	68.1	3.9	60.4	75.8
อุบลราชธานี	1,308	1,050,848	82.2	3.9	74.5	89.9
ยโสธร	1,152	262,428	64.7	7.8	49.4	80.1
ชัยภูมิ	1,012	494,947	59.6	5.5	48.8	70.3
อำนาจเจริญ	1,015	159,829	60.0	3.6	52.9	67.1
หนองบัวลำภู	1,312	290,940	77.1	2.3	72.6	81.6
ขอนแก่น	1,160	939,205	72.8	4.6	63.7	81.8
อุดรธานี	1,126	697,764	63.1	6.9	49.5	76.7
เลย	1,105	302,208	67.9	3.9	60.3	75.6
หนองคาย	1,058	425,469	67.2	3.6	60.1	74.4

ตารางที่ 9.4.18 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบอาการฉุกเฉิน/รุนแรงของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ทั้ง 5 หัวข้อ ที่ควรนำส่งโรงพยาบาลทันที ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,107	482,793	67.2	7.7	52.1	82.3
ร้อยเอ็ด	1,300	828,097	83.3	6.0	71.6	95.0
กาฬสินธุ์	1,177	521,751	72.2	3.5	65.3	79.0
สกลนคร	1,115	561,982	71.7	7.1	57.8	85.6
นครพนม	1,126	312,635	63.5	6.0	51.7	75.4
มุกดาหาร	1,056	146,136	64.7	7.8	49.5	80.0
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	966	632,968	57.5	5.2	47.3	67.7
ลำพูน	1,165	226,865	72.3	5.4	61.7	82.9
ลำปาง	1,137	404,013	68.3	5.3	57.9	78.7
อุตรดิตถ์	1,044	225,175	67.0	4.1	58.8	75.1
แพร่	1,222	261,227	72.3	3.4	65.7	78.9
น่าน	1,035	217,705	66.9	5.3	56.6	77.3
พะเยา	1,017	229,771	62.0	5.2	51.9	72.1
เชียงราย	999	505,808	60.1	3.9	52.5	67.7
แม่ฮ่องสอน	882	80,931	60.4	7.0	46.6	74.3
นครสวรรค์	1,076	431,348	55.6	6.2	43.3	67.8
อุทัยธานี	1,015	154,826	64.1	6.5	51.3	77.0
กำแพงเพชร	1,148	375,484	71.4	3.9	63.6	79.1
ตาก	944	164,177	51.4	8.8	34.1	68.7
สุโขทัย	1,062	296,765	64.3	4.7	55.1	73.5
พิษณุโลก	1,045	408,215	65.7	5.7	54.5	76.9
พิจิตร	1,076	284,190	69.8	3.1	63.6	75.9
เพชรบูรณ์	1,116	500,970	72.0	3.8	64.6	79.5
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,105	713,564	65.3	6.7	52.0	78.5
กระบี่	1,304	234,505	77.8	3.9	70.2	85.5
พังงา	993	96,390	55.9	8.3	39.5	72.2
ภูเก็ต	1,127	151,414	68.5	3.6	61.4	75.6
สุราษฎร์ธานี	1,243	518,887	72.8	3.8	65.4	80.2
ระนอง	1,207	80,796	68.7	5.0	58.9	78.6
ชุมพร	1,167	249,906	71.1	6.5	58.3	83.8
สงขลา	1,081	632,531	66.8	5.1	56.9	76.8
สตูล	1,095	130,471	65.6	5.5	54.9	76.3
ตรัง	1,273	321,778	72.7	4.1	64.6	80.8
พัทลุง	996	208,293	55.4	3.5	48.5	62.2
ปัตตานี	1,046	281,298	70.0	3.7	62.8	77.2
ยะลา	1,092	200,169	65.4	4.7	56.1	74.7
นราธิวาส	955	254,768	55.9	6.6	43.0	68.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

# ส่วนที่ 10

## โรคความดันโลหิตสูง





ตารางที่ 10.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	4,355	2,027,148	41.8	1.0	39.9	43.8
25 - 34	6,004	2,506,967	54.9	1.1	52.8	57.0
35 - 44	8,111	3,438,331	66.6	1.0	64.7	68.5
45 - 54	6,811	2,962,783	74.2	1.1	72.1	76.3
55 - 64	11,907	2,011,489	80.3	0.7	78.8	81.7
65 - 74	5,653	952,336	83.9	0.9	82.1	85.7
รวม	42,841	13,899,054	62.6	0.6	61.3	63.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	4,922	2,294,641	50.8	1.0	48.8	52.8
25 - 34	7,041	3,066,825	67.7	1.0	65.8	69.6
35 - 44	9,884	4,378,875	78.3	0.8	76.7	79.8
45 - 54	8,283	3,605,075	81.0	1.0	79.0	82.9
55 - 64	12,786	2,529,442	87.9	0.6	86.8	89.1
65 - 74	6,191	1,204,855	88.3	0.9	86.6	89.9
รวม	49,107	17,079,713	73.2	0.6	72.1	74.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	9,277	4,321,790	46.2	0.9	44.5	47.8
25 - 34	13,045	5,573,792	61.3	0.8	59.6	62.9
35 - 44	17,995	7,817,207	72.7	0.7	71.2	74.1
45 - 54	15,094	6,567,857	77.8	0.8	76.1	79.4
55 - 64	24,693	4,540,931	84.4	0.5	83.3	85.4
65 - 74	11,844	2,157,191	86.3	0.7	84.9	87.7
รวมทั้งประเทศ	91,948	30,978,767	68.0	0.5	66.9	69.1

ตารางที่ 10.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	44,679	8,936,273	58.8	1.0	56.9	60.6
นอกเขตเทศบาล	47,269	22,042,494	72.6	0.7	71.3	73.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	631	1,478,716	35.3	2.5	30.3	40.3
ภาคกลาง	29,511	7,475,309	66.4	1.0	64.4	68.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23,351	11,499,842	73.9	0.9	72.1	75.8
ภาคเหนือ	21,716	6,368,965	75.3	1.0	73.3	77.3
ภาคใต้	16,739	4,155,935	68.3	1.1	66.1	70.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	3,321	1,248,895	62.5	2.9	56.8	68.2
เขต สคร.ที่ 2	6,493	1,195,665	73.1	1.8	69.6	76.6
เขต สคร.ที่ 3	10,856	2,897,559	70.3	1.3	67.8	72.8
เขต สคร.ที่ 4	8,841	2,133,190	60.8	1.9	57.1	64.5
เขต สคร.ที่ 5	5,082	3,658,022	76.4	1.8	73.0	79.9
เขต สคร.ที่ 6	9,807	4,624,145	74.3	1.4	71.5	77.1
เขต สคร.ที่ 7	8,462	3,217,675	70.8	1.7	67.4	74.2
เขต สคร.ที่ 8	4,889	1,326,710	71.7	2.7	66.3	77.1
เขต สคร.ที่ 9	6,116	1,810,144	73.0	1.5	70.1	75.9
เขต สคร.ที่ 10	10,711	3,232,112	78.3	1.3	75.6	80.9
เขต สคร.ที่ 11	8,458	2,065,474	69.9	1.8	66.4	73.4
เขต สคร.ที่ 12	8,281	2,090,460	66.7	1.5	63.9	69.6

ตารางที่ 10.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	631	1,478,716	35.3	2.5	30.3	40.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,228	596,370	69.9	3.4	63.2	76.6
นนทบุรี	1,045	419,538	53.8	5.6	42.8	64.8
ปทุมธานี	1,019	404,362	61.7	3.6	54.7	68.7
พระนครศรีอยุธยา	1,257	424,995	75.4	3.1	69.4	81.4
อ่างทอง	1,454	179,759	82.9	3.8	75.6	90.3
ลพบุรี	1,273	413,511	74.6	3.1	68.5	80.8
สิงห์บุรี	1,282	124,639	77.5	3.2	71.2	83.7
ชัยนาท	1,271	181,075	71.7	3.3	65.3	78.2
สระบุรี	1,213	296,680	65.7	4.3	57.2	74.2
ชลบุรี	1,186	649,637	71.3	2.9	65.7	77.0
ระยอง	1,172	284,867	65.7	2.6	60.7	70.8
จันทบุรี	1,208	260,372	69.9	2.2	65.5	74.3
ตราด	1,252	109,381	69.0	2.7	63.7	74.3
ฉะเชิงเทรา	1,220	352,051	72.3	3.6	65.1	79.4
ปราจีนบุรี	1,272	252,718	73.7	4.4	65.0	82.4
นครนายก	1,141	131,580	70.2	3.5	63.3	77.0
สระแก้ว	1,177	260,584	69.5	4.6	60.4	78.5
ราชบุรี	1,236	421,781	69.4	4.0	61.5	77.2
กาญจนบุรี	1,058	317,192	56.4	4.1	48.5	64.4
สุพรรณบุรี	1,091	353,092	56.4	6.2	44.3	68.6
นครปฐม	943	333,276	54.0	5.1	44.1	64.0
สมุทรสาคร	1,036	173,528	61.6	3.0	55.7	67.5
สมุทรสงคราม	1,240	84,872	61.4	6.4	48.8	74.0
เพชรบุรี	1,164	221,566	65.6	2.6	60.6	70.7
ประจวบคีรีขันธ์	1,073	227,883	67.7	4.3	59.2	76.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,305	1,450,501	77.8	3.1	71.8	83.9
บุรีรัมย์	1,315	873,237	77.3	3.3	70.9	83.7
สุรินทร์	1,265	752,212	76.8	4.3	68.4	85.2
ศรีสะเกษ	1,189	750,460	72.2	4.8	62.9	81.6
อุบลราชธานี	1,171	913,131	71.0	2.4	66.3	75.7
ยโสธร	1,339	307,047	74.0	5.7	62.8	85.2
ชัยภูมิ	1,197	582,072	71.5	2.9	65.8	77.1
อำนาจเจริญ	1,346	217,560	80.9	3.1	74.9	87.0
หนองบัวลำภู	1,230	260,502	68.6	2.4	63.9	73.3
ขอนแก่น	1,140	892,395	70.4	3.7	63.1	77.6
อุดรธานี	1,295	856,207	78.3	2.6	73.2	83.4
เลย	1,185	335,895	74.0	2.7	68.8	79.3
หนองคาย	1,246	474,731	75.8	3.9	68.3	83.4

ตารางที่ 10.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,273	564,400	79.3	2.8	73.8	84.8
ร้อยเอ็ด	1,301	729,514	73.8	4.7	64.7	83.0
กาฬสินธุ์	1,137	510,501	72.8	4.0	64.9	80.7
สกลนคร	1,179	549,912	69.3	5.1	59.2	79.3
นครพนม	1,355	369,898	74.2	3.1	68.2	80.3
มุกดาหาร	883	109,666	45.1	7.4	30.5	59.6
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,263	869,758	75.9	3.3	69.5	82.3
ลำพูน	1,269	230,728	74.4	4.7	65.2	83.7
ลำปาง	1,358	462,590	76.9	3.1	70.8	83.0
อุตรดิตถ์	1,115	238,423	70.6	2.9	64.9	76.3
แพร่	1,414	307,727	84.5	2.5	79.7	89.4
น่าน	1,412	284,411	77.9	3.4	71.4	84.5
พะเยา	1,378	307,110	82.8	2.3	78.3	87.2
เชียงราย	1,296	655,672	79.5	3.4	72.9	86.1
แม่ฮ่องสอน	1,321	114,115	78.0	3.6	71.0	85.0
นครสวรรค์	1,198	460,151	65.5	5.2	55.3	75.7
อุทัยธานี	1,230	178,332	77.7	4.0	69.9	85.5
กำแพงเพชร	1,244	385,855	75.3	3.1	69.2	81.5
ตาก	1,205	220,919	67.7	3.7	60.4	75.0
สุโขทัย	1,375	367,932	79.4	2.5	74.6	84.2
พิษณุโลก	1,257	478,241	75.9	2.5	71.0	80.7
พิจิตร	1,217	302,372	74.4	2.2	70.0	78.7
เพชรบูรณ์	1,164	504,629	70.0	3.7	62.8	77.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,136	761,902	70.0	3.3	63.4	76.5
กระบี่	1,203	186,685	63.4	5.0	53.7	73.2
พังงา	1,281	137,584	75.2	4.6	66.1	84.2
ภูเก็ต	1,047	132,909	56.8	6.3	44.4	69.1
สุราษฎร์ธานี	1,264	510,995	73.6	4.0	65.7	81.5
ระนอง	1,263	85,149	74.6	2.6	69.4	79.8
ชุมพร	1,264	250,250	72.6	3.1	66.5	78.7
สงขลา	919	531,427	57.6	4.4	49.1	66.1
สตูล	1,181	142,979	72.7	4.1	64.6	80.9
ตรัง	1,285	322,711	74.6	3.0	68.6	80.5
พัทลุง	1,413	306,457	81.3	1.6	78.1	84.5
ปัตตานี	1,226	279,733	68.4	2.8	62.9	74.0
ยะลา	1,130	189,841	61.3	3.2	55.1	67.5
นราธิวาส	1,127	317,312	65.4	3.8	58.0	72.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.1.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 35 - 74 ปี ตามเพศและในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

เพศ/พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวม	69,626	21,083,186	77.8	0.6	76.7	79.0
ชาย	32,482	9,364,939	73.2	0.7	71.8	74.6
หญิง	37,144	11,718,247	82.0	0.6	80.8	83.2
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	34,255	6,298,365	67.7	1.1	65.4	69.9
นอกเขตเทศบาล	35,371	14,784,821	83.2	0.7	81.9	84.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	534	1,154,485	41.3	2.9	35.6	47.0
ภาคกลาง	21,976	4,960,347	79.0	1.0	77.1	81.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,668	7,708,675	82.8	0.9	81.0	84.6
ภาคเหนือ	16,901	4,520,214	84.5	1.0	82.6	86.5
ภาคใต้	12,547	2,739,464	81.6	1.1	79.4	83.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	2,521	823,474	75.1	3.4	68.5	81.7
เขต สคร.ที่ 2	4,903	831,060	83.0	1.5	80.1	86.0
เขต สคร.ที่ 3	8,138	1,926,723	81.3	1.2	78.9	83.6
เขต สคร.ที่ 4	6,414	1,379,090	76.3	2.1	72.2	80.4
เขต สคร.ที่ 5	3,782	2,405,294	85.4	1.6	82.2	88.6
เขต สคร.ที่ 6	7,542	3,183,569	82.6	1.5	79.7	85.5
เขต สคร.ที่ 7	6,344	2,119,812	80.3	1.7	77.1	83.6
เขต สคร.ที่ 8	3,827	925,560	81.1	3.2	74.9	87.4
เขต สคร.ที่ 9	4,813	1,312,696	84.4	1.2	82.0	86.8
เขต สคร.ที่ 10	8,261	2,281,958	86.1	1.1	83.8	88.3
เขต สคร.ที่ 11	6,313	1,343,300	82.8	1.6	79.6	86.1
เขต สคร.ที่ 12	6,234	1,396,164	80.5	1.5	77.5	83.4

ตารางที่ 10.1.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากร อายุ 35 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	534	1,154,485	41.3	2.9	35.6	47.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	915	408,954	79.3	3.4	72.6	85.9
นนทบุรี	836	311,517	64.6	6.2	52.4	76.9
ปทุมธานี	744	225,384	79.2	3.5	72.3	86.1
พระนครศรีอยุธยา	941	286,573	86.8	2.1	82.6	91.0
อ่างทอง	1,184	139,227	85.1	3.4	78.4	91.7
ลพบุรี	955	281,712	85.4	2.2	81.1	89.8
สิงห์บุรี	903	81,876	87.3	2.2	83.0	91.5
ชัยนาท	951	131,076	86.6	2.9	80.9	92.3
สระบุรี	910	197,170	75.1	3.8	67.7	82.5
ชลบุรี	894	425,689	81.9	3.0	76.1	87.7
ระยอง	862	171,701	78.9	2.1	74.8	83.1
จันทบุรี	929	179,077	79.8	2.0	75.8	83.8
ตราด	975	80,356	86.4	1.9	82.7	90.2
ฉะเชิงเทรา	891	229,750	83.8	3.8	76.4	91.2
ปราจีนบุรี	972	170,916	82.2	2.7	76.9	87.6
นครนายก	827	88,108	85.6	1.9	81.9	89.3
สระแก้ว	873	172,173	79.8	3.3	73.4	86.3
ราชบุรี	911	294,584	85.5	3.3	79.0	92.1
กาญจนบุรี	736	196,553	74.1	4.5	65.2	83.0
สุพรรณบุรี	827	244,940	68.4	7.9	52.9	83.9
นครปฐม	699	202,935	73.2	3.9	65.6	80.7
สมุทรสาคร	779	114,292	72.5	3.2	66.3	78.7
สมุทรสงคราม	922	58,599	77.2	5.9	65.7	88.7
เพชรบุรี	827	140,153	81.9	3.3	75.5	88.4
ประจวบคีรีขันธ์	713	127,035	80.7	4.0	72.8	88.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	938	911,237	87.5	2.4	82.7	92.3
บุรีรัมย์	949	547,288	85.5	2.8	80.0	91.0
สุรินทร์	938	505,277	86.9	3.5	80.1	93.7
ศรีสะเกษ	908	511,588	78.6	4.9	68.9	88.2
อุบลราชธานี	838	564,422	80.7	2.3	76.2	85.3
ยโสธร	974	188,421	83.0	4.2	74.7	91.3
ชัยภูมิ	957	441,492	79.7	4.4	71.1	88.3
อำนาจเจริญ	1,074	160,250	89.8	1.4	87.0	92.6
หนองบัวลำภู	1,008	195,419	77.2	2.1	73.1	81.3
ขอนแก่น	883	638,062	74.9	4.4	66.2	83.6
อุดรธานี	962	568,216	88.6	2.0	84.6	92.6
เลย	963	259,720	85.1	2.1	81.0	89.1
หนองคาย	966	340,929	86.9	2.9	81.2	92.5

ตารางที่ 10.1.5 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากร อายุ 35 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	948	363,397	87.5	2.1	83.4 - 91.5
ร้อยเอ็ด	978	488,034	83.3	3.1	77.3 - 89.3
กาฬสินธุ์	834	329,792	80.9	3.6	73.8 - 87.9
สกลนคร	891	384,740	80.7	3.9	73.0 - 88.4
นครพนม	975	233,689	84.5	1.6	81.4 - 87.6
มุกดาหาร	684	76,703	58.9	8.2	42.9 - 75.0
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	963	614,998	83.6	3.0	77.7 - 89.4
ลำพูน	995	171,825	85.4	4.0	77.6 - 93.2
ลำปาง	1,047	339,133	85.3	2.7	79.9 - 90.6
อุตรดิตถ์	912	183,610	83.5	2.3	78.9 - 88.1
แพร่	1,143	233,249	89.8	2.1	85.6 - 93.9
น่าน	1,064	177,131	86.9	3.3	80.4 - 93.4
พะเยา	1,115	230,799	89.0	1.8	85.5 - 92.6
เชียงราย	999	443,262	87.2	2.5	82.4 - 92.0
แม่ฮ่องสอน	935	71,561	84.0	2.6	78.9 - 89.2
นครสวรรค์	962	314,298	74.6	7.1	60.6 - 88.6
อุทัยธานี	929	119,883	86.3	3.6	79.2 - 93.4
กำแพงเพชร	936	258,540	85.3	2.4	80.6 - 89.9
ตาก	926	148,628	79.6	2.9	73.9 - 85.4
สุโขทัย	1,061	261,959	92.1	1.7	88.7 - 95.5
พิษณุโลก	998	350,591	86.4	2.8	80.9 - 91.9
พิจิตร	1,000	232,840	84.0	2.3	79.4 - 88.6
เพชรบูรณ์	916	367,907	80.3	2.3	75.8 - 84.8
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	848	505,058	83.0	3.2	76.8 - 89.3
กระบี่	908	121,515	75.1	6.4	62.6 - 87.6
พังงา	984	91,579	86.4	3.6	79.3 - 93.4
ภูเก็ต	760	81,904	70.7	4.7	61.4 - 80.0
สุราษฎร์ธานี	892	310,092	84.9	3.0	78.9 - 90.9
ระนอง	935	53,050	85.4	2.0	81.5 - 89.4
ชุมพร	986	180,101	88.9	1.8	85.3 - 92.5
สงขลา	694	365,548	70.5	4.8	61.1 - 79.8
สตูล	880	92,056	86.2	2.6	81.2 - 91.3
ตรัง	1,017	222,552	88.0	3.2	81.7 - 94.3
พัทลุง	1,080	208,352	91.5	1.2	89.0 - 93.9
ปัตตานี	873	169,500	80.3	2.5	75.3 - 85.2
ยะลา	839	125,084	78.7	4.1	70.6 - 86.8
นราธิวาส	851	213,072	82.3	3.2	76.0 - 88.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	94	47,585	1.0	0.2	0.6	1.4
25 - 34	247	98,479	2.2	0.2	1.8	2.6
35 - 44	622	220,652	4.3	0.3	3.8	4.8
45 - 54	1,056	442,776	11.3	0.9	9.5	13.0
55 - 64	3,082	488,601	19.8	0.6	18.5	21.0
65 - 74	2,038	318,088	28.5	1.0	26.5	30.5
รวม	7,139	1,616,182	7.4	0.2	6.9	7.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	97	48,946	1.1	0.2	0.7	1.5
25 - 34	238	101,405	2.3	0.2	1.8	2.7
35 - 44	839	368,580	6.7	0.4	5.9	7.4
45 - 54	1,528	715,701	16.3	0.7	14.9	17.7
55 - 64	4,020	779,705	27.5	0.7	26.2	28.8
65 - 74	2,578	478,771	35.6	1.0	33.7	37.5
รวม	9,300	2,493,107	10.8	0.2	10.3	11.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	191	96,531	1.0	0.2	0.7	1.3
25 - 34	485	199,884	2.2	0.2	1.9	2.6
35 - 44	1,461	589,232	5.5	0.2	5.1	6.0
45 - 54	2,584	1,158,476	13.9	0.6	12.7	15.1
55 - 64	7,102	1,268,306	23.9	0.5	22.9	24.9
65 - 74	4,616	796,859	32.4	0.8	30.9	33.9
รวมทั้งประเทศ	16,439	4,109,289	9.1	0.2	8.8	9.5

ตารางที่ 10.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	9,257	1,627,520	10.9	0.3	10.2	11.5
นอกเขตเทศบาล	7,182	2,481,769	8.3	0.2	7.8	8.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	230	428,383	10.4	0.9	8.5	12.4
ภาคกลาง	5,683	1,092,932	9.8	0.3	9.3	10.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,096	1,063,106	6.9	0.3	6.2	7.6
ภาคเหนือ	4,110	943,731	11.3	0.4	10.5	12.1
ภาคใต้	3,320	581,137	9.7	0.4	8.8	10.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	756	210,264	10.7	0.8	9.1	12.2
เขต สคร.ที่ 2	1,095	148,882	9.2	0.4	8.3	10.0
เขต สคร.ที่ 3	2,078	417,304	10.3	0.5	9.2	11.3
เขต สคร.ที่ 4	1,754	316,482	9.2	0.4	8.3	10.0
เขต สคร.ที่ 5	723	349,566	7.4	0.6	6.2	8.5
เขต สคร.ที่ 6	1,206	432,838	7.0	0.6	5.8	8.2
เขต สคร.ที่ 7	1,167	280,702	6.3	0.5	5.3	7.2
เขต สคร.ที่ 8	951	228,597	12.6	0.8	10.9	14.2
เขต สคร.ที่ 9	1,270	264,473	10.9	0.6	9.6	12.1
เขต สคร.ที่ 10	1,889	450,661	11.0	0.6	9.8	12.2
เขต สคร.ที่ 11	1,627	250,502	8.6	0.6	7.4	9.7
เขต สคร.ที่ 12	1,693	330,634	10.7	0.6	9.5	11.8

ตารางที่ 10.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	230	428,383	10.4	0.9	8.5	12.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	265	94,466	11.2	1.4	8.5	13.9
นนทบุรี	254	82,496	10.7	1.3	8.2	13.2
ปทุมธานี	196	56,492	8.7	1.3	6.3	11.2
พระนครศรีอยุธยา	306	71,276	12.8	1.2	10.4	15.2
อ่างทอง	212	18,499	8.6	0.6	7.3	9.8
ลพบุรี	239	54,792	9.9	0.9	8.1	11.7
สิงห์บุรี	236	17,904	11.4	0.9	9.6	13.1
ชัยนาท	216	27,758	11.1	1.1	9.0	13.2
สระบุรี	192	29,928	6.7	0.8	5.0	8.3
ชลบุรี	278	99,787	11.1	1.4	8.3	13.9
ระยอง	215	38,613	9.1	1.2	6.7	11.4
จันทบุรี	238	36,926	10.1	1.3	7.6	12.5
ตราด	237	14,839	9.4	1.0	7.5	11.4
ฉะเชิงเทรา	203	44,923	9.3	1.3	6.8	11.9
ปราจีนบุรี	227	28,732	8.4	1.4	5.7	11.2
นครนายก	205	19,571	10.5	1.1	8.3	12.7
สระแก้ว	210	39,446	10.7	2.0	6.8	14.6
ราชบุรี	230	59,005	9.8	1.2	7.5	12.0
กาญจนบุรี	220	48,359	8.7	1.3	6.2	11.2
สุพรรณบุรี	210	59,890	9.6	1.4	6.8	12.4
นครปฐม	174	46,488	7.6	0.7	6.3	9.0
สมุทรสาคร	225	26,287	9.8	1.0	7.9	11.8
สมุทรสงคราม	283	14,336	10.5	1.2	8.2	12.9
เพชรบุรี	240	35,657	10.8	0.8	9.1	12.4
ประจวบคีรีขันธ์	172	26,461	8.0	1.2	5.7	10.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	219	169,453	9.2	1.0	7.1	11.2
บุรีรัมย์	163	67,639	6.0	1.2	3.6	8.4
สุรินทร์	185	65,584	6.8	0.7	5.4	8.1
ศรีสะเกษ	170	55,492	5.4	0.8	3.8	7.1
อุบลราชธานี	156	91,545	7.2	1.2	4.8	9.6
ยโสธร	159	23,915	5.8	0.8	4.2	7.4
ชัยภูมิ	156	46,890	5.8	1.2	3.4	8.2
อำนาจเจริญ	156	16,576	6.3	0.9	4.4	8.1
หนองบัวลำภู	137	19,489	5.1	0.6	3.9	6.4
ขอนแก่น	154	101,195	8.0	1.4	5.3	10.7
อุดรธานี	149	58,045	5.4	1.1	3.2	7.6
เลย	145	31,258	7.0	1.0	5.0	9.1
หนองคาย	202	49,004	8.0	1.3	5.4	10.5

ตารางที่ 10.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากร อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	150	41,025	5.8	1.9	2.1	9.5
ร้อยเอ็ด	146	84,641	8.6	2.0	4.7	12.5
กาฬสินธุ์	123	48,181	7.0	1.6	3.8	10.3
สกลนคร	169	46,079	5.9	1.3	3.4	8.4
นครพนม	210	34,202	7.0	1.0	5.1	8.9
มุกดาหาร	147	12,894	5.3	0.8	3.8	6.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	270	153,128	13.5	1.8	10.0	17.1
ลำพูน	206	30,160	9.8	1.1	7.7	12.0
ลำปาง	221	56,232	9.4	0.9	7.6	11.2
อุตรดิตถ์	216	38,511	11.5	1.0	9.5	13.6
แพร่	255	43,370	11.9	1.4	9.2	14.7
น่าน	237	25,814	7.1	1.4	4.4	9.8
พะเยา	246	42,582	11.6	1.2	9.2	14.1
เชียงราย	221	84,780	10.4	0.8	8.9	11.9
แม่ฮ่องสอน	233	14,595	10.2	3.4	3.6	16.9
นครสวรรค์	234	92,567	13.5	1.4	10.8	16.3
อุทัยธานี	207	19,555	8.6	1.4	5.8	11.5
กำแพงเพชร	235	57,482	11.4	1.5	8.5	14.3
ตาก	249	34,789	11.3	1.9	7.6	15.0
สุโขทัย	267	45,655	9.9	1.3	7.3	12.5
พิษณุโลก	328	81,952	13.1	1.4	10.4	15.8
พิจิตร	275	58,993	14.6	1.4	11.9	17.3
เพชรบูรณ์	210	63,567	9.0	1.3	6.4	11.6
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	187	76,101	7.0	1.2	4.8	9.3
กระบี่	201	16,829	5.7	0.7	4.3	7.2
พังงา	242	16,524	9.1	0.9	7.3	10.9
ภูเก็ต	223	19,818	8.6	1.3	5.9	11.2
สุราษฎร์ธานี	229	68,432	10.0	1.4	7.3	12.7
ระนอง	292	13,785	12.2	1.4	9.5	14.9
ชุมพร	253	39,012	11.5	1.6	8.3	14.6
สงขลา	254	108,367	11.9	1.4	9.1	14.7
สตูล	206	16,307	8.4	0.9	6.6	10.2
ตรัง	239	40,488	9.4	1.1	7.3	11.6
พัทลุง	219	33,256	9.0	1.0	6.9	11.0
ปัตตานี	272	43,380	10.8	1.1	8.6	13.0
ยะลา	237	28,131	9.2	1.2	6.7	11.6
นราธิวาส	266	60,704	12.6	1.7	9.2	16.0

ตารางที่ 10.2.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	94	47,585	1.9	0.4	1.2	2.5
25 - 34	247	98,479	3.1	0.3	2.5	3.7
35 - 44	622	220,652	5.3	0.3	4.7	6.0
45 - 54	1,056	442,776	13.2	1.0	11.2	15.2
55 - 64	3,082	488,601	21.9	0.7	20.6	23.2
65 - 74	2,038	318,088	30.9	1.1	28.8	33.0
รวม	7,139	1,616,182	9.8	0.3	9.2	10.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	97	48,946	1.7	0.3	1.1	2.3
25 - 34	238	101,405	2.8	0.3	2.2	3.4
35 - 44	839	368,580	7.6	0.4	6.8	8.4
45 - 54	1,528	715,701	18.0	0.8	16.5	19.5
55 - 64	4,020	779,705	28.9	0.7	27.5	30.3
65 - 74	2,578	478,771	37.3	1.0	35.3	39.2
รวม	9,300	2,493,107	13.0	0.3	12.4	13.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	191	96,531	1.8	0.3	1.3	2.3
25 - 34	485	199,884	3.0	0.2	2.5	3.4
35 - 44	1,461	589,232	6.6	0.3	6.0	7.1
45 - 54	2,584	1,158,476	15.8	0.7	14.5	17.1
55 - 64	7,102	1,268,306	25.7	0.5	24.7	26.8
65 - 74	4,616	796,859	34.4	0.8	32.9	36.0
รวมทั้งประเทศ	16,439	4,109,289	11.5	0.2	11.0	12.0

ตารางที่ 10.2.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	9,257	1,627,520	15.3	0.5	14.4	16.2
นอกเขตเทศบาล	7,182	2,481,769	9.9	0.3	9.4	10.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	230	428,383	21.9	2.1	17.6	26.3
ภาคกลาง	5,683	1,092,932	12.5	0.4	11.8	13.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,096	1,063,106	8.2	0.4	7.4	8.9
ภาคเหนือ	4,110	943,731	13.4	0.5	12.4	14.4
ภาคใต้	3,320	581,137	11.9	0.5	10.9	12.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	756	210,264	14.1	1.1	12.0	16.2
เขต สคร.ที่ 2	1,095	148,882	10.9	0.6	9.8	12.0
เขต สคร.ที่ 3	2,078	417,304	12.4	0.7	11.1	13.6
เขต สคร.ที่ 4	1,754	316,482	12.5	0.6	11.2	13.7
เขต สคร.ที่ 5	723	349,566	8.6	0.7	7.2	9.9
เขต สคร.ที่ 6	1,206	432,838	8.2	0.7	6.8	9.7
เขต สคร.ที่ 7	1,167	280,702	7.6	0.6	6.4	8.7
เขต สคร.ที่ 8	951	228,597	15.4	1.2	13.0	17.8
เขต สคร.ที่ 9	1,270	264,473	13.2	0.8	11.6	14.7
เขต สคร.ที่ 10	1,889	450,661	12.7	0.7	11.3	14.0
เขต สคร.ที่ 11	1,627	250,502	10.4	0.7	9.0	11.9
เขต สคร.ที่ 12	1,693	330,634	13.3	0.7	11.9	14.7

ตารางที่ 10.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	230	428,383	21.9	2.1	17.6	26.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	265	94,466	12.7	1.6	9.6	15.8
นนทบุรี	254	82,496	15.9	1.2	13.5	18.3
ปทุมธานี	196	56,492	11.3	1.8	7.8	14.8
พระนครศรีอยุธยา	306	71,276	15.1	1.6	12.1	18.2
อ่างทอง	212	18,499	9.0	0.7	7.6	10.3
ลพบุรี	239	54,792	11.9	1.1	9.6	14.1
สิงห์บุรี	236	17,904	13.5	1.2	11.1	15.9
ชัยนาท	216	27,758	13.9	1.8	10.4	17.3
สระบุรี	192	29,928	8.3	1.0	6.5	10.2
ชลบุรี	278	99,787	13.6	2.0	9.7	17.6
ระยอง	215	38,613	11.7	1.4	9.0	14.4
จันทบุรี	238	36,926	12.6	1.8	9.2	16.1
ตราด	237	14,839	12.3	1.5	9.3	15.3
ฉะเชิงเทรา	203	44,923	10.9	1.5	8.1	13.8
ปราจีนบุรี	227	28,732	9.7	1.6	6.6	12.8
นครนายก	205	19,571	12.7	1.5	9.7	15.7
สระแก้ว	210	39,446	13.2	2.4	8.5	17.9
ราชบุรี	230	59,005	12.6	1.7	9.2	15.9
กาญจนบุรี	220	48,359	12.8	1.5	9.8	15.7
สุพรรณบุรี	210	59,890	12.9	2.1	8.8	17.0
นครปฐม	174	46,488	11.4	1.5	8.5	14.3
สมุทรสาคร	225	26,287	13.5	1.5	10.6	16.5
สมุทรสงคราม	283	14,336	14.3	1.1	12.2	16.4
เพชรบุรี	240	35,657	13.9	0.9	12.1	15.6
ประจวบคีรีขันธ์	172	26,461	10.1	1.5	7.2	13.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	219	169,453	10.6	1.2	8.3	13.0
บุรีรัมย์	163	67,639	6.9	1.5	4.0	9.9
สุรินทร์	185	65,584	7.7	0.7	6.3	9.1
ศรีสะเกษ	170	55,492	6.2	0.9	4.3	8.0
อุบลราชธานี	156	91,545	9.0	1.4	6.3	11.7
ยโสธร	159	23,915	6.5	1.0	4.6	8.5
ชัยภูมิ	156	46,890	7.0	1.6	3.8	10.2
อำนาจเจริญ	156	16,576	7.0	1.1	4.8	9.1
หนองบัวลำภู	137	19,489	6.2	0.8	4.7	7.7
ขอนแก่น	154	101,195	9.6	1.6	6.4	12.8
อุดรธานี	149	58,045	6.3	1.3	3.7	8.9
เลย	145	31,258	8.3	1.1	6.1	10.6
หนองคาย	202	49,004	9.4	1.5	6.5	12.2

ตารางที่ 10.2.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	150	41,025	6.3	2.1	2.3	10.4	
ร้อยเอ็ด	146	84,641	10.0	2.4	5.3	14.8	
กาฬสินธุ์	123	48,181	8.4	2.0	4.4	12.4	
สกลนคร	169	46,079	7.2	1.6	4.0	10.4	
นครพนม	210	34,202	8.3	1.3	5.8	10.8	
มุกดาหาร	147	12,894	10.3	1.5	7.3	13.3	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	270	153,128	16.1	2.0	12.1	20.2	
ลำพูน	206	30,160	11.9	1.2	9.5	14.3	
ลำปาง	221	56,232	10.7	1.2	8.5	13.0	
อุตรดิตถ์	216	38,511	14.8	1.4	11.9	17.6	
แพร่	255	43,370	13.0	1.4	10.2	15.9	
น่าน	237	25,814	8.1	1.6	5.0	11.2	
พะเยา	246	42,582	13.1	1.5	10.2	15.9	
เชียงราย	221	84,780	11.6	1.0	9.6	13.7	
แม่ฮ่องสอน	233	14,595	11.3	3.7	3.9	18.7	
นครสวรรค์	234	92,567	17.6	2.6	12.6	22.7	
อุทัยธานี	207	19,555	9.9	1.8	6.3	13.4	
กำแพงเพชร	235	57,482	13.5	1.6	10.2	16.7	
ตาก	249	34,789	14.3	2.4	9.6	19.0	
สุโขทัย	267	45,655	11.3	1.3	8.7	14.0	
พิษณุโลก	328	81,952	15.4	1.9	11.7	19.1	
พิจิตร	275	58,993	17.6	1.5	14.6	20.7	
เพชรบูรณ์	210	63,567	11.2	1.5	8.2	14.1	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	187	76,101	8.7	1.4	5.8	11.5	
กระบี่	201	16,829	7.1	1.1	5.0	9.2	
พังงา	242	16,524	10.3	1.1	8.1	12.5	
ภูเก็ต	223	19,818	12.2	1.3	9.6	14.8	
สุราษฎร์ธานี	229	68,432	12.0	1.7	8.6	15.3	
ระนอง	292	13,785	14.0	1.7	10.7	17.3	
ชุมพร	253	39,012	13.4	2.1	9.2	17.6	
สงขลา	254	108,367	15.8	1.7	12.4	19.1	
สตูล	206	16,307	9.9	1.0	7.9	11.9	
ตรัง	239	40,488	11.4	1.3	8.9	13.9	
พัทลุง	219	33,256	10.2	1.2	7.8	12.6	
ปัตตานี	272	43,380	13.2	1.3	10.6	15.8	
ยะลา	237	28,131	11.9	1.6	8.6	15.1	
นราธิวาส	266	60,704	15.7	2.2	11.4	20.1	



ตารางที่ 10.2.7 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ในประชากร ที่เป็นความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	21	21.4	0.6	20.3	22.5
25 - 34	140	28.9	0.4	28.2	29.6
35 - 44	428	37.6	0.3	37.0	38.1
45 - 54	787	44.6	0.5	43.6	45.5
55 - 64	2,343	52.5	0.3	52.0	53.1
65 - 74	1,570	59.6	0.3	59.0	60.3
รวม	5,289	48.4	0.3	47.7	49.1
<b>หญิง</b>					
15 - 24	29	20.5	0.3	20.0	21.0
25 - 34	119	29.4	0.5	28.5	30.3
35 - 44	584	37.2	0.3	36.6	37.8
45 - 54	1,169	45.1	0.2	44.7	45.6
55 - 64	3,025	52.1	0.2	51.7	52.5
65 - 74	1,967	58.6	0.3	57.9	59.3
รวม	6,893	48.3	0.2	47.8	48.8
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	50	20.9	0.3	20.3	21.5
25 - 34	259	29.2	0.3	28.6	29.7
35 - 44	1,012	37.3	0.2	36.9	37.8
45 - 54	1,956	44.9	0.3	44.4	45.4
55 - 64	5,368	52.3	0.2	51.9	52.6
65 - 74	3,537	59.0	0.3	58.5	59.5
รวมทั้งประเทศ	12,182	48.4	0.2	47.9	48.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.2.8 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ในประชากร ที่เป็นความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	6,917	48.5	0.2	48.0	49.0
นอกเขตเทศบาล	5,265	48.3	0.3	47.7	48.8
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	145	47.7	0.8	46.1	49.3
ภาคกลาง	4,265	48.4	0.3	47.8	49.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,161	48.0	0.6	46.8	49.1
ภาคเหนือ	3,111	48.4	0.3	47.9	48.9
ภาคใต้	2,500	49.3	0.5	48.4	50.1
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร.ที่ 1	528	47.9	0.6	46.7	49.1
เขต สคร.ที่ 2	798	49.2	0.7	47.8	50.6
เขต สคร.ที่ 3	1,582	47.5	0.4	46.6	48.3
เขต สคร.ที่ 4	1,357	49.5	0.6	48.3	50.7
เขต สคร.ที่ 5	527	48.2	0.9	46.5	50.0
เขต สคร.ที่ 6	823	48.2	1.0	46.2	50.1
เขต สคร.ที่ 7	811	47.4	1.1	45.2	49.6
เขต สคร.ที่ 8	680	47.9	0.6	46.8	49.0
เขต สคร.ที่ 9	920	47.9	0.5	47.0	48.8
เขต สคร.ที่ 10	1,511	48.9	0.4	48.1	49.7
เขต สคร.ที่ 11	1,232	49.2	0.7	47.9	50.6
เขต สคร.ที่ 12	1,268	49.3	0.6	48.1	50.5

ตารางที่ 10.2.9 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ในประชากร ที่เป็นความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	145	47.7	0.8	46.1	49.3
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	175	47.3	0.6	46.2	48.4
นนทบุรี	188	47.2	0.9	45.5	49.0
ปทุมธานี	131	49.3	1.4	46.6	52.0
พระนครศรีอยุธยา	209	47.7	0.7	46.3	49.2
อ่างทอง	176	48.8	1.0	46.9	50.7
ลพบุรี	186	48.9	1.5	45.9	51.9
สิงห์บุรี	168	49.3	1.1	47.2	51.4
ชัยนาท	127	50.5	1.2	48.1	52.9
สระบุรี	141	48.9	1.3	46.3	51.5
ชลบุรี	210	47.6	1.2	45.3	49.9
ระยอง	137	45.0	1.3	42.5	47.6
จันทบุรี	202	48.3	0.9	46.5	50.0
ตราด	193	48.5	1.1	46.3	50.8
ฉะเชิงเทรา	157	48.3	0.8	46.6	49.9
ปราจีนบุรี	211	48.5	1.4	45.7	51.2
นครนายก	153	50.2	1.2	47.7	52.6
สระแก้ว	144	44.8	2.4	40.1	49.5
ราชบุรี	171	48.9	0.9	47.1	50.7
กาญจนบุรี	165	49.3	1.4	46.5	52.1
สุพรรณบุรี	170	51.1	2.1	47.0	55.3
นครปฐม	123	49.0	1.7	45.6	52.4
สมุทรสาคร	168	48.3	1.3	45.8	50.8
สมุทรสงคราม	253	50.1	0.8	48.6	51.6
เพชรบุรี	199	49.0	1.4	46.3	51.7
ประจวบคีรีขันธ์	108	49.5	1.3	46.8	52.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	159	48.5	1.3	46.0	51.0
บุรีรัมย์	125	49.2	2.2	44.9	53.4
สุรินทร์	134	47.8	1.0	45.8	49.7
ศรีสะเกษ	99	49.6	1.8	46.0	53.2
อุบลราชธานี	118	46.0	2.3	41.4	50.6
ยโสธร	139	49.1	1.8	45.5	52.7
ชัยภูมิ	109	46.5	3.6	39.4	53.6
อำนาจเจริญ	111	45.3	1.5	42.4	48.2
หนองบัวลำภู	120	48.5	0.9	46.7	50.3
ขอนแก่น	107	50.2	0.9	48.4	52.0
อุดรธานี	100	52.0	1.7	48.6	55.3
เลย	106	48.3	1.0	46.3	50.3
หนองคาย	123	47.7	0.9	46.0	49.5

ตารางที่ 10.2.9 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ในประชากร ที่เป็นความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)</b>					
มหาสารคาม	109	48.2	1.3	45.6	50.8
ร้อยเอ็ด	91	44.0	2.2	39.6	48.3
กาฬสินธุ์	67	46.0	2.6	40.8	51.2
สกลนคร	89	47.8	1.4	45.0	50.6
นครพนม	136	47.9	1.3	45.3	50.4
มุกดาหาร	119	47.9	1.3	45.3	50.4
<b>ภาคเหนือ</b>					
เชียงใหม่	204	48.3	0.8	46.8	49.9
ลำพูน	170	48.6	0.7	47.3	50.0
ลำปาง	203	49.2	0.7	47.9	50.6
อุตรดิตถ์	134	48.6	1.0	46.6	50.6
แพร่	202	49.6	0.9	47.9	51.3
น่าน	205	50.3	1.1	48.1	52.5
พะเยา	188	50.5	0.8	48.9	52.1
เชียงราย	196	48.3	1.1	46.2	50.5
แม่ฮ่องสอน	143	48.4	2.8	42.9	53.9
นครสวรรค์	171	49.8	0.8	48.3	51.3
อุทัยธานี	130	46.4	2.9	40.6	52.1
กำแพงเพชร	164	47.9	1.0	45.9	49.8
ตาก	181	47.0	0.9	45.2	48.7
สุโขทัย	212	47.8	1.0	45.8	49.8
พิษณุโลก	233	47.2	0.9	45.5	48.8
พิจิตร	215	46.2	1.1	44.0	48.4
เพชรบูรณ์	160	48.9	1.1	46.8	51.0
<b>ภาคใต้</b>					
นครศรีธรรมราช	145	50.6	1.2	48.2	53.0
กระบี่	178	48.0	1.6	44.8	51.2
พังงา	177	49.3	1.6	46.0	52.5
ภูเก็ต	164	47.4	1.8	43.8	51.0
สุราษฎร์ธานี	164	48.6	1.7	45.3	51.9
ระนอง	215	47.2	0.8	45.6	48.8
ชุมพร	189	49.2	1.8	45.7	52.8
สงขลา	164	49.4	1.5	46.5	52.3
สตูล	139	47.8	1.0	45.8	49.8
ตรัง	183	50.0	1.0	48.0	52.1
พัทลุง	198	51.0	1.1	48.8	53.3
ปัตตานี	205	50.3	1.5	47.3	53.3
ยะลา	167	46.7	1.2	44.3	49.1
นราธิวาส	212	48.4	1.0	46.4	50.4

ตารางที่ 10.3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากรที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	41	25,630	59.0	8.7	41.9	76.2
25 - 34	149	61,608	69.3	4.1	61.3	77.2
35 - 44	465	163,776	79.4	2.4	74.7	84.1
45 - 54	899	369,797	87.0	2.0	83.1	90.8
55 - 64	2,797	441,008	92.5	0.8	91.0	94.0
65 - 74	1,906	293,198	94.0	0.9	92.2	95.8
รวม	6,257	1,355,016	87.3	0.8	85.7	88.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	52	23,980	52.0	9.3	33.8	70.3
25 - 34	158	65,340	69.1	4.8	59.7	78.5
35 - 44	663	288,234	80.8	2.1	76.6	85.0
45 - 54	1,362	644,267	91.9	1.0	89.9	93.9
55 - 64	3,764	728,700	95.2	0.6	94.1	96.3
65 - 74	2,461	454,482	96.3	0.6	95.1	97.6
รวม	8,460	2,205,002	90.5	0.6	89.3	91.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	93	49,610	55.4	5.3	45.1	65.8
25 - 34	307	126,948	69.2	3.3	62.7	75.7
35 - 44	1,128	452,009	80.3	1.7	77.0	83.6
45 - 54	2,261	1,014,064	90.0	1.1	87.8	92.2
55 - 64	6,561	1,169,708	94.2	0.5	93.3	95.1
65 - 74	4,367	747,680	95.4	0.5	94.4	96.5
รวมทั้งประเทศ	14,717	3,560,018	89.3	0.6	88.1	90.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากร ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	8,344	1,444,934	90.8	0.7	89.4	92.3
นอกเขตเทศบาล	6,373	2,115,084	88.2	0.8	86.7	89.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	215	403,618	95.1	1.5	92.0	98.3
ภาคกลาง	5,186	961,080	90.0	0.9	88.3	91.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,579	864,665	85.9	1.4	83.2	88.6
ภาคเหนือ	3,783	847,399	91.1	1.3	88.6	93.6
ภาคใต้	2,954	483,257	86.3	1.1	84.0	88.5
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	675	183,148	87.8	2.2	83.5	92.0
เขต สคร.ที่ 2	1,025	134,848	92.2	1.8	88.7	95.7
เขต สคร.ที่ 3	1,937	378,748	93.8	1.2	91.6	96.1
เขต สคร.ที่ 4	1,549	264,336	85.6	2.0	81.6	89.6
เขต สคร.ที่ 5	616	294,298	86.9	2.9	81.2	92.5
เขต สคร.ที่ 6	999	342,438	84.7	2.2	80.5	89.0
เขต สคร.ที่ 7	964	227,929	86.5	1.8	83.1	90.0
เขต สคร.ที่ 8	851	198,654	89.3	2.0	85.4	93.3
เขต สคร.ที่ 9	1,232	255,051	97.8	0.7	96.4	99.2
เขต สคร.ที่ 10	1,700	393,694	88.1	2.4	83.5	92.8
เขต สคร.ที่ 11	1,449	208,954	86.7	1.6	83.5	89.8
เขต สคร.ที่ 12	1,505	274,303	86.0	1.6	82.9	89.0

ตารางที่ 10.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากร ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	215	403,618	95.1	1.5	92.0	98.3
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	227	79,682	86.3	4.6	77.3	95.4
นนทบุรี	229	71,598	87.7	4.0	80.0	95.5
ปทุมธานี	174	49,709	88.2	3.5	81.3	95.2
พระนครศรีอยุธยา	272	61,841	87.5	3.4	80.8	94.1
อ่างทอง	202	17,693	97.7	0.9	95.8	99.5
ลพบุรี	205	46,207	86.4	3.6	79.3	93.4
สิงห์บุรี	229	17,472	98.0	1.1	95.9	100.0
ชัยนาท	199	23,994	88.3	5.4	77.7	98.8
สระบุรี	190	29,482	99.4	0.6	98.1	100.0
ชลบุรี	264	93,540	99.3	0.4	98.5	100.0
ระยอง	184	31,224	85.2	4.7	76.0	94.5
จันทบุรี	230	36,007	99.7	0.3	99.1	100.0
ตราด	229	14,202	96.1	1.8	92.4	99.7
ฉะเชิงเทรา	198	43,685	99.2	0.8	97.7	100.0
ปราจีนบุรี	220	27,776	97.3	1.5	94.3	100.0
นครนายก	190	18,889	97.2	1.3	94.6	99.8
สระแก้ว	195	33,742	89.8	4.2	81.6	98.1
ราชบุรี	202	48,985	83.8	3.6	76.7	90.9
กาญจนบุรี	186	39,064	82.5	4.6	73.4	91.6
สุพรรณบุรี	196	52,720	88.5	7.0	74.8	100.0
นครปฐม	147	37,524	82.6	6.4	70.0	95.3
สมุทรสาคร	206	23,729	95.6	1.3	93.0	98.1
สมุทรสงคราม	266	12,401	88.8	4.0	81.0	96.6
เพชรบุรี	211	30,224	88.6	2.7	83.3	94.0
ประจวบคีรีขันธ์	135	19,688	77.9	5.0	68.2	87.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	208	158,510	94.1	2.8	88.7	99.5
บุรีรัมย์	123	45,427	78.2	11.2	56.2	100.0
สุรินทร์	148	50,697	77.6	3.8	70.1	85.1
ศรีสะเกษ	119	38,084	79.7	5.7	68.6	90.8
อุบลราชธานี	129	79,923	88.5	2.8	82.9	94.1
ยโสธร	141	18,454	88.1	6.3	75.6	100.0
ชัยภูมิ	137	39,664	84.6	8.5	68.0	100.0
อำนาจเจริญ	132	13,114	81.3	4.0	73.5	89.2
หนองบัวลำภู	118	15,310	83.5	5.3	73.0	93.9
ขอนแก่น	129	84,908	86.4	2.6	81.4	91.4
อุดรธานี	123	45,550	82.7	5.1	72.7	92.7
เลย	131	27,832	92.5	3.4	85.8	99.1
หนองคาย	160	39,953	86.0	3.8	78.6	93.4

ตารางที่ 10.3.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากร ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อายุ 15-74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	123	28,873	80.9	3.6	73.8 - 88.0
ร้อยเอ็ด	122	68,836	95.5	2.8	89.9 - 100.0
กาฬสินธุ์	93	31,177	64.9	8.4	48.3 - 81.5
สกลนคร	156	42,676	96.1	2.4	91.4 - 100.0
นครพนม	159	25,051	79.4	4.8	70.0 - 88.9
มุกดาหาร	128	10,627	86.8	4.3	78.4 - 95.2
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	236	130,924	85.8	6.2	73.7 - 98.0
ลำพูน	186	27,154	91.3	2.9	85.5 - 97.0
ลำปาง	208	51,357	91.6	3.3	85.2 - 98.1
อุตรดิตถ์	195	33,335	89.0	3.7	81.7 - 96.3
แพร่	233	38,828	89.7	4.6	80.6 - 98.8
น่าน	217	22,668	87.8	4.4	79.2 - 96.4
พะเยา	214	34,842	82.5	6.1	70.5 - 94.4
เชียงราย	198	75,233	90.3	2.7	85.1 - 95.6
แม่ฮ่องสอน	208	12,688	92.3	5.4	81.7 - 100.0
นครสวรรค์	202	77,279	84.6	3.6	77.6 - 91.6
อุทัยธานี	168	14,851	82.7	5.7	71.4 - 93.9
กำแพงเพชร	211	49,463	88.6	4.2	80.4 - 96.8
ตาก	248	34,661	99.6	0.3	98.9 - 100.0
สุโขทัย	263	45,164	99.3	0.7	97.9 - 100.0
พิษณุโลก	324	80,519	98.6	0.9	96.8 - 100.0
พิจิตร	270	57,062	99.7	0.3	99.2 - 100.0
เพชรบูรณ์	202	61,372	100.0	0.0	100.0 - 100.0
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	162	65,700	87.7	3.0	81.8 - 93.6
กระบี่	187	15,542	94.1	3.5	87.3 - 100.0
พังงา	217	13,658	82.9	4.6	73.9 - 91.9
ภูเก็ต	208	17,713	91.7	3.2	85.4 - 98.1
สุราษฎร์ธานี	194	53,704	85.0	3.3	78.6 - 91.4
ระนอง	268	11,770	85.8	5.3	75.3 - 96.3
ชุมพร	213	30,866	83.4	4.8	73.9 - 92.9
สงขลา	224	88,616	82.1	3.4	75.5 - 88.7
สตูล	185	14,209	91.4	4.2	83.2 - 99.6
ตรัง	222	35,951	93.9	2.1	89.7 - 98.0
พัทลุง	211	31,087	95.0	2.5	90.1 - 99.8
ปัตตานี	226	30,575	83.0	3.2	76.6 - 89.3
ยะลา	207	23,672	85.4	3.3	79.0 - 91.9
นราธิวาส	230	50,192	83.6	2.9	77.9 - 89.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.3.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการผ่อนคลายความเครียด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	28	19,964	51.1	11.3	29.0	73.2
25 - 34	106	44,639	57.8	5.2	47.6	68.0
35 - 44	372	135,118	70.9	2.9	65.3	76.5
45 - 54	764	317,592	79.6	2.2	75.3	84.0
55 - 64	2,541	402,202	88.0	0.9	86.2	89.8
65 - 74	1,752	266,497	89.9	1.6	86.9	93.0
รวม	5,563	1,186,012	81.3	0.9	79.5	83.1
<b>หญิง</b>						
15 - 24	41	20,628	47.1	9.5	28.4	65.8
25 - 34	130	51,042	58.2	5.7	47.0	69.3
35 - 44	588	262,781	76.9	2.3	72.4	81.5
45 - 54	1,222	579,175	87.3	1.3	84.8	89.8
55 - 64	3,500	681,250	91.7	0.7	90.2	93.1
65 - 74	2,284	424,892	93.8	0.8	92.3	95.3
รวม	7,765	2,019,766	86.6	0.7	85.1	88.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	69	40,592	49.0	6.1	37.1	60.9
25 - 34	236	95,681	58.0	4.0	50.1	65.8
35 - 44	960	397,899	74.8	1.9	71.1	78.4
45 - 54	1,986	896,766	84.4	1.3	81.9	87.0
55 - 64	6,041	1,083,451	90.3	0.6	89.1	91.4
65 - 74	4,036	691,389	92.3	0.8	90.8	93.8
รวมทั้งประเทศ	13,328	3,205,778	84.5	0.6	83.3	85.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการผ่อนคลายความเครียด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	7,587	1,309,154	86.2	0.9	84.5	88.0
นอกเขตเทศบาล	5,741	1,896,624	83.4	0.9	81.7	85.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	197	363,885	92.1	2.1	87.7	96.4
ภาคกลาง	4,639	855,502	84.6	1.0	82.6	86.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,384	782,282	80.5	1.4	77.8	83.3
ภาคเหนือ	3,408	759,934	86.6	1.4	83.9	89.3
ภาคใต้	2,700	444,175	82.8	1.2	80.4	85.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	630	169,980	83.3	2.2	79.1	87.6
เขต สคร.ที่ 2	939	120,938	87.1	2.5	82.2	92.0
เขต สคร.ที่ 3	1,666	322,542	87.1	1.4	84.3	89.9
เขต สคร.ที่ 4	1,404	242,041	81.2	2.1	77.0	85.3
เขต สคร.ที่ 5	575	273,193	83.0	3.0	77.0	88.9
เขต สคร.ที่ 6	935	307,348	77.3	2.0	73.5	81.2
เขต สคร.ที่ 7	874	201,741	82.5	1.8	79.0	86.0
เขต สคร.ที่ 8	754	177,778	84.5	2.1	80.4	88.7
เขต สคร.ที่ 9	1,063	212,165	91.1	1.3	88.5	93.7
เขต สคร.ที่ 10	1,591	369,991	85.2	2.4	80.4	90.0
เขต สคร.ที่ 11	1,350	198,019	83.8	1.7	80.3	87.2
เขต สคร.ที่ 12	1,350	246,156	82.1	1.7	78.8	85.4

ตารางที่ 10.3.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการผ่อนคลายความเครียด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	197	363,885	92.1	2.1	87.7	96.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	197	69,818	79.1	4.8	69.6	88.6
นนทบุรี	205	64,247	80.7	4.0	72.8	88.6
ปทุมธานี	165	46,909	83.6	3.3	77.1	90.2
พระนครศรีอยุธยา	260	58,825	86.2	3.5	79.3	93.1
อ่างทอง	187	16,240	91.2	2.8	85.7	96.8
ลพบุรี	197	44,449	83.4	5.1	73.5	93.4
สิงห์บุรี	219	16,553	94.2	1.6	91.0	97.4
ชัยนาท	166	17,561	79.4	7.4	64.9	93.9
สระบุรี	170	26,134	92.9	3.2	86.6	99.3
ชลบุรี	240	84,058	93.0	2.4	88.3	97.7
ระยอง	153	25,402	74.3	6.5	61.6	87.1
จันทบุรี	187	27,324	92.4	3.2	86.0	98.7
ตราด	197	10,837	92.5	2.2	88.2	96.8
ฉะเชิงเทรา	164	36,208	97.8	1.3	95.2	100.0
ปราจีนบุรี	194	24,800	93.3	2.7	88.0	98.7
นครนายก	164	15,921	88.4	6.6	75.5	100.0
สระแก้ว	170	28,174	81.4	3.4	74.8	88.1
ราชบุรี	178	44,190	79.1	4.4	70.4	87.9
กาญจนบุรี	174	37,102	80.4	4.7	71.1	89.7
สุพรรณบุรี	183	49,170	84.4	6.8	71.2	97.7
นครปฐม	140	36,009	79.3	6.4	66.7	91.8
สมุทรสาคร	185	20,927	89.9	2.3	85.4	94.4
สมุทรสงคราม	236	11,225	82.8	4.4	74.2	91.5
เพชรบุรี	183	25,886	80.8	3.4	74.2	87.4
ประจวบคีรีขันธ์	125	17,531	74.0	5.1	64.0	83.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	193	144,839	89.6	3.3	83.0	96.1
บุรีรัมย์	114	43,193	74.6	10.8	53.3	95.9
สุรินทร์	141	47,531	75.2	4.2	67.0	83.4
ศรีสะเกษ	104	33,988	77.0	6.3	64.7	89.4
อุบลราชธานี	120	75,477	84.8	2.6	79.7	90.0
ยโสธร	137	18,000	85.9	6.0	74.2	97.6
ชัยภูมิ	127	37,630	80.9	8.7	63.8	98.0
อำนาจเจริญ	121	11,058	75.9	5.4	65.3	86.5
หนองบัวลำภู	108	13,227	72.6	4.4	63.9	81.3
ขอนแก่น	119	75,456	77.8	4.0	69.9	85.8
อุดรธานี	119	43,256	78.5	4.7	69.2	87.8
เลย	127	26,200	89.4	4.0	81.6	97.2
หนองคาย	142	35,583	80.2	4.6	71.1	89.2

ตารางที่ 10.3.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการผ่อนคลายความเครียด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	117	26,622	75.7	4.0	67.7	83.6	
ร้อยเอ็ด	116	57,368	81.5	4.3	73.0	90.0	
กาฬสินธุ์	87	29,638	61.9	8.8	44.7	79.2	
สกลนคร	127	30,965	91.3	3.7	84.1	98.5	
นครพนม	144	22,302	74.0	4.7	64.9	83.2	
มุกดาหาร	121	9,952	83.7	4.2	75.3	92.0	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	223	123,857	82.5	6.3	70.1	95.0	
ลำพูน	181	26,331	88.5	3.9	80.8	96.2	
ลำปาง	199	49,263	89.8	3.0	83.9	95.8	
อุตรดิตถ์	183	30,814	83.8	3.2	77.5	90.1	
แพร่	225	37,146	87.1	4.4	78.4	95.8	
น่าน	208	22,240	87.0	4.5	78.2	95.8	
พะเยา	205	33,272	79.4	5.9	67.8	90.9	
เชียงราย	190	72,367	88.5	2.7	83.2	93.7	
แม่ฮ่องสอน	160	5,513	72.1	8.8	54.8	89.5	
นครสวรรค์	188	74,691	82.2	3.5	75.3	89.1	
อุทัยธานี	159	14,366	80.5	6.0	68.8	92.2	
กำแพงเพชร	191	42,705	83.4	5.1	73.3	93.4	
ตาก	208	27,698	93.5	1.7	90.2	96.8	
สุโขทัย	238	40,855	94.0	2.0	90.2	97.9	
พิษณุโลก	268	61,650	90.1	2.9	84.4	95.7	
พิจิตร	216	46,017	91.2	2.7	85.9	96.6	
เพชรบูรณ์	166	51,149	93.6	2.7	88.3	98.9	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	153	63,292	85.7	3.1	79.5	91.9	
กระบี่	174	14,715	92.3	3.8	84.8	99.7	
พังงา	197	12,217	78.3	4.2	70.1	86.6	
ภูเก็ต	195	16,776	89.6	3.6	82.5	96.8	
สุราษฎร์ธานี	184	51,321	81.8	3.9	74.2	89.4	
ระนอง	252	11,374	84.2	5.3	73.7	94.7	
ชุมพร	195	28,324	78.6	4.4	69.9	87.2	
สงขลา	209	82,959	78.7	3.6	71.6	85.8	
สตูล	165	12,830	88.8	4.3	80.4	97.2	
ตรัง	177	25,289	85.4	5.0	75.6	95.2	
พัทลุง	186	26,756	92.0	2.8	86.5	97.4	
ปัตตานี	203	28,322	79.9	3.0	73.9	85.9	
ยะลา	195	22,328	83.4	2.9	77.6	89.2	
นราธิวาส	215	47,673	80.8	3.1	74.7	87.0	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ของทอด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	33	21,592	53.3	10.8	32.2	74.4
25 - 34	105	44,761	57.7	5.1	47.8	67.7
35 - 44	389	137,540	71.8	2.8	66.3	77.3
45 - 54	782	323,340	79.8	2.3	75.2	84.4
55 - 64	2,549	400,855	87.4	0.9	85.5	89.2
65 - 74	1,761	266,578	88.9	1.5	85.9	91.9
รวม	5,619	1,194,667	81.1	1.0	79.2	83.0
<b>หญิง</b>						
15 - 24	41	19,857	44.7	8.3	28.4	61.0
25 - 34	121	53,103	60.6	5.3	50.2	70.9
35 - 44	591	264,750	76.6	2.3	72.0	81.2
45 - 54	1,241	580,984	86.8	1.6	83.7	89.8
55 - 64	3,525	681,074	90.6	0.8	89.0	92.2
65 - 74	2,299	424,786	92.6	0.9	90.9	94.3
รวม	7,818	2,024,555	85.9	0.8	84.3	87.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	74	41,450	48.8	5.6	37.9	59.7
25 - 34	226	97,865	59.2	3.8	51.8	66.6
35 - 44	980	402,290	74.9	1.9	71.2	78.5
45 - 54	2,023	904,324	84.1	1.4	81.4	86.9
55 - 64	6,074	1,081,929	89.4	0.6	88.1	90.6
65 - 74	4,060	691,364	91.1	0.9	89.3	93.0
รวมทั้งประเทศ	13,437	3,219,221	84.0	0.7	82.7	85.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ของทอด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	7,618	1,298,522	85.0	1.0	83.0	86.9
นอกเขตเทศบาล	5,819	1,920,700	83.4	0.9	81.7	85.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	196	358,030	90.2	2.8	84.3	96.0
ภาคกลาง	4,699	862,620	84.1	1.0	82.1	86.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,396	791,802	80.6	1.4	77.9	83.4
ภาคเหนือ	3,443	767,981	86.5	1.4	83.8	89.2
ภาคใต้	2,703	438,789	81.6	1.2	79.3	83.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	619	166,454	81.2	2.6	76.1	86.3
เขต สคร.ที่ 2	964	124,652	87.6	2.2	83.2	92.0
เขต สคร.ที่ 3	1,686	329,227	87.1	1.3	84.5	89.8
เขต สคร.ที่ 4	1,430	242,287	80.5	2.1	76.3	84.6
เขต สคร.ที่ 5	580	273,933	82.9	3.2	76.7	89.1
เขต สคร.ที่ 6	932	308,928	77.0	1.7	73.7	80.3
เขต สคร.ที่ 7	884	208,942	83.5	2.0	79.6	87.4
เขต สคร.ที่ 8	761	179,846	84.9	2.1	80.8	88.9
เขต สคร.ที่ 9	1,096	219,316	92.9	1.2	90.5	95.2
เขต สคร.ที่ 10	1,586	368,819	83.9	2.4	79.1	88.6
เขต สคร.ที่ 11	1,345	194,498	82.1	1.8	78.6	85.5
เขต สคร.ที่ 12	1,358	244,291	81.2	1.6	78.1	84.3

ตารางที่ 10.3.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ของทอด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
กรุงเทพมหานคร	196	358,030	90.2	2.8	84.3	96.0	
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	201	71,927	79.5	4.5	70.8	88.3	
นนทบุรี	189	59,650	76.3	5.4	65.6	86.9	
ปทุมธานี	165	46,277	82.1	3.8	74.6	89.6	
พระนครศรีอยุธยา	265	60,526	86.0	3.6	79.0	93.0	
อ่างทอง	190	16,123	89.6	2.4	84.9	94.4	
ลพบุรี	193	44,114	82.5	4.9	72.8	92.1	
สิงห์บุรี	221	16,840	96.1	1.5	93.2	99.1	
ชัยนาท	185	21,124	84.6	5.7	73.4	95.7	
สระบุรี	175	26,451	93.4	2.6	88.3	98.6	
ชลบุรี	232	83,007	92.1	2.1	88.0	96.2	
ระยอง	169	28,541	79.6	5.8	68.2	90.9	
จันทบุรี	188	27,934	91.9	2.6	86.8	97.0	
ตราด	201	10,697	90.5	2.5	85.5	95.4	
ฉะเชิงเทรา	165	35,694	95.2	1.8	91.6	98.7	
ปราจีนบุรี	191	24,218	91.3	3.7	84.0	98.6	
นครนายก	162	16,073	87.5	3.5	80.6	94.4	
สระแก้ว	177	31,135	84.5	3.9	76.8	92.1	
ราชบุรี	189	46,417	80.4	4.3	72.0	88.8	
กาญจนบุรี	166	33,667	72.7	4.2	64.4	80.9	
สุพรรณบุรี	183	47,838	84.1	7.2	69.9	98.4	
นครปฐม	142	36,402	80.1	5.7	68.9	91.4	
สมุทรสาคร	187	21,513	92.0	2.1	87.9	96.1	
สมุทรสงคราม	245	11,549	82.8	3.7	75.5	90.2	
เพชรบุรี	194	27,856	83.0	3.9	75.3	90.7	
ประจวบคีรีขันธ์	124	17,044	71.4	5.6	60.3	82.4	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	191	145,854	89.8	2.8	84.4	95.3	
บุรีรัมย์	119	44,852	77.2	11.1	55.3	99.0	
สุรินทร์	141	46,358	73.2	5.5	62.3	84.0	
ศรีสะเกษ	105	35,311	76.2	5.6	65.2	87.2	
อุบลราชธานี	127	79,125	88.0	3.0	82.1	94.0	
ยโสธร	138	18,051	86.7	6.5	73.9	99.5	
ชัยภูมิ	129	36,869	79.0	11.0	57.4	100.0	
อำนาจเจริญ	114	11,562	73.2	5.4	62.6	83.7	
หนองบัวลำภู	107	13,633	74.7	4.3	66.4	83.1	
ขอนแก่น	122	77,548	78.9	1.9	75.2	82.6	
อุดรธานี	109	39,587	72.3	3.6	65.2	79.3	
เลย	126	26,423	87.8	4.4	79.1	96.4	
หนองคาย	145	36,523	81.8	3.7	74.6	89.0	

ตารางที่ 10.3.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ของทอด ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	117	27,532	77.1	6.1	65.2	89.1
ร้อยเอ็ด	119	58,698	81.6	3.7	74.4	88.8
กาฬสินธุ์	87	28,984	60.8	8.4	44.3	77.4
สกลนคร	128	31,522	90.7	4.9	81.2	100.0
นครพนม	146	22,987	74.9	3.8	67.5	82.3
มุกดาหาร	126	10,384	86.5	4.3	78.0	95.0
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	215	118,704	78.3	6.3	65.8	90.7
ลำพูน	177	25,753	87.1	3.4	80.4	93.9
ลำปาง	203	50,671	90.6	3.3	84.2	97.0
อุตรดิตถ์	185	31,484	84.4	4.2	76.1	92.6
แพร่	226	37,684	87.2	4.5	78.3	96.1
น่าน	208	21,843	84.8	4.5	76.1	93.6
พะเยา	203	33,002	79.4	5.8	67.9	90.9
เชียงราย	193	73,805	88.9	2.9	83.3	94.6
แม่ฮ่องสอน	161	7,357	80.3	7.6	65.5	95.2
นครสวรรค์	194	74,854	82.0	3.4	75.2	88.7
อุทัยธานี	161	14,370	80.4	5.8	69.0	91.8
กำแพงเพชร	189	44,045	84.7	5.1	74.6	94.7
ตาก	217	28,511	92.9	3.9	85.2	100.0
สุโขทัย	245	41,719	94.5	2.5	89.6	99.4
พิษณุโลก	275	64,017	93.8	1.8	90.3	97.2
พิจิตร	217	46,577	91.8	2.6	86.6	97.0
เพชรบูรณ์	174	53,585	96.1	1.5	93.2	98.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	149	62,153	84.7	3.1	78.7	90.8
กระบี่	174	13,771	84.3	4.9	74.7	94.0
พังงา	201	12,310	77.3	4.6	68.2	86.3
ภูเก็ต	195	16,311	86.2	5.6	75.1	97.3
สุราษฎร์ธานี	184	51,888	82.3	3.2	75.9	88.6
ระนอง	244	10,448	79.9	4.4	71.1	88.6
ชุมพร	198	27,616	76.0	5.8	64.6	87.4
สงขลา	191	78,156	74.5	3.1	68.4	80.6
สตูล	168	13,202	89.7	4.1	81.5	97.8
ตรัง	182	26,700	90.0	2.5	85.1	94.9
พัทลุง	187	26,504	91.1	3.3	84.6	97.6
ปัตตานี	213	28,251	79.1	3.6	72.1	86.1
ยะลา	196	22,589	83.9	3.3	77.4	90.3
นราธิวาส	221	48,889	81.8	3.1	75.8	87.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.3.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลดอาหารเค็ม หรือลดการกินเกลือ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	29	20,644	51.0	10.9	29.5	72.4
25 - 34	110	46,171	59.0	5.0	49.2	68.8
35 - 44	388	137,474	71.8	2.8	66.3	77.3
45 - 54	765	316,334	78.5	2.2	74.2	82.9
55 - 64	2,513	399,172	87.0	1.0	85.2	88.9
65 - 74	1,718	260,399	87.0	1.6	83.9	90.1
รวม	5,523	1,180,195	80.2	0.9	78.4	82.0
<b>หญิง</b>						
15 - 24	39	21,103	52.4	9.7	33.4	71.4
25 - 34	127	54,781	63.1	5.2	52.9	73.4
35 - 44	583	260,676	75.7	2.4	71.1	80.4
45 - 54	1,217	578,605	86.2	1.3	83.6	88.8
55 - 64	3,526	685,803	91.3	0.7	90.0	92.6
65 - 74	2,272	422,596	92.7	0.8	91.2	94.2
รวม	7,764	2,023,564	86.1	0.7	84.8	87.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	68	41,747	51.7	5.8	40.3	63.1
25 - 34	237	100,952	61.2	3.8	53.8	68.5
35 - 44	971	398,150	74.3	1.9	70.6	78.0
45 - 54	1,982	894,939	83.3	1.3	80.8	85.9
55 - 64	6,039	1,084,975	89.7	0.6	88.6	90.8
65 - 74	3,990	682,995	90.4	0.8	88.9	92.0
รวมทั้งประเทศ	13,287	3,203,759	83.9	0.6	82.6	85.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลดอาหารเค็ม หรือลดการกินเกลือ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	7,564	1,324,632	86.6	0.8	85.0	88.2
นอกเขตเทศบาล	5,723	1,879,128	82.1	0.9	80.3	83.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	203	378,417	94.6	1.6	91.2	97.9
ภาคกลาง	4,661	864,238	84.2	1.0	82.3	86.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,355	786,134	80.5	1.4	77.7	83.3
ภาคเหนือ	3,365	738,022	83.8	1.6	80.7	86.8
ภาคใต้	2,703	436,948	81.5	1.2	79.2	83.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	638	171,852	83.2	2.2	78.9	87.5
เขต สคร.ที่ 2	954	124,198	87.8	2.0	83.9	91.7
เขต สคร.ที่ 3	1,656	328,022	86.6	1.5	83.8	89.5
เขต สคร.ที่ 4	1,413	240,166	80.1	2.0	76.2	84.0
เขต สคร.ที่ 5	562	271,089	83.0	3.0	77.1	89.0
เขต สคร.ที่ 6	918	309,949	77.5	1.9	73.7	81.3
เขต สคร.ที่ 7	875	205,095	81.9	2.1	77.8	86.0
เขต สคร.ที่ 8	729	166,765	79.1	3.2	72.9	85.3
เขต สคร.ที่ 9	1,058	203,661	87.7	2.1	83.7	91.8
เขต สคร.ที่ 10	1,578	367,596	83.9	2.4	79.2	88.6
เขต สคร.ที่ 11	1,357	194,359	82.7	1.5	79.6	85.7
เขต สคร.ที่ 12	1,346	242,589	80.6	1.7	77.3	83.9

ตารางที่ 10.3.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลดอาหารเค็ม หรือลดการกินเกลือ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	203	378,417	94.6	1.6	91.2	97.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	207	73,288	80.9	4.5	72.1	89.8
นนทบุรี	209	65,509	82.0	4.4	73.3	90.6
ปทุมธานี	165	46,185	82.0	2.4	77.3	86.6
พระนครศรีอยุธยา	264	60,158	85.7	3.6	78.6	92.8
อ่างทอง	189	16,443	92.1	2.4	87.4	96.8
ลพบุรี	193	43,417	81.8	4.1	73.7	89.8
สิงห์บุรี	219	16,859	96.2	1.4	93.4	99.0
ชัยนาท	177	20,269	82.5	5.4	72.0	93.0
สระบุรี	176	27,210	95.8	1.8	92.2	99.4
ชลบุรี	240	86,135	95.1	1.6	91.9	98.2
ระยอง	171	28,931	80.7	5.7	69.5	91.8
จันทบุรี	181	28,118	93.2	2.7	88.0	98.4
ตราด	190	10,449	89.3	3.1	83.1	95.4
ฉะเชิงเทรา	156	34,042	91.2	2.0	87.3	95.0
ปราจีนบุรี	183	21,910	81.9	3.8	74.5	89.3
นครนายก	160	15,392	83.8	9.5	65.1	100.0
สระแก้ว	168	29,757	80.0	5.1	70.0	89.9
ราชบุรี	182	44,409	76.6	4.2	68.3	85.0
กาญจนบุรี	171	36,246	78.8	4.1	70.7	86.8
สุพรรณบุรี	180	47,258	84.1	7.2	70.0	98.2
นครปฐม	139	35,421	78.0	5.1	67.9	88.1
สมุทรสาคร	188	21,319	91.7	1.9	88.0	95.5
สมุทรสงคราม	238	11,076	80.6	3.7	73.2	87.9
เพชรบุรี	186	26,347	79.1	3.2	73.0	85.3
ประจวบคีรีขันธ์	129	18,090	75.7	5.2	65.5	85.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	187	144,090	90.8	2.4	86.0	95.6
บุรีรัมย์	115	44,103	76.1	10.9	54.7	97.6
สุรินทร์	134	46,174	73.2	4.3	64.7	81.8
ศรีสะเกษ	111	36,550	78.5	5.6	67.6	89.5
อุบลราชธานี	123	76,777	86.6	3.3	80.0	93.2
ยโสธร	137	17,918	86.1	6.5	73.2	98.9
ชัยภูมิ	126	36,722	78.7	11.0	57.2	100.0
อำนาจเจริญ	113	10,951	70.2	6.5	57.5	83.0
หนองบัวลำภู	99	12,758	69.8	4.5	60.9	78.6
ขอนแก่น	119	79,979	81.5	1.7	78.1	84.9
อุดรธานี	115	41,716	76.9	4.6	67.9	86.0
เลย	122	25,216	85.6	4.6	76.6	94.6
หนองคาย	144	36,441	81.1	3.3	74.6	87.5

ตารางที่ 10.3.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลดอาหารเค็ม หรือลดการกินเกลือ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	116	27,493	77.0	6.1	65.1 - 89.0
ร้อยเอ็ด	117	59,088	82.2	4.2	73.9 - 90.5
กาฬสินธุ์	86	27,258	57.6	9.5	38.8 - 76.3
สกลนคร	125	31,579	87.9	4.3	79.5 - 96.4
นครพนม	144	21,530	69.8	5.1	59.9 - 79.8
มุกดาหาร	122	9,790	81.7	5.1	71.7 - 91.8
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	221	122,431	80.7	6.1	68.8 - 92.6
ลำพูน	173	25,041	84.6	4.4	76.0 - 93.3
ลำปาง	198	49,627	89.0	3.2	82.6 - 95.3
อุตรดิตถ์	183	30,221	82.3	4.7	73.1 - 91.6
แพร่	223	37,002	85.6	4.3	77.1 - 94.1
น่าน	204	21,427	83.5	4.8	74.0 - 93.0
พะเยา	198	32,337	78.7	5.8	67.3 - 90.1
เชียงราย	190	73,075	88.1	3.0	82.1 - 94.0
แม่ฮ่องสอน	171	6,656	81.0	7.5	66.3 - 95.7
นครสวรรค์	182	65,074	71.2	4.3	62.7 - 79.8
อุทัยธานี	156	14,123	79.0	5.9	67.3 - 90.6
กำแพงเพชร	187	43,668	84.2	4.0	76.3 - 92.0
ตาก	214	27,011	90.1	4.6	81.1 - 99.2
สุโขทัย	230	38,759	89.8	2.6	84.7 - 94.9
พิษณุโลก	270	60,684	91.1	3.3	84.7 - 97.5
พิจิตร	204	43,900	88.3	5.0	78.4 - 98.2
เพชรบูรณ์	161	46,987	84.4	5.9	72.9 - 95.9
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	146	59,769	81.0	3.2	74.7 - 87.2
กระบี่	174	13,632	84.5	5.2	74.2 - 94.8
พังงา	201	12,463	79.2	4.1	71.1 - 87.3
ภูเก็ต	198	16,900	89.1	3.8	81.5 - 96.6
สุราษฎร์ธานี	188	52,581	84.1	3.2	77.7 - 90.5
ระนอง	251	10,252	78.4	6.1	66.4 - 90.4
ชุมพร	199	28,762	82.6	3.2	76.3 - 88.8
สงขลา	207	82,861	78.8	3.2	72.5 - 85.2
สตูล	166	12,971	88.1	3.8	80.6 - 95.6
ตรัง	182	25,647	86.3	4.8	76.9 - 95.6
พัทลุง	179	25,464	88.6	3.2	82.3 - 94.8
ปัตตานี	206	27,351	76.6	4.0	68.7 - 84.6
ยะลา	192	21,434	78.8	6.0	67.0 - 90.5
นราธิวาส	214	46,862	78.5	3.3	71.9 - 85.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.13 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนปัจจุบัน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	25	11,694	30.3	8.8	13.0	47.7
25 - 34	90	40,051	52.5	5.2	42.3	62.8
35 - 44	344	122,615	65.6	3.0	59.7	71.5
45 - 54	750	306,507	78.7	2.3	74.3	83.1
55 - 64	2,458	382,029	85.9	1.0	83.9	87.9
65 - 74	1,724	256,469	89.9	1.2	87.6	92.3
รวม	5,391	1,119,366	78.8	1.0	76.8	80.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	34	18,526	46.8	9.8	27.5	66.1
25 - 34	117	51,582	60.7	5.4	50.1	71.2
35 - 44	542	237,630	72.7	2.5	67.7	77.6
45 - 54	1,181	546,691	83.5	1.8	79.9	87.0
55 - 64	3,436	665,000	90.7	0.7	89.3	92.1
65 - 74	2,262	412,142	93.0	0.8	91.4	94.6
รวม	7,572	1,931,572	84.6	0.9	82.9	86.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	59	30,220	38.7	7.9	23.2	54.1
25 - 34	207	91,633	56.8	3.8	49.3	64.3
35 - 44	886	360,245	70.1	2.0	66.2	74.0
45 - 54	1,931	853,198	81.7	1.6	78.6	84.8
55 - 64	5,894	1,047,029	88.9	0.6	87.7	90.1
65 - 74	3,986	668,612	91.8	0.7	90.4	93.2
รวมทั้งประเทศ	12,963	3,050,937	82.4	0.7	80.9	83.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.14 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนปัจจุบัน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	7,378	1,233,569	83.2	1.2	80.9	85.5
นอกเขตเทศบาล	5,585	1,817,368	81.8	1.0	79.9	83.7
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	179	327,058	85.6	3.6	78.3	93.0
ภาคกลาง	4,633	846,726	84.1	1.0	82.1	86.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,256	745,250	79.5	1.5	76.5	82.4
ภาคเหนือ	3,312	724,335	84.9	1.7	81.7	88.2
ภาคใต้	2,583	407,568	77.8	1.5	74.8	80.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	628	168,129	82.5	2.3	77.9	87.0
เขต สคร.ที่ 2	946	123,630	87.8	2.3	83.4	92.3
เขต สคร.ที่ 3	1,643	318,863	86.0	1.5	83.1	88.9
เขต สคร.ที่ 4	1,416	236,103	80.9	2.1	76.6	85.1
เขต สคร.ที่ 5	554	261,646	84.5	3.1	78.5	90.5
เขต สคร.ที่ 6	880	295,521	75.9	2.1	71.7	80.1
เขต สคร.ที่ 7	822	188,083	78.7	2.8	73.2	84.2
เขต สคร.ที่ 8	721	159,512	79.3	3.4	72.7	85.9
เขต สคร.ที่ 9	1,050	206,198	92.3	1.7	89.0	95.7
เขต สคร.ที่ 10	1,541	358,626	83.7	2.6	78.7	88.7
เขต สคร.ที่ 11	1,303	182,471	79.4	2.0	75.5	83.3
เขต สคร.ที่ 12	1,280	225,097	76.5	2.1	72.3	80.6

ตารางที่ 10.3.15 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนปัจจุบัน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	179	327,058	85.6	3.6	78.3	93.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	201	70,108	79.2	4.6	70.0	88.3
นนทบุรี	213	65,132	81.2	3.4	74.5	88.0
ปทุมธานี	159	44,940	82.8	5.0	73.1	92.6
พระนครศรีอยุธยา	256	58,058	83.6	3.9	76.0	91.2
อ่างทอง	189	16,591	93.5	2.7	88.1	98.8
ลพบุรี	192	43,509	82.8	4.5	73.9	91.7
สิงห์บุรี	219	16,867	95.4	1.7	92.0	98.8
ชัยนาท	175	20,017	82.3	6.5	69.6	95.0
สระบุรี	171	26,647	93.7	3.2	87.4	99.9
ชลบุรี	231	81,058	94.5	1.8	91.0	98.1
ระยอง	152	26,047	75.0	5.3	64.6	85.4
จันทบุรี	181	27,861	92.1	2.4	87.3	96.8
ตราด	196	10,661	89.4	2.8	84.0	94.9
ฉะเชิงเทรา	161	35,879	93.8	2.5	88.9	98.6
ปราจีนบุรี	184	22,266	84.1	4.8	74.6	93.6
นครนายก	166	17,108	93.0	2.5	88.1	97.9
สระแก้ว	171	27,875	76.6	4.9	67.0	86.2
ราชบุรี	185	44,202	78.0	4.2	69.7	86.3
กาญจนบุรี	176	37,722	81.2	4.8	71.7	90.6
สุพรรณบุรี	170	42,492	81.1	7.6	66.2	96.0
นครปฐม	139	36,047	79.8	6.7	66.6	92.9
สมุทรสาคร	180	19,647	91.6	2.8	86.2	97.1
สมุทรสงคราม	246	11,445	83.7	4.3	75.3	92.1
เพชรบุรี	196	27,678	83.9	3.2	77.5	90.2
ประจวบคีรีขันธ์	124	16,870	72.7	4.7	63.6	81.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	183	137,705	93.5	2.4	88.8	98.2
บุรีรัมย์	111	40,812	72.7	10.7	51.7	93.7
สุรินทร์	133	44,223	74.3	6.1	62.4	86.2
ศรีสะเกษ	99	31,904	71.7	7.9	56.1	87.4
อุบลราชธานี	108	69,452	83.0	5.1	73.1	93.0
ยโสธร	129	16,085	77.3	8.5	60.6	94.1
ชัยภูมิ	127	38,906	83.3	8.4	66.7	99.9
อำนาจเจริญ	115	10,314	73.5	3.8	66.0	81.0
หนองบัวลำภู	108	13,983	76.5	6.7	63.3	89.6
ขอนแก่น	118	76,999	81.1	3.7	73.8	88.4
อุดรธานี	113	42,086	78.0	5.5	67.2	88.9
เลย	119	24,004	85.5	4.5	76.6	94.3
หนองคาย	137	33,859	77.8	4.2	69.5	86.1

ตารางที่ 10.3.15 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยา  
แผนปัจจุบัน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	104	23,584	68.2	7.9	52.8	83.7
ร้อยเอ็ด	108	56,274	79.8	3.0	74.0	85.6
กาฬสินธุ์	73	24,731	54.6	8.4	38.1	71.1
สกลนคร	116	28,758	84.8	5.2	74.6	95.0
นครพนม	137	21,932	72.0	5.5	61.2	82.7
มุกดาหาร	118	9,639	82.3	5.1	72.3	92.3
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	216	120,442	81.7	6.5	68.8	94.6
ลำพูน	177	25,956	88.4	3.9	80.7	96.2
ลำปาง	197	47,980	86.0	2.8	80.5	91.5
อุตรดิตถ์	167	27,038	75.5	6.9	62.1	89.0
แพร่	227	37,777	88.1	4.9	78.5	97.6
น่าน	200	20,869	81.4	4.7	72.1	90.6
พะเยา	191	30,783	76.0	7.8	60.8	91.3
เชียงราย	188	69,451	87.0	2.8	81.5	92.5
แม่ฮ่องสอน	145	5,366	78.1	7.3	63.6	92.5
นครสวรรค์	162	58,841	71.5	4.6	62.4	80.5
อุทัยธานี	153	13,442	78.8	6.0	67.0	90.6
กำแพงเพชร	191	42,121	79.8	6.0	67.9	91.7
ตาก	212	27,674	90.4	4.2	82.0	98.7
สุโขทัย	244	42,388	95.8	2.5	90.9	100.0
พิษณุโลก	259	59,784	95.0	1.9	91.4	98.7
พิจิตร	215	45,109	92.1	2.3	87.5	96.7
เพชรบูรณ์	168	49,313	99.2	0.4	98.4	100.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	135	56,499	79.9	4.2	71.7	88.1
กระบี่	169	13,086	83.7	4.3	75.3	92.2
พังงา	198	12,403	77.4	4.2	69.2	85.7
ภูเก็ต	200	16,818	89.1	3.2	82.8	95.3
สุราษฎร์ธานี	174	48,391	79.0	4.0	71.2	86.7
ระนอง	249	10,945	80.6	6.1	68.6	92.6
ชุมพร	178	24,328	72.3	5.6	61.4	83.3
สงขลา	182	71,728	69.1	4.0	61.2	76.9
สตูล	154	11,386	80.8	5.0	71.0	90.7
ตรัง	172	23,834	83.9	5.9	72.3	95.5
พัทลุง	177	25,158	90.7	2.8	85.3	96.2
ปัตตานี	199	26,249	76.7	3.3	70.2	83.2
ยะลา	186	20,467	75.2	5.5	64.4	85.9
นราธิวาส	210	46,274	78.6	4.3	70.2	87.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.3.16 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	25	19,056	49.7	11.6	26.9	72.5
25 - 34	106	45,625	58.0	5.1	48.1	67.9
35 - 44	367	136,296	72.6	2.7	67.3	77.9
45 - 54	752	330,048	81.9	2.3	77.4	86.5
55 - 64	2,462	389,245	86.0	1.0	84.1	87.9
65 - 74	1,674	254,692	86.1	1.4	83.3	88.9
รวม	5,386	1,174,962	80.7	1.0	78.8	82.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	35	17,516	39.4	7.9	23.9	55.0
25 - 34	117	51,566	59.6	5.3	49.3	70.0
35 - 44	556	249,743	73.8	2.4	69.1	78.5
45 - 54	1,147	547,101	83.3	1.6	80.2	86.4
55 - 64	3,324	651,176	87.8	0.9	86.1	89.5
65 - 74	2,126	396,908	88.9	1.0	87.0	90.8
รวม	7,305	1,914,010	82.7	0.8	81.2	84.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	60	36,572	44.2	5.8	32.8	55.6
25 - 34	223	97,190	58.9	3.7	51.5	66.2
35 - 44	923	386,039	73.4	1.9	69.7	77.1
45 - 54	1,899	877,150	82.8	1.5	79.9	85.7
55 - 64	5,786	1,040,422	87.1	0.7	85.8	88.4
65 - 74	3,800	651,600	87.8	0.9	86.0	89.6
รวมทั้งประเทศ	12,691	3,088,972	81.9	0.7	80.6	83.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.17 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมน้ำหนัก  
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	7,231	1,263,249	83.8	0.9	82.0	85.6
นอกเขตเทศบาล	5,460	1,825,723	80.7	0.9	78.9	82.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	198	361,664	91.4	2.2	86.9	95.8
ภาคกลาง	4,390	813,016	80.7	1.0	78.7	82.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,277	762,751	79.2	1.6	76.0	82.4
ภาคเหนือ	3,278	730,855	83.8	1.5	80.9	86.6
ภาคใต้	2,548	420,686	79.1	1.1	76.9	81.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	600	158,945	79.3	2.3	74.7	83.9
เขต สคร.ที่ 2	891	115,387	82.9	2.8	77.4	88.4
เขต สคร.ที่ 3	1,563	308,298	82.9	1.5	79.9	85.9
เขต สคร.ที่ 4	1,336	230,386	77.8	2.0	73.9	81.8
เขต สคร.ที่ 5	554	261,859	81.1	3.4	74.4	87.7
เขต สคร.ที่ 6	882	305,209	77.4	2.6	72.3	82.5
เขต สคร.ที่ 7	841	195,683	79.7	2.2	75.5	84.0
เขต สคร.ที่ 8	728	173,621	82.6	2.4	77.9	87.4
เขต สคร.ที่ 9	1,032	205,184	88.6	1.5	85.7	91.5
เขต สคร.ที่ 10	1,518	352,050	81.7	2.6	76.7	86.8
เขต สคร.ที่ 11	1,284	187,071	79.8	1.7	76.5	83.2
เขต สคร.ที่ 12	1,264	233,615	78.6	1.5	75.7	81.5

ตารางที่ 10.3.18 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมน้ำหนัก  
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	198	361,664	91.4	2.2	86.9	95.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	191	69,058	76.9	5.0	67.2	86.7
นนทบุรี	199	61,815	79.1	3.8	71.6	86.6
ปทุมธานี	150	39,868	73.8	3.8	66.4	81.2
พระนครศรีอยุธยา	251	57,263	84.0	3.8	76.5	91.5
อ่างทอง	166	15,096	86.3	4.2	78.0	94.5
ลพบุรี	183	42,020	79.4	3.6	72.3	86.5
สิงห์บุรี	212	16,282	92.8	2.5	87.9	97.7
ชัยนาท	168	17,089	73.7	12.6	49.0	98.5
สระบุรี	162	24,901	88.7	2.6	83.7	93.7
ชลบุรี	229	81,903	90.1	1.8	86.6	93.7
ระยอง	144	24,475	74.1	6.6	61.0	87.1
จันทบุรี	170	25,970	89.0	3.2	82.8	95.2
ตราด	178	9,507	83.4	3.5	76.5	90.3
ฉะเชิงเทรา	153	32,059	86.2	4.8	76.9	95.6
ปราจีนบุรี	176	22,320	84.0	4.6	75.0	92.9
นครนายก	157	14,904	84.6	4.0	76.6	92.5
สระแก้ว	165	28,102	77.4	4.7	68.2	86.6
ราชบุรี	177	44,420	77.4	4.4	68.7	86.1
กาญจนบุรี	164	35,362	78.2	4.6	69.2	87.1
สุพรรณบุรี	177	46,209	82.6	6.8	69.3	95.9
นครปฐม	124	32,370	72.1	4.7	62.8	81.4
สมุทรสาคร	177	20,241	87.6	2.9	81.9	93.2
สมุทรสงคราม	219	9,237	69.2	3.6	62.2	76.2
เพชรบุรี	173	25,213	76.3	3.9	68.7	84.0
ประจวบคีรีขันธ์	125	17,334	75.0	5.6	64.1	85.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	188	144,817	90.0	3.9	82.3	97.7
บุรีรัมย์	110	40,880	73.0	10.9	51.5	94.5
สุรินทร์	137	44,417	73.5	4.6	64.4	82.5
ศรีสะเกษ	97	31,932	73.6	7.2	59.3	87.8
อุบลราชธานี	120	74,155	83.6	3.5	76.7	90.6
ยโสธร	130	16,912	81.5	8.1	65.6	97.3
ชัยภูมิ	119	31,744	69.5	8.9	52.0	86.9
อำนาจเจริญ	114	11,560	75.3	5.4	64.7	85.9
หนองบัวลำภู	99	13,524	74.2	4.8	64.9	83.6
ขอนแก่น	113	73,468	75.8	2.1	71.7	80.0
อุดรธานี	101	35,478	69.7	4.5	60.8	78.6
เลย	117	24,460	83.0	4.9	73.5	92.6
หนองคาย	138	34,270	78.6	4.8	69.2	88.0

ตารางที่ 10.3.18 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	114	28,037	78.6	3.5	71.7	85.4	
ร้อยเอ็ด	114	66,105	92.0	4.6	83.0	100.0	
กาฬสินธุ์	86	29,866	62.8	8.6	46.0	79.6	
สกลนคร	120	30,319	84.2	4.1	76.1	92.2	
นครพนม	140	21,135	72.4	5.6	61.4	83.4	
มุกดาหาร	120	9,672	80.8	5.1	70.8	90.8	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	214	118,503	80.2	6.5	67.4	93.0	
ลำพูน	166	23,426	80.2	5.3	69.8	90.6	
ลำปาง	193	48,126	87.8	2.9	82.2	93.5	
อุตรดิตถ์	182	31,587	85.1	3.8	77.7	92.5	
แพร่	220	35,979	83.8	4.3	75.4	92.1	
น่าน	199	20,372	80.1	3.9	72.4	87.8	
พะเยา	194	31,565	76.8	5.8	65.3	88.2	
เชียงราย	182	68,788	83.6	4.6	74.5	92.6	
แม่ฮ่องสอน	150	5,291	75.4	9.3	57.1	93.8	
นครสวรรค์	184	72,928	80.3	3.6	73.2	87.4	
อุทัยธานี	154	13,933	78.4	5.8	67.0	89.8	
กำแพงเพชร	189	44,086	85.8	5.2	75.7	96.0	
ตาก	203	26,467	89.9	3.3	83.4	96.4	
สุโขทัย	222	37,101	85.7	3.5	78.7	92.6	
พิษณุโลก	262	60,948	90.0	2.8	84.5	95.6	
พิจิตร	201	42,674	85.0	5.8	73.5	96.5	
เพชรบูรณ์	163	49,080	90.8	3.0	85.0	96.7	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	144	60,024	81.9	2.8	76.5	87.4	
กระบี่	160	14,124	88.2	3.4	81.5	94.9	
พังงา	193	11,320	73.5	4.9	63.9	83.1	
ภูเก็ต	187	15,455	83.1	5.8	71.7	94.5	
สุราษฎร์ธานี	178	49,071	78.8	3.7	71.5	86.1	
ระนอง	238	10,706	78.9	6.6	65.9	91.8	
ชุมพร	184	26,371	74.8	4.9	65.3	84.4	
สงขลา	195	81,070	77.2	2.6	72.1	82.4	
สตูล	153	11,801	83.1	4.3	74.7	91.6	
ตรัง	167	25,273	86.2	2.9	80.4	92.0	
พัทลุง	169	23,797	82.9	2.9	77.2	88.7	
ปัตตานี	199	27,255	77.9	3.6	70.8	85.0	
ยะลา	179	21,271	79.8	3.7	72.4	87.1	
นราธิวาส	202	43,149	74.0	4.4	65.3	82.7	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.19 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	27	19,642	49.5	11.3	27.4	71.7
25 - 34	100	43,734	55.9	5.2	45.8	66.0
35 - 44	345	121,333	64.0	3.2	57.6	70.3
45 - 54	698	295,677	74.5	2.3	70.0	79.0
55 - 64	2,333	373,479	82.0	1.1	79.9	84.1
65 - 74	1,615	243,707	82.5	1.8	79.0	85.9
รวม	5,118	1,097,573	75.4	1.1	73.3	77.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	34	14,239	32.9	7.1	19.0	46.9
25 - 34	117	52,452	60.4	5.3	50.1	70.8
35 - 44	502	226,624	67.4	2.7	62.0	72.8
45 - 54	1,070	520,504	78.9	1.7	75.6	82.2
55 - 64	3,140	621,052	84.1	1.0	82.2	85.9
65 - 74	2,027	378,043	83.6	1.3	81.0	86.2
รวม	6,890	1,812,915	78.2	0.9	76.5	79.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	61	33,881	40.9	5.8	29.5	52.3
25 - 34	217	96,187	58.3	3.8	50.9	65.7
35 - 44	847	347,958	66.2	2.2	61.9	70.4
45 - 54	1,768	816,182	77.2	1.5	74.3	80.1
55 - 64	5,473	994,531	83.3	0.7	81.8	84.7
65 - 74	3,642	621,750	83.2	1.1	81.1	85.2
รวมทั้งประเทศ	12,008	2,910,488	77.2	0.8	75.6	78.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.20 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	6,830	1,191,126	79.0	1.2	76.8	81.3
นอกเขตเทศบาล	5,178	1,719,361	75.9	1.0	73.9	77.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	186	344,737	87.2	3.1	80.8	93.6
ภาคกลาง	4,061	742,448	74.2	1.2	71.8	76.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,235	736,814	75.8	1.6	72.7	79.0
ภาคเหนือ	3,100	688,093	78.6	1.5	75.6	81.7
ภาคใต้	2,426	398,395	75.2	1.5	72.3	78.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	550	144,445	71.6	2.6	66.4	76.7
เขต สคร.ที่ 2	836	108,361	77.5	3.5	70.6	84.4
เขต สคร.ที่ 3	1,461	279,211	76.4	1.9	72.6	80.2
เขต สคร.ที่ 4	1,214	210,432	71.8	2.3	67.3	76.3
เขต สคร.ที่ 5	537	260,812	79.2	3.6	72.1	86.2
เขต สคร.ที่ 6	861	284,795	71.7	1.9	67.9	75.4
เขต สคร.ที่ 7	837	191,206	78.0	2.4	73.3	82.8
เขต สคร.ที่ 8	667	157,675	75.2	2.6	70.1	80.4
เขต สคร.ที่ 9	956	184,477	79.8	2.3	75.2	84.4
เขต สคร.ที่ 10	1,477	345,941	79.7	2.6	74.6	84.8
เขต สคร.ที่ 11	1,206	177,304	76.0	2.1	71.9	80.1
เขต สคร.ที่ 12	1,220	221,091	74.5	2.0	70.6	78.4

ตารางที่ 10.3.21 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการออกกำลังกาย  
อย่างถูกต้องเหมาะสม ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	186	344,737	87.2	3.1	80.8	93.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	165	56,745	66.1	6.4	53.6	78.6
นนทบุรี	178	55,648	70.9	4.5	62.1	79.6
ปทุมธานี	141	36,093	66.2	3.9	58.5	73.8
พระนครศรีอยุธยา	231	52,705	76.7	4.1	68.6	84.8
อ่างทอง	151	14,081	80.2	4.8	70.9	89.6
ลพบุรี	171	38,508	72.3	5.4	61.7	82.8
สิงห์บุรี	206	16,123	91.6	2.3	87.1	96.0
ชัยนาท	159	16,165	66.4	12.8	41.4	91.5
สระบุรี	149	23,484	86.9	5.7	75.8	98.0
ชลบุรี	216	73,092	82.9	2.3	78.3	87.4
ระยอง	145	25,606	74.8	6.4	62.3	87.3
จันทบุรี	163	24,412	81.6	4.1	73.6	89.5
ตราด	168	8,724	74.2	6.3	61.9	86.5
ฉะเชิงเทรา	145	31,831	86.2	3.3	79.8	92.6
ปราจีนบุรี	171	21,261	80.6	5.8	69.3	91.9
นครนายก	141	12,674	70.3	11.4	47.9	92.6
สระแก้ว	147	24,866	72.7	3.9	65.1	80.4
ราชบุรี	156	38,649	68.6	5.3	58.2	78.9
กาญจนบุรี	144	28,798	64.3	3.7	57.0	71.5
สุพรรณบุรี	163	43,756	78.3	7.7	63.2	93.3
นครปฐม	117	31,613	71.3	6.2	59.2	83.4
สมุทรสาคร	173	19,432	83.6	3.9	75.9	91.3
สมุทรสงคราม	180	8,527	63.9	4.7	54.6	73.1
เพชรบุรี	166	23,834	74.7	3.8	67.2	82.1
ประจวบคีรีขันธ์	115	15,823	68.1	6.4	55.5	80.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	185	138,748	85.6	4.9	75.9	95.3
บุรีรัมย์	111	42,213	72.8	10.5	52.2	93.4
สุรินทร์	132	46,533	73.7	4.3	65.1	82.2
ศรีสะเกษ	96	30,352	68.9	7.3	54.7	83.2
อุบลราชธานี	119	72,207	81.3	4.4	72.6	90.1
ยโสธร	128	17,347	83.3	6.9	69.7	96.9
ชัยภูมิ	109	33,319	72.1	10.1	52.3	91.9
อำนาจเจริญ	114	10,701	71.9	4.9	62.3	81.5
หนองบัวลำภู	83	10,003	56.1	5.2	45.9	66.3
ขอนแก่น	112	68,671	69.9	4.2	61.7	78.0
อุดรธานี	112	40,267	73.1	4.6	64.0	82.2
เลย	114	23,395	78.5	4.0	70.6	86.5
หนองคาย	136	31,864	72.7	5.0	62.9	82.5

ตารางที่ 10.3.21 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	111	26,975	76.9	3.8	69.3	84.4
ร้อยเอ็ด	107	54,945	77.6	2.8	72.1	83.2
กาฬสินธุ์	86	28,675	61.5	8.4	45.1	77.9
สกลนคร	118	28,730	82.4	4.2	74.2	90.6
นครพนม	148	22,540	75.9	5.4	65.3	86.5
มุกดาหาร	114	9,330	78.3	6.1	66.2	90.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	206	115,835	77.7	6.6	64.6	90.7
ลำพูน	165	23,659	81.2	5.6	70.2	92.2
ลำปาง	180	45,191	81.5	4.8	72.0	91.0
อุตรดิตถ์	161	26,260	71.6	4.5	62.7	80.5
แพร่	207	34,644	81.6	4.2	73.4	89.9
น่าน	193	19,938	77.9	5.0	68.1	87.8
พะเยา	194	31,676	76.9	5.8	65.6	88.3
เชียงราย	181	70,014	84.4	3.3	77.8	90.9
แม่ฮ่องสอน	151	4,983	60.6	6.5	47.8	73.3
นครสวรรค์	160	64,849	72.0	4.5	63.1	80.9
อุทัยธานี	148	13,211	74.3	6.4	61.6	86.9
กำแพงเพชร	180	41,260	79.3	5.7	68.1	90.5
ตาก	189	23,867	81.1	4.3	72.7	89.5
สุโขทัย	215	36,091	83.0	5.4	72.3	93.6
พิษณุโลก	246	56,278	83.0	4.5	74.0	91.9
พิจิตร	179	38,354	77.1	5.7	65.9	88.3
เพชรบูรณ์	145	41,981	77.9	5.8	66.5	89.4
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	139	57,672	78.3	3.5	71.5	85.1
กระบี่	158	13,724	85.4	3.7	78.3	92.6
พังงา	178	10,328	68.0	6.8	54.6	81.3
ภูเก็ต	183	14,859	78.9	5.9	67.3	90.6
สุราษฎร์ธานี	160	45,725	74.4	5.0	64.5	84.3
ระนอง	215	9,707	74.6	6.7	61.5	87.8
ชุมพร	173	25,290	72.1	5.0	62.3	81.9
สงขลา	190	75,546	73.0	4.0	65.1	80.8
สตูล	151	11,580	81.2	3.9	73.5	88.9
ตรัง	153	23,145	79.1	4.5	70.2	88.1
พัทลุง	169	23,691	82.1	4.0	74.3	89.9
ปัตตานี	187	26,441	75.7	4.1	67.7	83.7
ยะลา	174	19,346	71.7	6.9	58.2	85.3
นราธิวาส	196	41,342	70.1	4.9	60.5	79.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.3.22 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการสูบบุหรี่ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10	9,820	62.0	19.9	22.8	100.0
25 - 34	44	16,781	44.2	6.6	31.3	57.1
35 - 44	127	45,499	53.8	5.0	44.0	63.5
45 - 54	222	99,158	60.1	3.7	52.8	67.3
55 - 64	716	115,870	71.9	1.9	68.2	75.7
65 - 74	428	62,273	65.9	3.1	59.8	71.9
รวม	1,547	349,400	62.5	1.6	59.3	65.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	4	3,996	100.0	0.0	100.0	100.0
25 - 34	7	3,720	73.5	19.5	35.2	100.0
35 - 44	19	7,553	67.6	10.7	46.6	88.6
45 - 54	31	15,715	57.1	13.4	30.7	83.4
55 - 64	106	23,330	74.4	5.7	63.2	85.7
65 - 74	77	13,594	73.2	5.2	63.0	83.4
รวม	244	67,908	69.5	5.0	59.7	79.4
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	14	13,816	69.6	15.1	40.1	99.2
25 - 34	51	20,501	47.7	6.6	34.8	60.6
35 - 44	146	53,052	55.4	4.6	46.4	64.4
45 - 54	253	114,873	59.6	3.8	52.3	67.0
55 - 64	822	139,200	72.4	1.9	68.7	76.0
65 - 74	505	75,867	67.1	2.7	61.7	72.4
รวมทั้งประเทศ	1,791	417,308	63.5	1.6	60.4	66.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.23 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการสูบบุหรี่ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	949	138,073	62.1	2.8	56.6	67.7
นอกเขตเทศบาล	842	279,235	64.3	2.0	60.4	68.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	9	18,291	59.1	15.9	24.1	94.2
ภาคกลาง	578	108,925	62.0	3.0	56.2	67.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	318	105,480	61.0	2.7	55.7	66.3
ภาคเหนือ	484	115,480	68.4	3.0	62.6	74.2
ภาคใต้	402	69,132	63.7	3.0	57.7	69.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	85	21,084	56.7	7.4	42.2	71.3
เขต สคร.ที่ 2	104	12,999	62.6	6.4	50.0	75.2
เขต สคร.ที่ 3	204	45,332	69.3	4.7	60.1	78.6
เขต สคร.ที่ 4	185	29,509	56.4	4.4	47.8	65.1
เขต สคร.ที่ 5	78	30,508	65.1	5.1	55.1	75.1
เขต สคร.ที่ 6	131	55,692	61.8	4.1	53.8	69.8
เขต สคร.ที่ 7	109	19,281	53.6	5.5	42.8	64.4
เขต สคร.ที่ 8	97	24,017	67.3	6.4	54.9	79.8
เขต สคร.ที่ 9	158	30,899	78.7	3.5	71.8	85.7
เขต สคร.ที่ 10	229	60,565	64.6	4.4	55.8	73.3
เขต สคร.ที่ 11	183	28,136	60.1	4.6	51.1	69.2
เขต สคร.ที่ 12	219	40,996	66.4	4.1	58.5	74.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.24 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการสูบบุหรี่ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	9	18,291	59.1	15.9	24.1	94.2
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	26	9,103	66.8	11.4	44.4	89.2
นนทบุรี	14	7,409	59.6	13.9	32.3	86.9
ปทุมธานี	25	5,668	45.1	10.0	25.5	64.7
พระนครศรีอยุธยา	46	8,008	65.7	8.4	49.3	82.2
อ่างทอง	16	1,308	48.2	12.5	23.7	72.8
ลพบุรี	25	5,272	63.7	12.5	39.1	88.4
สิงห์บุรี	20	1,686	87.7	6.7	74.5	100.0
ชัยนาท	21	1,941	50.0	15.0	20.4	79.5
สระบุรี	22	2,793	70.1	11.2	48.0	92.1
ชลบุรี	35	11,818	91.5	6.0	79.7	100.0
ระยอง	21	6,582	65.3	19.7	26.6	100.0
จันทบุรี	34	6,089	83.6	6.9	70.0	97.2
ตราด	21	1,170	66.9	10.3	46.6	87.2
ฉะเชิงเทรา	22	5,996	60.1	9.8	40.9	79.4
ปราจีนบุรี	20	1,746	53.8	10.2	33.8	73.7
นครนายก	12	1,461	49.9	18.0	14.5	85.4
สระแก้ว	13	1,367	38.0	10.1	18.1	57.9
ราชบุรี	18	4,570	55.4	11.7	32.4	78.4
กาญจนบุรี	23	4,838	55.9	6.9	42.3	69.5
สุพรรณบุรี	21	5,526	51.7	8.0	36.1	67.3
นครปฐม	13	1,888	30.4	15.1	0.8	60.0
สมุทรสาคร	22	4,042	89.9	5.5	79.2	100.0
สมุทรสงคราม	44	2,003	59.9	10.2	39.9	80.0
เพชรบุรี	28	4,191	66.7	10.7	45.7	87.7
ประจวบคีรีขันธ์	16	2,451	56.2	11.1	34.3	78.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	24	12,991	79.1	6.0	67.3	90.9
บุรีรัมย์	14	3,818	41.6	11.9	18.1	65.0
สุรินทร์	24	8,944	61.0	10.1	41.1	80.9
ศรีสะเกษ	12	1,870	31.0	10.6	10.1	52.0
อุบลราชธานี	13	8,354	61.8	11.1	39.9	83.7
ยโสธร	16	1,649	66.3	8.2	50.1	82.5
ชัยภูมิ	16	4,755	72.5	11.9	49.1	95.9
อำนาจเจริญ	9	1,191	46.9	18.2	11.1	82.7
หนองบัวลำภู	3	537	27.2	19.6	0.0	65.8
ขอนแก่น	22	17,902	64.3	5.8	52.8	75.8
อุดรธานี	15	4,565	64.5	13.7	37.5	91.6
เลย	14	2,172	59.9	8.6	42.9	76.8
หนองคาย	23	5,375	70.9	11.1	49.1	92.8

ตารางที่ 10.3.24 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิก การสูบบุหรี่ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	13	2,552	43.3	11.5	20.6	66.0
ร้อยเอ็ด	21	16,182	62.9	9.9	43.4	82.4
กาฬสินธุ์	20	6,405	61.6	16.1	30.0	93.2
สกลนคร	14	2,141	66.5	10.3	46.2	86.7
นครพนม	21	2,435	41.5	10.8	20.2	62.7
มุกดาหาร	24	1,641	70.9	10.3	50.6	91.1
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	48	23,732	71.6	8.9	54.0	89.2
ลำพูน	25	3,497	72.3	9.3	53.9	90.7
ลำปาง	16	5,103	59.7	12.6	34.9	84.5
อุตรดิตถ์	22	2,701	67.6	11.6	44.8	90.4
แพร่	21	3,936	51.7	12.4	27.2	76.1
น่าน	30	3,233	50.7	10.7	29.6	71.8
พะเยา	27	4,338	43.6	8.0	27.8	59.4
เชียงราย	29	15,389	73.1	9.1	55.2	91.0
แม่ฮ่องสอน	33	1,336	58.9	17.3	24.9	92.9
นครสวรรค์	17	10,205	64.2	12.1	40.3	88.1
อุทัยธานี	24	1,983	73.2	11.1	51.4	95.0
กำแพงเพชร	38	8,246	75.8	9.6	56.9	94.6
ตาก	37	4,690	69.0	4.7	59.8	78.2
สุโขทัย	40	8,203	78.7	8.9	61.3	96.2
พิษณุโลก	40	10,665	85.1	5.5	74.2	96.0
พิจิตร	18	3,583	58.0	16.4	25.7	90.2
เพชรบูรณ์	19	4,639	84.3	8.9	66.7	100.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	19	7,841	78.6	8.6	61.5	95.6
กระบี่	35	2,527	81.9	5.9	70.2	93.5
พังงา	24	1,735	53.3	12.9	27.9	78.6
ภูเก็ต	23	2,392	73.2	14.4	44.9	100.0
สุราษฎร์ธานี	24	7,119	51.4	8.5	34.8	68.1
ระนอง	27	1,433	54.9	19.0	17.3	92.4
ชุมพร	31	5,089	47.3	10.5	26.7	67.9
สงขลา	44	14,040	62.3	7.0	48.5	76.1
สตูล	23	1,575	56.4	12.5	31.8	81.1
ตรัง	23	2,797	60.1	8.6	43.1	77.1
พัทลุง	27	4,841	74.5	9.4	55.9	93.0
ปัตตานี	42	6,499	75.8	6.5	63.1	88.5
ยะลา	37	5,787	78.8	6.0	67.0	90.6
นราธิวาส	23	5,458	58.5	16.8	25.5	91.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.25 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	15	8,191	43.1	10.5	22.5	63.7
25 - 34	40	16,977	44.6	7.4	30.2	59.1
35 - 44	133	49,776	53.8	4.7	44.6	63.1
45 - 54	228	101,488	58.2	6.8	44.7	71.6
55 - 64	506	77,269	65.9	3.0	60.0	71.7
65 - 74	216	30,042	69.8	4.5	60.9	78.7
รวม	1,138	283,743	58.6	2.8	53.0	64.2
<b>หญิง</b>						
15 - 24	6	3,363	49.5	8.7	32.5	66.5
25 - 34	13	4,084	29.3	10.3	9.2	49.4
35 - 44	57	29,305	58.4	6.4	45.8	71.0
45 - 54	113	69,921	78.9	5.3	68.4	89.3
55 - 64	122	30,101	67.2	5.7	56.1	78.3
65 - 74	38	7,496	80.0	6.3	67.5	92.4
รวม	349	144,270	67.5	3.3	61.0	74.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	21	11,553	44.8	8.0	29.1	60.5
25 - 34	53	21,060	40.5	6.4	28.0	53.1
35 - 44	190	79,082	55.5	4.0	47.5	63.4
45 - 54	341	171,409	65.1	5.4	54.5	75.8
55 - 64	628	107,370	66.2	2.5	61.3	71.2
65 - 74	254	37,539	71.6	3.9	63.9	79.4
รวมทั้งประเทศ	1,487	428,013	61.3	2.3	56.8	65.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.26 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	837	159,225	62.0	3.1	55.9	68.1
นอกเขตเทศบาล	650	268,788	60.9	3.2	54.7	67.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	9	31,450	69.8	13.5	40.1	99.4
ภาคกลาง	483	104,904	60.9	2.6	55.8	66.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	342	131,344	58.6	5.4	48.1	69.1
ภาคเหนือ	470	125,312	63.8	3.0	57.9	69.8
ภาคใต้	183	35,004	58.1	4.0	50.2	66.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	67	21,580	61.6	5.7	50.3	72.8
เขต สคร.ที่ 2	104	16,489	66.0	6.0	54.2	77.9
เขต สคร.ที่ 3	199	47,640	64.5	4.4	56.0	73.1
เขต สคร.ที่ 4	113	19,194	50.0	5.4	39.5	60.5
เขต สคร.ที่ 5	90	46,759	67.6	5.3	57.3	78.0
เขต สคร.ที่ 6	138	52,941	49.4	8.8	32.2	66.5
เขต สคร.ที่ 7	114	31,644	66.2	6.6	53.2	79.2
เขต สคร.ที่ 8	107	32,669	67.5	5.5	56.6	78.4
เขต สคร.ที่ 9	100	20,842	75.1	4.2	66.9	83.3
เขต สคร.ที่ 10	263	71,801	59.8	4.3	51.4	68.2
เขต สคร.ที่ 11	110	19,678	60.3	5.3	49.9	70.7
เขต สคร.ที่ 12	73	15,327	55.6	6.2	43.4	67.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.27 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิกการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
กรุงเทพมหานคร	9	31,450	69.8	13.5	40.1	99.4	
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	22	7,656	48.4	11.1	26.5	70.2	
นนทบุรี	12	7,052	62.7	13.3	36.7	88.8	
ปทุมธานี	25	7,318	60.7	5.4	50.0	71.4	
พระนครศรีอยุธยา	30	7,210	61.3	9.9	41.9	80.8	
อ่างทอง	23	2,037	55.7	15.7	24.7	86.6	
ลพบุรี	31	8,416	75.9	9.8	56.6	95.1	
สิงห์บุรี	17	1,494	78.0	6.7	64.9	91.1	
ชัยนาท	15	1,782	39.6	9.5	20.9	58.3	
สระบุรี	18	2,761	72.4	14.9	43.1	100.0	
ชลบุรี	26	12,249	66.5	9.8	47.3	85.7	
ระยอง	21	4,483	54.9	10.5	34.3	75.5	
จันทบุรี	27	5,301	78.1	6.3	65.8	90.4	
ตราด	23	1,468	64.7	11.3	42.4	87.0	
ฉะเชิงเทรา	19	4,721	90.8	4.6	81.6	99.9	
ปราจีนบุรี	31	5,955	83.3	5.1	73.3	93.4	
นครนายก	11	1,072	47.9	22.4	3.9	91.9	
สระแก้ว	19	4,735	61.0	14.4	32.6	89.4	
ราชบุรี	19	4,103	47.8	12.7	22.8	72.8	
กาญจนบุรี	15	4,281	44.8	10.4	24.3	65.4	
สุพรรณบุรี	8	2,142	53.3	23.3	7.4	99.2	
นครปฐม	2	340	8.8	6.0	0.0	20.6	
สมุทรสาคร	13	3,072	93.0	5.5	82.2	100.0	
สมุทรสงคราม	22	1,207	61.7	8.8	44.3	79.0	
เพชรบุรี	25	2,868	56.4	8.4	39.8	72.9	
ประจวบคีรีขันธ์	9	1,181	58.6	12.1	34.9	82.4	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	28	24,671	79.7	8.7	62.6	96.8	
บุรีรัมย์	17	6,080	64.1	17.2	30.3	98.0	
สุรินทร์	25	10,375	51.4	8.7	34.3	68.5	
ศรีสะเกษ	15	7,621	65.7	14.1	37.9	93.5	
อุบลราชธานี	16	12,896	77.1	11.5	54.4	99.8	
ยโสธร	15	1,974	60.8	11.6	38.0	83.5	
ชัยภูมิ	20	5,633	66.4	13.7	39.4	93.4	
อำนาจเจริญ	13	1,393	39.2	10.8	17.8	60.5	
หนองบัวลำภู	10	1,789	68.5	20.2	28.8	100.0	
ขอนแก่น	18	14,706	56.0	8.6	39.2	72.9	
อุดรธานี	20	7,194	56.2	13.9	28.8	83.5	
เลย	13	2,381	53.0	10.4	32.6	73.4	
หนองคาย	29	10,005	65.0	7.6	50.0	80.0	

ตารางที่ 10.3.27 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการลด เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	15	4,048	48.9	19.3	10.8 86.9
ร้อยเอ็ด	17	5,927	24.1	17.6	0.0 58.7
กาฬสินธุ์	16	6,891	53.7	11.2	31.6 75.8
สกลนคร	15	3,058	72.5	12.9	47.1 97.8
นครพนม	26	3,807	60.0	11.1	38.1 81.9
มุกดาหาร	14	896	42.5	12.6	17.8 67.3
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	38	16,415	49.0	5.8	37.5 60.4
ลำพูน	30	3,883	55.1	9.5	36.4 73.8
ลำปาง	33	8,298	64.9	8.8	47.4 82.3
อุตรดิตถ์	29	5,665	61.6	7.6	46.6 76.6
แพร่	40	7,579	59.2	8.4	42.6 75.8
น่าน	35	3,584	52.1	10.8	30.8 73.3
พะเยา	22	4,096	37.9	12.2	13.9 61.9
เชียงราย	43	26,752	78.9	7.9	63.3 94.5
แม่ฮ่องสอน	22	1,194	50.0	20.1	10.3 89.7
นครสวรรค์	25	13,197	63.3	11.6	40.5 86.1
อุทัยธานี	14	1,865	63.9	10.4	43.4 84.3
กำแพงเพชร	38	10,739	67.6	7.4	53.0 82.3
ตาก	3	597	77.2	14.8	48.1 100.0
สุโขทัย	37	6,458	76.2	9.4	57.7 94.7
พิษณุโลก	20	5,123	83.4	8.7	66.3 100.0
พิจิตร	30	6,869	78.4	8.6	61.4 95.4
เพชรบูรณ์	11	2,998	94.3	5.3	83.9 100.0
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	9	3,816	63.8	14.5	35.0 92.6
กระบี่	11	652	56.7	16.6	23.8 89.6
พังงา	20	1,193	69.1	10.9	47.7 90.6
ภูเก็ต	17	2,420	78.2	15.5	47.7 100.0
สุราษฎร์ธานี	25	8,212	58.9	7.5	44.1 73.8
ระนอง	16	673	34.7	9.4	16.1 53.4
ชุมพร	12	2,712	56.2	15.4	25.8 86.7
สงขลา	13	6,853	47.9	6.5	35.0 60.8
สตูล	6	333	37.5	23.4	0.0 83.7
ตรัง	16	1,884	72.7	9.2	54.5 90.9
พัทลุง	16	2,426	81.1	12.5	56.4 100.0
ปัตตานี	4	234	37.3	19.3	0.0 75.4
ยะลา	6	520	30.7	14.0	2.9 58.4
นราธิวาส	12	3,077	69.1	26.2	17.2 100.0

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่งน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.3.28 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10	14,232	37.9	13.3	11.7	64.0
25 - 34	37	15,416	20.1	5.0	10.4	29.9
35 - 44	86	24,479	13.4	2.0	9.5	17.4
45 - 54	202	93,152	25.0	2.4	20.3	29.7
55 - 64	734	128,389	30.3	1.6	27.1	33.6
65 - 74	508	75,084	28.0	2.0	24.1	31.8
รวม	1,577	350,751	25.8	1.0	23.8	27.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	13	6,081	14.3	5.8	2.8	25.7
25 - 34	36	17,713	22.4	4.8	12.9	31.9
35 - 44	128	63,989	20.1	2.7	14.9	25.3
45 - 54	298	154,603	25.0	2.7	19.6	30.4
55 - 64	901	190,183	27.3	1.1	25.0	29.5
65 - 74	592	110,079	26.5	1.6	23.4	29.7
รวม	1,968	542,648	25.0	1.0	23.0	27.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	23	20,313	25.3	6.8	11.9	38.7
25 - 34	73	33,128	21.3	3.5	14.5	28.1
35 - 44	214	88,468	17.7	1.9	14.0	21.4
45 - 54	500	247,755	25.0	2.0	21.2	28.9
55 - 64	1,635	318,572	28.4	1.0	26.5	30.4
65 - 74	1,100	185,163	27.1	1.2	24.7	29.5
รวมทั้งประเทศ	3,545	893,399	25.3	0.8	23.7	26.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.3.29 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพรในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,057	391,927	27.9	1.3	25.3	30.5
นอกเขตเทศบาล	1,488	501,472	23.6	1.0	21.6	25.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	75	135,993	37.7	4.0	29.4	46.0
ภาคกลาง	1,130	212,920	22.1	1.2	19.8	24.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	614	213,953	23.7	1.8	20.2	27.2
ภาคเหนือ	922	203,591	25.5	1.2	23.1	27.8
ภาคใต้	804	126,942	25.2	1.8	21.7	28.7
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	167	45,975	23.5	2.8	18.1	29.0
เขต สคร.ที่ 2	193	21,976	16.6	2.2	12.2	20.9
เขต สคร.ที่ 3	425	84,115	23.5	2.1	19.5	27.6
เขต สคร.ที่ 4	345	60,854	21.9	2.2	17.7	26.2
เขต สคร.ที่ 5	120	55,763	18.9	2.8	13.5	24.3
เขต สคร.ที่ 6	236	95,030	25.0	3.0	19.0	30.9
เขต สคร.ที่ 7	258	63,160	27.8	3.0	21.9	33.7
เขต สคร.ที่ 8	185	41,745	21.5	2.2	17.2	25.9
เขต สคร.ที่ 9	268	52,182	24.9	2.1	20.8	29.0
เขต สคร.ที่ 10	469	109,664	27.7	1.9	24.0	31.3
เขต สคร.ที่ 11	392	47,449	21.5	2.5	16.6	26.3
เขต สคร.ที่ 12	412	79,493	28.1	2.5	23.2	33.0

ตารางที่ 10.3.30 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	75	135,993	37.7	4.0	29.4	46.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	56	16,278	19.6	4.6	10.6	28.5
นนทบุรี	55	18,304	23.4	5.0	13.6	33.1
ปทุมธานี	42	11,757	22.5	2.3	18.0	27.1
พระนครศรีอยุธยา	70	15,914	24.5	5.5	13.7	35.4
อ่างทอง	38	3,335	19.0	4.8	9.6	28.4
ลพบุรี	36	7,906	16.5	4.5	7.6	25.3
สิงห์บุรี	46	2,963	17.3	3.8	9.9	24.7
ชัยนาท	43	4,488	19.3	5.4	8.7	30.0
สระบุรี	30	3,284	12.3	3.8	4.8	19.8
ชลบุรี	83	30,559	36.0	5.6	24.9	47.1
ระยอง	35	3,982	11.5	2.9	5.9	17.1
จันทบุรี	56	9,037	32.2	4.9	22.6	41.7
ตราด	44	2,980	25.9	3.5	19.1	32.8
ฉะเชิงเทรา	40	9,330	24.7	4.1	16.5	32.8
ปราจีนบุรี	37	3,869	14.9	2.2	10.6	19.2
นครนายก	37	3,035	17.2	4.8	7.8	26.7
สระแก้ว	37	5,044	14.9	3.2	8.7	21.1
ราชบุรี	43	9,169	16.6	3.7	9.2	23.9
กาญจนบุรี	47	7,841	18.0	4.4	9.5	26.6
สุพรรณบุรี	47	12,216	24.8	6.9	11.2	38.3
นครปฐม	35	13,965	32.3	6.0	20.6	44.0
สมุทรสาคร	43	4,669	23.3	5.0	13.5	33.0
สมุทรสงคราม	48	2,252	16.6	2.4	11.9	21.3
เพชรบุรี	54	7,063	22.4	5.1	12.4	32.4
ประจวบคีรีขันธ์	28	3,680	17.4	3.8	10.0	24.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	38	33,333	23.4	5.0	13.5	33.3
บุรีรัมย์	30	9,397	16.9	3.8	9.4	24.4
สุรินทร์	28	6,517	11.8	3.5	5.0	18.6
ศรีสะเกษ	19	5,711	14.1	4.0	6.3	21.9
อุบลราชธานี	49	34,167	42.3	5.2	32.0	52.6
ยโสธร	35	5,968	29.3	6.1	17.3	41.3
ชัยภูมิ	24	6,516	15.8	5.9	4.1	27.5
อำนาจเจริญ	28	2,330	16.9	3.3	10.5	23.3
หนองบัวลำภู	28	2,760	15.2	4.6	6.2	24.2
ขอนแก่น	41	24,063	26.1	4.9	16.5	35.6
อุดรธานี	34	16,014	31.4	6.4	18.9	43.9
เลย	26	6,379	23.0	8.3	6.7	39.3
หนองคาย	34	7,852	19.2	5.0	9.4	29.0

ตารางที่ 10.3.30 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันด้วยการกินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	24	5,765	16.8	5.7	5.5	28.1
ร้อยเอ็ด	34	26,710	37.5	7.4	22.9	52.1
กาฬสินธุ์	15	5,486	12.3	2.4	7.6	16.9
สกลนคร	30	7,155	22.7	4.9	13.1	32.3
นครพนม	48	5,040	17.6	3.9	10.0	25.1
มุกดาหาร	49	2,789	23.9	4.9	14.4	33.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	79	39,299	31.3	4.6	22.3	40.3
ลำพูน	54	7,375	26.2	4.5	17.5	35.0
ลำปาง	54	14,245	26.4	3.4	19.7	33.1
อุตรดิตถ์	65	9,963	30.0	4.9	20.4	39.5
แพร่	62	10,168	24.3	4.4	15.7	33.0
น่าน	47	5,246	21.4	5.0	11.5	31.2
พะเยา	71	11,924	30.6	3.6	23.5	37.7
เชียงราย	61	20,325	26.5	4.2	18.2	34.7
แม่ฮ่องสอน	41	1,082	16.3	6.5	3.5	29.0
นครสวรรค์	47	16,161	20.2	2.6	15.1	25.4
อุทัยธานี	33	2,882	17.2	3.4	10.5	23.9
กำแพงเพชร	45	10,321	20.7	6.5	7.9	33.4
ตาก	39	5,569	18.7	2.3	14.2	23.3
สุโขทัย	68	10,332	24.7	5.4	14.1	35.2
พิษณุโลก	56	12,970	22.2	3.3	15.6	28.7
พิจิตร	60	12,381	26.2	3.3	19.6	32.7
เพชรบูรณ์	40	13,348	28.9	5.6	18.0	39.8
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	30	9,045	13.3	5.2	3.1	23.5
กระบี่	46	3,066	20.0	4.4	11.3	28.6
พังงา	55	3,459	23.8	4.1	15.8	31.8
ภูเก็ต	103	8,286	44.8	5.4	34.2	55.4
สุราษฎร์ธานี	48	15,017	25.3	4.7	16.0	34.5
ระนอง	58	2,067	15.7	2.6	10.6	20.9
ชุมพร	52	6,509	20.3	5.7	9.0	31.5
สงขลา	88	31,944	31.6	5.0	21.7	41.5
สตูล	41	3,349	26.5	6.1	14.4	38.5
ตรัง	40	7,395	27.2	7.5	12.4	42.0
พัทลุง	44	6,397	23.6	4.3	15.1	32.1
ปัตตานี	61	8,757	26.6	5.8	15.2	38.0
ยะลา	66	7,187	27.2	2.7	21.9	32.5
นราธิวาส	72	14,463	26.0	6.7	12.8	39.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.4.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	11	6,365	42.5	12.9	17.1	67.8
25 - 34	56	20,978	41.4	6.9	27.9	54.9
35 - 44	183	67,355	45.8	4.0	38.0	53.6
45 - 54	399	173,075	49.0	6.0	37.2	60.7
55 - 64	1,353	224,238	54.3	1.7	50.9	57.7
65 - 74	960	148,905	55.1	2.1	51.0	59.2
รวม	2,962	640,916	51.3	2.1	47.2	55.3
<b>หญิง</b>						
15 - 24	26	14,378	63.6	12.0	40.0	87.3
25 - 34	68	27,397	47.9	7.0	34.2	61.6
35 - 44	340	146,747	56.5	3.4	49.8	63.3
45 - 54	663	295,385	50.7	2.3	46.1	55.3
55 - 64	1,972	372,067	52.8	1.8	49.3	56.4
65 - 74	1,312	239,587	54.7	1.9	51.0	58.5
รวม	4,381	1,095,561	53.1	1.4	50.4	55.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	37	20,743	55.2	9.3	37.0	73.3
25 - 34	124	48,376	44.9	5.0	35.1	54.6
35 - 44	523	214,101	52.6	2.5	47.8	57.5
45 - 54	1,062	468,460	50.0	3.0	44.2	55.9
55 - 64	3,325	596,305	53.4	1.4	50.5	56.2
65 - 74	2,272	388,492	54.9	1.5	52.0	57.8
รวมทั้งประเทศ	7,343	1,736,477	52.4	1.3	49.9	54.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.4.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	3,968	649,894	50.0	1.7	46.6	53.4
นอกเขตเทศบาล	3,375	1,086,583	54.0	1.8	50.4	57.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	90	155,281	48.6	5.7	36.8	60.4
ภาคกลาง	2,660	482,777	52.7	1.7	49.4	56.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,302	440,656	52.0	3.4	45.4	58.6
ภาคเหนือ	1,865	416,325	53.8	2.3	49.4	58.3
ภาคใต้	1,426	241,439	52.7	2.7	47.5	57.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	341	88,167	48.6	4.3	40.1	57.1
เขต สคร.ที่ 2	579	75,669	56.9	3.4	50.2	63.6
เขต สคร.ที่ 3	862	166,055	47.6	2.9	42.0	53.2
เขต สคร.ที่ 4	878	152,886	60.6	2.6	55.4	65.7
เขต สคร.ที่ 5	294	129,232	44.9	4.8	35.5	54.3
เขต สคร.ที่ 6	524	209,943	60.3	5.9	48.8	71.8
เขต สคร.ที่ 7	484	101,481	48.1	4.0	40.3	55.9
เขต สคร.ที่ 8	485	90,764	52.0	6.3	39.5	64.4
เขต สคร.ที่ 9	501	99,867	46.0	3.1	39.9	52.1
เขต สคร.ที่ 10	879	225,694	59.1	2.8	53.6	64.7
เขต สคร.ที่ 11	764	118,317	57.9	3.6	50.8	65.0
เขต สคร.ที่ 12	662	123,121	48.5	3.5	41.6	55.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.4.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	90	155,281	48.6	5.7	36.8	60.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	114	35,038	44.9	6.6	31.8	57.9
นนทบุรี	121	34,824	50.4	5.8	39.0	61.8
ปทุมธานี	66	17,610	35.1	6.6	22.0	48.1
พระนครศรีอยุธยา	154	35,733	57.6	7.6	42.7	72.6
อ่างทอง	122	10,863	60.6	5.6	49.7	71.6
ลพบุรี	115	26,110	55.5	5.4	44.8	66.1
สิงห์บุรี	117	10,087	59.2	6.7	46.1	72.4
ชัยนาท	131	12,868	55.8	10.3	35.7	76.0
สระบุรี	94	15,741	56.4	8.8	39.2	73.7
ชลบุรี	118	36,121	44.7	6.6	31.7	57.8
ระยอง	86	12,096	37.5	8.9	20.0	54.9
จันทบุรี	91	12,505	40.9	5.1	30.9	51.0
ตราด	90	5,551	48.5	7.4	33.9	63.1
ฉะเชิงเทรา	106	24,756	64.7	7.4	50.1	79.3
ปราจีนบุรี	82	11,195	42.8	5.4	32.2	53.4
นครนายก	72	8,157	46.1	6.3	33.7	58.4
สระแก้ว	103	20,635	61.7	8.4	45.2	78.2
ราชบุรี	102	26,180	53.8	6.7	40.6	67.0
กาญจนบุรี	108	23,240	59.4	6.2	47.4	71.5
สุพรรณบุรี	89	28,808	59.5	7.4	45.0	74.0
นครปฐม	94	26,836	75.5	3.8	68.0	83.0
สมุทรสาคร	82	8,101	39.0	5.1	29.1	48.9
สมุทรสงคราม	175	7,821	62.8	4.1	54.8	70.8
เพชรบุรี	132	18,543	63.6	7.8	48.1	79.0
ประจวบคีรีขันธ์	96	13,357	73.1	7.0	59.3	86.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	93	68,885	45.0	7.8	29.8	60.3
บุรีรัมย์	56	20,368	43.9	7.3	29.5	58.3
สุรินทร์	80	27,075	53.2	6.9	39.5	66.8
ศรีสะเกษ	40	12,459	34.7	6.8	21.5	48.0
อุบลราชธานี	53	30,110	39.9	7.6	25.0	54.8
ยโสธร	109	15,541	78.3	5.8	66.8	89.8
ชัยภูมิ	65	12,905	34.5	10.4	14.0	55.0
อำนาจเจริญ	55	6,151	51.6	6.2	39.4	63.8
หนองบัวลำภู	42	5,131	34.5	6.9	20.9	48.1
ขอนแก่น	68	43,187	50.8	8.2	34.6	67.0
อุดรธานี	82	33,840	73.6	7.3	59.3	87.9
เลย	53	10,706	39.8	7.7	24.6	55.0
หนองคาย	88	22,906	59.9	7.8	44.5	75.2

ตารางที่ 10.4.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน ในประชากร  
ที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	65	14,463	51.9	8.6	35.1	68.7
ร้อยเอ็ด	81	64,311	80.3	12.3	56.2	100.0
กาฬสินธุ์	45	15,399	52.6	6.2	40.5	64.7
สกลนคร	61	17,390	52.5	9.1	34.5	70.4
นครพนม	92	13,303	53.6	5.2	43.4	63.7
มุกดาหาร	74	6,528	65.2	8.4	48.6	81.8
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	153	85,515	66.5	5.6	55.5	77.5
ลำพูน	98	15,033	54.9	8.5	38.2	71.7
ลำปาง	90	24,516	48.0	7.5	33.3	62.7
อุตรดิตถ์	88	13,764	44.8	6.4	32.2	57.3
แพร่	168	30,441	78.8	3.4	72.0	85.5
น่าน	100	8,962	40.8	8.0	25.1	56.5
พะเยา	107	18,380	55.7	5.2	45.5	65.9
เชียงราย	93	40,678	55.4	6.5	42.6	68.1
แม่ฮ่องสอน	70	2,168	28.4	7.3	14.1	42.7
นครสวรรค์	95	20,529	31.0	9.5	12.3	49.7
อุทัยธานี	115	10,822	77.6	5.2	67.3	87.8
กำแพงเพชร	127	27,045	61.2	7.6	46.2	76.2
ตาก	97	14,787	47.2	5.7	35.9	58.4
สุโขทัย	116	21,596	50.9	6.7	37.7	64.0
พิษณุโลก	128	33,197	53.7	7.5	39.0	68.5
พิจิตร	148	32,368	64.4	4.5	55.5	73.3
เพชรบูรณ์	72	16,523	32.6	3.9	24.9	40.3
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	81	40,826	69.1	7.8	53.8	84.4
กระบี่	99	8,597	54.7	6.8	41.4	68.1
พังงา	105	7,362	55.0	5.3	44.7	65.4
ภูเก็ต	138	10,763	63.8	7.3	49.4	78.2
สุราษฎร์ธานี	110	30,507	54.8	5.6	43.8	65.8
ระนอง	130	5,772	49.6	4.4	41.0	58.2
ชุมพร	101	14,490	45.3	8.5	28.5	62.1
สงขลา	107	41,141	49.2	8.9	31.7	66.7
สตูล	79	6,999	53.2	8.0	37.5	68.9
ตรัง	92	11,094	40.6	5.8	29.2	52.1
พัทลุง	83	13,564	48.8	5.4	38.3	59.4
ปัตตานี	106	16,929	55.2	7.5	40.4	70.0
ยะลา	99	10,072	44.4	5.0	34.6	54.3
นราธิวาส	96	23,322	47.8	6.8	34.5	61.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 10.4.4 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	79	1.5	0.4	0.7	2.3
25 - 34	190	4.4	1.1	2.3	6.6
35 - 44	424	6.1	0.6	4.9	7.2
45 - 54	802	7.0	0.6	5.8	8.1
55 - 64	2,519	7.0	0.2	6.6	7.4
65 - 74	1,719	6.9	0.2	6.5	7.2
รวม	5,733	6.5	0.2	6.1	7.0
<b>หญิง</b>					
15 - 24	79	4.1	1.1	1.9	6.3
25 - 34	177	5.1	1.2	2.8	7.4
35 - 44	653	6.2	0.3	5.6	6.8
45 - 54	1,257	6.5	0.2	6.1	6.9
55 - 64	3,427	7.2	0.1	6.9	7.4
65 - 74	2,267	7.3	0.2	7.0	7.6
รวม	7,860	6.7	0.1	6.5	7.0
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	158	2.8	0.6	1.7	4
25 - 34	367	4.7	0.8	3.2	6.3
35 - 44	1,077	6.1	0.3	5.6	6.7
45 - 54	2,059	6.7	0.2	6.2	7.1
55 - 64	5,946	7.1	0.1	6.9	7.4
65 - 74	3,986	7.1	0.1	6.8	7.4
รวมทั้งประเทศ	13,593	6.6	0.1	6.4	6.9

ตารางที่ 10.4.5 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	7,638	6.4	0.2	6.1	6.7
นอกเขตเทศบาล	5,955	6.8	0.2	6.5	7.1
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	152	6.4	0.5	5.4	7.4
ภาคกลาง	4,782	6.7	0.2	6.4	7.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,609	6.5	0.3	5.9	7.0
ภาคเหนือ	3,402	6.8	0.2	6.4	7.2
ภาคใต้	2,648	6.8	0.3	6.2	7.3
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร.ที่ 1	662	6.6	0.4	5.9	7.3
เขต สคร.ที่ 2	989	7.7	0.3	7.2	8.3
เขต สคร.ที่ 3	1,704	6.3	0.3	5.6	6.9
เขต สคร.ที่ 4	1,427	6.9	0.3	6.4	7.4
เขต สคร.ที่ 5	574	6.6	0.3	6.0	7.1
เขต สคร.ที่ 6	1,021	6.8	0.6	5.7	7.9
เขต สคร.ที่ 7	1,014	5.9	0.5	5.0	6.8
เขต สคร.ที่ 8	754	7.4	0.4	6.7	8.0
เขต สคร.ที่ 9	1,019	6.5	0.3	5.9	7.1
เขต สคร.ที่ 10	1,629	6.7	0.3	6.2	7.3
เขต สคร.ที่ 11	1,380	7.0	0.5	6.1	7.9
เขต สคร.ที่ 12	1,268	6.6	0.3	6.0	7.2

ตารางที่ 10.4.6 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	152	6.4	0.5	5.4	7.4
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	174	6.4	0.4	5.6	7.2
นนทบุรี	226	6.2	0.6	5.0	7.5
ปทุมธานี	163	6.1	0.2	5.7	6.6
พระนครศรีอยุธยา	273	7.3	0.7	6.0	8.7
อ่างทอง	209	8.0	0.3	7.3	8.6
ลพบุรี	204	8.3	0.6	7.2	9.5
สิงห์บุรี	214	6.8	0.4	5.9	7.6
ชัยนาท	186	7.8	0.8	6.4	9.3
สระบุรี	176	7.0	0.5	6.1	7.9
ชลบุรี	261	6.3	0.9	4.5	8.0
ระยอง	179	4.7	0.5	3.6	5.7
จันทบุรี	196	6.7	0.3	6.2	7.3
ตราด	195	5.7	0.5	4.8	6.7
ฉะเชิงเทรา	171	7.5	0.8	6.0	9.1
ปราจีนบุรี	189	7.0	0.7	5.6	8.4
นครนายก	185	4.7	0.4	3.8	5.5
สระแก้ว	154	6.2	0.8	4.7	7.6
ราชบุรี	201	6.7	0.5	5.7	7.7
กาญจนบุรี	167	6.9	0.7	5.5	8.2
สุพรรณบุรี	155	6.4	0.8	4.9	7.9
นครปฐม	145	7.2	0.5	6.2	8.3
สมุทรสาคร	179	6.6	0.4	5.7	7.4
สมุทรสงคราม	240	8.7	0.5	7.8	9.6
เพชรบุรี	203	7.8	0.6	6.6	9.1
ประจวบคีรีขันธ์	137	6.1	1.0	4.0	8.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	189	6.5	0.3	5.9	7.2
บุรีรัมย์	121	6.6	0.4	5.9	7.3
สุรินทร์	142	7.0	1.0	5.1	8.9
ศรีสะเกษ	123	6.5	0.7	5.2	7.9
อุบลราชธานี	143	6.1	1.1	4.0	8.2
ยโสธร	152	8.9	1.1	6.8	11.0
ชัยภูมิ	122	6.1	0.5	5.1	7.1
อำนาจเจริญ	166	3.7	0.6	2.6	4.8
หนองบัวลำภู	111	6.6	0.5	5.6	7.7
ขอนแก่น	134	6.2	1.0	4.2	8.2
อุดรธานี	125	8.1	1.8	4.7	11.6
เลย	126	5.6	0.5	4.6	6.5
หนองคาย	173	6.4	0.9	4.7	8.1

ตารางที่ 10.4.6 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่มีความดันโลหิตสูง อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	126	5.5	0.6	4.3	6.8
ร้อยเอ็ด	130	8.3	1.2	6.0	10.6
กาฬสินธุ์	96	5.2	0.4	4.4	6.1
สกลนคร	133	5.2	1.2	2.9	7.6
นครพนม	175	3.8	0.7	2.4	5.1
มุกดาหาร	122	8.1	0.7	6.8	9.5
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	248	6.8	0.6	5.7	8.0
ลำพูน	190	6.0	0.5	5.0	6.9
ลำปาง	203	5.4	0.3	4.8	6.0
อุตรดิตถ์	160	5.8	0.5	4.7	6.8
แพร่	224	9.7	0.4	8.9	10.5
น่าน	201	4.7	0.3	4.1	5.3
พะเยา	177	6.1	0.5	5.1	7.1
เชียงราย	207	7.2	0.8	5.5	8.8
แม่ฮ่องสอน	179	3.9	0.4	3.1	4.8
นครสวรรค์	172	7.3	0.6	6.1	8.5
อุทัยธานี	173	5.2	0.9	3.4	7.0
กำแพงเพชร	185	7.9	0.7	6.5	9.4
ตาก	238	6.2	0.5	5.3	7.1
สุโขทัย	223	6.6	0.5	5.5	7.6
พิษณุโลก	239	7.2	0.7	5.8	8.6
พิจิตร	224	7.7	0.6	6.6	8.8
เพชรบูรณ์	159	6.1	0.6	4.9	7.3
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	151	7.9	1.0	5.9	9.8
กระบี่	178	7.0	1.1	4.8	9.2
พังงา	202	7.0	0.6	5.9	8.2
ภูเก็ต	191	8.7	1.2	6.4	11.0
สุราษฎร์ธานี	189	6.8	0.7	5.5	8.1
ระนอง	263	5.6	0.4	4.8	6.4
ชุมพร	206	5.4	1.1	3.3	7.5
สงขลา	171	6.5	0.8	5.0	8.0
สตูล	151	6.1	0.5	5.1	7.1
ตรัง	186	6.1	0.5	5.0	7.1
พัทลุง	190	7.1	0.4	6.4	7.9
ปัตตานี	210	6.7	0.6	5.5	7.8
ยะลา	171	5.9	0.8	4.4	7.4
นราธิวาส	189	7.1	0.8	5.5	8.7

ตารางที่ 10.4.7 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและดูภาวะแทรกซ้อนในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>ชาย</b>					
15 - 24	4	4.4	0.6	3.2	5.7
25 - 34	20	5.3	1.1	3.2	7.4
35 - 44	88	4.4	0.6	3.3	5.6
45 - 54	191	4.4	0.3	3.7	5.0
55 - 64	647	4.8	0.3	4.1	5.4
65 - 74	499	4.0	0.2	3.6	4.4
รวม	1,449	4.5	0.2	4.1	4.8
<b>หญิง</b>					
15 - 24	9	10.2	2.8	4.6	15.7
25 - 34	29	6.9	1.6	3.8	10.0
35 - 44	128	4.4	0.8	3.0	5.9
45 - 54	294	4.9	0.4	4.2	5.6
55 - 64	936	4.3	0.2	4.0	4.7
65 - 74	653	4.3	0.2	3.8	4.7
รวม	2,049	4.6	0.2	4.3	5.0
<b>ชายและหญิง</b>					
15 - 24	13	7.8	1.8	4.3	11.4
25 - 34	49	6.2	1.0	4.1	8.2
35 - 44	216	4.4	0.5	3.4	5.5
45 - 54	485	4.7	0.3	4.2	5.2
55 - 64	1,583	4.5	0.2	4.1	4.8
65 - 74	1,152	4.2	0.2	3.8	4.5
รวมทั้งประเทศ	3,498	4.6	0.1	4.3	4.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.4.8 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและดูภาวะแทรกซ้อนในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
<b>เขตการปกครอง</b>					
ในเขตเทศบาล	2,042	4.7	0.2	4.2	5.1
นอกเขตเทศบาล	1,456	4.5	0.2	4.1	4.9
<b>ภาค</b>					
กรุงเทพมหานคร	46	5.8	0.7	4.5	7.1
ภาคกลาง	1,193	4.3	0.2	3.9	4.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	727	4.6	0.3	4.1	5.2
ภาคเหนือ	852	4.7	0.3	4.1	5.4
ภาคใต้	680	3.9	0.3	3.4	4.3
<b>เขต สคร.</b>					
เขต สคร.ที่ 1	229	4.3	0.4	3.5	5.0
เขต สคร.ที่ 2	229	4.0	0.4	3.2	4.7
เขต สคร.ที่ 3	435	4.4	0.4	3.6	5.2
เขต สคร.ที่ 4	300	4.4	0.3	3.8	5.0
เขต สคร.ที่ 5	156	5.0	0.6	3.7	6.2
เขต สคร.ที่ 6	278	4.4	0.4	3.6	5.2
เขต สคร.ที่ 7	293	4.6	0.4	3.8	5.5
เขต สคร.ที่ 8	175	5.0	0.4	4.2	5.8
เขต สคร.ที่ 9	322	4.9	0.8	3.3	6.5
เขต สคร.ที่ 10	355	4.4	0.4	3.7	5.1
เขต สคร.ที่ 11	358	3.6	0.3	2.9	4.3
เขต สคร.ที่ 12	322	4.1	0.4	3.4	4.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 10.4.9 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและดูภาวะแทรกซ้อนในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
กรุงเทพมหานคร	46	5.8	0.7	4.5	7.1
ภาคกลาง					
สมุทรปราการ	37	3.0	0.4	2.2	3.7
นนทบุรี	83	4.5	0.9	2.8	6.2
ปทุมธานี	73	4.2	0.4	3.4	5.1
พระนครศรีอยุธยา	73	4.0	0.4	3.3	4.7
อ่างทอง	31	3.7	0.5	2.7	4.6
ลพบุรี	64	3.9	0.7	2.6	5.2
สิงห์บุรี	66	3.5	0.5	2.5	4.4
ชัยนาท	38	5.1	1.1	2.9	7.2
สระบุรี	30	4.0	0.6	2.7	5.2
ชลบุรี	85	5.8	1.1	3.5	8.0
ระยอง	78	4.1	0.4	3.4	4.8
จันทบุรี	43	3.9	0.8	2.5	5.4
ตราด	54	3.8	0.5	2.7	4.9
ฉะเชิงเทรา	17	3.3	0.4	2.5	4.2
ปราจีนบุรี	39	3.0	0.4	2.3	3.7
นครนายก	29	4.5	1.7	1.1	7.9
สระแก้ว	53	3.3	0.1	3.1	3.6
ราชบุรี	66	3.7	0.4	2.9	4.5
กาญจนบุรี	43	3.4	0.4	2.7	4.2
สุพรรณบุรี	37	3.2	0.5	2.3	4.1
นครปฐม	21	7.3	1.9	3.6	11.0
สมุทรสาคร	47	6.5	2.0	2.6	10.5
สมุทรสงคราม	22	3.3	0.4	2.4	4.2
เพชรบุรี	42	4.3	0.6	3.1	5.4
ประจวบคีรีขันธ์	22	6.5	1.0	4.5	8.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
นครราชสีมา	54	5.2	0.7	3.8	6.5
บุรีรัมย์	33	3.2	0.5	2.3	4.1
สุรินทร์	37	6.4	2.4	1.6	11.1
ศรีสะเกษ	39	3.8	0.6	2.7	5.0
อุบลราชธานี	49	5.4	0.7	3.9	6.8
ยโสธร	44	2.8	0.5	1.9	3.6
ชัยภูมิ	32	5.3	1.1	3.2	7.4
อำนาจเจริญ	43	3.0	0.4	2.3	3.7
หนองบัวลำภู	16	3.5	0.5	2.4	4.5
ขอนแก่น	42	5.3	0.9	3.6	7.0
อุดรธานี	33	4.3	1.3	1.8	6.8
เลย	32	3.6	0.5	2.6	4.6
หนองคาย	39	3.5	0.4	2.6	4.3

ตารางที่ 10.4.9 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติ จากการทำงานของไตและดูภาวะแทรกซ้อนในประชากรที่มีความดันโลหิตสูงอายุ 15 - 74 ปี ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	ค่าเฉลี่ย (Means)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าเฉลี่ย (Std Error of Means)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณค่าเฉลี่ย (95% Confidence Limits for Means)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	43	5.0	0.7	3.6	6.3
ร้อยเอ็ด	37	3.9	0.3	3.5	4.4
กาฬสินธุ์	36	3.3	0.4	2.4	4.2
สกลนคร	35	3.6	0.5	2.7	4.6
นครพนม	41	5.4	1.2	2.9	7.8
มุกดาหาร	42	6.1	0.6	4.8	7.3
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	47	5.2	0.9	3.4	7.0
ลำพูน	40	4.6	0.5	3.6	5.7
ลำปาง	42	3.1	0.5	2.2	4.0
อุตรดิตถ์	43	5.6	1.7	2.2	9.0
แพร่	49	5.9	1.0	4.0	7.8
น่าน	61	3.3	0.3	2.7	3.8
พะเยา	44	4.1	0.5	3.2	5.1
เชียงราย	36	3.7	0.4	2.9	4.5
แม่ฮ่องสอน	36	3.8	0.6	2.6	5.1
นครสวรรค์	51	4.5	0.3	3.8	5.1
อุทัยธานี	26	6.0	1.7	2.6	9.5
กำแพงเพชร	33	3.8	0.7	2.4	5.1
ตาก	67	5.5	1.6	2.4	8.7
สุโขทัย	46	2.9	0.2	2.6	3.3
พิษณุโลก	101	3.7	0.5	2.6	4.7
พิจิตร	65	6.3	0.8	4.8	7.7
เพชรบูรณ์	65	7.1	2.9	1.5	12.8
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	31	2.4	0.2	2.1	2.7
กระบี่	64	3.4	0.6	2.2	4.5
พังงา	36	7.0	3.7	0.3	14.3
ภูเก็ต	44	5.2	1.1	3.0	7.5
สุราษฎร์ธานี	57	3.1	0.2	2.7	3.4
ระนอง	54	2.5	0.2	2.2	2.9
ชุมพร	72	4.9	0.9	3.1	6.7
สงขลา	54	4.1	0.7	2.6	5.5
สตูล	41	4.9	1.0	2.9	6.9
ตรัง	57	5.5	0.9	3.8	7.3
พัทลุง	41	2.5	0.2	2.2	2.9
ปัตตานี	41	4.7	1.3	2.1	7.3
ยะลา	49	3.5	0.7	2.2	4.8
นราธิวาส	39	3.7	0.8	2.1	5.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



## ส่วนที่ 14

คุณภาพชีวิตและภาวะบกพร่องทาง  
ร่างกาย



ตารางที่ 14.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่มีความบกพร่องหรือไม่มีปัญหาสุขภาพ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	10,314	4,686,319	92.3	0.5	91.3	93.3
25 - 34	9,787	4,257,473	90.0	0.6	88.9	91.1
35 - 44	10,283	4,601,443	87.2	0.6	86.0	88.4
45 - 54	7,502	3,430,344	84.0	0.9	82.3	85.7
55 - 64	11,056	1,933,528	75.5	0.7	74.2	76.9
65 - 74	4,368	769,993	66.0	0.9	64.3	67.8
รวม	53,310	19,679,100	86.0	0.4	85.2	86.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	9,166	4,233,492	89.7	0.6	88.5	90.8
25 - 34	8,985	4,056,140	86.7	0.7	85.4	88.1
35 - 44	10,287	4,765,235	82.9	0.7	81.6	84.2
45 - 54	7,706	3,568,269	78.4	0.8	76.9	80.0
55 - 64	9,561	1,938,782	66.4	0.8	64.9	68.0
65 - 74	3,866	776,267	56.0	1.2	53.7	58.3
รวม	49,571	19,338,185	80.6	0.5	79.6	81.5
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	19,480	8,919,810	91.1	0.5	90.2	91.9
25 - 34	18,772	8,313,614	88.4	0.5	87.4	89.4
35 - 44	20,570	9,366,678	84.9	0.5	83.9	86.0
45 - 54	15,208	6,998,613	81.1	0.7	79.8	82.4
55 - 64	20,617	3,872,310	70.7	0.6	69.4	71.9
65 - 74	8,234	1,546,260	60.6	0.8	58.9	62.2
รวมทั้งประเทศ	102,881	39,017,285	83.2	0.4	82.4	84.0

ตารางที่ 14.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่มีความบกพร่องหรือไม่มีปัญหาสุขภาพ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	52,511	13,398,317	85.0	0.5	84.0	86.0
นอกเขตเทศบาล	50,370	25,618,968	82.3	0.5	81.2	83.4
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	1,498	3,855,680	90.2	1.4	87.5	92.8
ภาคกลาง	34,608	9,929,095	84.9	0.6	83.8	86.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	25,260	13,102,469	82.2	0.8	80.7	83.8
ภาคเหนือ	22,245	6,925,373	79.2	1.0	77.3	81.2
ภาคใต้	19,270	5,204,668	83.2	0.8	81.7	84.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	4,355	1,824,639	86.3	1.5	83.4	89.3
เขต สคร. ที่ 2	7,102	1,425,490	85.7	1.2	83.3	88.1
เขต สคร. ที่ 3	12,243	3,541,396	83.8	1.1	81.6	86.0
เขต สคร. ที่ 4	10,908	3,137,570	85.0	1.0	83.1	86.9
เขต สคร. ที่ 5	5,141	3,920,209	80.3	1.5	77.2	83.3
เขต สคร. ที่ 6	10,881	5,400,503	84.2	1.1	82.1	86.4
เขต สคร. ที่ 7	9,238	3,781,757	81.6	1.6	78.4	84.8
เขต สคร. ที่ 8	5,320	1,598,763	81.2	2.2	77.0	85.4
เขต สคร. ที่ 9	6,368	2,005,125	78.8	1.6	75.6	82.0
เขต สคร. ที่ 10	10,557	3,321,485	78.6	1.5	75.5	81.6
เขต สคร. ที่ 11	9,705	2,584,354	85.3	1.2	83.0	87.6
เขต สคร. ที่ 12	9,565	2,620,314	81.3	1.0	79.4	83.2

ตารางที่ 14.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่มีความบกพร่องหรือไม่มีปัญหาสุขภาพ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	1,498	3,855,680	90.2	1.4	87.5	92.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	1,445	789,950	89.7	1.7	86.3	93.1
นนทบุรี	1,458	705,269	86.5	2.9	80.7	92.3
ปทุมธานี	1,462	612,045	85.2	2.3	80.7	89.7
พระนครศรีอยุธยา	1,435	507,325	87.5	1.5	84.6	90.4
อ่างทอง	1,486	194,118	89.0	1.6	85.8	92.1
ลพบุรี	1,353	468,957	82.7	2.8	77.1	88.2
สิงห์บุรี	1,364	133,489	80.9	3.4	74.2	87.5
ชัยนาท	1,367	214,367	83.7	1.8	80.3	87.2
สระบุรี	1,532	414,559	90.7	1.8	87.2	94.3
ชลบุรี	1,356	792,306	84.9	2.4	80.2	89.5
ระยอง	1,244	356,562	80.4	2.4	75.7	85.1
จันทบุรี	1,301	309,453	81.0	1.8	77.5	84.6
ตราด	1,428	135,946	85.1	4.0	77.2	93.0
ฉะเชิงเทรา	1,424	422,926	85.0	3.0	79.2	90.8
ปราจีนบุรี	1,385	286,365	82.9	3.3	76.5	89.3
นครนายก	1,383	160,736	84.5	3.1	78.5	90.5
สระแก้ว	1,277	287,151	73.1	6.7	59.9	86.3
ราชบุรี	1,464	549,899	88.0	2.1	83.9	92.2
กาญจนบุรี	1,275	472,052	84.6	2.9	78.8	90.3
สุพรรณบุรี	1,412	555,149	86.4	1.9	82.6	90.1
นครปฐม	1,384	566,222	87.4	2.1	83.3	91.5
สมุทรสาคร	1,398	308,785	85.8	3.1	79.8	91.8
สมุทรสงคราม	1,314	108,029	72.9	5.7	61.6	84.2
เพชรบุรี	1,289	273,243	79.1	3.5	72.1	86.0
ประจวบคีรีขันธ์	1,372	304,191	83.8	2.7	78.5	89.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	1,304	1,549,730	81.1	2.1	76.9	85.3
บุรีรัมย์	1,239	900,223	79.0	3.4	72.3	85.6
สุรินทร์	1,334	845,296	84.8	2.3	80.3	89.2
ศรีสะเกษ	1,149	823,508	76.8	4.8	67.3	86.3
อุบลราชธานี	1,376	1,112,189	86.0	1.9	82.3	89.8
ยโสธร	1,382	341,332	82.1	5.1	72.1	92.1
ชัยภูมิ	1,264	624,961	74.7	5.1	64.6	84.8
อำนาจเจริญ	1,315	225,962	82.1	2.1	77.9	86.2
หนองบัวลำภู	1,336	303,966	80.0	2.4	75.2	84.8
ขอนแก่น	1,406	1,135,294	84.3	2.0	80.4	88.3
อุดรธานี	1,300	931,650	84.8	2.3	80.4	89.3
เลย	1,426	387,455	82.5	5.2	72.2	92.7
หนองคาย	1,331	547,983	82.3	3.4	75.7	89.0

ตารางที่ 14.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ประเมินตนเองว่าไม่มีความบกพร่องหรือไม่มีปัญหาสุขภาพ  
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	1,321	590,345	81.1	3.2	74.7	87.4
ร้อยเอ็ด	1,389	882,455	88.9	2.5	83.9	93.9
กาฬสินธุ์	1,372	621,355	85.0	2.7	79.8	90.2
สกลนคร	1,333	666,900	80.9	4.8	71.5	90.4
นครพนม	1,312	400,956	79.2	4.4	70.5	87.8
มุกดาหาร	1,371	210,911	84.8	2.7	79.4	90.2
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	1,210	838,116	71.9	4.4	63.3	80.6
ลำพูน	1,361	266,614	83.1	2.7	77.8	88.4
ลำปาง	1,401	510,063	83.9	1.2	81.5	86.3
อุตรดิตถ์	1,304	275,443	78.1	3.6	71.1	85.1
แพร่	1,378	292,917	79.1	3.3	72.6	85.5
น่าน	1,316	296,604	80.6	2.8	75.2	86.0
พะเยา	1,346	316,400	82.4	2.5	77.5	87.2
เชียงราย	1,321	687,412	79.6	3.3	73.2	86.1
แม่ฮ่องสอน	1,224	113,358	76.5	2.8	71.0	81.9
นครสวรรค์	1,379	614,387	79.4	4.5	70.6	88.2
อุทัยธานี	1,281	195,601	81.1	3.8	73.6	88.5
กำแพงเพชร	1,276	434,826	81.3	2.5	76.3	86.2
ตาก	1,265	254,674	75.0	3.2	68.7	81.4
สุโขทัย	1,297	370,187	79.4	3.1	73.3	85.4
พิษณุโลก	1,241	506,909	79.3	2.6	74.2	84.4
พิจิตร	1,384	353,949	84.5	1.6	81.4	87.6
เพชรบูรณ์	1,261	597,913	80.1	4.0	72.2	88.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	1,415	960,696	86.7	2.4	82.1	91.3
กระบี่	1,440	269,319	88.8	1.7	85.4	92.1
พังงา	1,359	155,093	84.1	3.3	77.6	90.7
ภูเก็ต	1,411	215,112	89.3	1.0	87.5	91.2
สุราษฎร์ธานี	1,327	597,171	83.1	1.8	79.5	86.6
ระนอง	1,387	96,394	80.8	3.8	73.4	88.2
ชุมพร	1,366	290,569	82.1	4.9	72.4	91.8
สงขลา	1,327	772,430	80.6	2.0	76.6	84.7
สตูล	1,390	170,366	84.5	3.5	77.6	91.4
ตรัง	1,445	378,142	84.3	2.0	80.3	88.2
พัทลุง	1,391	312,747	82.3	2.5	77.5	87.2
ปัตตานี	1,272	335,726	78.9	2.0	74.9	82.8
ยะลา	1,346	248,589	77.2	4.0	69.3	85.1
นราธิวาส	1,394	402,314	82.5	2.5	77.6	87.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

**ส่วนที่ 15**  
**การบาดเจ็บ**





ตารางที่ 15.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับขีรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	5,237	2,420,098	49.7	1.1	47.5	51.9
25 - 34	5,462	2,462,269	54.2	1.2	51.8	56.5
35 - 44	5,759	2,575,977	52.7	1.0	50.6	54.7
45 - 54	4,439	2,033,271	57.2	1.2	54.8	59.5
55 - 64	5,827	1,004,324	51.7	1.1	49.7	53.8
65 - 74	1,973	318,455	49.0	1.4	46.2	51.8
รวม	28,697	10,814,394	52.9	0.8	51.2	54.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	4,399	1,943,032	47.3	1.2	44.9	49.7
25 - 34	5,017	2,206,262	54.2	1.1	52.1	56.4
35 - 44	5,600	2,463,119	54.8	1.0	52.8	56.9
45 - 54	3,812	1,570,992	54.5	1.3	52.0	57.0
55 - 64	2,795	470,541	48.3	1.4	45.6	51.0
65 - 74	541	91,418	39.6	2.3	35.0	44.2
รวม	22,164	8,745,364	52.2	0.9	50.5	53.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	9,636	4,363,130	48.6	1.0	46.7	50.5
25 - 34	10,479	4,668,531	54.2	1.0	52.3	56.1
35 - 44	11,359	5,039,096	53.7	0.9	52.0	55.4
45 - 54	8,251	3,604,263	56.0	1.0	53.9	58.1
55 - 64	8,622	1,474,865	50.6	1.0	48.7	52.5
65 - 74	2,514	409,873	46.5	1.4	43.9	49.2
รวมทั้งประเทศ	50,861	19,559,758	52.6	0.8	51.0	54.1

ตารางที่ 15.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับซีรคจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซีรคจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	27,442	6,635,671	58.5	1.2	56.2	60.8
นอกเขตเทศบาล	23,419	12,924,088	50.0	1.0	48.0	51.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	537	1,471,680	69.7	4.4	61.0	78.5
ภาคกลาง	16,344	4,756,879	51.9	1.4	49.1	54.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,581	7,045,153	53.5	1.3	50.9	56.1
ภาคเหนือ	11,712	3,789,604	51.0	1.7	47.7	54.2
ภาคใต้	9,687	2,496,444	46.8	1.9	43.2	50.5
<b>เขตสคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	1,756	755,255	55.6	4.1	47.7	63.6
เขต สคร.ที่ 2	3,837	780,382	56.1	2.8	50.6	61.5
เขต สคร.ที่ 3	5,729	1,767,380	52.2	2.6	47.2	57.2
เขต สคร.ที่ 4	5,022	1,453,862	48.0	2.4	43.2	52.8
เขต สคร.ที่ 5	2,884	2,292,338	57.9	2.7	52.7	63.2
เขต สคร.ที่ 6	5,286	2,902,509	54.0	2.0	50.1	58.0
เขต สคร.ที่ 7	4,411	1,850,305	48.2	2.3	43.7	52.7
เขต สคร.ที่ 8	2,766	860,984	51.3	3.7	44.1	58.5
เขต สคร.ที่ 9	3,810	1,181,797	54.4	2.9	48.7	60.1
เขต สคร.ที่ 10	5,136	1,746,822	48.8	2.4	44.1	53.5
เขต สคร.ที่ 11	5,012	1,156,233	44.8	3.1	38.7	50.8
เขต สคร.ที่ 12	4,675	1,340,211	48.7	2.1	44.6	52.9

ตารางที่ 15.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับขีรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
กรุงเทพมหานคร	537	1,471,680	69.7	4.4	61.0	78.5	
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	622	373,424	63.2	5.5	52.5	74.0	
นนทบุรี	470	256,052	55.7	4.8	46.3	65.1	
ปทุมธานี	622	234,597	50.2	8.3	33.9	66.6	
พระนครศรีอยุธยา	664	264,606	61.3	5.5	50.6	72.0	
อ่างทอง	582	78,841	44.2	3.8	36.7	51.7	
ลพบุรี	598	214,182	46.9	5.0	37.2	56.6	
สิงห์บุรี	1,098	112,951	78.9	3.1	72.8	85.0	
ชัยนาท	718	116,876	52.0	4.8	42.5	61.5	
สระบุรี	841	257,533	66.3	7.1	52.4	80.2	
ชลบุรี	693	461,439	61.2	7.2	47.0	75.3	
ระยอง	667	198,526	51.5	4.8	42.0	61.0	
จันทบุรี	651	162,318	47.9	5.7	36.6	59.2	
ตราด	630	53,981	40.9	4.3	32.5	49.3	
ฉะเชิงเทรา	520	137,684	32.8	6.7	19.6	45.9	
ปราจีนบุรี	527	120,380	44.6	4.7	35.2	53.9	
นครนายก	812	102,787	65.7	4.9	56.1	75.3	
สระแก้ว	607	156,842	46.3	5.8	34.9	57.8	
ราชบุรี	653	262,235	51.6	5.7	40.3	62.8	
กาญจนบุรี	612	195,256	38.8	4.6	29.7	47.9	
สุพรรณบุรี	603	255,164	47.7	8.8	30.5	65.0	
นครปฐม	720	250,153	48.6	5.5	37.8	59.5	
สมุทรสาคร	469	137,288	58.2	6.9	44.7	71.7	
สมุทรสงคราม	518	46,037	45.8	4.6	36.8	54.8	
เพชรบุรี	635	131,088	44.4	5.0	34.5	54.2	
ประจวบคีรีขันธ์	812	176,642	52.3	4.7	43.1	61.5	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	769	924,788	59.5	5.1	49.5	69.5	
บุรีรัมย์	611	448,382	47.7	6.0	35.8	59.5	
สุรินทร์	909	565,016	71.1	3.9	63.4	78.9	
ศรีสะเกษ	623	447,066	53.4	5.6	42.3	64.4	
อุบลราชธานี	754	577,799	53.7	4.1	45.7	61.7	
ยโสธร	554	141,235	41.9	4.5	33.1	50.7	
ชัยภูมิ	595	354,152	52.9	4.0	45.1	60.7	
อำนาจเจริญ	533	98,453	43.1	4.3	34.5	51.6	
หนองบัวลำภู	458	104,828	34.0	4.9	24.4	43.6	
ขอนแก่น	706	609,343	60.7	4.8	51.2	70.2	
อุดรธานี	654	478,968	48.8	4.4	40.1	57.5	
เลย	684	203,240	51.0	5.8	39.7	62.3	
หนองคาย	662	263,645	45.5	6.1	33.4	57.5	

ตารางที่ 15.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	649	312,650	51.2	5.0	41.4	61.1
ร้อยเอ็ด	687	551,573	63.6	4.6	54.6	72.7
กาฬสินธุ์	786	378,263	60.8	4.5	51.9	69.6
สกลนคร	600	292,166	41.8	6.6	28.8	54.7
นครพนม	750	214,469	47.6	5.9	36.1	59.1
มุกดาหาร	597	79,119	37.7	7.7	22.5	52.8
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	679	519,814	53.0	6.6	40.0	66.0
ลำพูน	629	129,340	46.3	5.8	34.9	57.6
ลำปาง	676	263,081	51.3	5.7	40.1	62.4
อุตรดิตถ์	896	189,348	60.9	4.9	51.3	70.6
แพร่	657	149,529	47.2	6.0	35.6	58.9
น่าน	613	134,833	47.1	7.8	31.8	62.3
พะเยา	691	168,581	50.8	4.8	41.4	60.2
เชียงราย	614	332,221	43.3	3.3	36.8	49.8
แม่ฮ่องสอน	577	49,423	47.4	4.1	39.4	55.4
นครสวรรค์	745	373,897	57.4	5.7	46.2	68.6
อุทัยธานี	820	120,241	57.6	8.6	40.8	74.3
กำแพงเพชร	680	217,420	47.1	6.9	33.7	60.6
ตาก	667	128,113	46.2	6.9	32.6	59.8
สุโขทัย	702	188,983	47.4	6.8	34.1	60.8
พิษณุโลก	881	327,650	58.1	5.2	47.8	68.4
พิจิตร	521	149,426	41.7	3.7	34.5	48.9
เพชรบูรณ์	664	347,704	55.9	6.6	42.9	68.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	630	403,370	44.0	7.3	29.6	58.3
กระบี่	648	92,110	35.6	5.2	25.4	45.8
พังงา	746	71,795	45.6	8.8	28.2	62.9
ภูเก็ต	1,061	168,878	81.6	2.8	76.1	87.1
สุราษฎร์ธานี	513	220,012	34.4	5.0	24.6	44.2
ระนอง	748	58,602	61.3	8.1	45.5	77.2
ชุมพร	666	141,466	46.1	3.5	39.3	53.0
สงขลา	723	447,261	54.9	3.8	47.4	62.3
สตูล	805	88,608	49.2	6.8	35.9	62.5
ตรัง	791	209,987	54.8	5.6	43.8	65.8
พัทลุง	712	155,200	47.5	3.5	40.6	54.4
ปัตตานี	554	156,276	45.1	7.2	30.8	59.3
ยะลา	620	125,401	45.9	7.0	32.2	59.6
นราธิวาส	470	157,480	37.1	5.6	26.2	48.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.1.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
<b>ชาย</b>							
15 - 24	2,611	1,325,139	26.9	1.1	24.8	29.0	
25 - 34	2,753	1,386,922	31.1	1.2	28.8	33.4	
35 - 44	2,954	1,482,139	30.7	1.0	28.7	32.7	
45 - 54	2,373	1,281,898	35.7	1.3	33.2	38.2	
55 - 64	3,281	646,219	30.3	1.0	28.3	32.3	
65 - 74	1,308	239,502	27.5	1.4	24.8	30.1	
รวม	15,280	6,361,818	30.6	0.8	28.9	32.2	
<b>หญิง</b>							
15 - 24	2,529	1,252,857	27.3	1.1	25.2	29.4	
25 - 34	2,841	1,429,326	32.1	1.0	30.1	34.1	
35 - 44	3,465	1,850,270	34.4	1.2	32.1	36.7	
45 - 54	2,627	1,315,419	32.2	1.2	29.9	34.5	
55 - 64	2,916	639,982	26.8	0.9	25.0	28.6	
65 - 74	905	174,301	17.5	1.0	15.5	19.5	
รวม	15,283	6,662,155	30.4	0.8	28.9	32.0	
<b>ชายและหญิง</b>							
15 - 24	5,140	2,577,996	27.1	0.9	25.3	28.9	
25 - 34	5,594	2,816,247	31.6	0.9	29.9	33.4	
35 - 44	6,419	3,332,409	32.6	0.9	30.8	34.5	
45 - 54	5,000	2,597,317	33.8	1.0	31.8	35.9	
55 - 64	6,197	1,286,201	28.5	0.9	26.8	30.1	
65 - 74	2,213	413,803	22.1	1.0	20.2	24.0	
รวมทั้งประเทศ	30,563	13,023,973	30.5	0.8	29.0	32.0	

ตารางที่ 15.1.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	15,843	4,728,963	34.4	1.4	31.8	37.1
นอกเขตเทศบาล	14,720	8,295,010	28.7	0.9	26.8	30.5
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	610	1,602,941	45.8	4.5	37.0	54.6
ภาคกลาง	9,300	2,674,553	25.9	1.4	23.1	28.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,948	5,425,581	36.4	1.3	33.9	38.9
ภาคเหนือ	7,757	2,486,243	30.7	1.5	27.8	33.7
ภาคใต้	2,948	834,655	14.2	1.2	11.8	16.7
<b>เขตสคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	1,333	519,254	29.5	3.5	22.5	36.5
เขต สคร.ที่ 2	2,670	461,937	30.8	2.5	25.9	35.7
เขต สคร.ที่ 3	3,168	1,065,359	28.3	2.9	22.7	33.9
เขต สคร.ที่ 4	2,129	628,003	18.9	1.7	15.5	22.3
เขต สคร.ที่ 5	2,198	1,773,151	39.1	2.9	33.5	44.7
เขต สคร.ที่ 6	4,396	2,328,351	39.2	1.8	35.6	42.7
เขต สคร.ที่ 7	3,354	1,324,079	30.0	1.9	26.2	33.7
เขต สคร.ที่ 8	1,600	518,729	28.8	3.2	22.5	35.2
เขต สคร.ที่ 9	2,752	769,272	32.1	2.2	27.7	36.4
เขต สคร.ที่ 10	3,405	1,198,242	30.8	2.4	26.1	35.5
เขต สคร.ที่ 11	2,002	541,123	19.1	2.5	14.2	23.9
เขต สคร.ที่ 12	946	293,532	9.7	0.9	8.0	11.4

ตารางที่ 15.1.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	610	1,602,941	45.8	4.5	37.0	54.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	423	243,312	31.4	5.8	20.0	42.9
นนทบุรี	363	187,418	29.3	3.9	21.7	37.0
ปทุมธานี	526	172,701	28.6	8.2	12.5	44.6
พระนครศรีอยุธยา	444	159,135	30.8	5.2	20.6	41.1
อ่างทอง	265	37,139	18.8	3.0	12.9	24.6
ลพบุรี	473	148,076	30.1	4.0	22.4	37.9
สิงห์บุรี	1,054	105,494	68.9	4.6	60.0	77.9
ชัยนาท	489	62,507	26.2	5.0	16.5	35.9
สระบุรี	389	108,722	25.9	6.5	13.2	38.7
ชลบุรี	444	341,538	42.6	9.5	24.0	61.3
ระยอง	358	111,611	27.8	4.3	19.3	36.3
จันทบุรี	355	92,395	27.0	4.3	18.6	35.4
ตราด	444	38,145	26.1	4.2	17.8	34.3
ฉะเชิงเทรา	249	73,260	16.1	4.6	7.0	25.2
ปราจีนบุรี	243	61,063	20.0	3.8	12.6	27.3
นครนายก	418	46,568	27.6	5.3	17.3	37.9
สระแก้ว	234	57,466	15.7	3.8	8.1	23.2
ราชบุรี	399	169,690	30.9	7.0	17.2	44.7
กาญจนบุรี	210	60,989	11.5	2.6	6.3	16.7
สุพรรณบุรี	257	98,281	17.1	3.1	11.0	23.3
นครปฐม	262	87,590	14.8	3.3	8.4	21.3
สมุทรสาคร	207	52,902	18.4	3.8	10.9	25.9
สมุทรสงคราม	130	11,439	9.0	2.1	4.8	13.2
เพชรบุรี	280	59,920	19.1	4.2	10.9	27.2
ประจวบคีรีขันธ์	384	87,193	25.0	4.2	16.8	33.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	746	844,109	47.5	5.5	36.8	58.2
บุรีรัมย์	509	343,332	32.3	5.9	20.8	43.7
สุรินทร์	628	366,173	39.3	4.5	30.6	48.1
ศรีสะเกษ	462	333,651	32.9	5.5	22.0	43.7
อุบลราชธานี	470	352,952	28.2	2.2	24.0	32.5
ยโสธร	392	100,317	25.1	4.5	16.3	33.9
ชัยภูมิ	315	219,536	28.9	5.3	18.4	39.4
อำนาจเจริญ	339	70,023	27.3	3.6	20.3	34.3
หนองบัวลำภู	442	101,540	28.6	4.7	19.3	37.9
ขอนแก่น	519	453,466	40.6	4.8	31.1	50.1
อุดรธานี	529	358,010	33.2	3.6	26.1	40.3
เลย	568	164,548	37.3	6.1	25.5	49.2
หนองคาย	529	205,332	33.3	5.1	23.4	43.2

ตารางที่ 15.1.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	484	244,467	35.6	4.8	26.1	45.1
ร้อยเอ็ด	586	442,584	46.8	4.2	38.5	55.1
กาฬสินธุ์	739	358,405	51.0	4.7	41.7	60.3
สกลนคร	492	222,967	28.9	5.4	18.2	39.5
นครพนม	696	182,254	37.3	6.5	24.5	50.0
มุกดาหาร	503	61,915	26.7	7.0	13.1	40.4
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	478	363,219	33.8	6.7	20.7	47.0
ลำพูน	467	97,471	33.0	6.6	20.1	45.8
ลำปาง	582	226,325	41.6	5.9	30.1	53.2
อุตรดิตถ์	720	141,026	42.9	4.0	35.1	50.8
แพร่	344	87,006	25.1	5.8	13.8	36.4
น่าน	392	96,638	29.0	6.6	15.9	42.0
พะเยา	496	118,897	33.6	4.4	25.0	42.2
เชียงราย	357	183,914	22.4	2.5	17.5	27.4
แม่ฮ่องสอน	289	24,773	19.6	3.5	12.7	26.5
นครสวรรค์	441	218,268	31.5	5.3	21.0	41.9
อุทัยธานี	452	72,461	33.7	9.4	15.3	52.1
กำแพงเพชร	338	122,114	24.4	6.7	11.2	37.6
ตาก	404	75,905	24.2	4.2	15.9	32.5
สุโขทัย	497	127,950	28.8	5.2	18.5	39.0
พิษณุโลก	785	267,899	44.5	6.4	32.0	57.0
พิจิตร	369	105,887	27.2	3.0	21.4	33.0
เพชรบูรณ์	346	156,492	22.1	3.6	15.1	29.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	348	194,799	18.5	5.6	7.5	29.5
กระบี่	144	17,737	6.4	0.9	4.7	8.2
พังงา	271	24,438	14.2	3.6	7.2	21.2
ภูเก็ต	566	96,848	43.6	7.4	29.2	58.1
สุราษฎร์ธานี	364	146,931	21.4	4.4	12.8	29.9
ระนอง	131	11,691	11.1	2.5	6.1	16.1
ชุมพร	178	48,679	15.0	3.2	8.8	21.3
สงขลา	147	107,028	12.1	2.2	7.8	16.5
สตูล	134	15,942	8.3	1.6	5.2	11.3
ตรัง	126	34,789	8.4	1.8	4.8	11.9
พัทลุง	189	43,737	12.3	1.8	8.8	15.9
ปัตตานี	134	35,591	8.8	2.0	5.0	12.6
ยะลา	98	13,648	4.4	1.1	2.2	6.7
นราธิวาส	118	42,798	9.2	1.7	6.0	12.4

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 15.1.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขึ้นรถยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขึ้นรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	2,413	1,114,451	55.4	1.6	52.3	58.5
25 - 34	4,620	2,029,418	68.3	1.2	65.9	70.7
35 - 44	5,261	2,307,116	70.9	1.0	68.9	72.8
45 - 54	3,893	1,695,616	74.1	1.1	71.9	76.3
55 - 64	4,773	776,569	71.5	1.1	69.4	73.6
65 - 74	1,386	219,754	68.8	1.8	65.2	72.4
รวม	22,346	8,142,924	68.2	0.8	66.7	69.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	1,181	551,651	55.6	1.8	52.0	59.2
25 - 34	2,310	1,001,932	65.2	1.5	62.3	68.1
35 - 44	2,469	1,054,180	68.0	1.5	65.1	70.8
45 - 54	1,618	674,827	67.9	1.8	64.3	71.5
55 - 64	1,194	220,613	59.7	2.1	55.5	63.8
65 - 74	301	54,269	42.0	3.4	35.4	48.7
รวม	9,073	3,557,472	63.8	1.1	61.7	66.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	3,594	1,666,101	55.5	1.3	53.0	58.0
25 - 34	6,930	3,031,350	67.2	1.1	65.2	69.3
35 - 44	7,730	3,361,296	69.9	0.9	68.2	71.7
45 - 54	5,511	2,370,443	72.2	1.1	70.0	74.4
55 - 64	5,967	997,182	68.5	1.1	66.3	70.7
65 - 74	1,687	274,024	61.1	1.9	57.3	64.8
รวมทั้งประเทศ	31,419	11,700,396	66.8	0.8	65.3	68.3

ตารางที่ 15.1.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับรถยนต์  
ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	18,037	4,526,972	72.1	0.9	70.3	73.9
นอกเขตเทศบาล	13,382	7,173,424	63.9	1.1	61.7	66.1
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	424	1,102,489	87.9	2.1	83.8	92.0
ภาคกลาง	11,382	3,330,096	66.0	1.3	63.4	68.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,618	3,877,529	69.8	1.5	66.9	72.7
ภาคเหนือ	6,977	2,131,286	62.6	1.7	59.2	66.0
ภาคใต้	5,018	1,258,996	56.1	1.7	52.7	59.4
<b>เขตสคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	1,643	722,447	70.3	3.3	63.8	76.8
เขต สคร.ที่ 2	2,389	495,986	71.9	2.8	66.4	77.4
เขต สคร.ที่ 3	4,222	1,250,429	65.7	2.3	61.1	70.2
เขต สคร.ที่ 4	3,128	861,234	60.3	2.1	56.1	64.5
เขต สคร.ที่ 5	1,595	1,042,024	68.0	3.4	61.4	74.6
เขต สคร.ที่ 6	3,223	1,838,005	71.1	2.0	67.1	75.1
เขต สคร.ที่ 7	2,800	997,500	69.5	2.1	65.4	73.6
เขต สคร.ที่ 8	1,634	511,656	58.0	2.8	52.4	63.6
เขต สคร.ที่ 9	1,946	527,315	63.7	2.6	58.5	68.9
เขต สคร.ที่ 10	3,397	1,092,316	64.5	2.8	59.0	70.0
เขต สคร.ที่ 11	2,929	692,861	61.2	2.3	56.6	65.7
เขต สคร.ที่ 12	2,089	566,135	50.9	2.4	46.2	55.5

ตารางที่ 15.1.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขับรถยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	424	1,102,489	87.9	2.1	83.8	92.0
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	472	255,241	71.9	4.2	63.6	80.2
นนทบุรี	581	321,784	68.1	4.3	59.7	76.5
ปทุมธานี	640	251,545	71.6	7.2	57.5	85.7
พระนครศรีอยุธยา	422	149,118	73.1	4.3	64.7	81.5
อ่างทอง	448	53,106	74.1	4.9	64.6	83.7
ลพบุรี	415	152,307	61.2	5.9	49.5	72.8
สิงห์บุรี	521	48,441	87.1	2.3	82.6	91.6
ชัยนาท	398	56,509	59.5	5.3	49.1	69.8
สระบุรี	607	185,623	85.0	3.0	79.1	91.0
ชลบุรี	499	317,603	73.2	5.2	62.9	83.4
ระยอง	632	189,286	74.8	3.4	68.0	81.5
จันทบุรี	497	125,431	65.8	4.2	57.6	74.0
ตราด	457	38,421	68.1	2.8	62.6	73.6
ฉะเชิงเทรา	415	100,162	46.7	9.0	29.0	64.4
ปราจีนบุรี	390	82,643	58.8	5.0	48.9	68.6
นครนายก	487	55,307	76.3	3.1	70.3	82.3
สระแก้ว	373	86,335	46.2	6.6	33.2	59.1
ราชบุรี	400	144,892	63.5	4.2	55.3	71.8
กาญจนบุรี	378	114,627	50.4	5.8	38.9	61.8
สุพรรณบุรี	415	151,970	56.0	7.5	41.2	70.8
นครปฐม	548	191,028	69.1	3.2	62.9	75.3
สมุทรสาคร	361	83,707	71.4	3.4	64.7	78.1
สมุทรสงคราม	302	26,725	62.8	4.7	53.5	72.0
เพชรบุรี	329	66,319	54.5	3.4	47.9	61.1
ประจวบคีรีขันธ์	395	81,966	57.5	6.2	45.3	69.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	382	436,069	64.9	6.2	52.8	77.1
บุรีรัมย์	357	212,282	66.6	4.8	57.3	76.0
สุรินทร์	457	203,115	81.3	3.2	75.0	87.7
ศรีสะเกษ	377	206,788	63.7	4.3	55.3	72.0
อุบลราชธานี	470	339,971	77.1	4.5	68.4	85.9
ยโสธร	358	70,054	65.1	4.2	56.9	73.2
ชัยภูมิ	399	190,558	65.0	7.7	49.8	80.2
อำนาจเจริญ	392	65,845	67.2	4.0	59.3	75.0
หนองบัวลำภู	281	68,728	67.8	4.9	58.2	77.5
ขอนแก่น	420	448,013	76.8	2.9	71.1	82.4
อุดรธานี	430	329,405	74.7	4.9	65.0	84.3
เลย	432	127,258	63.3	3.7	56.1	70.5
หนองคาย	475	177,215	67.0	6.9	53.6	80.5

ตารางที่ 15.1.9 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อขึ้นรถยนต์ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขึ้นรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)					
มหาสารคาม	387	151,991	67.4	6.3	55.1 - 79.8
ร้อยเอ็ด	373	317,579	70.1	6.8	56.8 - 83.3
กาฬสินธุ์	425	217,816	69.0	3.9	61.4 - 76.6
สกลนคร	377	173,132	69.9	5.7	58.8 - 81.0
นครพนม	471	99,343	67.8	4.7	58.6 - 77.0
มุกดาหาร	355	42,367	60.8	6.4	48.2 - 73.4
ภาคเหนือ					
เชียงใหม่	439	341,138	60.5	7.0	46.7 - 74.3
ลำพูน	514	102,982	68.1	4.3	59.7 - 76.5
ลำปาง	460	156,128	74.6	4.2	66.4 - 82.7
อุตรดิตถ์	431	87,675	67.9	5.2	57.8 - 78.0
แพร่	484	103,894	70.8	4.9	61.1 - 80.4
น่าน	390	72,231	62.6	5.0	52.8 - 72.5
พะเยา	409	97,470	68.4	4.8	58.9 - 77.9
เชียงราย	376	195,871	61.0	6.7	47.8 - 74.1
แม่ฮ่องสอน	325	22,602	51.3	5.6	40.3 - 62.3
นครสวรรค์	432	233,502	58.9	2.8	53.4 - 64.5
อุทัยธานี	467	72,071	73.2	9.0	55.6 - 90.8
กำแพงเพชร	362	102,738	45.4	7.1	31.5 - 59.3
ตาก	351	71,819	52.9	5.4	42.3 - 63.6
สุโขทัย	335	79,743	58.2	6.7	45.1 - 71.3
พิษณุโลก	485	146,822	73.0	3.7	65.8 - 80.2
พิจิตร	373	103,344	64.1	3.3	57.6 - 70.7
เพชรบูรณ์	344	141,256	62.8	6.3	50.3 - 75.2
ภาคใต้					
นครศรีธรรมราช	324	198,363	63.1	6.1	51.1 - 75.1
กระบี่	416	62,862	51.9	6.9	38.3 - 65.4
พังงา	458	35,665	65.6	5.9	54.1 - 77.2
ภูเก็ต	579	84,329	74.8	5.4	64.2 - 85.4
สุราษฎร์ธานี	433	196,527	60.2	4.0	52.3 - 68.0
ระนอง	345	27,227	56.9	4.5	48.2 - 65.7
ชุมพร	374	87,887	56.5	2.8	51.0 - 62.0
สงขลา	342	207,077	54.3	4.7	45.0 - 63.5
สตูล	329	34,815	54.6	6.0	42.9 - 66.4
ตรัง	326	88,391	53.7	6.6	40.8 - 66.7
พัทลุง	355	78,177	62.8	3.5	55.9 - 69.7
ปัตตานี	214	43,198	36.7	5.3	26.4 - 47.0
ยะลา	277	48,144	45.9	4.2	37.8 - 54.0
นราธิวาส	246	66,334	42.5	6.9	29.0 - 56.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.1.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถยนต์ตอนหน้าอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	3,501	1,744,584	40.9	1.2	38.5	43.2
25 - 34	4,317	2,004,502	48.3	1.2	45.9	50.7
35 - 44	4,956	2,292,311	50.7	1.1	48.6	52.7
45 - 54	3,983	1,882,996	54.8	1.3	52.3	57.3
55 - 64	6,070	1,093,555	53.3	1.1	51.1	55.4
65 - 74	2,553	464,731	52.4	1.3	49.8	55.0
รวม	25,380	9,482,679	49.1	0.8	47.4	50.7
<b>หญิง</b>						
15 - 24	3,198	1,622,590	41.2	1.1	39.0	43.3
25 - 34	4,149	1,969,355	49.4	1.1	47.2	51.6
35 - 44	5,025	2,447,000	51.8	1.0	49.8	53.7
45 - 54	3,958	1,866,496	52.1	1.2	49.8	54.3
55 - 64	4,807	1,001,669	46.9	1.2	44.6	49.1
65 - 74	1,887	379,685	39.5	1.3	36.9	42.0
รวม	23,024	9,286,795	48.0	0.8	46.4	49.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	6,699	3,367,174	41.0	1.0	39.1	42.9
25 - 34	8,466	3,973,857	48.8	1.0	47.0	50.7
35 - 44	9,981	4,739,311	51.2	0.9	49.5	53.0
45 - 54	7,941	3,749,492	53.4	1.0	51.5	55.3
55 - 64	10,877	2,095,224	50.0	1.0	48.1	51.9
65 - 74	4,440	844,416	45.7	1.1	43.6	47.8
รวมทั้งประเทศ	48,404	18,769,474	48.5	0.7	47.1	50.0

ตารางที่ 15.1.11 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถยนต์ตอนหน้าอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	25,929	6,962,266	52.8	1.0	50.8	54.8
นอกเขตเทศบาล	22,475	11,807,207	46.3	1.0	44.4	48.3
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	856	2,154,066	61.8	3.0	55.9	67.7
ภาคกลาง	16,964	4,702,623	47.7	1.3	45.2	50.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13,932	7,124,891	55.3	1.5	52.4	58.2
ภาคเหนือ	10,793	3,340,578	47.5	1.5	44.5	50.4
ภาคใต้	5,859	1,447,314	26.8	1.3	24.4	29.3
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	2,374	989,666	54.2	2.9	48.4	59.9
เขต สคร.ที่ 2	4,271	814,869	59.4	2.7	54.0	64.7
เขต สคร.ที่ 3	6,017	1,768,641	48.3	2.4	43.6	53.0
เขต สคร.ที่ 4	4,302	1,129,447	37.7	1.9	34.1	41.3
เขต สคร.ที่ 5	3,200	2,300,645	60.6	3.5	53.7	67.5
เขต สคร.ที่ 6	5,813	2,990,648	55.8	2.0	51.7	59.8
เขต สคร.ที่ 7	4,919	1,833,598	49.2	2.2	45.0	53.4
เขต สคร.ที่ 8	2,390	756,132	48.4	3.4	41.8	55.0
เขต สคร.ที่ 9	3,189	924,537	46.8	2.1	42.8	50.8
เขต สคร.ที่ 10	5,214	1,659,909	47.4	2.3	42.9	51.9
เขต สคร.ที่ 11	3,501	835,230	31.3	2.1	27.1	35.4
เขต สคร.ที่ 12	2,358	612,084	22.5	1.5	19.5	25.5

ตารางที่ 15.1.12 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถยนต์ตอนหน้าอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
กรุงเทพมหานคร	856	2,154,066	61.8	3.0	55.9	67.7	
ภาคกลาง							
สมุทรปราการ	715	381,725	50.5	6.3	38.1	62.9	
นนทบุรี	776	382,668	54.0	4.7	44.8	63.2	
ปทุมธานี	905	384,318	59.5	4.7	50.2	68.8	
พระนครศรีอยุธยา	693	222,679	47.1	5.4	36.6	57.7	
อ่างทอง	687	86,708	47.5	4.0	39.6	55.4	
ลพบุรี	773	243,510	55.1	5.5	44.4	65.8	
สิงห์บุรี	1,142	112,886	78.7	3.8	71.3	86.2	
ชัยนาท	671	90,152	44.5	5.9	32.9	56.1	
สระบุรี	998	281,613	70.0	5.2	59.9	80.2	
ชลบุรี	747	469,043	59.5	6.0	47.8	71.2	
ระยอง	786	216,656	50.9	4.0	43.2	58.7	
จันทบุรี	639	146,847	43.5	2.8	38.0	49.0	
ตราด	679	54,004	41.0	8.5	24.4	57.6	
ฉะเชิงเทรา	677	189,963	43.4	7.4	28.9	57.9	
ปราจีนบุรี	553	117,212	38.4	4.2	30.3	46.6	
นครนายก	733	83,844	52.5	6.0	40.8	64.3	
สระแก้ว	488	109,349	34.2	4.8	24.8	43.5	
ราชบุรี	562	193,433	39.1	5.5	28.2	49.9	
กาญจนบุรี	471	127,146	26.3	4.3	17.8	34.8	
สุพรรณบุรี	529	160,646	32.1	4.3	23.6	40.6	
นครปฐม	793	296,432	50.6	4.2	42.4	58.8	
สมุทรสาคร	520	119,528	49.4	4.7	40.2	58.5	
สมุทรสงคราม	500	38,881	39.2	4.1	31.1	47.2	
เพชรบุรี	455	90,487	31.7	3.0	25.8	37.5	
ประจวบคีรีขันธ์	472	102,893	33.6	4.9	23.9	43.3	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
นครราชสีมา	854	959,867	63.0	5.5	52.2	73.8	
บุรีรัมย์	737	493,918	54.3	8.6	37.5	71.1	
สุรินทร์	862	460,288	66.4	5.9	54.9	78.0	
ศรีสะเกษ	631	402,107	48.1	5.6	37.0	59.2	
อุบลราชธานี	683	521,519	49.0	2.1	44.8	53.2	
ยโสธร	678	155,097	46.7	5.5	36.0	57.5	
ชัยภูมิ	747	386,571	57.7	7.8	42.4	73.0	
อำนาจเจริญ	794	124,960	53.9	3.2	47.6	60.2	
หนองบัวลำภู	706	159,098	53.2	3.9	45.4	60.9	
ขอนแก่น	690	662,843	62.7	4.3	54.3	71.0	
อุดรธานี	791	518,554	53.9	6.2	41.7	66.1	
เลย	779	242,130	61.4	3.0	55.6	67.2	
หนองคาย	774	288,500	53.4	7.1	39.4	67.4	

ตารางที่ 15.1.12 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง เมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่โดยสารรถยนต์ตอนหน้าอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	687	291,028	47.6	6.1	35.6	59.6
ร้อยเอ็ด	655	468,987	54.8	4.5	46.0	63.6
กาฬสินธุ์	731	359,508	56.0	4.7	46.7	65.3
สกลนคร	636	314,699	46.1	7.5	31.4	60.8
นครพนม	831	214,483	57.3	4.7	48.1	66.6
มุกดาหาร	666	100,733	49.2	9.5	30.7	67.8
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	576	431,878	43.4	5.8	32.0	54.7
ลำพูน	725	142,422	53.0	4.8	43.6	62.3
ลำปาง	818	278,926	60.5	4.3	52.0	69.0
อุตรดิตถ์	613	129,754	51.8	4.6	42.9	60.7
แพร่	774	162,381	49.1	4.8	39.7	58.6
น่าน	576	121,851	44.0	6.6	31.2	56.9
พะเยา	707	161,465	52.2	4.3	43.7	60.6
เชียงราย	648	326,374	42.6	5.4	32.1	53.1
แม่ฮ่องสอน	390	34,613	37.0	4.7	27.7	46.3
นครสวรรค์	642	339,731	53.3	5.1	43.2	63.4
อุทัยธานี	541	77,371	49.3	9.6	30.5	68.1
กำแพงเพชร	521	151,335	36.2	5.9	24.7	47.7
ตาก	522	93,499	35.1	4.3	26.5	43.6
สุโขทัย	635	164,480	44.0	6.4	31.6	56.5
พิษณุโลก	833	278,469	54.4	3.0	48.5	60.3
พิจิตร	686	187,695	53.7	3.1	47.5	59.9
เพชรบูรณ์	586	258,334	45.1	4.1	37.1	53.1
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	428	241,526	24.8	3.7	17.7	32.0
กระบี่	457	85,698	31.2	7.1	17.3	45.0
พังงา	612	44,880	29.1	6.2	16.9	41.4
ภูเก็ต	667	96,678	47.9	6.6	35.1	60.8
สุราษฎร์ธานี	569	247,393	37.5	4.0	29.8	45.3
ระนอง	348	31,757	31.7	4.5	23.0	40.5
ชุมพร	420	87,299	28.2	3.9	20.6	35.8
สงขลา	375	231,537	27.5	3.8	20.1	34.9
สตูล	366	38,051	24.4	3.5	17.5	31.3
ตรัง	409	90,733	25.7	4.7	16.5	34.8
พัทลุง	488	105,077	31.3	1.8	27.7	34.9
ปัตตานี	279	56,393	16.3	3.1	10.1	22.4
ยะลา	243	33,608	12.0	1.9	8.2	15.8
นราธิวาส	198	56,685	14.0	2.1	9.9	18.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 15.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,035	478,239	25.3	1.2	22.9	27.7
25 - 34	1,297	544,921	23.8	1.1	21.7	25.9
35 - 44	1,311	535,459	21.4	1.0	19.4	23.4
45 - 54	815	330,897	19.5	1.1	17.4	21.6
55 - 64	784	126,375	16.3	0.9	14.6	18.1
65 - 74	170	26,322	13.8	1.4	11.0	16.6
รวม	5,412	2,042,213	21.9	0.7	20.5	23.2
<b>หญิง</b>						
15 - 24	113	48,346	13.4	1.7	9.9	16.8
25 - 34	156	59,817	11.7	1.3	9.1	14.3
35 - 44	163	68,494	9.4	1.1	7.3	11.5
45 - 54	116	53,649	11.8	1.4	9.1	14.5
55 - 64	58	8,916	7.4	1.3	4.9	9.9
65 - 74	5	253	1.4	0.7	0.0	2.9
รวม	611	239,475	10.9	0.7	9.6	12.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,148	526,585	23.4	1.1	21.2	25.5
25 - 34	1,453	604,738	21.6	0.9	19.8	23.4
35 - 44	1,474	603,953	18.7	0.8	17.0	20.4
45 - 54	931	384,546	17.9	0.9	16.1	19.6
55 - 64	842	135,291	15.1	0.8	13.5	16.7
65 - 74	175	26,575	12.8	1.3	10.2	15.3
รวมทั้งประเทศ	6,023	2,281,688	19.8	0.6	18.6	21.0

ตารางที่ 15.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซึรดจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซึรดจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,983	588,817	18.0	0.9	16.3	19.8
นอกเขตเทศบาล	3,040	1,692,871	20.5	0.8	19.0	22.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	14	41,562	7.7	2.9	2.0	13.4
ภาคกลาง	1,559	410,691	17.6	1.0	15.7	19.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,673	874,625	18.5	1.0	16.6	20.4
ภาคเหนือ	2,057	726,470	25.4	1.3	22.8	28.0
ภาคใต้	720	228,339	21.0	1.9	17.3	24.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	127	59,687	17.6	3.4	10.9	24.2
เขต สคร.ที่ 2	413	90,250	24.7	1.6	21.5	27.8
เขต สคร.ที่ 3	630	168,325	16.8	1.5	13.8	19.8
เขต สคร.ที่ 4	389	92,429	14.7	1.7	11.5	18.0
เขต สคร.ที่ 5	278	214,521	15.8	1.8	12.3	19.4
เขต สคร.ที่ 6	705	341,743	18.0	1.4	15.2	20.9
เขต สคร.ที่ 7	690	318,361	21.6	1.9	17.9	25.3
เขต สคร.ที่ 8	355	126,516	24.3	2.0	20.4	28.2
เขต สคร.ที่ 9	571	189,142	23.8	2.6	18.8	28.8
เขต สคร.ที่ 10	1,131	410,812	26.7	2.0	22.8	30.5
เขต สคร.ที่ 11	364	123,774	19.6	3.1	13.5	25.6
เขต สคร.ที่ 12	356	104,565	23.1	1.7	19.8	26.4

ตารางที่ 15.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซึรดจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซึรดจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	14	41,562	7.7	2.9	2.0	13.4
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	20	10,949	6.1	2.8	0.6	11.7
นนทบุรี	24	9,968	11.0	4.5	2.2	19.9
ปทุมธานี	59	34,899	26.6	5.1	16.5	36.6
พระนครศรีอยุธยา	44	14,821	12.6	2.9	7.0	18.2
อ่างทอง	130	15,847	32.7	2.9	26.9	38.4
ลพบุรี	107	37,561	27.9	3.2	21.6	34.2
สิงห์บุรี	48	3,707	14.1	2.8	8.7	19.6
ชัยนาท	73	12,187	21.1	4.6	12.1	30.0
สระบุรี	55	20,949	21.3	2.9	15.6	27.0
ชลบุรี	55	22,548	14.1	4.1	6.1	22.1
ระยอง	34	10,199	11.1	2.0	7.1	15.1
จันทบุรี	149	39,626	30.7	2.8	25.2	36.2
ตราด	62	6,476	14.6	4.4	5.9	23.3
ฉะเชิงเทรา	58	17,477	16.3	4.2	8.0	24.6
ปราจีนบุรี	116	26,635	28.0	6.5	15.2	40.8
นครนายก	51	8,790	22.4	3.1	16.3	28.4
สระแก้ว	85	25,623	16.5	4.1	8.5	24.4
ราชบุรี	77	23,423	19.2	3.5	12.3	26.1
กาญจนบุรี	37	11,905	10.4	2.3	6.0	14.8
สุพรรณบุรี	54	11,766	11.8	3.1	5.8	17.8
นครปฐม	34	15,987	16.1	7.6	1.2	31.1
สมุทรสาคร	30	5,560	10.3	2.4	5.6	15.0
สมุทรสงคราม	69	4,162	16.6	3.1	10.5	22.8
เพชรบุรี	66	13,777	22.9	3.7	15.6	30.2
ประจวบคีรีขันธ์	22	5,848	11.0	3.0	5.1	16.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	67	93,912	18.5	3.6	11.4	25.6
บุรีรัมย์	68	49,348	15.3	2.9	9.5	21.0
สุรินทร์	65	40,204	13.1	3.3	6.7	19.6
ศรีสะเกษ	86	61,132	18.0	3.8	10.6	25.5
อุบลราชธานี	129	125,443	27.8	4.0	20.0	35.7
ยโสธร	89	26,002	20.2	4.2	12.0	28.3
ชัยภูมิ	78	31,058	14.3	1.8	10.9	17.8
อำนาจเจริญ	125	18,993	20.8	2.4	16.0	25.6
หนองบัวลำภู	133	34,412	24.8	2.7	19.5	30.1
ขอนแก่น	82	57,340	16.2	3.4	9.5	22.9
อุดรธานี	87	54,028	15.5	3.3	9.1	22.0
เลย	81	29,625	25.3	5.2	15.2	35.5
หนองคาย	95	41,114	20.8	4.5	12.0	29.5

ตารางที่ 15.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซิริดจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซิริดจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	106	57,243	21.1	5.4	10.5	31.7	
ร้อยเอ็ด	79	48,104	16.3	2.8	10.8	21.9	
กาฬสินธุ์	42	19,876	11.6	2.9	5.9	17.3	
สกลนคร	75	43,895	17.0	4.1	9.0	25.0	
นครพนม	81	28,577	20.5	5.6	9.6	31.4	
มุกดาหาร	105	14,319	21.4	4.4	12.8	29.9	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	109	89,239	26.2	5.8	14.8	37.6	
ลำพูน	161	37,796	31.5	5.8	20.1	43.0	
ลำปาง	168	58,391	27.4	4.6	18.5	36.4	
อุตรดิตถ์	99	22,389	20.5	3.6	13.4	27.5	
แพร่	127	38,075	26.1	2.9	20.3	31.8	
น่าน	142	24,454	19.9	3.8	12.3	27.4	
พะเยา	78	19,525	14.5	2.9	8.7	20.2	
เชียงราย	224	124,523	29.6	4.5	20.8	38.5	
แม่ฮ่องสอน	122	18,810	43.1	5.3	32.6	53.5	
นครสวรรค์	93	54,564	29.9	3.5	23.1	36.7	
อุทัยธานี	39	4,873	8.6	4.9	0.0	18.2	
กำแพงเพชร	101	32,981	19.9	2.8	14.5	25.3	
ตาก	136	32,909	28.1	4.3	19.6	36.6	
สุโขทัย	138	47,741	30.8	5.9	19.1	42.4	
พิษณุโลก	108	45,922	20.7	6.5	7.9	33.4	
พิจิตร	122	34,097	29.5	2.4	24.8	34.3	
เพชรบูรณ์	90	40,181	21.1	4.3	12.5	29.6	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	44	40,882	16.3	3.6	9.3	23.3	
กระบี่	55	3,801	16.6	5.0	6.8	26.4	
พังงา	25	2,499	9.0	2.7	3.7	14.3	
ภูเก็ต	25	4,756	14.9	2.6	9.7	20.1	
สุราษฎร์ธานี	90	51,512	27.7	7.3	13.3	42.0	
ระนอง	85	7,155	32.3	5.6	21.4	43.2	
ชุมพร	40	13,169	14.5	7.9	0.0	30.1	
สงขลา	62	41,066	20.2	2.4	15.5	24.9	
สตูล	36	4,849	27.8	5.8	16.4	39.3	
ตรัง	59	16,430	19.8	4.8	10.4	29.1	
พัทลุง	134	31,710	33.4	3.3	26.8	39.9	
ปัตตานี	29	3,828	23.0	6.3	10.7	35.3	
ยะลา	27	3,365	20.1	3.6	13.0	27.1	
นราธิวาส	9	3,318	16.4	7.0	2.6	30.2	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.2.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซึรดจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซึรดจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	830	403,453	23.9	1.3	21.4	26.4
25 - 34	912	402,190	19.8	1.1	17.7	21.8
35 - 44	847	356,533	16.4	1.0	14.4	18.4
45 - 54	489	227,582	15.4	1.2	13.0	17.9
55 - 64	447	72,610	11.7	0.9	10.0	13.4
65 - 74	100	16,128	10.8	1.6	7.6	14.0
รวม	3,625	1,478,496	18.1	0.7	16.7	19.6
<b>หญิง</b>						
15 - 24	83	39,987	13.6	1.9	10.0	17.3
25 - 34	105	40,284	9.8	1.2	7.4	12.2
35 - 44	97	35,796	6.1	0.9	4.3	7.8
45 - 54	66	30,405	8.0	1.3	5.5	10.5
55 - 64	30	3,506	4.1	0.9	2.3	5.9
65 - 74	2	201	1.7	1.5	0.0	4.5
รวม	383	150,179	8.5	0.7	7.2	9.8
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	913	443,440	22.4	1.2	20.1	24.7
25 - 34	1,017	442,474	18.1	0.9	16.3	19.9
35 - 44	944	392,329	14.2	0.8	12.6	15.8
45 - 54	555	257,986	13.9	1.1	11.8	16.0
55 - 64	477	76,116	10.8	0.8	9.2	12.3
65 - 74	102	16,328	10.2	1.5	7.2	13.1
รวมทั้งประเทศ	4,008	1,628,673	16.4	0.6	15.2	17.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.2.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,901	383,972	14.0	0.8	12.4	15.5
นอกเขตเทศบาล	2,107	1,244,701	17.4	0.8	15.7	19.0
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	9	26,018	5.4	2.3	1.0	9.9
ภาคกลาง	942	270,724	14.3	1.0	12.4	16.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,165	668,809	16.4	1.1	14.2	18.5
ภาคเหนือ	1,448	530,860	20.9	1.3	18.3	23.5
ภาคใต้	444	132,263	14.3	1.9	10.6	18.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	76	40,536	17.0	4.2	8.8	25.3
เขต สคร.ที่ 2	228	57,866	17.9	1.4	15.1	20.7
เขต สคร.ที่ 3	411	116,557	14.1	1.6	11.0	17.1
เขต สคร.ที่ 4	227	55,764	11.2	1.5	8.2	14.2
เขต สคร.ที่ 5	197	168,892	14.5	1.7	11.1	17.8
เขต สคร.ที่ 6	485	256,067	15.5	1.8	11.9	19.2
เขต สคร.ที่ 7	483	243,850	19.2	2.0	15.3	23.1
เขต สคร.ที่ 8	255	89,862	19.8	2.3	15.3	24.4
เขต สคร.ที่ 9	405	139,529	20.0	2.5	15.1	24.9
เขต สคร.ที่ 10	788	301,469	21.7	1.9	17.9	25.5
เขต สคร.ที่ 11	238	74,924	13.7	3.1	7.7	19.7
เขต สคร.ที่ 12	206	57,339	15.2	1.5	12.4	18.1

ตารางที่ 15.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในจังหวัดต่าง ๆ พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	9	26,018	5.4	2.3	1.0	9.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	15	7,504	4.9	2.9	0.0	10.6
นนทบุรี	13	5,424	10.7	4.6	1.7	19.7
ปทุมธานี	38	25,358	29.2	7.3	15.0	43.4
พระนครศรีอยุธยา	25	9,754	9.7	3.0	3.8	15.6
อ่างทอง	35	3,878	10.9	3.6	3.8	18.0
ลพบุรี	73	26,943	21.3	2.6	16.2	26.4
สิงห์บุรี	27	2,282	10.5	2.5	5.6	15.4
ชัยนาท	56	9,463	17.8	4.0	9.9	25.7
สระบุรี	37	15,301	17.8	2.3	13.4	22.2
ชลบุรี	29	14,632	12.9	4.1	4.8	21.1
ระยอง	22	8,002	10.2	2.8	4.7	15.8
จันทบุรี	97	25,722	23.0	2.1	18.8	27.1
ตราด	35	4,041	12.1	5.4	1.5	22.7
ฉะเชิงเทรา	44	13,050	14.4	4.7	5.2	23.6
ปราจีนบุรี	81	18,536	23.8	7.9	8.4	39.2
นครนายก	34	6,325	20.0	5.1	9.9	30.1
สระแก้ว	54	18,745	13.5	4.3	5.0	22.0
ราชบุรี	57	17,748	17.3	4.0	9.4	25.2
กาญจนบุรี	16	6,947	6.9	2.6	1.8	12.1
สุพรรณบุรี	38	8,702	10.4	3.5	3.6	17.2
นครปฐม	17	8,127	9.9	5.6	0.0	20.8
สมุทรสาคร	10	1,303	5.5	2.3	1.0	10.0
สมุทรสงคราม	37	2,110	11.2	2.7	5.9	16.5
เพชรบุรี	37	6,779	15.3	3.4	8.6	21.9
ประจวบคีรีขันธ์	15	4,048	9.5	2.9	3.8	15.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	35	59,108	13.7	2.9	7.9	19.4
บุรีรัมย์	62	51,891	18.3	3.9	10.6	25.9
สุรินทร์	44	29,003	11.2	2.8	5.7	16.7
ศรีสะเกษ	60	44,060	15.9	4.3	7.4	24.4
อุบลราชธานี	102	100,055	24.4	3.8	16.9	31.9
ยโสธร	65	20,791	17.3	3.7	10.1	24.6
ชัยภูมิ	56	28,889	14.9	2.3	10.3	19.4
อำนาจเจริญ	69	11,816	15.5	2.5	10.7	20.4
หนองบัวลำภู	89	23,736	19.5	3.4	12.7	26.2
ขอนแก่น	49	33,593	11.4	2.6	6.3	16.6
อุดรธานี	53	37,705	12.1	3.1	6.0	18.2
เลย	50	18,933	18.9	3.8	11.4	26.4
หนองคาย	80	36,337	23.0	5.3	12.6	33.5

ตารางที่ 15.2.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซึรดจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซึรดจักรยานยนต์ อายุ 15 - 74 ปี ในจังหวัดต่าง ๆ พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	72	46,793	18.6	9.2	0.6	36.6	
ร้อยเอ็ด	61	42,887	15.7	2.9	10.1	21.3	
กาฬสินธุ์	31	16,083	11.6	3.9	3.9	19.3	
สกลนคร	49	29,186	13.5	4.3	5.0	22.0	
นครพนม	62	27,514	24.0	8.0	8.4	39.7	
มุกดาหาร	76	10,428	18.7	4.0	10.9	26.5	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	81	73,259	23.6	6.4	11.0	36.1	
ลำพูน	108	24,887	22.2	4.6	13.1	31.3	
ลำปาง	117	40,941	21.1	3.9	13.5	28.6	
อุตรดิตถ์	68	16,942	18.2	4.3	9.8	26.6	
แพร่	85	25,840	18.8	3.0	12.9	24.6	
น่าน	98	17,665	17.8	3.9	10.2	25.4	
พะเยา	53	13,371	11.1	2.4	6.3	15.9	
เชียงราย	162	92,445	24.2	3.7	17.0	31.4	
แม่ฮ่องสอน	84	13,061	37.9	10.1	18.0	57.8	
นครสวรรค์	57	32,471	21.0	3.6	14.0	28.0	
อุทัยธานี	30	4,065	8.3	5.2	0.0	18.5	
กำแพงเพชร	76	29,735	19.7	5.2	9.4	30.0	
ตาก	98	24,293	23.4	4.0	15.7	31.2	
สุโขทัย	89	29,625	21.5	3.8	14.1	28.9	
พิษณุโลก	81	34,737	17.7	6.6	4.9	30.6	
พิจิตร	92	23,591	24.0	2.6	19.0	29.0	
เพชรบูรณ์	69	33,931	20.2	5.1	10.3	30.2	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	28	20,162	9.0	2.8	3.6	14.5	
กระบี่	47	2,386	13.0	3.8	5.5	20.5	
พังงา	16	2,342	9.7	2.4	4.9	14.4	
ภูเก็ต	15	2,739	10.4	3.1	4.3	16.5	
สุราษฎร์ธานี	50	33,125	21.2	7.7	6.2	36.2	
ระนอง	53	4,729	26.2	10.3	6.1	46.3	
ชุมพร	29	9,440	11.6	8.4	0.0	28.1	
สงขลา	35	24,241	14.0	2.5	9.0	19.0	
สตูล	21	2,192	19.4	5.4	8.8	30.1	
ตรัง	29	6,633	9.6	2.8	4.2	15.1	
พัทลุง	75	17,309	21.7	2.7	16.5	26.9	
ปัตตานี	19	3,090	24.0	5.1	14.0	33.9	
ยะลา	19	1,963	15.2	3.6	8.2	22.2	
นราธิวาส	8	1,911	10.6	5.0	0.7	20.4	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 15.2.7 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์หลังจากตีมีแอลลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่างๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	225	112,583	11.6	1.1	9.4	13.8
25 - 34	581	230,542	15.0	1.0	13.0	17.0
35 - 44	623	236,434	13.8	0.9	12.1	15.5
45 - 54	384	134,122	11.4	0.9	9.7	13.1
55 - 64	313	46,067	10.1	0.9	8.3	11.9
65 - 74	65	8,514	8.6	1.5	5.5	11.6
รวม	2,191	768,262	12.9	0.5	11.8	14.0
<b>หญิง</b>						
15 - 24	32	15,179	10.1	2.3	5.5	14.7
25 - 34	44	20,193	8.2	2.0	4.3	12.2
35 - 44	41	17,186	6.1	1.9	2.3	9.8
45 - 54	26	8,346	5.3	1.4	2.5	8.2
55 - 64	11	1,211	2.4	1.0	0.4	4.4
65 - 74	3	324	3.3	2.5	0.0	8.2
รวม	157	62,438	7.0	1.0	4.9	9.0
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	257	127,762	11.4	1.0	9.3	13.4
25 - 34	625	250,735	14.0	0.9	12.2	15.9
35 - 44	664	253,620	12.7	0.7	11.2	14.2
45 - 54	410	142,468	10.7	0.8	9.1	12.3
55 - 64	324	47,278	9.3	0.8	7.7	10.9
65 - 74	68	8,838	8.1	1.4	5.3	10.9
รวมทั้งประเทศ	2,348	830,700	12.1	0.5	11.2	13.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.2.8 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	1,262	254,771	11.7	0.7	10.3	13.1
นอกเขตเทศบาล	1,086	575,929	12.3	0.6	11.1	13.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	5	16,159	4.6	2.0	0.7	8.5
ภาคกลาง	755	206,491	12.8	0.9	11.1	14.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	501	249,639	9.8	0.8	8.2	11.3
ภาคเหนือ	781	263,897	16.3	1.0	14.2	18.3
ภาคใต้	306	94,513	13.4	1.8	9.8	16.9
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	74	36,640	13.9	2.4	9.1	18.6
เขต สคร.ที่ 2	179	42,461	18.0	2.1	13.8	22.2
เขต สคร.ที่ 3	321	87,001	12.4	1.4	9.8	15.1
เขต สคร.ที่ 4	181	40,389	9.8	1.3	7.2	12.3
เขต สคร.ที่ 5	101	71,854	10.6	1.7	7.3	14.0
เขต สคร.ที่ 6	224	120,089	10.2	1.2	7.9	12.5
เขต สคร.ที่ 7	176	57,696	8.2	1.3	5.7	10.7
เขต สคร.ที่ 8	143	44,711	13.6	2.3	9.2	18.1
เขต สคร.ที่ 9	198	60,634	14.6	1.6	11.4	17.7
เขต สคร.ที่ 10	440	158,552	18.0	1.5	15.1	21.0
เขต สคร.ที่ 11	185	55,976	13.5	2.9	7.8	19.2
เขต สคร.ที่ 12	121	38,538	13.2	1.3	10.6	15.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.2.9 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับรถยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	157	87,011	11.0	1.2	8.6	13.4
25 - 34	375	165,302	12.5	1.1	10.3	14.6
35 - 44	375	156,482	10.7	0.9	8.9	12.5
45 - 54	201	88,009	9.1	1.7	5.8	12.3
55 - 64	176	22,391	6.1	0.7	4.8	7.4
65 - 74	39	5,222	7.0	1.7	3.7	10.2
รวม	1,323	524,417	10.5	0.5	9.5	11.5
<b>หญิง</b>						
15 - 24	11	5,243	4.9	2.1	0.8	9.0
25 - 34	23	8,857	4.9	1.3	2.4	7.4
35 - 44	21	6,379	3.0	1.0	1.0	5.0
45 - 54	16	6,461	5.2	1.6	2.0	8.3
55 - 64	6	745	2.4	1.3	0.0	4.9
65 - 74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
รวม	77	27,685	4.2	0.7	2.7	5.6
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	168	92,254	10.3	1.1	8.1	12.5
25 - 34	398	174,159	11.5	1.0	9.6	13.5
35 - 44	396	162,860	9.7	0.8	8.1	11.3
45 - 54	217	94,470	8.6	1.5	5.7	11.6
55 - 64	182	23,137	5.9	0.6	4.6	7.1
65 - 74	39	5,222	6.3	1.5	3.3	9.2
รวมทั้งประเทศ	1,400	552,102	9.8	0.5	8.8	10.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.2.10 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง เฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	709	144,794	8.2	0.6	7.1	9.3
นอกเขตเทศบาล	691	407,307	10.5	0.6	9.2	11.7
<b>ภาค</b>						
ภาคกลาง	411	118,846	9.3	0.8	7.8	10.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	298	188,086	9.0	0.9	7.2	10.8
ภาคเหนือ	504	181,454	13.0	0.9	11.2	14.8
ภาคใต้	183	53,682	9.1	1.6	6.0	12.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	40	18,877	10.4	2.0	6.5	14.3
เขต สคร.ที่ 2	76	21,176	10.5	1.5	7.5	13.4
เขต สคร.ที่ 3	196	53,508	9.1	1.2	6.7	11.5
เขต สคร.ที่ 4	99	25,284	8.2	1.4	5.5	10.9
เขต สคร.ที่ 5	61	50,738	9.3	1.7	6.0	12.5
เขต สคร.ที่ 6	135	94,085	9.7	1.4	6.9	12.5
เขต สคร.ที่ 7	102	43,263	7.6	1.5	4.5	10.6
เขต สคร.ที่ 8	104	40,032	14.1	1.7	10.9	17.4
เขต สคร.ที่ 9	127	40,310	11.3	1.4	8.5	14.1
เขต สคร.ที่ 10	273	101,113	13.4	1.4	10.6	16.3
เขต สคร.ที่ 11	116	29,517	8.3	2.4	3.6	13.1
เขต สคร.ที่ 12	67	24,165	10.2	1.5	7.3	13.1

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่งน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.3.1 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซีรดจักรยานยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา  
ในประชากรที่ขับซีรดจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการ ประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	927	437,964	9.5	0.6	8.4	10.6
25 - 34	903	392,795	9.2	0.5	8.1	10.3
35 - 44	783	352,151	7.6	0.5	6.7	8.5
45 - 54	520	223,920	6.5	0.4	5.7	7.3
55 - 64	591	96,463	5.1	0.4	4.4	5.8
65 - 74	138	20,319	3.1	0.3	2.4	3.7
รวม	3,862	1,523,612	7.8	0.3	7.2	8.4
<b>หญิง</b>						
15 - 24	418	169,194	4.3	0.3	3.6	5.0
25 - 34	359	162,610	4.2	0.5	3.2	5.1
35 - 44	364	139,466	3.2	0.3	2.6	3.8
45 - 54	211	83,570	2.9	0.3	2.2	3.5
55 - 64	130	20,864	1.9	0.2	1.4	2.4
65 - 74	19	2,962	0.9	0.4	0.2	1.6
รวม	1,501	578,666	3.5	0.2	3.1	3.9
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	1,345	607,158	7.1	0.4	6.4	7.8
25 - 34	1,262	555,405	6.8	0.4	6.1	7.6
35 - 44	1,147	491,617	5.5	0.3	4.9	6.1
45 - 54	731	307,490	4.9	0.3	4.3	5.4
55 - 64	721	117,327	3.9	0.3	3.4	4.4
65 - 74	157	23,281	2.3	0.3	1.8	2.9
รวมทั้งประเทศ	5,363	2,102,278	5.8	0.2	5.4	6.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.3.2 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,677	593,523	5.3	0.3	4.8	5.9
นอกเขตเทศบาล	2,686	1,508,754	6.1	0.3	5.5	6.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	23	73,485	3.3	0.8	1.8	4.9
ภาคกลาง	1,596	453,033	5.1	0.4	4.4	5.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,434	734,307	5.8	0.4	5.0	6.6
ภาคเหนือ	1,373	508,190	7.2	0.4	6.3	8.0
ภาคใต้	937	333,263	6.4	0.7	5.1	7.8
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	118	55,270	4.0	0.9	2.3	5.8
เขต สคร.ที่ 2	414	76,220	5.7	0.7	4.4	7.0
เขต สคร.ที่ 3	579	184,504	5.5	0.7	4.2	6.8
เขต สคร.ที่ 4	485	137,039	4.8	0.6	3.6	6.0
เขต สคร.ที่ 5	241	164,664	4.3	0.5	3.3	5.3
เขต สคร.ที่ 6	542	276,400	5.4	0.6	4.2	6.5
เขต สคร.ที่ 7	651	293,243	8.1	0.9	6.3	9.8
เขต สคร.ที่ 8	345	132,460	8.4	0.7	7.0	9.9
เขต สคร.ที่ 9	493	155,267	7.5	0.8	5.9	9.1
เขต สคร.ที่ 10	535	220,463	6.4	0.6	5.2	7.6
เขต สคร.ที่ 11	407	146,984	5.9	0.9	4.0	7.7
เขต สคร.ที่ 12	530	186,279	7.0	0.9	5.1	8.8

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับซึรดจักรยานยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับซึรดจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	23	73,485	3.3	0.8	1.8	4.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	52	27,444	4.5	1.6	1.3	7.6
นนทบุรี	22	11,251	2.4	0.8	0.8	4.0
ปทุมธานี	53	30,134	6.4	1.7	3.1	9.7
พระนครศรีอยุธยา	43	13,885	3.3	1.1	1.1	5.5
อ่างทอง	117	14,976	8.4	1.8	4.8	11.9
ลพบุรี	105	31,906	7.4	1.4	4.6	10.2
สิงห์บุรี	47	4,228	3.0	0.8	1.5	4.5
ชัยนาท	86	9,494	4.6	1.2	2.3	6.9
สระบุรี	59	15,616	4.0	1.3	1.4	6.6
ชลบุรี	64	37,619	5.2	1.5	2.2	8.1
ระยอง	45	12,695	3.4	1.0	1.4	5.4
จันทบุรี	112	27,147	8.2	1.6	5.1	11.2
ตราด	71	8,983	7.0	1.9	3.3	10.7
ฉะเชิงเทรา	46	20,337	5.1	0.9	3.3	6.9
ปราจีนบุรี	86	18,185	6.8	1.2	4.5	9.1
นครนายก	32	3,110	2.0	0.8	0.4	3.5
สระแก้ว	71	28,984	8.8	4.0	0.9	16.7
ราชบุรี	78	26,906	5.5	1.3	2.9	8.2
กาญจนบุรี	60	31,142	6.4	2.5	1.5	11.3
สุพรรณบุรี	69	16,292	3.1	1.1	1.0	5.1
นครปฐม	44	18,706	3.6	1.0	1.6	5.6
สมุทรสาคร	28	9,412	7.1	2.5	2.3	11.9
สมุทรสงคราม	83	6,995	7.0	1.7	3.6	10.4
เพชรบุรี	99	22,823	8.0	2.0	4.0	12.0
ประจวบคีรีขันธ์	24	4,764	1.5	0.5	0.6	2.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	55	66,045	4.4	1.0	2.4	6.3
บุรีรัมย์	74	50,720	5.6	1.1	3.4	7.8
สุรินทร์	53	25,831	3.4	0.7	2.0	4.8
ศรีสะเกษ	82	44,332	5.7	1.4	2.9	8.6
อุบลราชธานี	132	119,646	11.6	1.7	8.2	15.0
ยโสธร	68	13,429	4.0	1.1	1.9	6.1
ชัยภูมิ	59	22,069	3.4	1.0	1.4	5.5
อำนาจเจริญ	122	19,934	9.8	1.7	6.5	13.2
หนองบัวลำภู	136	33,661	11.1	1.9	7.3	14.9
ขอนแก่น	84	76,368	7.9	1.9	4.1	11.7
อุดรธานี	57	35,965	3.9	0.7	2.5	5.3
เลย	31	10,270	2.7	0.9	0.9	4.5
หนองคาย	71	29,719	5.3	1.0	3.3	7.4

ตารางที่ 15.3.3 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขีรถจักรยานยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	66	35,950	5.9	2.8	0.5	11.3	
ร้อยเอ็ด	37	23,048	2.8	0.6	1.7	3.9	
กาฬสินธุ์	60	31,419	5.2	1.7	2.0	8.5	
สกลนคร	77	60,496	9.2	3.2	2.9	15.4	
นครพนม	38	15,692	3.8	0.9	2.0	5.5	
มุกดาหาร	132	19,714	9.7	4.3	1.2	18.2	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	103	85,244	9.2	1.7	5.8	12.7	
ลำพูน	68	12,131	4.5	1.3	1.9	7.0	
ลำปาง	55	21,652	4.3	0.8	2.7	5.8	
อุตรดิตถ์	88	20,279	6.9	1.3	4.2	9.5	
แพร่	34	10,711	3.5	1.1	1.3	5.7	
น่าน	54	14,478	5.4	1.1	3.3	7.5	
พะเยา	58	15,151	4.7	1.3	2.1	7.2	
เชียงราย	83	52,464	7.0	1.5	4.1	9.8	
แม่ฮ่องสอน	80	8,633	9.4	2.2	5.1	13.7	
นครสวรรค์	62	47,483	7.9	1.4	5.2	10.7	
อุทัยธานี	51	8,289	4.2	1.5	1.3	7.1	
กำแพงเพชร	102	37,324	8.4	1.5	5.4	11.4	
ตาก	98	23,048	9.0	1.2	6.5	11.4	
สุโขทัย	130	40,237	10.5	2.2	6.2	14.7	
พิษณุโลก	70	28,757	5.4	1.1	3.1	7.6	
พิจิตร	130	39,364	11.8	1.3	9.2	14.5	
เพชรบูรณ์	107	42,945	7.2	2.0	3.3	11.0	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	58	59,800	6.6	2.2	2.4	10.9	
กระบี่	66	10,692	4.2	1.4	1.5	6.9	
พังงา	47	4,370	2.8	0.8	1.3	4.3	
ภูเก็ต	96	19,122	9.6	2.7	4.4	14.9	
สุราษฎร์ธานี	65	31,785	5.4	0.8	3.8	7.0	
ระนอง	26	2,219	2.3	0.7	1.0	3.7	
ชุมพร	49	18,995	6.2	3.2	0.0	12.5	
สงขลา	70	56,271	7.0	1.6	3.9	10.0	
สตูล	61	9,212	5.4	1.4	2.8	8.1	
ตรัง	34	10,986	3.0	0.4	2.2	3.7	
พัทลุง	132	37,658	11.8	2.0	7.9	15.8	
ปัตตานี	81	23,142	6.8	1.5	4.0	9.7	
ยะลา	69	12,157	4.5	1.1	2.2	6.7	
นราธิวาส	83	36,854	9.2	4.8	0.0	18.7	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ตารางที่ 15.3.4 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	370	170,473	6.9	0.7	5.6	8.1
25 - 34	747	289,263	9.0	0.6	7.8	10.3
35 - 44	787	340,732	9.9	0.7	8.6	11.2
45 - 54	488	187,635	7.4	0.6	6.3	8.5
55 - 64	486	76,512	6.0	0.4	5.1	6.9
65 - 74	94	13,849	3.3	0.5	2.3	4.2
รวม	2,972	1,078,464	8.1	0.4	7.3	8.8
<b>หญิง</b>						
15 - 24	92	42,266	2.6	0.5	1.7	3.6
25 - 34	166	80,710	4.0	0.6	2.8	5.3
35 - 44	172	53,745	2.5	0.3	1.9	3.0
45 - 54	108	41,523	2.8	0.5	1.8	3.7
55 - 64	88	14,759	2.3	0.4	1.5	3.1
65 - 74	11	856	0.4	0.2	0.1	0.7
รวม	637	233,859	2.9	0.2	2.4	3.3
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	462	212,739	5.2	0.5	4.2	6.2
25 - 34	913	369,973	7.1	0.5	6.1	8.1
35 - 44	959	394,477	7.0	0.4	6.2	7.8
45 - 54	596	229,158	5.7	0.4	4.8	6.5
55 - 64	574	91,271	4.7	0.3	4.1	5.4
65 - 74	105	14,705	2.2	0.3	1.6	2.9
รวมทั้งประเทศ	3,609	1,312,323	6.1	0.3	5.5	6.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.3.5 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	2,063	450,445	6.1	0.4	5.2	6.9
นอกเขตเทศบาล	1,546	861,879	6.1	0.4	5.4	6.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	17	59,794	3.8	1.6	0.8	6.9
ภาคกลาง	1,263	382,063	6.4	0.6	5.2	7.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	866	414,382	5.8	0.5	4.9	6.8
ภาคเหนือ	869	267,530	6.4	0.5	5.4	7.5
ภาคใต้	594	188,555	6.9	0.8	5.4	8.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร.ที่ 1	128	75,876	6.9	2.2	2.5	11.3
เขต สคร.ที่ 2	278	54,751	6.9	0.8	5.2	8.5
เขต สคร.ที่ 3	520	163,774	7.2	1.0	5.2	9.2
เขต สคร.ที่ 4	337	87,662	4.9	0.6	3.7	6.1
เขต สคร.ที่ 5	142	86,476	4.4	0.7	2.9	5.8
เขต สคร.ที่ 6	342	169,620	5.1	0.7	3.7	6.5
เขต สคร.ที่ 7	382	158,286	8.6	1.1	6.4	10.9
เขต สคร.ที่ 8	204	62,664	6.0	0.7	4.6	7.4
เขต สคร.ที่ 9	320	88,618	8.4	1.4	5.7	11.1
เขต สคร.ที่ 10	345	116,248	5.7	0.7	4.4	6.9
เขต สคร.ที่ 11	297	100,348	7.3	1.2	5.0	9.7
เขต สคร.ที่ 12	297	88,207	6.5	0.9	4.6	8.3

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่งน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 15.3.6 ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา  
ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	17	59,794	3.8	1.6	0.8	6.9
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	66	29,765	6.0	2.3	1.5	10.5
นนทบุรี	33	22,529	4.8	1.5	1.8	7.8
ปทุมธานี	66	45,538	12.2	5.5	1.5	22.9
พระนครศรีอยุธยา	29	7,809	3.0	1.0	1.1	4.9
อ่างทอง	77	8,561	11.4	2.0	7.5	15.4
ลพบุรี	88	26,943	9.6	1.9	5.9	13.3
สิงห์บุรี	20	1,865	2.6	0.7	1.1	4.1
ชัยนาท	41	4,093	3.9	1.0	1.8	5.9
สระบุรี	52	13,289	5.1	1.3	2.5	7.6
ชลบุรี	69	37,342	7.5	3.0	1.7	13.4
ระยอง	37	10,941	4.0	1.0	2.0	6.0
จันทบุรี	94	25,574	11.2	1.5	8.3	14.1
ตราด	56	5,019	6.7	2.4	2.1	11.4
ฉะเชิงเทรา	32	12,036	4.8	0.9	3.0	6.6
ปราจีนบุรี	65	12,890	9.3	2.0	5.3	13.3
นครนายก	33	3,235	3.6	1.1	1.3	5.8
สระแก้ว	68	26,972	12.1	5.4	1.5	22.6
ราชบุรี	53	16,918	5.7	1.4	2.9	8.5
กาญจนบุรี	45	17,760	6.5	1.6	3.3	9.7
สุพรรณบุรี	61	15,447	4.4	0.8	2.7	6.0
นครปฐม	39	18,355	5.4	2.4	0.7	10.1
สมุทรสาคร	22	4,127	4.1	1.6	0.8	7.3
สมุทรสงคราม	67	5,142	10.7	2.3	6.1	15.3
เพชรบุรี	40	8,216	5.6	1.3	3.0	8.2
ประจวบคีรีขันธ์	10	1,697	0.8	0.3	0.3	1.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	30	40,713	4.5	1.3	2.0	7.1
บุรีรัมย์	32	18,678	5.7	1.4	3.0	8.5
สุรินทร์	32	10,366	3.1	1.5	0.2	6.1
ศรีสะเกษ	41	18,167	4.4	0.8	2.8	6.0
อุบลราชธานี	84	78,746	16.4	3.5	9.5	23.3
ยโสธร	44	7,306	6.4	2.1	2.3	10.5
ชัยภูมิ	48	16,719	3.9	1.0	2.0	5.9
อำนาจเจริญ	76	10,654	8.5	1.8	5.0	11.9
หนองบัวลำภู	57	13,926	12.3	2.2	8.1	16.6
ขอนแก่น	52	48,448	6.6	2.0	2.6	10.5
อุดรธานี	36	21,608	3.4	0.9	1.6	5.3
เลย	24	8,148	3.3	1.1	1.2	5.4
หนองคาย	41	15,184	3.9	2.2	0.0	8.2

ตารางที่ 15.3.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่เข้ารับรถยนต์ขณะรู้สึกง่วง ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในประชากรที่เข้ารับรถยนต์อายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
มหาสารคาม	53	18,307	6.4	3.2	0.1	12.7	
ร้อยเอ็ด	33	22,108	4.1	0.8	2.5	5.7	
กาฬสินธุ์	46	21,891	5.8	1.9	2.0	9.6	
สกลนคร	42	24,524	6.3	2.3	1.8	10.8	
นครพนม	20	6,841	3.2	1.0	1.3	5.1	
มุกดาหาร	75	12,048	12.0	6.2	0.0	24.3	
ภาคเหนือ							
เชียงใหม่	58	44,153	6.4	1.5	3.5	9.3	
ลำพูน	39	6,289	3.3	1.1	1.2	5.5	
ลำปาง	42	14,208	6.7	1.4	4.0	9.4	
อุตรดิตถ์	59	11,872	7.3	1.3	4.7	9.9	
แพร่	30	9,256	5.7	1.8	2.3	9.2	
น่าน	46	8,826	6.6	1.4	3.7	9.4	
พะเยา	34	8,787	4.2	1.2	1.8	6.6	
เชียงราย	38	20,171	5.0	1.6	1.8	8.2	
แม่ฮ่องสอน	58	4,558	8.3	2.1	4.2	12.4	
นครสวรรค์	32	16,983	4.2	0.8	2.7	5.7	
อุทัยธานี	28	3,965	2.9	0.8	1.2	4.5	
กำแพงเพชร	62	20,803	6.9	1.1	4.8	9.1	
ตาก	91	26,032	16.0	5.4	5.5	26.6	
สุโขทัย	63	18,294	11.4	2.2	7.2	15.6	
พิษณุโลก	47	11,402	3.3	1.1	1.2	5.4	
พิจิตร	82	20,914	10.8	2.4	6.1	15.4	
เพชรบูรณ์	60	21,018	9.1	2.7	3.9	14.4	
ภาคใต้							
นครศรีธรรมราช	37	38,306	10.6	3.9	3.0	18.3	
กระบี่	59	9,835	6.3	2.3	1.8	10.8	
พังงา	34	2,040	2.7	0.5	1.7	3.7	
ภูเก็ต	43	8,397	7.6	2.0	3.7	11.6	
สุราษฎร์ธานี	55	26,272	6.6	1.3	4.0	9.1	
ระนอง	38	4,035	6.4	3.2	0.2	12.7	
ชุมพร	31	11,464	5.5	1.8	1.9	9.1	
สงขลา	45	32,053	7.2	1.7	3.9	10.6	
สตูล	33	4,303	5.3	2.1	1.2	9.4	
ตรัง	20	5,011	2.4	1.1	0.3	4.6	
พัทลุง	51	11,156	7.5	2.0	3.6	11.4	
ปัตตานี	56	11,951	7.0	1.5	4.0	10.0	
ยะลา	38	6,135	5.3	1.0	3.2	7.3	
นราธิวาส	54	17,598	8.8	4.5	0.0	17.5	

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

**ส่วนที่ 16**  
**การตรวจคัดกรอง**  
**มะเร็งเต้านม**  
**และมะเร็งปากมดลูก**



ตารางที่ 16.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ทราบวิธีตรวจและได้ตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาก้อนผิดปกติ  
ทุกเดือน ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
หญิง						
15 - 24	2,705	1,232,295	29.2	1.1	27.1	31.4
25 - 34	4,943	2,202,231	52.3	1.1	50.2	54.3
35 - 44	6,997	3,109,255	58.8	1.1	56.7	61.0
45 - 54	5,543	2,346,699	57.5	1.4	54.8	60.2
55 - 64	7,031	1,343,065	51.2	1.0	49.3	53.1
65 - 74	2,362	439,786	36.4	1.2	33.9	38.8
รวม	29,581	10,673,330	49.3	0.8	47.8	50.9

ตารางที่ 16.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ทราบวิธีตรวจและได้ตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาก้อนผิดปกติ  
ทุกเดือน ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	14,522	3,215,436	44.3	1.2	41.9	46.7
นอกเขตเทศบาล	15,059	7,457,894	51.9	1.0	49.9	53.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	189	522,180	27.7	3.5	20.8	34.6
ภาคกลาง	8,890	2,445,963	45.9	1.2	43.5	48.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,016	4,029,520	53.9	1.6	50.7	57.0
ภาคเหนือ	7,251	2,243,279	55.3	1.4	52.5	58.1
ภาคใต้	5,235	1,432,388	49.8	1.6	46.5	53.0
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	1,002	407,607	42.1	3.3	35.5	48.6
เขต สคร. ที่ 2	2,118	418,650	52.9	2.5	47.9	57.9
เขต สคร. ที่ 3	3,039	865,411	44.6	2.0	40.6	48.6
เขต สคร. ที่ 4	2,731	754,294	46.2	2.0	42.2	50.2
เขต สคร. ที่ 5	1,806	1,301,966	55.8	3.1	49.7	61.9
เขต สคร. ที่ 6	3,531	1,731,495	58.2	2.9	52.5	63.8
เขต สคร. ที่ 7	2,679	996,059	46.0	2.1	41.8	50.2
เขต สคร. ที่ 8	1,606	461,520	53.4	2.4	48.7	58.0
เขต สคร. ที่ 9	1,898	602,755	50.6	2.5	45.6	55.5
เขต สคร. ที่ 10	3,747	1,179,003	58.9	2.2	54.5	63.3
เขต สคร. ที่ 11	2,669	728,875	53.2	2.6	48.2	58.2
เขต สคร. ที่ 12	2,566	703,513	46.6	2.0	42.7	50.6



ตารางที่ 16.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ทราบวิธีตรวจและได้ตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาก้อนผิดปกติ  
ทุกเดือน ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	189	522,180	27.7	3.5	20.8	34.6
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	316	139,721	34.1	4.5	25.3	42.9
นนทบุรี	293	150,025	37.9	5.3	27.6	48.2
ปทุมธานี	268	107,692	33.6	4.3	25.1	42.1
พระนครศรีอยุธยา	441	149,890	59.4	5.5	48.6	70.1
อ่างทอง	456	62,282	57.4	3.7	50.1	64.6
ลพบุรี	396	136,562	50.1	4.6	41.0	59.2
สิงห์บุรี	423	46,125	59.1	5.5	48.4	69.9
ชัยนาท	376	50,906	45.6	5.8	34.2	57.1
สระบุรี	467	122,775	55.7	5.8	44.3	67.0
ชลบุรี	413	249,140	58.8	4.5	49.9	67.7
ระยอง	269	61,880	31.0	4.7	21.7	40.2
จันทบุรี	349	87,592	49.3	3.2	43.1	55.5
ตราด	366	28,647	42.3	6.7	29.1	55.5
ฉะเชิงเทรา	308	91,466	40.4	5.4	29.8	50.9
ปราจีนบุรี	388	89,593	53.5	4.5	44.7	62.3
นครนายก	334	44,431	48.6	8.2	32.5	64.8
สระแก้ว	296	72,941	41.4	7.0	27.6	55.2
ราชบุรี	421	163,405	55.9	4.6	46.8	64.9
กาญจนบุรี	346	110,920	42.0	4.4	33.4	50.5
สุพรรณบุรี	359	137,093	45.7	4.6	36.7	54.7
นครปฐม	335	121,876	39.6	5.5	28.8	50.5
สมุทรสาคร	149	25,852	34.9	5.5	24.2	45.6
สมุทรสงคราม	401	34,388	50.3	4.1	42.3	58.3
เพชรบุรี	343	71,137	44.9	3.9	37.2	52.5
ประจวบคีรีขันธ์	377	89,622	53.6	5.6	42.5	64.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	475	546,653	60.7	4.5	51.8	69.7
บุรีรัมย์	491	309,321	54.5	7.7	39.3	69.8
สุรินทร์	427	242,207	50.6	7.1	36.7	64.5
ศรีสะเกษ	350	231,071	47.9	4.6	38.8	56.9
อุบลราชธานี	280	233,934	37.6	4.2	29.3	45.8
ยโสธร	485	100,742	51.8	7.9	36.4	67.2
ชัยภูมิ	413	203,784	52.7	4.7	43.5	61.9
อำนาจเจริญ	430	69,236	52.7	3.4	46.1	59.3
หนองบัวลำภู	460	100,846	53.7	3.9	46.1	61.3
ขอนแก่น	379	291,939	45.9	7.7	30.8	61.1
อุดรธานี	439	329,701	62.1	7.2	47.9	76.3
เลย	437	131,942	61.8	2.0	57.8	65.8
หนองคาย	473	195,826	64.1	6.0	52.3	75.8

ตารางที่ 16.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ทราบวิธีตรวจและได้ตรวจค่าเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาก้อนผิดปกติทุกเดือน ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	431	204,264	60.2	5.6	49.1	71.2
ร้อยเอ็ด	492	283,928	67.0	6.2	54.8	79.2
กาฬสินธุ์	420	193,049	56.7	5.4	46.0	67.4
สกลนคร	385	185,844	48.8	5.5	37.9	59.6
นครพนม	531	143,697	58.7	7.4	44.2	73.2
มุกดาหาร	218	31,536	28.9	5.8	17.5	40.2
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	380	283,719	51.1	6.3	38.8	63.4
ลำพูน	453	92,117	63.4	3.9	55.7	71.0
ลำปาง	468	172,410	59.0	3.5	52.0	65.9
อุตรดิตถ์	342	81,423	50.4	4.1	42.4	58.4
แพร่	516	109,739	64.7	4.2	56.5	73.0
น่าน	552	102,734	58.8	7.6	43.8	73.8
พะเยา	548	131,959	71.0	4.1	63.0	79.1
เชียงราย	490	251,882	60.2	4.4	51.5	69.0
แม่ฮ่องสอน	340	34,442	56.7	5.9	45.2	68.3
นครสวรรค์	442	174,727	55.9	4.1	47.9	64.0
อุทัยธานี	396	59,640	53.4	7.0	39.7	67.2
กำแพงเพชร	375	121,131	50.1	5.7	38.9	61.4
ตาก	329	64,182	40.6	5.5	29.7	51.5
สุโขทัย	443	121,373	52.6	2.5	47.7	57.5
พิษณุโลก	398	160,012	53.5	5.3	43.0	64.0
พิจิตร	393	106,023	53.2	2.7	47.9	58.4
เพชรบูรณ์	386	175,766	51.4	6.2	39.1	63.6
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	313	247,667	48.9	5.7	37.7	60.0
กระบี่	421	81,202	60.2	6.2	47.9	72.4
พังงา	435	45,471	59.1	5.6	48.2	70.1
ภูเก็ต	303	45,878	39.5	4.4	30.8	48.2
สุราษฎร์ธานี	433	184,252	54.9	4.1	46.7	63.0
ระนอง	340	27,659	55.4	3.6	48.2	62.5
ชุมพร	424	96,747	64.9	6.7	51.6	78.1
สงขลา	346	204,445	46.2	4.1	38.1	54.3
สตูล	353	41,103	46.3	4.2	38.1	54.5
ตรัง	451	118,830	58.8	5.5	47.9	69.7
พัทลุง	483	108,693	58.8	4.9	49.1	68.4
ปัตตานี	328	84,565	43.7	5.9	32.0	55.4
ยะลา	283	47,270	30.8	4.6	21.8	39.8
นราธิวาส	322	98,608	40.6	5.6	29.6	51.6

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 16.1.4 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้อนผิดปกติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
หญิง						
15 - 24	866	399,267	8.6	0.5	7.7	9.6
25 - 34	1,971	913,199	20.2	0.8	18.6	21.8
35 - 44	3,533	1,622,470	29.0	0.9	27.3	30.8
45 - 54	3,009	1,320,023	30.3	1.0	28.4	32.2
55 - 64	3,835	782,297	28.3	0.9	26.6	30.0
65 - 74	1,186	236,734	18.3	0.9	16.4	20.1
รวม	14,400	5,273,991	22.8	0.6	21.7	23.9

ตารางที่ 16.1.5 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้อนผิดปกติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	6,798	1,586,238	19.9	0.7	18.5	21.4
นอกเขตเทศบาล	7,602	3,687,753	24.3	0.8	22.7	25.8
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	117	293,622	13.6	1.6	10.4	16.8
ภาคกลาง	4,439	1,208,251	20.6	0.9	18.7	22.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,491	2,222,487	28.8	1.3	26.3	31.3
ภาคเหนือ	3,225	960,356	22.4	1.1	20.2	24.5
ภาคใต้	2,128	589,274	19.0	1.3	16.5	21.6
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	556	204,938	19.1	2.6	13.9	24.3
เขต สคร. ที่ 2	910	172,825	20.6	1.7	17.3	23.9
เขต สคร. ที่ 3	1,609	466,248	22.0	1.7	18.7	25.4
เขต สคร. ที่ 4	1,364	364,241	19.7	1.4	16.9	22.5
เขต สคร. ที่ 5	978	662,088	27.2	2.4	22.6	31.9
เขต สคร. ที่ 6	1,974	1,022,804	33.4	2.2	29.1	37.7
เขต สคร. ที่ 7	1,539	537,595	24.1	2.1	20.0	28.2
เขต สคร. ที่ 8	708	195,250	21.3	2.1	17.3	25.4
เขต สคร. ที่ 9	763	249,132	19.7	1.9	15.9	23.5
เขต สคร. ที่ 10	1,754	515,974	24.4	1.7	21.2	27.7
เขต สคร. ที่ 11	1,088	271,097	18.2	2.0	14.3	22.2
เขต สคร. ที่ 12	1,040	318,177	19.7	1.7	16.5	23.0

ตารางที่ 16.1.6 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้อนผิดปกติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	117	293,622	13.6	1.6	10.4	16.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	207	102,192	23.4	4.9	13.7	33.1
นนทบุรี	130	56,443	12.9	2.8	7.5	18.4
ปทุมธานี	193	71,879	19.9	6.1	8.0	31.9
พระนครศรีอยุธยา	233	76,616	27.8	4.4	19.1	36.4
อ่างทอง	175	24,364	21.4	4.0	13.4	29.3
ลพบุรี	197	61,648	21.5	3.1	15.4	27.6
สิงห์บุรี	230	26,258	32.5	6.0	20.7	44.2
ชัยนาท	171	22,687	17.8	4.4	9.2	26.4
สระบุรี	137	37,869	16.4	3.0	10.4	22.3
ชลบุรี	182	106,155	22.2	3.9	14.6	29.9
ระยอง	164	39,368	17.6	3.1	11.5	23.7
จันทบุรี	145	30,471	16.4	2.1	12.2	20.6
ตราด	224	19,008	24.2	5.0	14.3	34.2
ฉะเชิงเทรา	148	43,428	17.3	2.8	11.8	22.7
ปราจีนบุรี	172	39,177	22.3	3.2	16.1	28.6
นครนายก	168	23,573	24.3	6.0	12.6	36.1
สระแก้ว	199	62,876	33.2	8.5	16.4	50.0
ราชบุรี	251	90,827	29.3	3.9	21.6	37.0
กาญจนบุรี	113	43,808	15.8	4.9	6.1	25.4
สุพรรณบุรี	158	62,720	19.5	3.0	13.6	25.3
นครปฐม	164	55,402	16.9	3.7	9.6	24.2
สมุทรสาคร	174	27,187	14.9	3.9	7.3	22.5
สมุทรสงคราม	141	9,603	12.8	2.3	8.4	17.2
เพชรบุรี	173	34,484	20.0	2.6	14.8	25.1
ประจวบคีรีขันธ์	190	40,210	22.6	2.7	17.4	27.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	230	234,272	24.1	2.9	18.4	29.8
บุรีรัมย์	307	219,672	38.5	5.6	27.4	49.6
สุรินทร์	237	107,326	21.9	6.3	9.6	34.2
ศรีสะเกษ	206	140,615	27.9	7.0	14.2	41.6
อุบลราชธานี	159	128,561	20.2	3.0	14.4	26.0
ยโสธร	223	44,197	21.7	6.7	8.5	34.9
ชัยภูมิ	204	100,819	25.4	3.9	17.8	33.0
อำนาจเจริญ	261	41,291	31.2	3.8	23.8	38.7
หนองบัวลำภู	247	56,170	30.1	4.6	21.1	39.1
ขอนแก่น	251	186,961	28.2	5.4	17.5	38.9
อุดรธานี	284	221,547	39.4	5.6	28.4	50.5
เลย	186	59,863	26.3	4.9	16.7	35.9
หนองคาย	233	84,713	30.0	5.6	19.1	41.0

ตารางที่ 16.1.6 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อก่อนเกิดปกติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	281	158,321	44.6	7.2	30.5	58.7
ร้อยเอ็ด	221	123,107	28.7	4.2	20.5	36.9
กาฬสินธุ์	271	132,121	37.0	4.9	27.4	46.5
สกลนคร	193	85,420	22.2	4.3	13.7	30.7
นครพนม	353	79,560	31.8	4.7	22.6	41.1
มุกดาหาร	144	17,952	15.4	2.4	10.5	20.2
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	223	151,163	25.4	4.2	17.2	33.6
ลำพูน	132	25,081	15.3	2.0	11.4	19.3
ลำปาง	161	59,344	19.5	3.0	13.7	25.3
อุตรดิตถ์	137	34,362	20.1	3.1	14.0	26.2
แพร่	228	47,005	25.5	4.2	17.2	33.7
น่าน	218	34,024	19.2	3.2	12.9	25.5
พะเยา	326	80,198	42.7	3.8	35.2	50.3
เชียงราย	213	94,113	22.0	4.0	14.1	29.9
แม่ฮ่องสอน	253	25,048	34.2	7.1	20.2	48.3
นครสวรรค์	181	70,363	20.9	3.5	14.0	27.7
อุทัยธานี	202	29,694	25.8	7.2	11.6	39.9
กำแพงเพชร	148	43,733	17.2	3.6	10.2	24.3
ตาก	134	23,777	14.1	2.4	9.4	18.8
สุโขทัย	79	17,300	7.3	1.9	3.5	11.1
พิษณุโลก	213	88,904	28.0	4.5	19.2	36.8
พิจิตร	177	51,460	24.7	3.5	17.8	31.5
เพชรบูรณ์	200	84,789	22.7	4.7	13.5	32.0
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	113	83,734	15.6	4.4	6.9	24.3
กระบี่	182	29,169	19.4	6.9	5.8	33.1
พังงา	196	23,912	27.2	7.4	12.6	41.7
ภูเก็ต	87	11,550	9.0	3.3	2.5	15.4
สุราษฎร์ธานี	194	79,331	22.4	3.1	16.2	28.5
ระนอง	132	7,575	13.3	3.4	6.6	20.0
ชุมพร	184	35,827	21.0	4.7	11.8	30.3
สงขลา	168	107,039	22.1	4.1	14.0	30.2
สตูล	130	19,018	19.0	4.1	11.0	27.0
ตรัง	183	50,061	23.3	3.8	15.8	30.8
พัทลุง	212	45,830	24.4	3.4	17.6	31.1
ปัตตานี	109	25,507	12.1	2.8	6.5	17.7
ยะลา	102	16,558	10.3	2.6	5.1	15.4
นราธิวาส	136	54,164	21.6	4.1	13.5	29.7

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 16.2.1 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ตามช่วงอายุ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
หญิง						
15 - 24	793	379,510	8.2	0.4	7.3	9.1
25 - 34	2,417	1,126,268	24.9	0.8	23.3	26.6
35 - 44	5,188	2,442,843	43.6	0.9	41.8	45.4
45 - 54	4,171	1,872,510	43.3	1.0	41.3	45.3
55 - 64	4,558	931,941	33.9	0.8	32.3	35.5
65 - 74	865	182,808	14.4	0.8	12.7	16.0
รวม 15-74	17,992	6,935,881	30.0	0.6	28.9	31.1

ตารางที่ 16.2.2 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	8,118	1,845,699	23.6	0.7	22.2	24.9
นอกเขตเทศบาล	9,874	5,090,182	33.3	0.8	31.8	34.9
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	127	336,429	16.3	1.8	12.9	19.8
ภาคกลาง	5,147	1,428,291	24.4	0.9	22.7	26.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,551	2,987,685	38.5	1.3	36.0	41.0
ภาคเหนือ	4,437	1,430,447	33.1	1.0	31.1	35.1
ภาคใต้	2,730	753,029	24.3	1.1	22.1	26.4
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	518	204,091	19.0	2.3	14.4	23.5
เขต สคร. ที่ 2	1,083	217,370	26.2	1.5	23.3	29.2
เขต สคร. ที่ 3	1,938	552,832	26.1	1.6	22.9	29.2
เขต สคร. ที่ 4	1,608	453,998	24.8	1.3	22.2	27.3
เขต สคร. ที่ 5	1,211	956,356	39.2	2.3	34.6	43.8
เขต สคร. ที่ 6	2,439	1,235,934	40.3	2.2	36.0	44.5
เขต สคร. ที่ 7	1,901	795,395	35.3	2.0	31.5	39.2
เขต สคร. ที่ 8	1,050	318,967	34.4	2.4	29.8	39.0
เขต สคร. ที่ 9	1,140	398,821	31.4	1.9	27.7	35.1
เขต สคร. ที่ 10	2,247	712,658	33.6	1.5	30.7	36.5
เขต สคร. ที่ 11	1,353	339,739	22.8	1.7	19.4	26.1
เขต สคร. ที่ 12	1,377	413,291	25.6	1.3	23.0	28.2



ตารางที่ 16.2.3 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	127	336,429	16.3	1.8	12.9	19.8
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	225	107,730	24.2	4.7	14.9	33.5
นนทบุรี	146	61,405	14.3	2.8	8.9	19.8
ปทุมธานี	171	74,932	20.6	5.5	9.8	31.4
พระนครศรีอยุธยา	201	67,754	23.9	3.3	17.5	30.3
อ่างทอง	254	35,376	31.0	3.9	23.3	38.8
ลพบุรี	229	83,288	29.8	2.8	24.3	35.2
สิงห์บุรี	235	24,754	30.5	4.4	21.8	39.2
ชัยนาท	202	32,688	26.0	2.9	20.3	31.7
สระบุรี	163	41,264	18.1	2.9	12.4	23.8
ชลบุรี	205	108,734	22.7	3.5	15.8	29.7
ระยอง	207	50,557	22.8	3.5	15.8	29.7
จันทบุรี	190	41,488	22.6	2.1	18.4	26.7
ตราด	213	17,839	22.9	4.2	14.7	31.2
ฉะเชิงเทรา	187	61,892	24.9	3.0	19.0	30.7
ปราจีนบุรี	240	57,371	32.6	4.4	24.0	41.1
นครนายก	199	26,626	27.6	3.1	21.4	33.7
สระแก้ว	272	80,595	42.1	6.6	29.2	55.0
ราชบุรี	295	113,242	36.2	3.2	30.0	42.5
กาญจนบุรี	147	50,238	18.1	2.6	13.0	23.2
สุพรรณบุรี	264	107,647	33.1	3.8	25.7	40.5
นครปฐม	148	50,980	15.6	2.5	10.7	20.5
สมุทรสาคร	148	28,704	17.5	3.0	11.7	23.4
สมุทรสงคราม	203	15,005	20.1	3.0	14.3	25.9
เพชรบุรี	179	38,704	22.4	2.6	17.3	27.6
ประจวบคีรีขันธ์	224	49,477	27.6	3.9	20.0	35.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	284	345,367	35.5	3.3	29.0	42.0
บุรีรัมย์	279	207,783	36.4	3.7	29.2	43.6
สุรินทร์	320	211,016	42.4	7.2	28.2	56.6
ศรีสะเกษ	246	182,472	35.6	5.2	25.4	45.8
อุบลราชธานี	221	183,453	28.7	2.6	23.7	33.7
ยโสธร	255	66,679	32.6	5.7	21.4	43.9
ชัยภูมิ	328	192,191	48.4	5.8	37.0	59.8
อำนาจเจริญ	344	60,339	44.6	4.7	35.4	53.7
หนองบัวลำภู	356	85,821	46.3	2.9	40.7	51.9
ขอนแก่น	279	226,428	34.1	5.7	23.0	45.3
อุดรธานี	292	238,594	42.3	5.7	31.2	53.4
เลย	300	93,968	40.6	3.6	33.5	47.8
หนองคาย	284	109,117	37.5	5.1	27.5	47.6

ตารางที่ 16.2.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหาหามะเร็งปากมดลูกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	318	160,287	45.0	6.1	33.0	57.0
ร้อยเอ็ด	315	166,547	38.6	4.6	29.5	47.6
กาฬสินธุ์	295	155,172	44.7	4.3	36.2	53.1
สกลนคร	295	166,735	42.8	6.2	30.7	54.9
นครพนม	329	100,783	40.4	4.8	30.9	49.8
มุกดาหาร	211	34,933	28.9	5.1	18.9	38.9
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	260	187,856	31.3	3.1	25.2	37.4
ลำพูน	214	43,089	27.0	4.0	19.2	34.8
ลำปาง	254	96,793	32.1	3.5	25.2	38.9
อุตรดิตถ์	186	45,123	25.7	3.3	19.1	32.3
แพร่	256	57,692	31.1	3.7	23.8	38.4
น่าน	286	58,181	32.7	3.4	26.1	39.3
พะเยา	389	95,878	51.1	3.2	44.8	57.5
เชียงราย	315	149,530	34.3	4.1	26.1	42.4
แม่ฮ่องสอน	273	23,638	32.3	3.0	26.5	38.1
นครสวรรค์	198	88,314	26.0	2.2	21.7	30.2
อุทัยธานี	312	47,065	40.9	6.2	28.7	53.1
กำแพงเพชร	271	98,767	37.5	4.6	28.4	46.6
ตาก	202	44,517	26.8	4.6	17.7	36.0
สุโขทัย	229	77,174	32.8	3.6	25.6	39.9
พิษณุโลก	255	112,877	35.4	5.0	25.5	45.2
พิจิตร	269	84,821	40.4	4.9	30.8	50.1
เพชรบูรณ์	268	119,131	31.8	3.1	25.8	37.9
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	151	98,961	18.1	2.4	13.3	22.9
กระบี่	209	39,656	26.4	4.4	17.8	35.0
พังงา	236	26,643	30.7	6.0	19.0	42.5
ภูเก็ต	89	14,827	11.6	4.3	3.2	20.0
สุราษฎร์ธานี	211	89,818	25.4	3.7	18.1	32.6
ระนอง	261	18,960	33.0	3.1	27.0	39.0
ชุมพร	196	50,875	30.1	6.9	16.6	43.7
สงขลา	200	130,748	27.1	2.8	21.7	32.5
สตูล	169	22,670	22.4	3.9	14.8	30.0
ตรัง	214	69,117	32.2	4.1	24.1	40.2
พัทลุง	328	77,468	40.9	3.0	34.9	46.9
ปัตตานี	167	37,007	17.6	2.7	12.2	22.9
ยะลา	151	21,775	13.7	2.3	9.2	18.2
นราธิวาส	148	54,505	21.3	3.7	14.1	28.5

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 16.2.4 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	14,377	5,746,348	40.62	0.75	39.14	42.09
เขตการปกครอง						
<i>ในเขตเทศบาล</i>	6,424	1,510,383	31.13	1.00	29.17	33.08
<i>นอกเขตเทศบาล</i>	7,953	4,235,964	45.57	1.03	43.55	47.59
ภาค						
<i>กรุงเทพมหานคร</i>	97	272,528	19.55	2.40	14.84	24.25
<i>ภาคกลาง</i>	3,950	1,153,985	34.32	1.13	32.11	36.53
<i>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</i>	4,445	2,476,723	51.31	1.69	47.99	54.63
<i>ภาคเหนือ</i>	3,712	1,228,918	44.16	1.35	41.51	46.81
<i>ภาคใต้</i>	2,173	614,195	34.47	1.51	31.52	37.43
เขต สคร.						
<i>เขต สคร. ที่ 1</i>	391	155,097	26.14	2.95	20.35	31.93
<i>เขต สคร. ที่ 2</i>	843	177,538	34.64	1.94	30.83	38.45
<i>เขต สคร. ที่ 3</i>	1,493	451,566	34.98	2.13	30.80	39.16
<i>เขต สคร. ที่ 4</i>	1,223	369,783	38.29	1.65	35.06	41.52
<i>เขต สคร. ที่ 5</i>	939	785,173	53.18	3.01	47.28	59.09
<i>เขต สคร. ที่ 6</i>	1,956	1,019,111	52.47	3.03	46.54	58.40
<i>เขต สคร. ที่ 7</i>	1,550	672,439	47.76	2.53	42.80	52.71
<i>เขต สคร. ที่ 8</i>	885	274,656	45.46	2.93	39.72	51.21
<i>เขต สคร. ที่ 9</i>	948	340,511	42.08	2.61	36.96	47.20
<i>เขต สคร. ที่ 10</i>	1,879	613,751	44.82	1.90	41.10	48.54
<i>เขต สคร. ที่ 11</i>	1,060	272,371	31.90	2.32	27.36	36.44
<i>เขต สคร. ที่ 12</i>	1,113	341,824	36.84	1.94	33.03	40.65

ตารางที่ 16.2.5 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกภายใน 1 ปีที่ผ่านมา  
ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	97	272,528	19.55	2.40	14.84	24.25
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	176	94,907	32.36	6.44	19.71	45.01
นนทบุรี	106	45,641	16.69	3.61	9.60	23.78
ปทุมธานี	120	51,039	35.05	7.12	21.06	49.03
พระนครศรีอยุธยา	165	58,416	33.53	4.61	24.48	42.58
อ่างทอง	215	30,952	35.44	4.66	26.28	44.59
ลพบุรี	179	68,769	40.18	3.04	34.21	46.14
สิงห์บุรี	169	18,494	40.76	5.56	29.84	51.68
ชัยนาท	157	27,901	38.40	4.67	29.22	47.58
สระบุรี	123	31,423	23.11	3.97	15.31	30.90
ชลบุรี	152	84,467	29.40	4.49	20.58	38.22
ระยอง	151	37,914	32.47	3.80	25.01	39.92
จันทบุรี	153	34,676	30.20	2.85	24.60	35.80
ตราด	164	15,363	32.40	6.02	20.58	44.23
ฉะเชิงเทรา	152	53,162	35.77	4.43	27.07	44.47
ปราจีนบุรี	192	47,332	41.38	5.53	30.52	52.23
นครนายก	154	22,101	40.29	5.20	30.07	50.51
สระแก้ว	199	61,645	54.29	6.20	42.11	66.48
ราชบุรี	234	95,250	53.41	4.46	44.65	62.18
กาญจนบุรี	116	42,514	29.56	4.18	21.34	37.78
สุพรรณบุรี	211	88,061	45.04	4.46	36.29	53.79
นครปฐม	107	41,492	29.98	3.00	24.09	35.87
สมุทรสาคร	110	23,354	23.27	3.57	16.26	30.28
สมุทรสงคราม	146	10,784	28.32	4.18	20.11	36.53
เพชรบุรี	135	31,146	36.38	3.82	28.88	43.89
ประจวบคีรีขันธ์	164	37,183	43.45	5.65	32.34	54.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	215	275,657	49.66	4.24	41.33	58.00
บุรีรัมย์	216	166,479	48.29	5.71	37.06	59.52
สุรินทร์	251	182,880	59.24	9.10	41.36	77.12
ศรีสะเกษ	204	158,283	44.65	6.23	32.40	56.89
อุบลราชธานี	177	157,123	42.12	3.79	34.67	49.58
ยโสธร	197	50,305	40.33	7.01	26.54	54.12
ชัยภูมิ	257	160,156	59.80	6.13	47.76	71.85
อำนาจเจริญ	291	53,190	58.06	5.01	48.21	67.90
หนองบัวลำภู	311	77,140	59.91	2.67	54.67	65.15
ขอนแก่น	223	189,371	43.54	8.52	26.79	60.29
อุดรธานี	225	194,496	56.80	6.71	43.61	69.99
เลย	248	83,254	53.95	4.93	44.27	63.64
หนองคาย	231	95,070	50.70	6.52	37.89	63.52

ตารางที่ 16.2.5 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหาหามะเร็งปากมดลูกภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	238	119,262	56.21	7.80	40.88	71.55
ร้อยเอ็ด	261	140,259	52.60	6.64	39.54	65.65
กาฬสินธุ์	219	120,258	55.80	5.04	45.89	65.70
สกลนคร	233	137,488	55.76	6.73	42.53	68.99
นครพนม	274	85,312	57.56	8.13	41.58	73.55
มุกดาหาร	174	30,738	44.32	7.01	30.54	58.10
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	214	158,367	40.70	4.29	32.26	49.13
ลำพูน	176	36,757	36.01	5.16	25.86	46.17
ลำปาง	215	83,630	42.83	4.77	33.45	52.21
อุตรดิตถ์	164	40,339	35.27	4.71	26.01	44.54
แพร่	221	51,212	42.17	5.09	32.16	52.19
น่าน	253	51,184	48.04	4.45	39.29	56.80
พะเยา	328	84,260	63.51	4.02	55.60	71.42
เชียงราย	256	128,118	46.17	4.84	36.66	55.69
แม่ฮ่องสอน	216	20,221	45.18	3.57	38.15	52.20
นครสวรรค์	165	73,926	33.63	2.98	27.77	39.49
อุทัยธานี	258	39,564	54.29	5.92	42.65	65.93
กำแพงเพชร	230	86,858	52.44	6.01	40.63	64.25
ตาก	168	37,354	37.02	6.04	25.13	48.90
สุโขทัย	200	69,530	45.60	5.09	35.58	55.62
พิษณุโลก	206	93,240	45.94	7.18	31.81	60.06
พิจิตร	232	74,308	50.97	5.25	40.64	61.30
เพชรบูรณ์	210	100,048	41.96	4.01	34.08	49.84
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	117	78,000	24.75	3.24	18.38	31.12
กระบี่	173	32,801	37.35	5.95	25.64	49.05
พังงา	194	22,405	43.28	6.75	30.00	56.57
ภูเก็ต	59	10,567	15.82	5.15	5.68	25.97
สุราษฎร์ธานี	157	71,729	36.75	5.31	26.31	47.19
ระนอง	209	15,956	46.83	4.36	38.26	55.41
ชุมพร	151	40,913	39.72	8.95	22.11	57.33
สงขลา	159	106,871	37.68	3.97	29.86	45.49
สตูล	133	17,426	30.13	5.39	19.53	40.73
ตรัง	189	63,312	48.14	6.54	35.27	61.02
พัทลุง	266	63,919	53.52	3.87	45.90	61.14
ปัตตานี	131	30,072	27.91	3.82	20.39	35.43
ยะลา	121	17,838	20.80	4.10	12.73	28.87
นราธิวาส	114	42,385	29.86	5.64	18.76	40.95

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

ตารางที่ 16.2.6 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
รวมทั้งประเทศ	22,494	8,871,826	62.71	0.68	61.37	64.04
เขตการปกครอง						
ในเขตเทศบาล	10,421	2,509,354	51.71	1.16	49.43	53.99
นอกเขตเทศบาล	12,073	6,362,473	68.45	0.83	66.82	70.07
ภาค						
กรุงเทพมหานคร	166	482,574	34.61	3.23	28.29	40.94
ภาคกลาง	6,720	1,992,698	59.26	1.31	56.69	61.83
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,336	3,456,217	71.61	1.18	69.30	73.91
ภาคเหนือ	5,706	1,921,071	69.04	1.18	66.72	71.36
ภาคใต้	3,566	1,019,267	57.21	1.52	54.22	60.19
เขต สคร.						
เขต สคร. ที่ 1	680	282,298	47.58	3.67	40.37	54.78
เขต สคร. ที่ 2	1,434	319,664	62.37	2.29	57.87	66.86
เขต สคร. ที่ 3	2,598	802,732	62.18	2.29	57.68	66.67
เขต สคร. ที่ 4	2,008	588,004	60.89	1.99	56.99	64.79
เขต สคร. ที่ 5	1,318	1,061,202	71.88	2.24	67.49	76.27
เขต สคร. ที่ 6	2,757	1,440,033	74.14	2.06	70.10	78.19
เขต สคร. ที่ 7	2,261	954,982	67.82	1.77	64.36	71.29
เขต สคร. ที่ 8	1,274	407,654	67.48	2.05	63.46	71.50
เขต สคร. ที่ 9	1,499	529,127	65.39	2.33	60.82	69.96
เขต สคร. ที่ 10	2,933	984,289	71.88	1.77	68.41	75.35
เขต สคร. ที่ 11	1,802	490,249	57.42	2.19	53.12	61.72
เขต สคร. ที่ 12	1,764	529,018	57.01	2.11	52.87	61.16

ตารางที่ 16.2.7 ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  
ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	166	482,574	34.61	3.23	28.29	40.94
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	323	184,990	63.07	5.20	52.85	73.29
นนทบุรี	234	113,092	41.35	5.91	29.74	52.96
ปทุมธานี	163	68,637	47.13	7.13	33.12	61.14
พระนครศรีอยุธยา	283	100,569	57.73	4.87	48.16	67.30
อ่างทอง	325	49,346	56.49	5.00	46.67	66.32
ลพบุรี	280	112,825	65.92	3.04	59.94	71.89
สิงห์บุรี	250	27,751	61.16	6.47	48.45	73.88
ชัยนาท	287	47,006	64.70	3.29	58.23	71.17
สระบุรี	292	82,736	60.84	6.38	48.31	73.37
ชลบุรี	253	166,163	57.83	8.11	41.90	73.77
ระยอง	259	64,427	55.18	3.26	48.76	61.59
จันทบุรี	272	64,111	55.83	2.21	51.49	60.17
ตราด	323	29,579	62.39	9.37	43.98	80.80
ฉะเชิงเทรา	262	91,485	61.56	4.30	53.11	70.00
ปราจีนบุรี	341	78,038	68.22	5.44	57.53	78.90
นครนายก	266	37,922	69.13	3.89	61.48	76.78
สระแก้ว	299	86,017	75.76	4.20	67.51	84.01
ราชบุรี	303	122,389	68.63	3.57	61.62	75.65
กาญจนบุรี	225	81,987	57.01	7.91	41.47	72.54
สุพรรณบุรี	327	137,622	70.39	4.42	61.70	79.07
นครปฐม	208	76,962	55.60	4.55	46.67	64.54
สมุทรสาคร	237	47,503	47.34	5.19	37.14	57.53
สมุทรสงคราม	243	17,664	46.39	6.38	33.85	58.93
เพชรบุรี	211	46,956	54.85	4.32	46.36	63.34
ประจวบคีรีขันธ์	254	56,921	66.51	4.14	58.37	74.65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	302	387,720	69.85	3.16	63.65	76.06
บุรีรัมย์	311	234,919	68.14	5.07	58.17	78.12
สุรินทร์	354	237,203	76.83	5.92	65.19	88.48
ศรีสะเกษ	296	234,227	66.07	3.38	59.41	72.72
อุบลราชธานี	269	228,690	61.31	3.14	55.15	67.47
ยโสธร	365	90,115	72.25	4.53	63.34	81.16
ชัยภูมิ	351	201,359	75.19	4.59	66.17	84.21
อำนาจเจริญ	388	70,345	76.78	3.82	69.28	84.29
หนองบัวลำภู	432	106,547	82.75	2.67	77.51	87.99
ขอนแก่น	318	288,012	66.22	5.54	55.33	77.11
อุดรธานี	335	265,213	77.45	3.80	69.97	84.93
เลย	342	113,296	73.42	3.43	66.68	80.16
หนองคาย	318	131,855	70.32	5.22	60.06	80.59

ตารางที่ 16.2.7 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ของสตรีที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหาหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ในประชากรหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	329	169,414	79.85	5.82	68.41	91.29
ร้อยเอ็ด	380	209,503	78.56	3.46	71.76	85.36
กาฬสินธุ์	303	156,192	72.47	4.89	62.85	82.09
สกลนคร	315	181,404	73.57	4.70	64.33	82.81
นครพนม	348	106,907	72.14	7.86	56.68	87.59
มุกดาหาร	280	43,294	62.42	7.33	48.01	76.84
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	352	273,386	70.25	4.50	61.40	79.10
ลำพูน	361	74,228	72.72	3.86	65.13	80.32
ลำปาง	355	138,028	70.69	3.60	63.62	77.76
อุตรดิตถ์	248	62,533	54.68	4.15	46.52	62.84
แพร่	363	81,913	67.46	5.28	57.07	77.85
น่าน	384	79,967	75.06	4.74	65.74	84.37
พะเยา	442	109,439	82.49	2.13	78.31	86.67
เชียงราย	365	196,685	70.89	4.11	62.81	78.96
แม่ฮ่องสอน	311	30,642	68.46	6.40	55.87	81.05
นครสวรรค์	309	149,838	68.16	2.40	63.44	72.88
อุทัยธานี	322	47,655	65.40	5.18	55.22	75.58
กำแพงเพชร	316	110,566	66.76	5.16	56.61	76.91
ตาก	287	59,836	59.29	5.96	47.58	71.01
สุโขทัย	340	112,948	74.07	4.12	65.97	82.18
พิษณุโลก	312	135,947	66.98	5.83	55.52	78.43
พิจิตร	327	99,596	68.31	4.10	60.26	76.37
เพชรบูรณ์	312	157,862	66.20	4.32	57.71	74.70
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	232	177,988	56.47	3.12	50.34	62.61
กระบี่	298	55,517	63.21	6.86	49.71	76.71
พังงา	304	34,027	65.73	6.94	52.08	79.38
ภูเก็ต	141	23,526	35.23	4.87	25.65	44.80
สุราษฎร์ธานี	266	118,748	60.84	5.73	49.57	72.12
ระนอง	313	22,200	65.16	4.36	56.58	73.74
ชุมพร	248	58,244	56.55	8.54	39.74	73.35
สงขลา	243	163,375	57.59	4.43	48.87	66.32
สตูล	241	31,964	55.26	5.08	45.27	65.26
ตรัง	277	80,722	61.38	6.41	48.77	73.99
พัทลุง	378	91,165	76.34	2.92	70.59	82.09
ปัตตานี	211	56,362	52.32	4.62	43.22	61.41
ยะลา	196	33,279	38.81	5.04	28.89	48.72
นราธิวาส	218	72,150	50.83	6.60	37.84	63.81

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%



ส่วนที่ 17  
การได้รับการตรวจเลือด  
เพื่อหา HIV



ตารางที่ 17.1.1 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งไม่นับรวมการบริจาคเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2553

ช่วงอายุ (ปี) / เพศ	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>ชาย</b>						
15 - 24	1,198	561,700	11.1	0.6	9.9	12.4
25 - 34	2,636	1,105,395	23.5	0.8	22.0	25.0
35 - 44	2,864	1,246,332	23.9	0.9	22.1	25.6
45 - 54	1,970	880,949	21.7	1.2	19.4	24.0
55 - 64	2,167	372,601	14.8	0.6	13.5	16.0
65 - 74	743	122,532	10.8	0.7	9.4	12.1
รวม	11,578	4,289,511	18.9	0.5	17.9	19.9
<b>หญิง</b>						
15 - 24	1,893	909,618	19.5	0.9	17.7	21.4
25 - 34	3,905	1,716,529	37.5	1.0	35.5	39.5
35 - 44	3,758	1,643,486	29.1	0.9	27.4	30.8
45 - 54	1,714	780,331	17.6	0.8	16.0	19.3
55 - 64	1,268	276,946	9.7	0.6	8.5	10.9
65 - 74	416	85,125	6.4	0.6	5.2	7.6
รวม	12,954	5,412,035	23.1	0.6	21.9	24.2
<b>ชายและหญิง</b>						
15 - 24	3,091	1,471,318	15.2	0.6	14.0	16.3
25 - 34	6,541	2,821,924	30.4	0.7	29.0	31.9
35 - 44	6,622	2,889,818	26.6	0.7	25.2	28.0
45 - 54	3,684	1,661,281	19.6	0.8	18.1	21.1
55 - 64	3,435	649,547	12.1	0.5	11.1	13.2
65 - 74	1,159	207,658	8.4	0.5	7.4	9.4
รวมทั้งประเทศ	24,532	9,701,546	21.0	0.5	20.1	21.9

ตารางที่ 17.1.2 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งไม่นับรวมการบริจาคเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่	จำนวน ตัวอย่าง (n)	การประมาณ จำนวน ประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ การประมาณสัดส่วน (Std Error of percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่น ของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
<b>เขตการปกครอง</b>						
ในเขตเทศบาล	13,019	3,395,766	22.1	0.8	20.5	23.7
นอกเขตเทศบาล	11,513	6,305,780	20.5	0.6	19.3	21.6
<b>ภาค</b>						
กรุงเทพมหานคร	309	792,729	19.3	2.5	14.3	24.2
ภาคกลาง	7,267	2,125,895	18.4	0.8	16.8	20.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,164	3,257,845	20.5	0.8	18.9	22.1
ภาคเหนือ	6,600	2,277,920	26.3	0.9	24.5	28.2
ภาคใต้	4,192	1,247,157	20.8	1.2	18.5	23.1
<b>เขต สคร.</b>						
เขต สคร. ที่ 1	870	402,663	19.6	2.2	15.2	24.0
เขต สคร. ที่ 2	1,233	260,293	15.8	1.1	13.7	18.0
เขต สคร. ที่ 3	3,006	894,010	21.3	1.5	18.3	24.3
เขต สคร. ที่ 4	2,158	568,930	15.5	1.1	13.3	17.7
เขต สคร. ที่ 5	1,222	969,776	19.9	1.7	16.5	23.2
เขต สคร. ที่ 6	2,726	1,497,146	23.5	1.2	21.1	25.9
เขต สคร. ที่ 7	2,216	790,923	17.2	1.1	15.1	19.3
เขต สคร. ที่ 8	1,179	419,528	21.6	1.8	17.9	25.2
เขต สคร. ที่ 9	1,499	443,904	17.6	1.4	14.8	20.4
เขต สคร. ที่ 10	3,922	1,414,487	33.9	1.6	30.8	36.9
เขต สคร. ที่ 11	2,159	681,502	22.8	2.1	18.7	26.8
เขต สคร. ที่ 12	2,033	565,655	18.8	1.0	16.8	20.8

ตารางที่ 17.1.3 ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งไม่นับรวมการบริจาคเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
กรุงเทพมหานคร	309	792,729	19.3	2.5	14.0	24.5
ภาคกลาง						
สมุทรปราการ	261	130,564	15.3	3.7	8.1	22.5
นนทบุรี	215	103,799	13.1	3.0	7.2	19.1
ปทุมธานี	290	161,301	23.2	4.1	15.2	31.2
พระนครศรีอยุธยา	365	137,562	24.2	3.0	18.2	30.1
อ่างทอง	339	45,364	20.9	2.3	16.4	25.5
ลพบุรี	241	90,179	16.1	2.3	11.6	20.6
สิงห์บุรี	222	23,993	14.7	2.3	10.2	19.1
ชัยนาท	217	36,985	14.8	2.0	10.9	18.6
สระบุรี	214	63,772	14.0	2.3	9.5	18.4
ชลบุรี	413	287,269	30.3	3.8	22.8	37.9
ระยอง	337	89,328	20.5	2.3	15.9	25.1
จันทบุรี	407	103,493	27.5	2.6	22.3	32.6
ตราด	530	47,154	29.7	6.1	17.7	41.8
ฉะเชิงเทรา	276	83,475	16.7	3.2	10.4	23.0
ปราจีนบุรี	276	63,740	18.5	2.7	13.3	23.8
นครนายก	256	28,983	15.3	2.9	9.7	21.0
สระแก้ว	250	60,002	15.4	3.2	9.0	21.8
ราชบุรี	288	100,075	16.1	3.0	10.3	22.0
กาญจนบุรี	304	99,453	17.4	3.1	11.2	23.5
สุพรรณบุรี	283	110,290	17.2	2.7	11.9	22.4
นครปฐม	189	66,112	10.6	2.4	5.8	15.4
สมุทรสาคร	238	60,687	17.1	4.7	8.0	26.3
สมุทรสงคราม	356	25,412	17.5	3.4	10.8	24.2
เพชรบุรี	284	62,131	18.2	2.4	13.4	22.9
ประจวบคีรีขันธ์	216	44,770	12.3	2.4	7.7	17.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
นครราชสีมา	280	374,723	19.7	2.2	15.4	24.1
บุรีรัมย์	350	230,268	20.1	3.9	12.4	27.8
สุรินทร์	328	245,732	24.7	5.1	14.6	34.7
ศรีสะเกษ	226	138,987	13.2	2.5	8.2	18.2
อุบลราชธานี	297	206,588	15.7	1.6	12.6	18.8
ยโสธร	381	103,559	25.4	4.5	16.6	34.1
ชัยภูมิ	264	119,053	14.1	2.9	8.5	19.7
อำนาจเจริญ	523	84,275	30.7	4.2	22.4	39.0
หนองบัวลำภู	437	105,312	27.9	2.1	23.7	32.1
ขอนแก่น	311	264,607	20.0	3.0	14.1	25.8
อุดรธานี	462	352,390	30.8	3.3	24.2	37.3
เลย	295	91,690	20.6	1.7	17.3	23.9
หนองคาย	314	139,509	21.5	2.5	16.5	26.4

ตารางที่ 17.1.3 (ต่อ) ความชุก (ร้อยละ) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งไม่นับรวมการบริจาคเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2553

จังหวัด	จำนวนตัวอย่าง (n)	การประมาณจำนวนประชากร (Weighted Frequency)	ร้อยละ (Percent)	ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณสัดส่วน (Std Error of Percent)	95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าประมาณสัดส่วน (95% Confidence Limits for Percent)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)						
มหาสารคาม	360	178,471	24.9	4.6	15.8	34.0
ร้อยเอ็ด	330	249,170	25.1	3.4	18.4	31.7
กาฬสินธุ์	217	115,997	16.1	3.0	10.2	22.1
สกลนคร	217	124,571	15.3	2.9	9.5	21.0
นครพนม	330	94,981	19.5	2.7	14.3	24.7
มุกดาหาร	242	37,963	15.3	2.7	10.0	20.5
ภาคเหนือ						
เชียงใหม่	605	420,467	36.4	3.7	29.3	43.6
ลำพูน	415	82,881	26.5	3.4	19.7	33.2
ลำปาง	456	177,830	29.5	3.5	22.6	36.3
อุตรดิตถ์	318	67,320	19.1	3.2	12.9	25.4
แพร่	364	91,220	25.2	2.7	20.0	30.5
น่าน	434	107,370	29.1	3.2	22.8	35.4
พะเยา	566	146,330	39.1	4.7	29.8	48.4
เชียงราย	655	335,282	39.3	4.2	31.1	47.5
แม่ฮ่องสอน	427	53,106	36.1	6.0	24.3	47.8
นครสวรรค์	279	172,920	22.7	3.4	15.9	29.5
อุทัยธานี	277	37,490	15.6	2.2	11.3	19.9
กำแพงเพชร	297	104,163	19.7	3.2	13.5	25.9
ตาก	323	58,918	17.4	2.5	12.5	22.3
สุโขทัย	304	85,674	18.5	3.6	11.5	25.5
พิษณุโลก	249	99,436	15.7	2.7	10.4	20.9
พิจิตร	326	104,956	25.3	2.9	19.6	30.9
เพชรบูรณ์	305	132,556	17.9	3.2	11.6	24.2
ภาคใต้						
นครศรีธรรมราช	261	239,163	22.2	4.0	14.3	30.1
กระบี่	368	76,045	25.2	6.6	12.3	38.2
พังงา	315	30,605	17.0	3.0	11.1	22.9
ภูเก็ต	286	46,305	19.3	3.1	13.3	25.3
สุราษฎร์ธานี	325	157,915	22.1	2.3	17.5	26.7
ระนอง	241	22,134	18.6	3.0	12.8	24.5
ชุมพร	363	109,335	30.7	8.7	13.5	47.8
สงขลา	279	155,458	20.4	2.6	15.2	25.5
สตูล	310	36,670	18.1	2.1	14.0	22.3
ตรัง	238	70,721	15.9	2.1	11.8	20.1
พัทลุง	360	91,940	24.5	1.7	21.2	27.8
ปัตตานี	288	68,233	16.2	1.9	12.5	19.9
ยะลา	267	53,481	16.8	2.9	11.1	22.4
นราธิวาส	291	89,153	18.4	3.3	12.0	24.9

ควรแปลผลอย่างระมัดระวังในกรณีที่จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 50 และ/หรือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% มากกว่า 20%

**ภาคผนวก 1**

**ตารางสรุปผลการสำรวจ**

**เปรียบเทียบระหว่างปี**

**พ.ศ.2548 -พ.ศ.2553**





สรุปผลการสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่สำคัญ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553

ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บที่สำคัญ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
ส่วนที่ 1	สุขภาพโดยทั่วไป									
	ความชุกของผู้ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม	59.0 (58.1, 60.0)	64.9 (63.8, 15.9)	53.4 (52.3, 54.6)	64.7 (63.2, 66.2)	70.3 (68.9, 71.6)	59.3 (57.6, 61.0)	72.4 (71.5, 73.3)	76.2 (75.3, 77.1)	68.8 (67.7, 69.8)
	ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือได้รับบาดเจ็บใน 30 วันที่ผ่านมา	1.4 (1.3, 1.4)	1.1 (1.0, 1.2)	1.6 (1.5, 1.7)	1.2 (1.1, 1.3)	1.0 (0.9, 1.0)	1.4 (1.3, 1.5)	1.1 (0.9, 1.1)	0.8 (0.8, 0.9)	1.1 (1.0, 1.2)
	ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใจใน 30 วันที่ผ่านมา	1.1 (1.0, 1.2)	0.8 (0.8, 0.9)	1.3 (1.2, 1.4)	0.8 (0.7, 0.9)	0.7 (0.6, 0.8)	1.0 (0.8,1.1)	0.8 (0.7, 0.8)	0.6 (0.6, 0.7)	0.9 (0.8, 1.0)
ส่วนที่ 2	การเข้าถึงบริการสุขภาพ									
	ความชุกของผู้ที่ทราบว่าตนเองมีการประกันสุขภาพ	97.6 (97.3, 97.9)	97.4 (97.1, 97.7)	97.8 (97.5, 98.1)	94.2 (93.5, 94.9)	94.0 (93.3, 94.6)	94.4 (93.6, 95.2)	97.0 (96.7, 97.4)	96.6 (96.2, 97.1)	97.4 (97.1, 97.8)
	ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	75.6 (74.6, 76.5)	75.6 (74.5, 76.7)	75.5 (74.5, 76.6)	72.0 (70.5, 73.5)	71.3 (69.8, 72.7)	72.7 (71.1, 74.3)	74.4 (73.2, 75.7)	74.4 (72.8, 76.0)	74.5 (73.3, 75.6)
	ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบประกันสังคม	12.6 (11.9, 13.2)	13.3 (12.5, 14.0)	11.9 (11.1, 12.6)	13.8 (12.8, 14.9)	14.5 (13.4, 15.7)	13.2 (12.2, 14.2)	15.4 (14.7, 16.1)	15.6 (14.7, 16.4)	15.2 (14.5, 15.9)
	ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	8.6 (7.9, 9.4)	8.2 (7.3, 9.0)	9.0 (8.3, 9.8)	8.6 (7.5, 9.6)	8.9 (7.4, 10.4)	8.2 (7.3, 9.0)	7.7 (6.8, 8.7)	7.5 (6.3, 8.8)	7.9 (7.2, 8.7)
	ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพในระบบสวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.1 (1.0, 1.3)	1.2 (0.9, 1.4)	1.1 (0.9, 1.3)	1.0 (0.9, 1.2)	1.0 (0.9, 1.2)	1.1 (0.8, 1.3)	1.5 (1.3, 1.7)	1.6 (1.2, 1.9)	1.4 (1.2, 1.6)
	ความชุกของผู้ที่มีการประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน	6.0 (5.5, 6.5)	6.1 (5.6, 6.7)	5.8 (5.3, 6.4)	6.0 (5.4, 6.7)	6.5 (5.8, 7.2)	5.6 (5.0, 6.2)	5.8 (5.4, 6.3)	6.0 (5.5, 6.5)	5.7 (5.2, 6.1)
	ความชุกของผู้ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความเจ็บป่วยโดยไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ให้กับสถานบริการสุขภาพต่างๆ ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.4 (44.2, 46.7)	42.5 (41.2, 43.9)	48.2 (46.8, 49.6)	38.5 (36.6, 40.5)	36.0 (34.2, 37.9)	40.9 (38.8, 43.0)	47.0 (45.3, 48.7)	46.3 (44.4, 48.1)	47.7 (45.9, 49.4)
ความชุกของผู้ที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วย แต่ไม่สามารถไปพบได้เพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายใน 12 เดือนที่ผ่านมา	7.8 (7.3, 8.2)	6.7 (6.2, 7.3)	8.7 (8.2, 9.3)	6.5 (5.8, 7.3)	5.8 (5.1, 6.5)	7.2 (6.3, 8.0)	6.9 (6.1, 7.8)	7.0 (6.0, 8.1)	6.8 (5.9, 7.8)	

ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บที่สำคัญ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
	ความชุกของการไปพบทันตแพทย์หรือ ทันตภิบาลเพื่อรักษาฟันและเหงือก ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.8 (22.1, 23.6)	18.4 (17.6, 19.2)	27.1 (26.2, 28.0)	22.1 (20.9-23.3)	18.4 (17.3, 19.6)	25.7 (24.2, 27.1)	20.7 (19.8-21.5)	16.4 (15.5, 17.3)	24.7 (23.6, 25.8)
ส่วนที่ 3	ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน ความชุกของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย $\geq 25$ กก./ม. <sup>2</sup> )	16.1 (15.6, 16.6)	14.4 (13.8, 15.0)	17.7 (17.1, 18.4)	19.1 (18.3-19.9)	16.8 (16.0, 17.7)	21.3 (20.3, 22.4)	21.3 (20.7-21.9)	18.6 (17.9, 19.3)	24.0 (23.3, 24.8)
	ความชุกของผู้ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย $\geq 30$ กก./ม. <sup>2</sup> )	3.0 (2.9, 3.2)	2.2 (2.0, 2.4)	3.8 (3.6, 4.1)	3.7 (3.5-4.0)	2.7 (2.5, 2.9)	4.7 (4.4, 5.1)	4.4 (4.1-4.6)	3.0 (2.7, 3.4)	5.7 (5.3, 6.0)
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่มีเส้นรอบเอว เกิน ( $\geq 90$ เซนติเมตร ในชาย และ $\geq 80$ เซนติเมตร ในหญิง)	N.A.	N.A.	N.A.	21.1 (20.3-21.9)	9.7 (9.1, 10.3)	32.2 (31.0, 33.4)	30.8 (30.2-31.5)	15.4 (14.7, 16.1)	45.5 (44.6, 46.5)
ส่วนที่ 4	การรับประทานผัก ผลไม้ ความชุกของผู้ที่รับประทานผักหรือผลไม้ รวมกัน 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวัน	17.3 (16.3, 18.4)	15.8 (14.7, 16.8)	18.9 (17.6, 20.1)	22.5 (20.2-24.9)	20.5 (18.2, 22.9)	24.5 (22.1, 26.9)	21.7 (20.4-23.1)	19.6 (18.2, 20.9)	23.8 (22.3, 25.3)
ส่วนที่ 5	กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ	91.5 (91.0, 92.0)	92.7 (92.2, 93.2)	90.4 (89.8, 91.0)	92.5 (91.9-93.1)	94.3 (93.7, 94.9)	90.8 (90.1, 91.5)	82.2 (81.2-83.3)	83.2 (82.1, 84.3)	81.3 (80.1, 82.5)
	ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง และอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์	30.9 (30.0, 31.9)	35.3 (34.1, 36.4)	26.8 (25.7, 27.8)	37.5 (36.3-38.7)	42.4 (40.7, 44.0)	32.7 (31.7, 33.7)	34.3 (33.2-35.5)	39.3 (37.8, 40.7)	29.6 (28.4, 30.9)
ส่วนที่ 6	การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ ความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ในปัจจุบัน	37.4 (36.7, 38.2)	59.1 (58.0, 60.2)	16.9 (16.1, 17.7)	36.1 (34.9-37.3)	57.4 (56.0, 58.8)	15.5 (14.2, 16.8)	29.5 (28.6-30.3)	47.4 (46.2, 48.7)	12.4 (11.7, 13.1)
	ความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์อย่างหนัก ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน)	3.6 (3.3, 3.8)	6.3 (5.8, 6.7)	1.0 (0.9, 1.2)	3.6 (3.3-3.9)	6.9 (6.3, 7.6)	0.6 (0.5, 0.8)	4.3 (4.0-4.6)	7.3 (6.8, 7.9)	1.4 (1.2, 1.6)
	ความชุกของผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา	14.0 (13.4, 14.5)	26.1 (25.0, 27.2)	3.5 (3.2, 3.8)	13.7 (12.6-14.7)	26.1 (24.1, 28.0)	3.1 (2.7, 3.5)	9.2 (8.7-9.7)	17.6 (16.6, 18.5)	2.3 (2.0, 2.6)

ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บที่สำคัญ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
ส่วนที่ 7	การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบ ในปัจจุบัน	22.3 (21.7, 22.9)	43.1 (42.1, 44.2)	2.7 (2.4, 3.0)	21.5 (21.0, 22.1)	41.5 (40.6, 42.5)	2.6 (2.1, 12.7)	18.7 (18.2, 18.3)	36.6 (35.6, 37.6)	2.2 (1.9, 2.4)
	ค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มสูบบุหรี่จนหมดมวน เป็นครั้งแรก	17.9 (17.8, 18.0)	17.7 (17.6, 17.8)	21.0 (20.5, 21.5)	17.9 (17.8, 18.0)	17.7 (17.6, 17.8)	21.1 (20.7, 21.6)	17.8 (17.7, 18.0)	17.7 (17.6, 17.8)	20.2 (19.6, 20.9)
	ความชุกของผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราะอยากเลิกสูบบุหรี่ ใน 12 เดือน ที่ผ่านมา	55.3 (53.7, 57.0)	55.1 (53.5, 56.8)	58.4 (53.7, 63.1)	52.6 (50.1, 55.0)	52.1 (49.7, 54.6)	59.3 (55.1, 63.5)	48.8 (46.9, 50.7)	48.9 (47.0, 50.9)	46.5 (41.8, 51.2)
ส่วนที่ 8	ความดันโลหิตสูง ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดัน โลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	65.8 (64.8, 66.8)	57.6 (56.4, 58.8)	73.6 (72.6, 74.7)	66.0 (64.5, 67.5)	58.6 (57.1, 60.2)	73.1 (71.3, 74.8)	68.0 (66.9, 69.1)	62.6 (61.3, 63.8)	73.2 (72.1, 74.3)
	ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดัน โลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 35-74 ปี	N.A.	N.A.	N.A.	75.5 (74.2, 76.9)	68.8 (67.1, 70.5)	81.5 (80.1, 82.8)	77.8 (76.7, 79.0)	73.2 (71.8, 74.6)	82.0 (80.8, 83.2)
	ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่ามีความ ดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15-74 ปี	8.3 (8.0, 8.6)	6.6 (6.2, 6.9)	10.0 (9.5, 10.4)	9.4 (8.8, 10.0)	7.6 (7.0, 8.2)	11.2 (10.5, 11.9)	9.1 (8.8, 9.5)	7.4 (6.9, 7.8)	10.8 (10.3, 11.3)
	ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดัน โลหิตทุกเดือน ในประชากรที่ทราบว่ามี ความดันโลหิตสูงอายุ 15-74 ปี	52.8 (50.8, 55.8)	47.7 (44.0, 49.3)	52.2 (48.8, 53.6)	50.8 (48.8, 52.8)	47.3 (44.5, 50.1)	53.0 (51.1, 54.9)	52.4 (49.9, 54.9)	51.3 (47.2, 55.3)	53.1 (50.4, 55.8)
	จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรที่มีความดัน โลหิตสูงอายุ 15-74 ปี ไปพบแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับ การรักษาใน 1 ปี ที่ผ่านมา	6.5 (6.3, 6.8)	6.1 (5.8, 6.5)	6.8 (6.5, 7.1)	6.8 (6.5, 7.1)	6.6 (6.1, 7.1)	7.0 (6.6, 7.3)	6.6 (6.4, 6.9)	6.5 (6.1, 7.0)	6.7 (6.5, 7.0)
ส่วนที่ 9	โรคเบาหวาน ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับ น้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	32.9 (32.0, 33.9)	27.0 (26.0, 28.0)	38.6 (37.5, 39.6)	39.3 (37.4, 41.2)	32.9 (31.1, 34.7)	45.5 (43.4, 47.6)	45.6 (44.3, 46.8)	40.2 (38.8, 41.6)	50.7 (49.4, 52.0)

ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บที่สำคัญ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
	ความชุกของผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 35-74 ปี	N.A.	N.A.	N.A.	51.3 (49.0, 53.6)	44.5 (42.3, 46.7)	57.3 (54.8, 59.9)	59.4 (58.0, 60.8)	53.7 (52.0, 55.4)	64.4 (63.1, 66.0)
	ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเป็นโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ปี	3.7 (3.5, 3.9)	2.6 (2.4, 2.8)	4.7 (4.4, 5.0)	3.9 (3.7, 4.2)	2.6 (2.4, 2.8)	5.3 (4.9, 5.6)	4.2 (4.0, 4.4)	3.1 (2.8, 3.3)	5.3 (5.0, 5.6)
	ความชุกของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกเดือน	57.0 (54.0, 60.1)	54.0 (49.9, 58.2)	58.7 (55.0, 62.4)	46.8 (43.8, 49.8)	45.3 (41.2, 49.4)	47.6 (44.4, 50.7)	46.0 (43.1, 49.0)	46.6 (41.6, 51.6)	45.7 (42.4, 49.1)
	จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ประชากรอายุ 15-74 ปีที่เป็นโรคเบาหวานไปพบแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการรักษาใน 1 ปีที่ผ่านมา	8.0 (7.7, 8.3)	7.3 (6.9, 7.7)	8.4 (8.0, 8.7)	8.1 (7.8, 8.4)	8.1 (7.7, 8.6)	8.1 (7.6, 8.6)	6.7 (6.3, 7.0)	6.1 (5.6, 6.7)	7.0 (6.6, 7.3)
<b>ส่วนที่ 10</b>	<b>โรคเรื้อรัง</b>									
	ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต	0.9 (0.8, 1.0)	0.9 (0.8, 1.0)	0.9 (0.7, 1.0)	1.1 (1.0, 1.2)	1.3 (1.1, 1.5)	0.9 (0.8, 1.0)	1.6 (1.4, 1.8)	1.8 (1.6, 2.1)	1.4 (1.1, 1.6)
	ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด	1.1 (1.0, 1.2)	0.8 (0.7, 0.9)	1.4 (1.2, 1.5)	1.5 (1.3, 1.6)	1.3 (1.1, 1.4)	1.7 (1.5, 1.9)	1.6 (1.4, 1.8)	1.6 (1.4, 1.9)	1.6 (1.4, 1.8)
	ความชุกของผู้ที่เคยมีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นหลอดเลือดลมอัมกเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง	1.1 (1.0, 1.2)	1.1 (1.0, 1.3)	1.0 (0.9, 1.2)	0.8 (0.7, 0.9)	1.0 (0.8, 1.1)	0.6 (0.5, 0.8)	1.3 (1.1, 1.5)	1.6 (1.3, 1.8)	1.1 (0.9, 1.3)
	ความชุกของผู้ที่มีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรัง	0.4 (0.3, 0.5)	0.4 (0.3, 0.4)	0.4 (0.3, 0.5)	0.7 (0.6, 0.7)	0.6 (0.5, 0.7)	0.7 (0.6, 0.8)	1.2 (1.1, 1.3)	1.3 (1.0, 1.5)	1.1 (0.9, 1.4)
ความชุกของผู้ที่มีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดในปัจจุบัน	1.6 (1.5, 1.7)	1.5 (1.3, 1.6)	1.8 (1.1, 1.9)	1.4 (1.2, 1.5)	1.3 (1.2, 1.5)	1.4 (1.2, 1.6)	1.2 (1.1, 1.3)	1.0 (0.8, 1.1)	1.5 (1.3, 1.7)	
<b>ส่วนที่ 11</b>	<b>การตรวจหามะเร็งปากมดลูก</b>									
	ความชุกของประชากรหญิงอายุ 35-74 ปี ผู้ที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปี	-	-	43.7 (42.4, 45.0)	-	-	52.7 (51.1, 54.3)	-	-	62.7 (61.4, 64.0)
<b>ส่วนที่ 12</b>	<b>โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี</b>									
	ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่เคยได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่นับรวมกรณีบริจาคเลือด	25.2 (24.3, 26.0)	23.2 (22.1, 24.3)	27.1 (26.1, 28.0)	24.6 (22.7, 26.6)	24.9 (22.7, 27.0)	24.4 (22.5, 26.3)	21.0 (20.1, 21.9)	18.9 (17.9, 19.9)	23.1 (21.9, 24.2)

ความชุก (ร้อยละ) / ค่าเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บที่สำคัญ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
ส่วนที่ 13	<b>การบาดเจ็บ</b>									
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อขับขี่ รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	52.4 (50.9, 54.0)	53.2 (51.6, 54.8)	51.4 (49.7, 53.2)	54.0 (51.9, 56.2)	54.5 (52.2, 56.9)	53.4 (51.3, 55.5)	52.6 (51.0, 54.1)	52.9 (51.2, 54.5)	52.2 (50.5, 53.9)
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อโดยสาร รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.3 (25.8, 28.8)	27.4 (25.8, 29.1)	27.2 (25.7, 28.7)	30.9 (28.2, 33.5)	31.0 (28.7, 33.4)	30.7 (27.8, 33.7)	30.5 (29.0, 32.0)	30.6 (28.9, 32.2)	30.4 (28.9, 32.0)
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัด นิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อขับ รถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	67.0 (65.5, 68.6)	68.0 (66.4, 69.5)	64.9 (62.7, 67.1)	68.3 (66.3, 70.2)	69.2 (67.1, 71.2)	66.3 (64.2, 68.5)	66.8 (65.3, 68.3)	63.8 (61.7, 66.0)	68.2 (66.7, 69.8)
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่คาดเข็มขัด นิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อโดยสาร รถยนต์ตอนหน้าใน 12 เดือนที่ผ่านมา	50.1 (48.8, 51.5)	51.5 (49.9, 53.0)	48.8 (47.3, 50.3)	51.2 (47.8, 54.5)	51.2 (48.0, 54.4)	51.1 (47.5, 54.7)	48.5 (47.1, 50.0)	49.1 (47.4, 50.7)	48.0 (46.4, 49.6)
	ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับขี่ รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วัน ที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับขี่ รถจักรยานยนต์อายุ 15-74 ปี	15.7 (15.0, 16.4)	27.0 (25.8, 28.1)	3.3 (3.0, 3.6)	15.5 (14.3, 16.8)	26.8 (24.9, 28.8)	3.4 (2.9, 3.9)	19.8* (18.6, 21.0) 16.4** (15.2, 17.7)	21.9* (20.5, 23.2) 18.1** (16.7, 19.6)	10.9* (9.6, 12.3) 8.5** (7.2, 9.8)
ความชุก (ร้อยละ) ของผู้ที่ขับรถยนต์ หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายใน 1 ชั่วโมง ใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรที่ขับรถยนต์อายุ 15-74 ปี	8.5 (8.0, 9.1)	14.9 (13.9, 15.9)	1.7 (1.4, 2.0)	10.1 (9.2, 11.0)	17.7 (16.2, 19.3)	1.7 (1.4, 2.1)	12.1* (11.2, 13.1) 9.8** (8.8, 10.7)	12.9* (11.8, 14.0) 10.5** (9.5, 11.5)	7.0* (4.9, 9.0) 4.2** (2.7, 5.6)	

\*ช่วงเวลาปกติยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

\*\*เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์